

# دوا کا انتخاب

ترجمہ

سیلکٹ یوریمیڈی

مصنفہ  
ہومیوڈاکٹر داس شمشیر

مترجم

ہومیوڈاکٹر محمد عرفان  
گلدیپ جسن

عرفان پبلیشرز چنیوٹ بازار فیصل آباد  
فون نمبر ۲۳۸۱۲ — ۶۱۶۶۶۶ — پاکستان

# دوا کا انتخاب

ترجمہ

ملیکٹ یو ریمیڈی

مؤلف  
ہومیوڈاکٹر واس بشمیر

ترجمہ

ہومیوڈاکٹر محمد عرفان  
گلدیپ حسین

عرفان پبلشرز چنیوٹ بازار فیصل آباد  
فون نمبر ۲۳۸۱۲ — ۹۱۶۶۶۶ — پاکستان

نام کتاب ————— سلیکٹ یور ریسیڈی (دوا کا انتخاب)

مصنف ————— ڈاکٹر بشمیر داس

مترجم ————— ہومیو ڈاکٹر محمد عرفان - کلیدیپ جین - عطا اللہ -

اشاعت اول ————— ۱۹۸۹ء

تعداد ————— ایک ہزار

صفحات ————— ۶۱۶

قیمت ————— ۹۰ روپے

پبلشر ————— عرفان پبلشر

چنیوٹ بازار - فیصل آباد - پاکستان

فون نمبر { ۲۳۸۱۲ / ۶۱۶۶۶۶ }

# حرف چند

یوں کہنے کو تو کتاب کی جدید اشاعت پیش خدمت ہے لیکن دراصل کتاب کو از سر نو لکھا اور ترتیب دیا گیا ہے۔ بہت سے مفید اضافے کئے گئے ہیں۔ تحقیق طلب مسائل کو جھپٹا گیا ہے اور ایسے زاویوں اور گوشوں کی جانب راہنمائی کی گئی ہے جن پر بہت کچھ کہا اور سنا جاسکتا ہے۔

مجھے اس کا اعتراف ہے کہ کتاب میں خامیاں بھی ہوں گی۔ خواہ وہ زبان و بیان کی ہوں یا مواد و مضمون کی۔ یہ اس موضوع پر اردو زبان میں اولین کتاب ہے اور نقشِ اول بہر حال نقشِ اول ہی ہوتا ہے۔ اس میں خرد کی بخیر گری بھی ہو اگر تری ہے اور جنون کی پردہ داری بھی۔ البتہ اب کی بار جن نامساعد حالات، صبر آزما اوقات اور گراں بار اتفاقات میں یہ کام سرانجام دیا گیا وہ بجائے خود ایک ایسی داستان ہے جس کا تذکرہ آپ کے لئے دلچسپی کا باعث نہیں ہو سکتا، لیکن میری جراحتِ دل کیلئے سامانِ صد ہزار تنگ دان ضرور ہو گا۔ غم ہائے روزگار کو سہارنے کے ساتھ ساتھ ذہن کو اس طرف مبذول کرنا کوہِ کنی سے کم نہ تھا۔ لیکن اسکے باوجود رسوم و قیود کی سرگشتگی جاتی رہی، دوسرے فرائض کے ساتھ یہ کام بھی ہوتا رہا اور اس طرح تیشے کے بغیر مرنے کا لطف آگیا۔ اگرچہ آدھی رات کے چراغ جلے تھے اور وقت کو نہ جانے کن کن بہانوں سے نہ روکا گیا۔

ویسے کتاب اس اعتبار سے پھر رسمی طور پر ادھوری ہے کہ مجھے کسی دوست خصوصاً جناب ضمیر صاحب۔ صادق صاحب یا منظر صاحب کا شکریہ ادا نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ دبی زبان میں ناشر کا بھی شکر گزار نہیں ہونا جن کی شبانہ روز کاوشوں سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

مخلص  
ڈاکٹر محمد عرفان

# فہرست

باب نمبر	تفصیل امراض	صفحہ
۱	دماغی امراض۔	۱
۲	اعصابی نظام کی بیماریاں۔	۷
۳	آنکھیں اور نظر سے متعلق بیماریاں۔	۱۲۳
۴	کان اور سننے کی بیماریاں۔	۱۵۰
۵	ناک اور گلے کی بیماریاں۔	۱۵۸
۶	مسوڑھے، دانت، منہ اور زبان کی بیماریاں۔	۱۹۳
۷	چھاتی، پیچھے پٹروں کی بیماری اور کھانسی۔	۲۲۲
۸	دل اور خون کی نالیوں کی بیماریاں۔	۲۵۳
۹	نظام انہضام کی بیماریاں اور سپٹ۔	۲۷۳
۱۰	پیشاب کے نظام کی بیماریاں۔ عام پیشاب، مثانہ، گروے۔	۳۳۸
۱۱	آلات تناسل کی بیماریاں۔ عام بیماریاں، سوزاک۔	۳۶۶
۱۲	ہڈیوں، جوڑوں اور ہچھوں کی بیماریاں۔	۴۳۳
۱۳	جلد، بالوں اور ناخنوں کی بیماریاں۔	۴۶۷
۱۴	عام بخار۔ حُمیات۔	۵۰۶
۱۵	متفرق۔ بیشی مرض۔ کمی مرض۔	۵۲۰

پہلا باب

# دماغی امراض

دوبلہ روپ میں منسلک لائبریری  
انمبر انفاذ 20518 تاریخ 1991  
باب 1000 منجیر کتاب 219

# دماغی امراض

دماغ کا غیر حاضر ہونا (بھولنا اور سوچنا بھی دیکھئے)

منکس ماسکٹا - جاگنے پر نہ جان سکے کہ کیا جواب دے اور کہاں ہے - بیخبر جیسے کہ مدہوش ہو۔  
لیک کینیم - خریداری کرے لیکن ان چیزوں کے بغیر ہی چلا جائے - خط کو ڈاک میں ڈالنے جائے  
لیکن خط ہاتھ میں لے واپس آجائے -

بودشا - پھپکاکی یا پستی اچھٹنے میں غیر حاضری دماغ - سفیدی مائل اُبھار غارش اور جلنے کے برابر۔  
اگنس کاٹس - جنسی بے راہ روی یا جلق کے بعد پڑھنے اور خیالات کے تسلسل کو جاری رکھنے  
میں دقت محسوس کرے -

ایتھوزا - سوچنے یا دماغ کی یکسوئی کے نااہل -

سچرس کنٹرول کس - دماغی غیر حاضری - خواب دیکھنے والا - اپنی کار کے عوض غلط کار لیجانا -  
گالیاں دینا - (غصہ بھی دیکھئے)

اینا کارڈیم - لعنت طاعت کرنا چاہے اور تمہیں کھانا چاہے - یادداشت جاتی رہے -  
ہائیوسائیمسٹ { ناراض ہوئے بغیر ہی گالیاں دینا چاہتا ہو - اگر پہلی دوائی اثر نہ کرے تب دوسری  
لائسین ۲۰۰ دوائی دینا چاہیے - ایک ہفتہ میں صرف ایک خوراک ہی دی جائے -  
کالی آئیوڈیم - گالیاں دے - اپنے بچوں اور خاندان والوں کے لئے سخت اور بد مزاج -  
لیڈیم ٹک - شاید ہی اچھے الفاظ میں بات کر سکے - جب نرمی سے بھی بولا جائے تب بھی تیز اور سخت  
آواز سے بولے - اس کے دوست بھی اس کو مطمئن نہ کر سکیں ، مذہبی خیالات کا جنون یا مذہبی مانجھولیا -  
اسے راضی کرنا ناممکن ہو -

## الکوحلی۔ الفولیت (خواہش بھی دیکھئے)

زنکولس بلوس۔۔۔ شرابیوں کا جنون۔

کافیا۔ شراب نوشی کی وجہ سے سر درد۔ جیسے کہ سر میں کیل گاڑے جا رہے ہوں۔ کھل ہو امیں باقی  
بے خوابی۔ بے اختیار ہنسی اور زندہ دلی۔

انٹم کروڈ۔ شراب نوشی کے بعد کافی عرصہ تک جی تھلانا۔

کیسپیکم۔ صبح کے وقت کی تھ۔ معدہ کی قتل۔ ڈراوے خواب اور ہڈیاں۔

زنگم۔ تھوڑی سی مقدار میں شراب نوشی سر درد۔

کینتھرس۔ مریض پیشاب کی تکلیف اور جنسی براہینگی کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔

اسام یورپیم۔ شراب کی زبردست خواہش۔

ایوناسٹائوا۔ اعصابیت اور بے خوابی۔ شراب کی خواہش دور کرتی ہے۔

سمی تی فیوگا۔ بخوابی ذہنی دباؤ کے ساتھ اور ہلکے ہڈیاں کے ساتھ۔

نکسوامیکا۔ انگوری شراب یا دی شراب سے اعصابیت۔ تھوڑی سی آواز سے ڈر جاتا ہے۔

رات کو ڈراؤنی چیزیں نظر آئیں۔ یہ دی شراب کے اثرات کو دور کرتی ہے۔ جیسے کہ تھیر معدہ

سرطان۔ بے چینی وغیرہ۔ حد اور رنگ کا رجحان۔ گول یا خنجر بھونکنے سے خود کشی کا رجحان۔

ایو سائیم کینابیس۔ حد شراب نوشی کے لئے۔

ہائوسائرس۔ مستقل ہڈیاں زیادہ بولنے اور بے خوابی کے ساتھ۔ بیاض تھ ہنسنے یا رنے کیساتھ۔

کینابیس انڈیکا۔ پرتشدد اور زیادہ باتونی خراب کی وجہ سے توہمات اور بدگمانیاں بڑھی ہوئی

چیزوں کے متعلق۔ وقت اور علاقہ کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ چہرہ سنا پتلیاں پھیلی ہوئیں اور جلدی

بیسینہ کا آنا۔

اوپیم۔ پرانے پامیوں کے لئے۔

سلفیورک ایسڈ۔ مزین شراب نوشی کی بلند ترین دوا کی تھوڑی سی مقدار خوراک بھی برداشت

نہ کر سکے۔ دسکی ملائے بغیر پانی نہ پی سکے۔ بلانڈی کی زبردست خواہش مریض پتلا تھوڑوں والا تھوڑا

سٹرا مونیم - مادی شرابیوں کیلئے بہترین - ہر کوئی سے اپنی طرف جانو آتے ہوئے دیکھے - اور ان سے بچنے کی کوشش کرے - چہرہ سُرخ چمکدار - تو بہت اور اداہم -

کوئیم - تھوڑی سی شراب یا انگوری شراب پانی ملا کر پینے سے بھی مدہوش ہو جائے - کوکا - شرابی مشروبات کی خواہش -

سفلینینم - کسی بھی صورت میں شراب کی خواہش - شراب کا درشتی رحمان -

الیومنا - آسانی سے نشہ ہو جائے خواہ تھوڑی سی شراب پی جائے -

لیکس - بد طینت لوگ بڑے بڑے جرائم کار جمان رکھنے والے - منتقم مزاج - حاسد - دوزخ کا بڑا چاہنے والے - اپنے آپ کو انہیں دوسروں کو مارنے والا - شراب نوشی سے پہلے اور شراب نوشی کے دوران میں بہت باتیں کرے -

پیٹرولیم - بغیر طاقت کے تیلے والے ، قوت ارادی نہ رکھنے والے - شراب کے گلاس کو دیکھ کر انکار نہ کر سکے - تھوڑی سی زیادہ شراب پینے پر تے کرے - جب پی لے تو بہت بولے -

آرمینیکم الیم - شراب کی پیاس ، جوڑی کی دوائی بھیجے ، اسے پہلے آزمانا چاہیے - تے کا جھان - اور اس سہال کا بھی - شرابیوں کا بازوؤں کا کاٹنا -

چائرس آف - جو لوگ شراب پھوڑنا چاہیں ، ان کی عادت کی اطلاع کے لئے ہر روز دن میں دو دفعہ دس سے تین قطرے دیجئے - (نوٹ) مذکورہ بالا ادویات ہر دفعہ ۲۰۰ پونسی سے کم ہرگز نہ دیجئے (یا بھر جو لکھی ہوئی پونسی ہو) حتیٰ اگر شراب کی خواہش مکمل طور پر دور ہو جائے -

### غصہ - (رنجش بھی دیکھئے)

سٹیفسگیا - غصہ یا غصہ کے بالعد اثرات کے لئے بہترین دوائی ہے - جذبات کے دبنے سے زبان تنگ ہو جائے - چوٹی سے ایڑی تک کانپنے - بخوابی - اپنے آپ کو قاتل ہونے نہ رکھ سکے - معمولی سی حرکت یا الفاظ جذبات کو بھڑک کر دیں - جلد ہی غصہ میں مبتلا ہو جائے - لیکن شاذ و نادر ہی اسکا اظہار کرے -

کیونکہ یہ بچوں میں غصہ جس کے نتیجہ کے طور پر اسہال، کھانسی اور تشنہ لڑا کا بچہ۔ بچہ ہر نٹ نٹی چیز کی خواہش کرے لیکن پیش کرنے پر انکار کر دے۔ خادم کے چہرہ پر مارے۔ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کیلئے معمولی معمولی چیزوں پر آپے سے باہر ہو جائے۔ ہر حصہ CM یا IM کی ایک خوراک دیجئے۔

آرم فولیٹم۔ جب غصہ کے اخراج کا موقع نہ پائے تو کانپے۔ کسی کو بے عزت کرنے کیلئے لڑنے کی کوشش کرے۔

بیوفو۔ اگر غلط سمجھا جائے تو ناراض ہو جائے۔

کالوسٹنٹس ۲۰۔ خاموشی سے جذبات کو ٹھیک پہنچنے پر برہمی (خادما یوسی) جو کہ شدید اعصابی درد کا باعث ہو، سر میں، آنکھوں میں، بڑی آنت اور اعصاب کے ساتھ تکلیف۔ کلکیر یا کارب۔ مباشرت یا بھلے کے بعد غصہ۔ نکس مار کاٹا۔ حمل کے دوران میں غصہ۔

آرم میٹ۔ } معمولی سے اختلاف رائے سے غصہ۔  
نکس وایکا۔ }

ایڈوڈم ۲۰۰۔ شدید غصہ، جو بھی نزدیک آئے اسے قتل کرنا چاہے۔ جب اپنے آپ میں ہوتو خوشی محسوس کرے۔

ہیپر سلف۔ لڑا کا اس سے نباہ کرنا مشکل ہو۔ کوئی چیز خوش نہ کر سکے۔ اشماس اور جگر ہوں کیلئے بہت زیادہ حساس جو اس کو پسند نہ ہوں۔ مستقل طور پر اشماس۔ چیزوں اور ماحول کو تبدیل کرنا چاہے لیکن تبدیل شدہ چیزوں سے بھی ناخوش اور شدید مزاج ہو۔ کالی آئیوڈ۔ شدت کی تنگ مزاجی۔ ظالمانہ اور تند مزاجی کا سلوک اپنے خاندان والوں سے اپنے بچوں اور دوسروں کے ساتھ، گالیاں دینے والا۔

نیرم آریسیک۔ معمولی چیزوں سے غصہ۔  
کرکس ٹائیوا۔ شدت کے ساتھ غصہ جس کے بعد پھپھٹائے۔

## جھنجھلاہٹ - (غصہ بھی دیکھو)

سٹیف گیریہ - ۲۰۰ - تھوڑے سے الفاظ جو غلط محسوس ہوں، غصہ اور برہمی پیدا کریں۔ جو لوگ خیالی برہمی کا باعث بنیں ان پر چیزیں دے مارنے کی زبردست خواہش۔  
 کوکولس انڈیکا - تھوڑی سی گرہ بڑھری کا سبب بنے۔  
 آرسینکیم البم - شور یا روشنی کی وجہ سے غصہ آئے۔  
 کوئیم - معمولی باتیں غصہ کا باعث بنیں۔

ٹیوبریکولینیم<sup>۲۱</sup> - ٹیڑھا اور بد مزاج بچہ کپڑوں کو دور پھینک دے، دوسرے بچوں سے بغیر کسی وجہ کے گستاخ ہو۔ چہرے پر کبھی سکراہٹ نہ ہو۔ غصے کا خوفناک طوفان۔ شدید غصہ اور بلند آواز سے روئے جو ضبط نہ ہو سکے۔ دو ماہ تک ہفتہ وار ایک خوراک، اگر ضرورت پڑے زیادہ دیر تک دی جا سکتی ہے۔  
 فاسفورس<sup>۲۲</sup> - وحشی غصہ، بد مزاجی کا طوفان ذہنی اور جسمانی طور پر سکول میں بچوں اور اساتذہ کے ساتھ لڑے۔ قابو میں نہ آنے والا بچہ۔ جب غصہ میں آئے اپنے کو غسل خانہ میں بند کر لے۔ آسانی سے ڈر جائے۔ ڈر کی وجہ سے کانپے اور ہلے۔ اندھیرے ڈرے۔ دہلی پی خواہ صورت جماعت۔  
 ایکولس - جلدی سے آپے سے باہر ہو جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ قابو پالے۔  
 (دیکھو ڈر، اندیشہ، دوسرہ، پریشانی)

## نفرت

اگنیشیا - دل لگی۔ تباہ کو کے دھوئیں اور تباہ کو نوشی کو برداشت نہ کر سکے۔  
 سپیا - خاندان کے افراد۔ کاروبار اور اپنے پیسے مخالف جنس سے نفرت۔ زور در پنج بے رخی  
 تھکا ہوا - اندھیرے میں الگ رہنا چاہے۔ میر سے نفرت پیدا ہو۔  
 پلاٹینا - سبکدوشی وجہ سے اپنے گھر کے افراد اور دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ دارفِع خیال کرے۔

پلسٹیل - عورتوں سے، جماعت سے۔ شادی۔  
 کیڈم سلف - ذہنی یا جسمانی کام کرنے سے نفرت۔

ایکونائٹ نیپلس - گانے کیوجہ سے رونا آئے یا گانا ملائے۔  
گریفائٹس - گانے سے نفرت۔

ریفینس - عورتوں میں مخالفت صنف سے نفرت۔  
نکس و امیکا - بد معنی کیوجہ سے کام سے نفرت۔ اگر وہ کام کرے تو غلط کرے۔  
پلمبم - کام سے نفرت جب مزن پچیش ہو۔  
سائیکیمین - بد معنی میں کام سے نفرت۔ گوشت سے نفرت۔ روٹی۔ نمکس اور بہتر شراب سے نفرت۔  
نیزم میور - روٹی چربی اور امیرانہ خوراک سے نفرت۔  
لیک - ویک - ڈیفلو - دودھ - آدمیوں عورتوں اور بچوں سے نفرت۔ دودھ نہ پی سکے کیونکہ یہ  
انہیں بیمار کر دیتا ہے۔ لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ بولنے سے نفرت، دودھ پینے سے مراد۔  
گلوزائن - خاندان سے نفرت۔

چیلڈرٹم - کام کرنے یا کھانا کھانے کی حرکت کرنے سے نفرت۔ پیر سے نفرت۔  
آجنٹم تاٹیکیم [خزن و ملال میں کام کرنے سے نفرت۔ اگر پہلی دوا مدد نہ کرے تو  
لیکسس] دوسری دوا آزمائی جاتی جائے۔  
ایسڈ تھیور - خاندان کے افراد اور بہترین دوستوں سے نفرت۔ گھر سے دور جانے کی خواہش۔  
عباش نش آدمیوں میں کینہ پن جنسی بے راہروی کی وجہ سے۔  
کوئم - کام کرنا نہ چاہے کھیل کو ترجیح دے  
کاجوٹم - اگرچہ دوسروں کی بات سننا چاہے لیکن بلایا جانا پسند نہ کرے۔ جن کتابوں کو عام طور  
پر پڑھتا ہو ان کو اندر سے دیکھنا نہ برداشت کرے۔ اپنی ہی صنف کی مجلس سے نفرت۔  
نیزم کارب - زیادہ مطالعہ کیوجہ سے کام نہ کر سکا۔ دودھ سے نفرت کیونکہ اگر پی لیا جائے تو  
اسہال لاحق ہو جائیں۔

پکرک ایسڈ - شادی سے نفرت۔ شادی کا خیال ناقابل برداشت۔  
کائی ٹیکرڈیکم - گوشت سے نفرت اور چڑچا پن کے ساتھ۔

کوکولس - کھانے اور پینے سے نفرت -  
 کلکیر یا کارب - بھوک کم، گوشت سے نفرت کے ساتھ اور ابلے انڈوں کی زبردست خواہش -  
 ایسڈ ٹائٹرک { گوشت کا دیکھنا یا خیال کرنا ہی برداشت نہ کر سکے -  
 ایسڈ میور { گوشت سے نفرت -  
 لائیکوپوڈیم - کافی اور گوشت سے نفرت - ان کو لینے سے نفرت ہو -  
 ویرٹرم ورائیڈ - مٹھائیوں سے نفرت - پانی کا ذائقہ بھی مٹھا معلوم ہو -  
 ابرو ٹینم - سوکڑے کئے بچوں میں دودھ سے نفرت، جو دودھ میں اُبلے ہوئی روٹی کے بے حد  
 مشتاق ہوں، اپنی بھوک مٹانے کے لئے -  
 ایہونا - آٹوؤں سے نفرت جو اس ذائقے گوشت سے نفرت جس کا کوئی ذائقہ محسوس نہ ہو یا  
 بیئر شراب سے نفرت -  
 ایو منافاس - قریب بیٹھنے سے یا مجلس میں بیٹھنے سے اور جواب دینے سے نفرت -  
 انٹرم ٹارٹ - دودھ سے نفرت جو کہ مریض کو بیمار کر دے - متلی اور تھے لاحق ہو - ہر قسم  
 کی غذا سے نفرت -  
 اوسیم - کافی یا مٹھا کو سے نفرت - ان کی بو سے کراہت اور خنفر -  
 پٹرو لیم - چربی غذا سے، گوشت، کھلی ہوا سے سخت نفرت، گوشتی کھانے سے زیادتی ہو -  
 کیومیلا - کافی، گرم مشروبات - شوربے اور مائع غذاؤں سے نفرت -  
 سیلشیا - والدہ کے دودھ سے نفرت جب بھی پیا جائے تو کر دے -  
 میگنیٹ پوٹس آسٹریس - بات چیت کرنے سے نفرت -  
 اپیکالک - ہر قسم کی خوراک سے سخت نفرت اور ناپسندیدگی -  
 کاربووٹج - قلیل ہضم اور اچھی خوراک سے نفرت - کافی اور کھائیوں کی خواہش -  
 سٹرومنیم - نباتات سے نفرت، پانی کا ایک گھونٹ بھی جب اس کے ہونٹوں کے قریب لایا  
 جائے تو سخت تشنچ پیدا ہو جائے - مائع صوف مشکل کے ساتھ ہی گلے کے اندر اتاری جاسکے -  
 گرائڈیلیا - اندھیرے سے نفرت، تمام رات کمرے میں روشنی چاہے -

ٹرنٹولا ہسپانیولا۔ کانے سے حساس بوخنی کا نام ہے وہ کود مائیگی اور ناپنا شروع کر دے گی۔  
تھرڈ لیون۔ شور سے نفرت۔ ہر آواز پر تمام جسم میں داخل ہوتی محسوس ہو۔ متلی اور چکر کا ہوش۔  
دانٹول میں آواز داخل ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر زیادتی ہو۔  
یٹوبرکولینم۔ ہر قسم کی خوراک۔ گوشت جس کو کھانا ناممکن ہو۔

## ذہنی تھکان، وپریشان، اعصابی کمزوری، گرٹھنا،

ایسٹرناس۔ اپنی حالت گرٹھنا۔ محبت میں ناکامی پر گرٹھنا۔  
اگنیشیا۔ تصوراتی تلخ واقعات اور تکالیف پر گرٹھنا یا پریشان ہونا۔  
نکس و امیکا۔ مقدسے باری پر پریشان ہونا جس کا ابھی فیصلہ ہونا ہو۔  
لیئم گنگ۔ تھکا ماندہ، پھلانا بیٹھ سکے لیکن پریشان ہو اور ماضی کے متعلق بہت سوچ بچار کرے۔  
درمیرم البم۔ خاموشی میں پریشان ہو یا گرٹھے۔  
جیلمسیم۔ بچے کے گم ہونے پر متواتر پریشان۔

## دھوکہ دہی - (دیکھئے دھوکہ)

غیب دانی۔ آئندہ ہونے والے واقعات و حالات کی پیش گوئی کرنا۔  
ایوڈوم۔ چوٹی کی دوائی ہے جب مریض پاگل ہونے کے قریب ہو۔ بغیر کسی وجہ کے تشدد پسند۔  
چیزوں کو پیٹنا اور تباہ کرنا۔

لائی سین۔ کہے کہ کھاک یا گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتا ہے جو کہ نظر کے سامنے بھی نہیں۔  
کہے کہ فلاں آدمی جو کہ اس کی نظر میں نہیں کہاں بیٹھا ہے۔

ایکونائٹ نیپس۔ کہے کہ اس کی مجبورہ جو کہ میوں دُور ہے فلاں غاص گیت گا رہی ہے۔  
فاسفورس۔ بہت کم حوصلگی۔ ڈرے۔ آسانی سے ناراض ہو جائے۔ پیشین گوئی کی حالت میں۔  
اگر کیس میکرس۔ شعر کہنے کا رجحان اور پیش گوئی کرنے کا رجحان۔

## رفاقت یا صحبت، نفرت

- کالونٹھس - دوستوں سے نفرت، ان سے دُور رہنے کی کوشش کرے۔  
 کیٹس - ہسٹیریا میں۔  
 کونیم - حیض کے دوران میں رفاقت سے نفرت لیکن ایسے رہنے سے ڈر۔  
 نیرٹم میور - حمل کے دوران میں۔  
 کیو پرم میٹ - درد کے دوران۔  
 بیوفو - رفاقت سے نفرت تاکہ جلق یا ہتھوڑی کر سکے۔  
 اگنیشیا - اعصابی مریضوں میں۔  
 کاجوٹم - اگرچہ قدرتی طور پر پشیملا ہو عورتوں کی رفاقت میں اچھا محسوس کرے۔  
 آدیوں سے بات چیت کرنا نا چاہے۔  
 پاسٹیلدا - مخالف صنف کی رفاقت سے نفرت جسے ذہنی طور پر خطرناک خیال کرے۔  
 لائیو کو پوڈیم - رفاقت سے نفرت لیکن قریب والے کمرے میں کسی کی موجودگی چاہے۔

## خواہش

- آرم میٹ - دل کی بیماریوں میں۔  
 کونیم - ہسٹیریا میں۔  
 سٹرامونیم - پاگل پن میں روشنی کی خواہش۔  
 آرچٹم ٹائٹریٹیم - اپنی بیوی یا بچے کو رفاقت کیلئے جگائے۔ اکیلا رہنے سے ڈرے۔  
 آر سینک البم - رفاقت چاہے جو کہ اس کے ڈر کو کم کرے۔  
 بیکسوئی - ( دیکھئے سوچنا۔ اور بھولنا ) - اعتماد کی کمی۔  
 اینا کارڈیم - اپنے آپ میں۔ پاگل پن جس میں اعتماد کی کمی۔  
 لائیو کو پوڈیم - ہسٹیریا میں۔ معالجوں اور علاجوں پر بے اعتمادی۔  
 آرم مرڈ - ریخیال کرے کہ اسکے لئے ان معالجوں کے پاس دوائی نہیں ہے۔ اور یہ بات اسے غمزدہ کر دے۔

## ذہنی تھکان

سلفر - صبح کے وقت جاگنے پر  
ایسیکوس ہپ - ذہنی پریشانی کے ساتھ جاگے۔ پریشانی میں بکری میں ہر طرف دیکھے۔  
تھیر، لوگوں کو نہ جانتا ہو۔ جیلان ہو کہ وہ کہاں ہے اور جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہے اس کے کیا معنی  
ہیں۔ بہت زیادہ غمی۔ تنک مزاجی۔ یادداشت کا نہ ہونا۔ اور کام سے نفرت۔ مطلوبہ چیزیں  
حاصل نہ کر سکنے پر غمی۔

زنکم۔ اعصابی امراض۔ سرخ بنار یا گرمی کی تکالیف سے دماغ متاثر ہو جائے۔  
بیسلاڈوٹا۔ ہڈیاں کے بعد۔

لیکس۔ ڈیفیئر یا میں۔

نکسوامیکا۔ کھانا کھانے کے بعد پریشانی اور ذہنی دباؤ اور بہت کم جسمانی کام سے۔  
کالی بڑم۔ مایہ نولیا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے عقل و ہوش کھودیتے کا احساس۔  
جلیسیم۔ محلو میں۔ ہتھ پری کرنے والوں میں۔

سٹراونیم۔ آدھی رات کے بعد پریشانی میں اٹھنا اور ادھر ادھر پریشانی میں چلنا چکر وں کیا تھ پریشانی۔  
پکرک الیرٹ۔ ذہنی تھکان کو پڑی یا پشت میں درد۔ گردن کے حصے میں۔ ادنی لوگوں اور  
اساتذہ کی ذہنی تھکان۔ قوت ارادی کی کمی۔ بولنے یا سوچنے یا دماغی کام کرنے سے نفرت۔  
وہ چیزوں میں دلچسپی کھودیتا ہے۔ کسی بھی دماغی کام سے مشغول ہو جاتا ہے۔

پٹرولیم۔ ذہنی تھکان اور پکر۔ اتنا بدحواس ہو کہ گلی میں اپنا راستہ بھول جائے۔ خیال  
کرے کہ اس کے قریب اور لوگ بھی ہیں جبکہ کوئی بھی نہ ہو۔ اس کے دہرے بازو ہیں۔ اس  
کے ساتھ بستر میں کوئی دوسرا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ ہونے کے خواب دیکھے۔

کلکیر یا کارب۔ ذہنی تھکان، سوچ نہ سکے۔ ڈرے کہ نا خواستہ ہے۔ ناکامی کا درد۔

اندرونی تناؤ۔ عزت نفس کے مجروح ہونے پر افسردہ

کوکا۔ ذہنی اور جسمانی دباؤ تلے کمزور ہونا۔ یا قیلے ہونا۔

الطیلم پیدا۔ شراب کے بعد۔

الیومنا۔ ذہانت کی تھکان۔ فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ قوت فیصلہ صدمہ برم۔ جانی پہچانی چیزیں یا جن کو جانتا ہو، انہیں غیر حقیقی معلوم ہوں یا ان کے متعلق شک کر وہ میں یا کہ نہیں۔ امبر اگر سیا۔ ذہنی تھکان۔ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف چلے جانا۔ ایک سال بچھے جواب کا انتظار کیے بغیر دوسرا بچھے۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر چلا جائے۔ قبیل از وقت پڑھایا۔

ہائیدر و مائینک الیڈ۔ دماغ پر بادل چھائے ہونے کا احساس۔ سینٹورائینگنا۔ احمق پن دماغی ابتری۔ کسی ایک چیز پر دماغ کو مرکوز نہ کر سکے۔ ایک چیز کو شرف کرے اسے نامکمل چھوڑ کر دوسری چیز کرے۔ آہستہ آہستہ دماغ کو مرکوز نہ کر سکے۔ یادداشت کھو بیٹھے۔ پریشانی محسوس کرے کہ اچانک مر جائے گی۔ بدگمانی کرے کہ اس کا خاندان اسے پاگل خانے بھیج دے گا۔ غلط بس یا غلط کاری پر سوار ہو جائے یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں جا رہی ہے جب صحیح راستے پر جائے تو صحیح جگہ پر سے اترے بغیر گزر جائے۔

ڈلکا مارا۔ ذہنی الجھاؤ کسی چیز کے لئے مجمع لفظ نہ مل سکے۔ ایسٹک الیڈ۔ ذہنی الجھاؤ، اپنے بچوں ہی کو نہ پہچانے۔ تازہ واقعات کو بھول جاتا ہے۔ ذہنی کوفت کے دھرے۔ چڑچڑاہٹ۔ خیال کرے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایگریس میکرس۔ بیوقوفانہ اور نکلی باتیں کرے۔ نامناسب موقع پر گاتا ہے اور ریشیاں بجاتا ہے شعراور مشین گوایاں کرے یا مخالف سمت میں بھول کر جائے۔ اپنے ماحول سے لاتعلقی ہو، خود سر ضدی اور مشکبہ۔ بیوقوف۔ بد وضع اور بے دھنکا۔

اینا کارڈیم۔ دماغی کمزوری اگر مکمل طور پر فائر العقل نہ ہو۔ آہستہ آہستہ سوچے۔ یادداشت کمزور کمزور۔ غمی اور دماغی کستی۔ متلون مزاجی ٹھیک یا غلط فیصلہ نہ کر سکے۔ بچکچائے اور کچھ نہ کرے۔ کینا بس سٹائیو۔ اپنی شخصیت کو کھڈا کر لے۔ دماغی الجھن کے ساتھ جکر۔

سکون و اثر۔ دیکھئے ہونگے کی اور تمام دہری حسیات درم بہم اور گلوٹ۔ اپنا گھر اور جانی  
بہجانی جگہیں اور چہرے عجیب و غریب معلوم ہوں۔

سلیشیا۔ طالب علموں، دکلاء اور پادریوں میں ذہنی تھکان۔ مستقل کوششوں سے اپنا  
کام مکمل کرنے کے لئے مثبت بیداری کی وجہ سے۔

### دلجوئی۔ دلاسا

نظیم میوٹرکیم۔ خنک اور ررنے والی حالت۔ دلجوئی کرنے پر زیادتی ہو۔

للیئم مگر نیم۔ رحم کے جنوں میں دلجوئی کرنے پر زیادتی۔

پسٹیل۔ مریض کی دل جوئی کرنے پر مرض میں آفات محسوس کرے۔

اگنیشیا۔ ہسپتالی مریضوں میں دلجوئی کرنے پر علامات مرض میں زیادہ ہو جائے۔

سپیشیا۔ قبض کے ساتھ لکیر یا میں دلجوئی کرنے پر علامات مرض میں زیادتی ہو جائے۔

کافیا۔ دلجوئی ذکر انا چاہے اور اکیلا ہی اپنی سخت بُری حالت سے لطف اٹھائے۔ خوش طبی

کرنے پر ناراض ہو جائے یا اسے خوش کرنے کی کوشش پر ناراض ہو جائے۔

سیبل سر۔ ہمدردی اسے ناراض کر دے۔

### تردید!

آرم میٹ۔ تردید سے تکالیف لاحق ہو جائیں۔

لائیکوپوڈیم۔ تردید کو برداشت نہ کر سکے۔

کافیا۔ تردید سے سہ درد لاحق ہو جائے

فیروم میٹ۔ تردید کو برداشت نہ کر سکے۔ لڑاکا۔

زبردست خواہش۔ دیکھئے خواہش

### موت۔ بختمہ یقین

ہیشیا۔ ٹائیفاؤڈ بخار میں۔

لیکس۔ - تنگی تنفس میں۔  
 سوراٹیم۔ - ٹائیفاؤڈ بخار لیکن ناک سے خون نکلنے پر افادہ۔  
 کیمفورا۔ - تبخیر معہہ میں۔  
 آپس۔ - دل کی طبعی بیماریوں میں۔

کانیا۔ - درد زہ میں

ایکونائٹ نیلس۔ - حمل کے دوران میں موت کے ڈر کے ساتھ۔  
 ہیلی بورکس نائیگرا۔ - موت کے ڈر کے بغیر موت کے دن کی پیش گوئی کرے۔  
 ڈر

ایکونائٹ نیلس۔ - حمل کے دوران میں موت کا ڈر۔ - موت کے دن اور وقت کی پیش گوئی کرے، یقین ہو کہ اس کی بیماری مسلک ثابت ہوگی۔

ڈیجٹلس۔ - دل کی بیماریوں میں۔

نکس وامیکا۔ - خودکشی کا رجحان۔ لیکن مرنے سے ڈرے۔

الیوننا۔ - موت کا ڈر، خودکشی کے رجحان و خیالات کے ساتھ۔

کالی فاس۔ - زندگی کی تھکاوٹ کے ساتھ۔

ورٹیرم البم۔ - ہیضہ میں ماتھے پر ٹھنڈے پسینوں کے ساتھ۔

کوکولس۔ - موت کا ڈر اور نامعلوم خطرے کا ڈر۔

ادییم۔ - سر پر کھڑی موت کا ڈر۔ ڈر اور وحشت کے اظہار کے ساتھ۔

آرینیکم البم۔ - جب اکیلا ہو تو اچانک موت کے آنے کا ڈر۔

اکلیساپائیکٹیا۔ - موت کا ڈر خاص طور پر رات کے وقت بستر میں۔

خواہش

آرم فول۔ - خوشی کی ساتھ موت کی خواہش کیونکہ وہ بھٹا ہے کردہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔

آرم میٹ۔ مستقل طور پر خود کشی تیز ہوا ہونے کی خبر ابھی کیوں ہے بہت زیادہ غم خیال کرے کہ وہ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر کام کو غلط طریقہ پر کرے۔ نا اُمیدی ایسے زندہ رہنے پر راضی نہ ہو۔ خیال کرے کہ وہ اس دُنیا کے لئے موزوں نہیں۔

### دھوکہ دینے والا

پلیم۔ دھوکہ اور غریب دینے کا رجحان۔ آہستہ بخمچے قبض، بیماری کا بہانہ بنانا۔ اپنی تکلیف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔

کوکا۔ صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ جائے۔ چڑچڑا۔ علیحدگی اور تاریکی میں غم۔  
آر جیٹم ٹائٹریکیم۔ ڈرپوک اور اعصابی غشی اور کانپنے کا احساس۔ دھوکہ دینے کا رجحان۔  
کاسٹیکیم۔ دھوکہ دینے کی خواہش رٹائی کے رجحان کے ساتھ۔ ناحق پریشان۔ توہم پرست  
قریب نظر۔ ادراک۔ موہم ہیکر۔ اندیشہ

سٹر امونیم۔ جانوروں کو دیکھنا، سیاہ کتے وغیرہ (ان علامات پر غور کیا کا علاج بھی کرتا ہے)۔  
اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ لبا اور ایک حصہ کم محسوس کرنا۔ اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی چیزیں علیحدگی اور اندھیرا نہ ہواشت کر کے۔ روشنی اور کسی کی موجودگی محسوس ہو۔ بھرت دیکھے اور ردحوں کی آوازیں سنے اور ان سے باتیں کرے۔ ایسے محسوس کرے کہ عیسویں کا بہت بڑا جتہ اس کا بچھا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھڑوں کا جلوس۔ اور اس کے بعد کا درچوں کا بہت بڑا اکھڑ رنگ کراس کی طرف آ رہے ہیں۔ اپنی اطراف ڈراوٹی تصاویر اپنے سامنے کے مقابلے میں حقیقت گیت گائے اور نمش باتیں کرے۔ قریب نظر اندھیاں۔ تیز آواز۔ بھونکنے کی گوشش کرے یا کاشے کی گوشش کرے چیزوں کو غلط نام سے پکارے۔ بوٹہ لکڑی کی گیلیاں محسوس ہوں۔ اس کے سونے کا کرہ اصطبل کی طرح۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھے۔ دغلا کرے۔ پیشین گوئیاں کرے۔

کلوریلیم۔ رات کو سخت خوفزدہ۔ پادریوں کے خواب دیکھے۔ اندھیرے میں یا آنکھیں بند کرنے پر آوازیں سنے۔

لیک کینیم۔ سانپوں کے توہمات۔ خیال کرے کہ وہ ان میں گھرا ہوا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے

ٹھکے کرمانپ کاٹ کھائیں گے۔ اپنے آپ کو میں چلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اذیت دینے والے خیالات  
 باتوں میں حقیقت نہ ہو۔ سمجھے تو کچھ وہ کہہ رہی ہے بھڑپ ہے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اسکی  
 مرضی یا خصوصیات نہیں۔ کسی اور کی ناک پہنے ہوئے ہے۔

سبا ڈیلا۔ اپنے جسم کے متعلق غلط معلومات، جس طرح پیٹ ہوائے پھولنے پر اپنے آپ کو حاملہ  
 پلاٹیم۔ تکبر اپنے آپ کو بہت بلند خیال کرنا۔ خیال کرے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ خیال کرے  
 کہ اس کا جسم دوسروں سے لمبا ہے۔ مغرور و خود سر۔

کیمفر۔ ہر بلنے والی چیز بھوت معلوم ہو، مکرے کی بے جان چیزیں زندہ معلوم ہوں اور اُسے  
 ڈرائیں۔ بہت زیادہ اعصابی۔ اجنبیوں اور اندھیرے سے ڈرے۔

کلیریا کاب۔ جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان کو دیکھے اور ان سے باتیں کرے۔ خیال کرے کہ وہ  
 کتوں سے گھری ہوئی ہے۔ ہر کام سے نفرت۔ غمگین اور ادا اس۔ ڈرے پر اور زندگی سے طرز  
 ایلنٹھس۔ محسوس کرے کہ چوٹا یا کوئی چیز بازو یا جسم پر رینگ رہی ہے۔

اینا کارڈیم۔ مریض اپنے آپ کو اچھائی اور بڑائی کے درمیان پاتا ہے۔ اس کی باہر کی توت ارادی  
 اس سے بڑی کا کام کرنا چاہے۔ لیکن اس کا ضمیر ایسا کرنے سے روکے۔ فیصلہ نہ کر سکتا۔ ایک  
 لمحہ وہ سوچے کہ ایسا ہے اور دوسرے لمحے بہت سے دلائل سوچے کہ ایسا نہیں کم حوصلہ۔ بطل  
 ڈرے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ چوروں کی تلاش کرتا ہے۔ دشمنوں کی توقع کرتا ہے۔ ہر چیز  
 اور ہر کسی سے خوف کھتا ہے۔ اس کی بری فطرت بغاوت اور بے انصافی پر گالتی ہے لیکن اچھی  
 فطرت رکھتی ہے اور ہٹائی ہے (ایمو مائٹس۔ بیلا ڈونا۔ اور سٹرامونیم بھی دیکھئے) بہنوں اور والوں  
 کی آوازیں سننے ہو کہ بہت ڈر رہوں۔

ہیلی بوریس ناچیکرا۔ جسم اور ذہن کا میونانہ اور سست رویہ۔ مدہوشی جس سے کہ بہت وقت  
 سے اٹھایا جائے تو اوجاع کے متعلق باتیں کرے اور کہے کہ وہ سینگوں اور مڑوں والے شیطان  
 دکھتا ہے۔ دہم بے بنیاد۔

کاشیکم۔ مجسود ضمیر جیسے کہ عورت نے جم کیا ہو۔  
 فیم آئیوڈم۔ جیسے کہ جسم ۳۰ فٹ اونچا ہو گیا ہو۔

پیشیا۔ محسوس کرے جسے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے۔

کیومیلا۔ غائب لوگوں کی آوازیں سنے جو اس کی نیند خراب کر دیں یا نیند میں خلل ڈال دیں۔

زنگم میٹ۔ اپنے اندر سے آوازیں بولتی محسوس ہوں کالی گلوچ اور گندی زبان بولیں۔

سیلا ڈونا۔ ڈراؤنے چہرے اور دیو دیکھے۔ ماتربے اور کٹا مٹا ہے۔ مریض اس وقت اپنے آپ کو یا کسی اور کو زخمی نہیں کرتا جب تک کہ وہ ایسا اپنے فطری میلے صحیح تصور نہ کرے، جو کہ وہی اس کا فطری کے غلات مریض اس پر حملہ کرے گا۔

سپاٹھیلیا۔ پریشان اور اعصابی مریضوں کیلئے۔ اُسے کے استعمال سے گزرتے کیونکہ مستقل طور پر کھانا کھانے کی خواہش رکھتا ہو۔ کھانا کھانے کے کانٹے سے خودکشی کی خواہش۔ کھانے کی میز پر تیز اور نوکدار اشیاء سے ڈرے۔

تھوچا۔ احساس کہ زندہ بچہ پیٹ میں ہو۔ جسم کو تپلا اور نرم و نازک محسوس کرے۔ آسانی سے ٹوٹنے والا جسے کہ شیشے کا بنا ہوا ہو۔

کینابلس انڈیکا۔ جگہ اور وقت کے تعین میں غلطیاں کرے۔ مریض محسوس کرے کہ اس نے پچھلے چھ ماہ سے خوراک نہیں کھائی۔ اگرچہ اس نے ابھی ابھی کھانا کھایا ہو۔ ایک میل کا فاصلہ بھی سو میل معلوم ہو۔ نامکمل خیالات سے ذہن بھرا ہوا ہو۔ گینڈو اور ہاتھیوں کا پچھا کرنے کے توہمات۔ تصور کرے کہ وہ بہترین گانا سن رہا ہے۔ آنکھیں بند کرے مزید خیالات اور خوابوں میں کھو جائے۔ تصور کرے کہ وہ ایک وسیع و عریض جگہ میں بغیر جسم کے رہ رہا ہے۔ جسم پھیلا ہوا محسوس ہو اور سر کی کھوٹری، آسمان کی عراب سے بھی بڑی محسوس ہو۔ ہر چیز غیر حقیقی معلوم ہو۔ اپنے آپ کو بھی غیر حقیقی محسوس کرے۔ سارے خیالات بہت بڑے بڑے معلوم ہوں آوازیں اور بہت ہی بہترین گانے سنے۔ خوبصورتی اور شہوری کے تصورات جن کا مقابلہ صرف بہشت ہی میں ممکن ہے۔

اسٹینیکم البم۔ گھر کو مکیتوں سے بھرا ہوا محسوس کرے۔ ان کی تلاش میں گھر میں دوڑے۔ یا ان کے ڈر کے مارے گھر میں چھپ جاوے۔

سکونا داڑوسا۔ محسوس کرے کہ عجیب و غریب جگہ اور غیر عام حالات میں رہ رہا ہے۔  
 ہر چیز عجیب و غریب اور تقریباً ڈرانے والی معلوم ہو۔ انسانیت سے حسد یا بغض۔ اپنے  
 دوستوں سے ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے دُور بھاگے۔  
 دسکم البم۔ توہم، جیسا کہ جسم کا اوپر والا حصہ اڑ رہا ہے۔  
 کوکولس۔ کسی چیز کے دیواروں۔ کرسیوں، فرش اور دیگر جگہوں پر ریگنے کا وہم اور وہ  
 اس پر بھی ریگنے لگی۔

ہائیوسائیمس۔ تصوراتی لوگوں سے باتیں کرے، جیسے کہ وہ اس پہلو میں بیٹھ ہوئے  
 ہیں، مری ہوئی بیوی، ہمیشہ یا خاوند سے باتیں کرے۔ جیسے کہ وہ دوبارہ زمین پر ہوں خیال  
 کرے کہ چیزیں کیڑے مکوڑے ہیں، مزرعہ کیڑے مکوڑے، چوہے، بلیاں اور بھوٹی  
 چھ میاں ہیں۔ محسوس کرے جیسے کہ اسکی انگلیاں اور ہاتھ بہت بڑے ہیں۔  
 کوکین۔ سوچتا ہے کہ وہ اپنے متعلق ناخوشگوار فقرات کہنے جا رہے ہیں۔ مننے کے  
 توہم۔ بستر پر لیٹے گھنٹوں نیند نہ آئے۔ اپنے کمرے اور بستر میں کھٹل اور کیڑے مکوڑے  
 دیکھے اور محسوس کرے۔ کذا اخلاقی سمجھ۔

الیومنا۔ جب وہ کوئی چیز کہتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی اور شخص نے یہ کہا ہے۔  
 اسی طرح جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی اور شخص نے یہ کہا ہے یا کسی  
 اور کے قالب میں ڈھال کر ہی دیکھ سکتا ہے۔ ذاتی پہچان کھو دیتا ہے۔  
 گلوٹائن — ٹھوڑی، گھٹے تک لمبی محسوس ہو۔ تھوڑی کو بار بار چھوئے تسلی کرنے کے  
 لئے کہ ایسا نہیں ہوا۔

کارلونیملف — آوازیں منے اور یقین کرے کہ اس نے ڈاکر ڈالا ہے۔  
 لیکسس۔ جب کسی کو بھی آہستہ آہستہ باتیں کرتی دیکھتی ہے تو خیال کرتی کہ اسی ہی کو معین  
 کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے کو غیر مرنی تسلط کے زیر اثر محسوس کرتی ہے (نیم خرابی کیمت میں)

اسے لازمی اس غیر مرئی طاقت کا حکم بجالانا چاہیے۔ ڈرتی ہے کہ دشمن اس کا پھیا کر رہے ہیں۔  
 مددائی کو زیر خیال کرے۔ گھر میں چور محسوس ہوں اور وہ کھڑکی پھلانگتا چلا ہے۔  
 ملی لوٹش — تو ہم خیال کرے کہ ہر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اونچا بولنے سے ڈرے۔  
 دور بھاگ جانا چاہیے۔

انگس کاٹش — بیزنگ پھلی کی بو کا دہم یا مشک کا دہم۔  
 کوکا — جلد یا کپڑوں پر کیڑوں کوٹروں کے چلنے کا دہم۔  
 ایتھوزا — بلیاں اور کتے نظر آنے کا دہم۔ بستر یا کھڑکی سے پھلانگتا چلا ہے۔  
 اسارم یورپ — جیسے کہ ہوا میں اوپر ہی تیر رہی ہے ایک ہا جگر پراچکر جیسے کہ ستر ہیوں  
 کو ہوں۔

برٹیا کلاب — جیسے کہ اس میں ہر چیز بٹے۔ جیسے کہ جہاز میں بٹے۔  
 کر دکس — جیسے کہ پیٹ میں کوئی زندہ چیز ہو۔ خیالی حاملہ پن۔ تبدیل ہونی والی طبیعت۔  
 مار فینم — جیسے کہ کمرہ بچوں سے بھرا ہوا ہے۔ بستر پر آدمی علامات بیان ذکر سکے  
 معمولی چیزوں پر آہیں بھرے۔

میڈور منیم — جو کام آج کرے ایسے محسوس کرے کہ بوقت پہلے کئے ہیں۔ اس کے  
 پیچھے کوئی آہستہ گی سے بول رہا ہے۔ فریج کے پیچھے سے جہرے بھانکیں اور  
 اسے کہیں کر آ۔ زندگی غیر حقیقی ایک خواب معلوم ہو۔ ناقابل معافی گناہ کر دیا ہے۔ اور وہ جہنم میں  
 جانے لگی۔ فکر نہ کرے خواہ دوزخ میں جائے یا بہشت میں بے صبر اور بہت خود غرض۔  
 مرگورس — محسوس کرے جیسے کہ گلی میں کیڑے رنگ کر اوپر اٹھ رہے ہیں۔ سب کا پھلکا  
 گے میں لگ جائے کا احساس۔ کان میں برف جیسی ٹھنڈک۔ کانوں سے ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہو۔  
 پیلاڈیم — محسوس کرے کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ عزت نفس مجروح۔  
 پٹرو لیم — خیال کرے کہ اس کے ساتھ بستر میں کوئی دوسرا فرد یا بچہ ہے اپنے دوا دوسے زیادہ

ہونے کے خواب دیکھے۔ اس کی بائیں دو گئی ہیں۔

پلاٹینم — ایسا محسوس ہو کر وہ اپنے ہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ تھوڑی سی غیر حاضری کے بعد ہر چیز تبدیل شدہ معلوم ہو۔ آنکھ اور دماغ میں چیزوں کا تناسب قائم رکھنے کا احساس نہ ہو۔ سواریٹیم — محسوس کرے کہ دماغ جسم سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ماتھے میں دماغ کے لئے اتنی جگہ نہیں ہے، جیسے کہ اس نے اپنے کانوں سے سنا ہو۔

سائیکلکامین — جب کبھی بھی کسی آدمی کو کسی چیز کو چھو لے تو اپنے آپ کو گندہ محسوس کرے۔ اور نہ مانا چلے، ہر چیز دہری نظر آئے جیسے کہ بستر میں پڑے ہوئے آدمی۔ فرائیڈ انجم نہ دینے سے تکالیف یا باراکام کرنے سے تکالیف ظاہر ہوں۔

سٹیفسگیر یا — جب پہلے تو محسوس کرے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ پریشانی اور ڈر کا باعث بنے اور وہ اپنے پیچھے کی طرف نہ دیکھے۔

سلفر — ہر چیز خوبصورتی میں تبدیل ہو جائے۔ پرانے پتھر ٹپے اور پرانی چڑیا گالی گڑی کا بہترین نمونہ معلوم ہوں ہر چیز خوبصورت معلوم ہو جیسے کہ مریض محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر چیز کو چھونے کی خواہش کرے۔

کینائیس سٹائیوا — اپنے آپ کے مارے جانے کے متعلق خرم چھڑنے کا اعلیٰ ترین ہستی کی طرف سے حکم ہے۔

کیو پیرم ایٹیکم — وہم کہ اس کو پولیس گرفتار کرنے آگئی ہے۔ ہر قسم کی شکلوں اور علاقوں یا حدود خاص طور پر جب شام کے وقت سونے کیلئے آنکھیں بند کرے یا سونے کی کوشش کرے۔ اولینڈر — اپنے آپ یا اپنے کپڑوں کو دھوئے کسی چیز کو چھونے کے بعد، کسی آدمی کو چھونے کے بعد خیال کرے کہ اس نے کسی گندی چیز کو چھوا ہے جس کے نتیجے کے طور پر اسے لازمی طور پر دھونا چاہیے۔

پائیروجینم — یہ وہم کہ وہ امیر آدمی ہے اور بینک میں بہت دولت رکھتا ہے۔

نکس ماسکٹا — یہ خیال کردہ آدمی ہے اور دوسرے کو کھیلنا ہوا دیکھے۔ وہ گم محسوس کرے اور جب اس کے ساتھ بولا جائے تو پریشانی کے عالم میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے کہ وہ دوسرے رکھتی ہے۔

نکس دامیکا۔ تنگ مزاج۔ ہر چیز اور ہر کسی میں عیب نکالے۔ دوسروں کے الفاظ اور توجہ سے بہت زیادہ حساس۔ اپنے بہترین دوستوں کو مارنے کا رجحان۔ خودکشی کرنا چاہے لیکن اتنا بزدل کہ خودکشی سے ڈرے۔ بہت ہی زود رنج۔ لڑاکا۔ کینہ جو۔

مرکیوس — ہر قسم کی اچائی کی تمیز کھو بیٹھے۔ جسمانی طور پر پر لگندہ اپنی عزت نفس کج گزارہ نکالے ہوئے۔ یادداشت کی بہت کمزوری۔ نظر کمزور۔ بدبودار سانس۔ بھاری پالش شوز بان۔ انگلیشیا۔ غم کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت ہی حساس۔ کاروبار الفت و محبت میں بالوسی۔ کلکیر یا کرب — دماغ اور دوسرے اعضا کی نامکمل بڑھوتری جھوٹے کے ساتھ۔ علم حاصل کرنے میں کسبت اہم مسلم حاصل نہ کر سکتا۔

لائیکوپوڈیم — بہت زیادہ روحانی دباؤ۔ ناامید۔ اپنی نجات کے بارے میں متفکر یا اپنے فرائض انجام دینے کے بارے میں متفکر۔ امتحان دینے کے بارے میں متفکر۔ زود رنج۔ غمگین، بہت ہوشیلا اور ناراض قبض کھٹی خوراک کے ڈھکار۔

سٹیف گیگیا — بخوابی۔ شرم کے ساتھ ڈر لوگ متغیر، عزتی، ناامیدی، علیحدگی کا خواہشمند۔ نیمومیلہ۔ حساس۔ زود رنج۔ کم حوصلہ۔ بہت آسانی کے ساتھ ناراض ہو جائے۔ اور ان کے نتیجے کے طور پر عوارض میں مبتلا ہو جائے۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا — کسی بات پر غصہ آنے پر جو چیز بھی ہاتھ آئے دے مارے خواہ کسی چیز پر گرے، معمولی سا بھی اختلاف رائے پر جو بھی چیز ہاتھ آئے وہ دے مارے۔

### افسردہ دلی

کالی بروڈیم — مادہ منویہ کے اخراج پر۔ تکلیف دہ ادھام۔ بخوابی اور سر پر بند لانے والی تباہی کا ڈر جس سے ہر قسم کی تباہ ہو جائے گی۔ ڈر اور پریشانی دہم اور اخلاقی کمزوری

آرم میٹ - اتنی زیادہ افسردگی کہ مریض خودکشی کی طرف کھنچا جائے۔  
 نکسو امیکا - مادہ منور کے اخراج پر۔  
 امبرگریسا - روحانی کمزوری یا دلولوں کی کمزوری۔  
 آرٹیمیشیا - افسردگی مرگی کے حملہ سے ایک دن پہلے۔  
 بیلی بوس - کسرج بخار کے بعد۔  
 کروٹیلس - کمزوری کے ساتھ افسردگی غشی اور بائیں کوہے میں درد۔  
 کیڈیم سلف - افسردگی برائے ماننے کے ساتھ۔ ناامیدی۔ ہمت کی کمی۔  
 زینکم میٹ - جلدی امراض سے افسردگی۔ دن میں دو دفعہ دوائی دینی چاہیے۔  
 نائٹرک ایسڈ - شام کے وقت۔  
 کینا بس ٹائیوا - دوپہر سے پہلے۔  
 فاسفورس - اس نظریہ کے ساتھ کہ ناقابل اصلاح دل رکھتا ہے۔  
 جیلسمیم - گرمی سے نامردی سے۔  
 نیٹرم میور - بے تحاشا بھوک سے۔  
 کیلیڈیم - نامردی سے۔  
 ڈیجٹالس - دل کی دھڑکن کے ساتھ  
 کوکا - کام کی زیادتی اور زیادتیوں سے  
 فائٹولا کا - گھٹیا سے۔ آتشک میں  
 اگنس کاسٹس - عام کمزوری اور قوت حیات کی کمزوری موت کی یقینی آمد کے خیال کی سہت زیادتی۔  
 میو رکیس - جب لیکوریا سے آفاقہ ہو۔  
 ایسڈ فاس - افسردگی جو بہت زیادہ لا تعلقی۔ بے پرواہی۔ بے رخی وغیرہ وغیرہ  
 امونیا کارب - روحانی کمزوری۔ زیادہ روئے غشی کے دروں کے ساتھ پریشانی بے امنی  
 اور حرکت سے بہت زیادہ کمزوری وجہ سے تنگی نفس۔

تمنا۔ خواہش۔ طلب۔ (کھانا ہے)  
 سلفر۔ ہر وقت شراب پینے کی خواہش صبح سے شام تک۔ بچہ ناک نے کھلا ہوا مواد کھاتا ہے  
 حاملہ عورتوں میں برانڈی کی خواہش۔

فاسفورس۔ معدہ کی مٹن دور کر کے شراب کی خواہش کو دور کرتی ہے، نتیجتاً بہت زیادہ بھوک۔  
 پلیئم۔ ایمیں ایک خاص کر شراب خریدنے کیلئے روپر چوڑی کرے جو نہی اس پر سے پابندی شامی جائے  
 خواہش جاتی رہے۔

ایسڈ سلفیورک۔ شراب خوری کی عادت کو دور کرنے کے لئے ایک حصہ سلفیورک ایسڈ اور تین  
 حصہ الکومل ملا کر دینے سے عادت دور ہو جاتی ہے۔ دس سے پندرہ قطرے تین چار ہفتے دیں۔  
 ٹیزٹولا اسپانیولا۔ راکھ کھانے کی خواہش خاص طور پر حمل کے دوران اور پُر درد حیض،  
 ریت کھانے کی خواہش۔

ایسڈ ٹائمرک۔ چاک کھانے کی خواہش چربی تک چونا مٹی۔ پستہ کھانے کی عادت۔  
 ایومونا۔ نشاستہ۔ کچے چاول۔ چاک۔ کوئلہ۔ چاء، اپری ہوئی کافی۔ کھٹی اور مضم  
 ہونے والی اشیاء۔ آلو۔ گوشت۔ اور میر سے نفرت۔  
 سکونٹا اور ورسا۔ بچہ کو نلہ منہ میں ڈالے۔ ظاہرہ خوش ذوقی سے یا باز غبت کھائے۔ کچے  
 آلو کھانا چاہے، اس سے معلوم ہو کہ وہ کھانے اور نہ کھانے والی اشیاء میں تیز نہیں کر سکتا۔  
 کوٹرکس۔ شراب کے بُرے اثرات اور چائے۔ تمباکو وغیرہ کے بُرے اثرات سے محفوظ رکھے  
 یا بُرے اثرات سے بچائے۔

سٹرنٹینکس۔ شراب کی زبردست خواہش کو دور کر دے۔ مدد کچھ کے دس سے پندرہ قطرے  
 دن میں دو دفعہ دیجئے۔

پیسٹی فلورائن۔ مارنیا اور افیون کی خواہش دور کر دے۔ پانچ سے دس قطرے فی خوراک۔  
 ایونیا شایوا { دیجئے۔  
 فائیٹولا کا۔ دانتوں اور مسوڑھوں کو کاٹنے کی نہ رکنے والی خواہش۔ دھواں لگے گوشت کی  
 زبردست خواہش اور عام گوشت کی بھی خواہش۔

مینگنم۔ ہر وقت بستر پر پڑے رہنے کی خواہش۔ بستر میں آرام سے آفاقہ۔ تکلیف اور پریشانی  
حکمت سے زیادہ ہوتی ہیں۔

ہیپر سلفر۔ سرکہ اور اچار کی زبردست خواہش۔

ہائیو سائیمس۔ پاگل آدمیوں میں کام کرنے کی خواہش۔

کیلیڈیم۔ تمباکو کے لئے توڑ۔ اس کی زبردست خواہش کو دُر کرتی ہے۔ یادداشت کی  
کمزوری ادماغی غیر معاضی اور بھولنا۔ ہر چیز جلدی میں کیجاتی ہے۔ یہ مندرجہ بالا علامات کے  
ساتھ آنکھ کے اوپر پھیلیوں کا بھی علاج کرتی ہے۔

پلاڈیم۔ خوشامد کی جانے خواہش۔

لیڈم پال۔ وہ سکی کی خواہش کو دُر کرتی ہے۔

کالی بائیکرومیکم۔ بیڑ اور تیزابی مشروبات کی خواہش۔

میٹروئیم۔ نمک، مٹھائیوں۔ سبز پھلوں۔ برف کھٹی چیزوں اور سنگتروں کی زبردست خواہش۔

مرکیورس۔ گائے کا گوبر اور تالابوں کا کچر کھانے کی کوشش۔

سینی کولا۔ پیچھے کی طرف دیکھنے کی خواہش۔

سیسیا۔ انگور کی شراب۔ سرکہ اور مٹھائیوں کی خواہش۔

ایٹوڈم۔ گوشت اور نشہ آور مشروبات کی خواہش۔

تھلاپسی۔ مکھن دودھ کی خواہش۔

سائیکلمین۔ سارڈین (ایک خاص قسم کی مچھلی) کھانے کی خواہش۔

کروٹیس ایچ۔ برف کی زبردست خواہش۔

سٹروئیم۔ اپنے دانتوں سے کاٹنے اور بھاڑنے کی زبردست خواہش تیزاب کھانے کی

زبردست خواہش۔ سرکہ سے آفاقہ۔

میگنیشیا کلرب۔ ٹی بی اور کسی مرض میں بار بار مبتلا ہونے والے بچوں میں گوشت کی زبردست خواہش

سٹس کیناؤن - پیئر کھانے کی خواہش، کام میں مبتلا ہونے کا رجحان کے ساتھ جو کافی عرصہ تک قائم رہے، سردی میں زیادتی - تیزابی خوراک یا پھل جو تکلیف یا عیش کا باعث نہیں - ایلیم سپا - کچے پیاز کھانے کی خواہش -

کوئیم - اپنے بہترین پیرے پینے کی خواہش کرے - بے فائدہ چیزیں خرید کرے - چیزوں کی پرواہ نہ کرے، انہیں ضائع یا برباد کر دے -

کلیریا کارب - انڈوں کی خواہش، چوننا - سیٹ - پنل - چاک - اگر گیس ایمٹ - بہت ہی ٹھنڈے پانی کی اچانک زبردست خواہش - پریشانی کے حملے کے دوران میں جو فائدہ بخش ہو -

کلیریا فاس - سور کے نمکین گوشت - سور کے ران کے گوشت نمکین یا خشک ہوئے بھوسہ ہوئے گوشت کی زبردست خواہش - نفخ زیادہ - بچوں کا ہیضہ -

آرچیم ٹائریکیم - کھانڈ اور ٹھائیوں کی خواہش جو اس نہ آئے - نشاستہ اور آٹہ نہ لے سکے - یہ بیمار کر دے -

سیلینیم - نشہ آور مشروبات کی نہ کھنے والی خواہش -

بیوفو - علیحدہ ہونے کی خواہش جلیق کیلے - علیحدگی خواہش کرے لیکن علیحدہ ہونے سے ڈرے - لائیکوپوڈیم - میٹھی اور گرم چیزوں کی زبردست خواہش - کافی اور گوشت سے نفرت - برائی آوینا - کسی چیز کی خواہش لیکن یہ نہ جانے کہ کس کی - بچے کو ایک کے بعد دوسرا کھلونا دیکھے لیکن وہ سب کو مسترد کر دے -

لیکسیل - کاغذ کھانے کی زبردست خواہش -

مینیریم - جربئی، سور کی ران اور دودھ پینے کی زبردست خواہش -

نیرٹم سلف - برف اور انتہائی ٹھنڈے پانی کی خواہش -

اٹمٹ مارٹ - تیزاب اور کھٹے پھلوں کی خواہش جو اسے بیمار کر دیں - سرکہ کھٹے چیزوں، کھٹی شراب

اور کھٹے پھلوں سے معدہ کی تکالیف -

دریہ گرم الیم - اپنے ہی پاخانے اور پیشاب کو پینے کی زبردست خواہش -

کوکا - شرابی مشروبات اور تباکو، روایتی نشہ بازوں کے لئے -

آئرینک ایم - سرکہ کی خواہش خاص طور پر حاملہ عورتوں میں -

بکس وایکام  
لیکس  
پسٹیل  
بڑھتی کی خواہش - دیئے گئے محاسبے دیں -

کاشیکم - نوجوان لڑکیاں شادی کی خواہش میں جلیں -

ٹوئیکم - تباکو نوشی کی خواہش کو دور کر دے - ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ کی پوشی میں ہر ہفتہ ایک خوراک

کاربوونج - کافی - تیز بات - میٹھی اور نمکین چیزوں کی خواہش - قابلِ ہضم اور بہترین خوراک  
سے نفرت -

انگچور اور ابرا - کافی کے لئے زبردست خواہش -

تباہ کن

بیسلا ڈونا - حاسد عصبہ ور - کاٹا ہے - مارتا ہے - بھاگتا ہے - سخت بدنایا گھناؤنے

پھرے - ڈراؤنے چہرے -

کینتھرس - طیش میں لانے والے توہمات - جنسی جوش کی وجہ سے چلائے اور بولے -

بڑھوتری

برٹیا کارب - دماغی بڑھوتری کی جگہ جسم بڑھے - ہم ایسے مریضوں میں ڈراؤنے یوقوفی دیکھتے ہیں

جیسا کہ بچوں میں - بچکانہ یوقوفی اور معصومیت - ۱۸ سے ۲۵ سال کی عمر کی لڑکیوں میں یوقوفانہ

باتیں - گزلیوں کے ساتھ کھیلتی ہے اور یوقوفی کی باتیں کہے - یوقوفانہ رویہ - عورت بنی میں دیر

سے آنا - عورتوں والے کام اور استعمال میں دیر سے آنا -

ڈر

کیڈیم سلفٹ — کسی بھی جہانی اور دہنی کام کرنے سے ڈرنا۔

کوئیم — رکیلے ہونے کا ڈر۔

چائنا آف — کتوں اور دوسرے جانوروں کا ڈر۔

فاسفورس — ڈر جیسے کہ ہر کونے میں کوئی چیز ریگڑی ہے۔

بوریکس — بچے کی طرف حرکت سے ڈر۔

لائیکوپوڈیم — متفکر، غمگین، اور چڑچڑا۔ آدمیوں سے ڈرے۔ رفاقت سے نفرت۔

جلیسیم — حرکت سے ڈر۔ اعصابی۔ گانے والوں اور مقررہوں سے ڈر۔

اگنیشیا — پھوٹی پھوٹی باتوں سے ڈر۔

کھانا ہے

دریٹرم ایلیم — اپنا ہی باغیانہ کھائے اور پیشاب پیئے۔

سلفر — بچہ ناک سے نکل ہوئی رطوبت کھائے۔ نزلہ زکام کا رجحان۔

بھاگ جانا

بیل اڈونا — بھاگ جانے یا فریجیر یا بستر میں پھپھ جانے کی خواہش۔

اوسیم — بخار میں خاص طور پر ٹائیفائڈ بخار میں بھاگ جانے کی خواہش۔

لائیکوپوڈیم — عورتوں میں اپنے بچوں سے بھاگ جانے کی خواہش۔

دریٹرم ایلیم — دماغی جھلیتوں کی وجہ سے بھاگ جانے کی خواہش۔

میکرویرس — ہسٹیریا میں بھاگ جانے کی خواہش جیسے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو۔

ہائوسائٹیس — بستر سے کود جائے اور در بھاگ جانے کی کوشش کرے۔

امتحان

آرٹھم ٹائٹ — امتحان سے ناکامی کی وجہ سے سخت ہراساں ہونا۔ پیشگی ڈرجو اسپہال

کاباعت بنے، دروازے کے قریب نشست چاہے۔ بھاگ جانے کے لئے سکول

کے بچے جو سکول یا جرح یا مسجد میں جانے سے ڈریں۔

اینا کارڈیم۔ امتحان سے پہلے ڈر۔ زیادہ پڑھنے سے اعصابی کمزوری۔ مادہ منویہ کے اخراج سے کمزوری۔ یادداشت کی کمی۔

لائیکوپوڈیم۔ امتحان کے پاس کرنے کے سلسلے میں افسردگی۔ قدرتی طور پر ڈر پیدا کرنے والی وحوشات سے حساس اور جسم پر واضح اثرات۔ جھلکا یا ہوا۔ چڑچڑا۔

اجتھوزا سٹینٹیم۔ سوچنے یا تجربہ مرکوز کرنے کی نااہلیت۔ اس علامت کے ساتھ مریض امتحان کے خوف پر قابو پا لے گا۔

جیلسمیم۔ امتحان سے پہلے سخت ہراساں یا سخت خوف۔  
ڈر۔ (موت اور ڈر بھی دیکھئے)

ایکونائٹ این۔ موت کا خوف اندھیرے کا پُر شور بگبگوں اور گانے سے خوف۔ موت کا ڈر حمل کے دوران میں۔ بھوتوں کا خوف۔ ٹرلی کار یا ریلوے ٹرین میں داخل ہونے کا ڈر۔ پریشانی کے ساتھ ڈر۔ گلیوں کو پار کرنے کا ڈر۔ سخت ڈر۔ بہت زیادہ پریشانی اور بے چینی۔ سٹر انونیم۔ بدحواسی میں ڈر۔ کتوں کا ڈر۔ غریب نظر یا خیال باطل کی وجہ سے ڈر۔ پانی کا خوف۔ ریشنی کا خوف۔ غلط کام کرنے کا خوف یا بھڑبھارے جانے کا خوف۔ اندھیرے کا خوف، لیکن چمکدار چیزوں سے بھی خوف۔ رات کا خوف۔ زخمی ہو جانے کا خوف۔ بہت زیادہ پیاس لیکن پانی سے ڈرے۔

ادییم۔ زخم یا جراحت کے بعد خوف کا قائم رہنا۔ جب ڈر کی وجہ سے اسہال ہوں۔ آسانی سے ڈر جائے۔ موت کا ڈر۔ خاص طور پر جب ڈر کی وجہ سے بزدلی ہو۔ نکسوامیرکا۔ غیر حقیقی خوابوں سے خوف۔ خوف کا مسلط ہو جانا۔ شور کا خوف۔ اعصابی اور چڑچڑے لوگوں کے لئے موزوں۔

کیوپرم میت۔ جب خوف کی وجہ سے تشنجی دیکشی یا تنگی تنفس ہو۔  
مرکیورس۔ خون بھاگ جانے کی خواہش کے ساتھ۔ جیسے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو۔

آرٹینک الیم - چاقو سے مارے جانے کا خوف - اکیلے رہنے سے ڈرے ساتھی چاہے بہت بے چینی محسوس کرے -

کیوریم ایسٹیکم - بستر کے کپڑوں یا کمر کو آگ لگنے کا خوف -  
سیلشیا - ذہنی تھکان - منجمذ خیالات - صرف اپنوں کے متعلق سوچے اور ڈرے انہیں تلاش کرے - اور گئے -

آرٹیکا ایم - اچانک موت کا خوف - ڈرے کہ اچانک کچھ ہو جائیگا - رات کے وقت اٹھے اور اپنے دل کو پکڑے - ڈراؤنے خواب اور کاہوس - جو لوگ اس کی طرف آئیں ان سے ٹکرانے کا خوف -  
کلکیر یا کارب - پریشانی اور خوف کہ کچھ خوفناک اور ننگا واقعہ ہونے والا ہے - ڈر کر لوگ اس کی ذہنی بدحواسی کو جان جائیں گے - سائے کا خوف - پاگل ہو جانے کا خوف -  
میسلا ڈونا - تصوراتی چیزوں اور برائیوں کا خوف - دُور بھاگ جانا چاہے - جانوروں کا خوف -  
کتوں کا خوف -

ہائپوسائیمس - زہر دینے جانے کا خوف - زخمی ہونے کا خوف - بھارت بھارت کا خوف -  
پانی اور لوگوں کا خوف - درندوں سے کاٹے جانے کا خوف -

سکسینم - ٹرینوں یعنی ریل گاڑیوں اور بندکروں کا خوف -  
اگنیٹیا - ہوائی حملے کا خوف ہسٹریائی لوگوں میں جو تھوڑی سی انگشت پریشانیوں کا خوف کی وجہ سے غمی -

برائی اونیا - غربت کا خوف - یا غریب ہو جانے کا خوف -  
جیلسیم - بیماری اور ہوائی حملے کا خوف وغیرہ - شیخ کا خوف - بیماری اور ہوائی حملوں کی بھری سکول کی دھڑکن کا تیز ہونا - تھکا مائدہ اور کاہنے - بے چینی اور پریشانی اس ودا میں ملتی ہے گرنے کا خوف -

آرٹیم ٹنٹریٹیم - ضرورت سے زیادہ پریشان - ڈرا ہوا - جلد باز بیماری اور ہوائی حملے کی وجہ سے

بے چینی اور ادھر بھاگنا اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ خوف کو موت نزدیک آرہی ہے۔  
 مجمع میں جانے کا خوف، چرچا سنا یا بھرے ہوئے کمرے میں جانے کا خوف جہاں وہ سانس  
 نہ لے سکے جسے کہ اوپر اٹھانے والی لفٹ یا سڑگ۔

فاسفورس۔ سر پر منڈلانے والی تباہی کا خوف۔ اندھیرے کا۔ اکیلے رہنے کا۔ دم گھٹنے کا۔  
 طوفان برق و باراں کا۔ یا کسی بُری بات کے وقوع پذیر ہونے کا۔  
 ایونٹا۔ شام کے وقت۔

لائسیمین۔ پانی کا خوف۔ پانی نظر آنے پر مٹیاب کی خواہش۔ یہ خاص دوائی ہے  
 جب پانی کا خوف ہو۔

کینا بس انڈیکا۔ ہمیشہ کے لئے گم ہو جانے کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی پکار و رشت  
 نہ کر سکے کیونکہ وہ مڑا ہوا محسوس کرتا ہے جھکدار چیزیں دیکھنے پر خوف۔ ہوا کے چھوٹے سانس  
 پر یا کسی کے آنے پر۔ اندھیرے کا خوف۔

لائیکو پوڈیم۔ اکیلے رہنے کا خوف۔ مجمع کا خوف۔ اندھیرے، موت، بھوتوں اور لوگوں کا خوف۔  
 کوکولس۔ موت کا خوف اور انجانے خطرے کا خوف۔

کالی کارب۔ مستقبل کا خوف۔ موت۔ کسی چیز کے ہونے کا خوف، بھوتوں کا ان لوگوں،  
 میں جو تھکے ماندے ہوئے ہوں۔ چڑچڑے اور حساس کبھی بھی مطمئن نہ ہوں۔ کبھی بھی اکیلے  
 نہ رہنا چاہے۔

کلیسٹس۔ اکیلے رہنے کا خوف لیکن قابل قبول لوگوں سے ملنے کو پسند نہ کریں۔  
 اینا کارڈیم۔ ڈر ہے کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ چوروں کو تلاش کرے۔ دشمنوں کی توقع کرے۔  
 ہر چیز اور ہر کسی سے ڈرے۔ اندرونی پریشانی سے بھرپور بہت ہی زیادہ بزدل جسم کو احساس  
 کے بغیر رقم کرے۔ ظالم۔ کینہ دہا اور بد طبیعت۔

کیلیڈیم۔ شدید اعصابی۔ اپنے ہی سائے سے ڈرے۔ تمام ارات شہوت پرستی کے خیالات

سے جاگتا رہے۔ پریشانی خاص طور پر سونے سے پہلے۔ اپنے مستقبل سے ڈرے۔  
 کیسفر۔ پریشانی کے ساتھ شدید خوف۔ اجنبی لوگوں کا خوف۔ اندھیرے کا تصوراتی بھوتوں کا خوف۔  
 میسنگم۔ پریشانی اور خوف۔ بہت زیادہ اندیشہ۔ کچھ بہت ہی خطرناک واقعہ ہونے والا ہے۔  
 ذہنی مصروفیت کی کوشش کرتا ہے۔ جتنی زیادہ یہ کوشش کرتا ہے اتنا ہی پریشان ہوتا ہے۔ وہ پرج  
 نہیں سکتا کیوں کہ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نیچے لیٹ جاتا ہے اور یہ سب گدگداتی  
 ہیں۔ لیٹ جانے سے اتفاق ہوتا ہے۔  
 پھونچیا۔ موت کا ڈر۔ مستقبل کا ڈر یا خوف۔ یا کسی خطرناک کام کے وقوع ہونے کا خوف۔  
 تنگی تنفس اور پریشانی کے ہمراہ۔  
 پاؤلینیا فانیٹیا۔ گھل گھل کر مرنے کا خوف۔  
 اوسموڈیم۔ سیڑھیوں پر چڑھتے یا اترتے وقت گرنے کا خوف۔  
 مانسینڈا۔ بد روحوں کا دیوانہ ہونا۔  
 میڈویرنم۔ جب اکیلا ہو تو موت کا ڈر یا خوف۔ جاگنے پر ڈر کا احساس جیسے کوئی  
 خطرناک واقعہ ہو چکا۔ اندھیرے کا خوف۔  
 سیننی کولا۔ اندھیرے کا خوف۔ اپنے پیچھے کی طرف دیکھنے کی متواتر خواہش۔  
 کینابلس انڈیکا۔ اندھیرے کا خوف۔  
 ٹیرنولا ہسپانولا۔ لامحدہ خوف۔ کسی واقعہ کے ہونے کا خوف۔ کسی چیز کا خوف جو موجود نہ  
 ہو۔ خوفناک چیزیں دیکھے جو دماغ نہ ہوں۔  
 سٹیفسگیریا۔ اپنے ہی سایہ سے خوف۔ بڑی کے ساتھ پریشانی۔ اندرونی جذبات کو بہت  
 گہری ٹھیس پہنچا۔ ہاتھ میں جو چیز ہوا سے دور پھینک دینا۔  
 ہائیڈرومائیک الیڈ۔ خیالی تکالیف۔ ہر چیز کا خوف۔ گھوڑوں کا خوف۔  
 گرتے ہوئے گھر کا خوف۔

## خوشامد

پلاڈیم - خوشامد کی خواہش۔

مقبول جانا (دماغی غیر حاضری بھی دیکھیے۔ سوچ اور غلطیاں)

لیک کیٹیم - مریض غیر حاضر دماغ۔ وہ بہت بھولنے والا۔ بازار سے چیزیں خریدے لیکن ان کے بغیر ہی چلا آئے۔ وہ لفظ یا الفاظ لکھتے وقت بھول جائے جب بولے غراوا دی طور پر زیادہ آہستہ طور پر دیکھی ہوئی یا سوچی ہوئی چیزوں کے بدل بولے۔ لکھتے وقت وہ بہت زیادہ الفاظ استعمال کرے صحیح الفاظ کی جگہ۔ پڑھتے یا مطالعہ کرتے وقت کیسوئی اور توجہ قائم نہ رکھ سکے۔ ایسڈ فاس - جنسی بے راہروی کیوجہ سے حافظہ کی کمزوری۔ بے پرواہ۔ ناقص یادداشت اپنے خیالات کو مجتمع نہ کر سکے۔

ایناکارڈیم - دماغی محنت کی وجہ سے بھول جانا، خاص طور پر صبح کے وقت۔ عام ادھرنگ کے بعد یا عام فالج کے بعد، کمزوری یا حافظہ کی کمی۔ لعنت ملامت یا قسمیں کھانے کی نہ بٹنے یا دبے والی خواہش۔

بریسٹا کارب :- بوڑھے لوگوں میں مکر کیوجہ ذہن سے دماغی صلاحیتوں کے کم ہونے کے لئے خاص طور پر نفیس ہے۔

کینا بس انڈیکا - مریض بہت ہی زیادہ بھولتا ہے، فقرہ مکمل نہ کر کے کیونکہ یاد نہ کر سکے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے۔

سیلینیم - جاگتے وقت بھول جائے اور غیند میں اس چیز کے خواب دیکھے۔

سفلیٹیم - بھول جانے والا۔ کمزور دماغ والا۔ بغیر کسی وجہ کے ہنسے یا روئے۔

صحت مند ہونے سے ناامید نگین - کاروبار اور دوسرے کاموں سے لاپرواہ۔

گلوناٹن - بھول جانے کی وجہ سے مریض مضحکہ خیز بن جائے۔ وہ جانی پہچانی کیلو کے نام خیر اور محل وقوع بھول جائے اگرچہ وہ دہائی سالوں رہا ہو۔ گھر کا راستہ بھلا دھائی دے۔ جانی پہچانی گلیاں عجیب معلوم ہوں۔

سینف گیرا۔ جلیق یا اخراج منی کے بعد حافظہ کمزوری کی جنسی مشاغل پر متواتر عمل کرنا۔ وہ جب کسی چیز کو پڑھتا ہے تو معمولی سی یاد باقی رہتی ہے۔ بہت زیادہ یاد کرنے کے بعد شکل یاد کر سکے۔  
 ایک دیک ٹریفیل۔ لا پرواہی اور ذہنی کام سے نفرت کی وجہ سے بھول جانا۔ غمی اور آسان طریقہ سے موت کی خواہش کرے۔

کیلڈیم۔ بھول جانا۔ غیر حاضری دماغ۔ جنسی زیادتیوں یا تمباکو کی زہر کی وجہ سے بہت زیادہ پُرجوش، وہ سوچ نہ سکے جتنا زیادہ سوچے اتنا ہی زیادہ موضوع سے دور ہٹے۔ یہ ذہنی اور دماغی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ مشتمل مریضوں کے لئے بہترین ہے۔ جو کسی بھی چیز کے متعلق پُر یقین نہ ہوں اگرچہ انہوں نے کوئی چیز دیکھی اور محسوس کیوں نہ کی ہو، وہ اس کے وجود کے متعلق شک میں پڑ جائے جب وہ چیز اس سے دور ہٹ جائے۔

آئیوڈیم۔ آسانی سے بھول جائے کوئی چیز بھول جائے لیکن یہ نہ جانے کہ کیا بھول گیا ہے۔ اس کے ذہن پر اس کا وزن ہو۔ یہ اسے بے چین اور وہ اسے اعصابی مرض بنائے۔  
 المینتھن گلیٹڈ لوسا۔ ایک لمحہ پہلے ہی بولی ہوئی چیز بھول جائے، متواتر بھولتا رہے۔  
 اولینڈر۔ کمزور یادداشت اور بھول جائے آہستہ آہستہ سمجھے۔  
 امبرگریسا۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ساتھ الفاظ اور واقعات یاد نہ کر سکے۔ قبل از وقت بڑھاپا۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کو تبدیل کر دے۔

کونیم۔ یادداشت کی کمزوری۔ بھول جانا۔ ذہنی کاوش کے نابل۔  
 کالی بروم۔ نامردی کے ساتھ بھول جانا۔ قلت خون۔ لاغری یا وہ الفاظ بھول جائے رکن تہی بھول جائے۔

زینک فاس۔ ذہنی کمزوری بھولنے سے کم درجہ کی بیوقوفی میں تبدیل ہو جائے۔ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جن۔ کمزور تصور اور درجہ بیٹھنے پر زیادہ ہو۔ مطالعہ یا مشقت کے کام پر زیادہ ہو۔ ہاتھ پاؤں کے پٹھوں کی کمزوری۔ کانپنا اور بھڑکنا۔ پاؤں اور ٹانگوں کی شدید کمزوری۔ شدید ایسا دگیاں اور اخراج مٹی جس کے بعد خضبیوں اور منی کی مالیوں میں کھینچنے والے درد۔  
 میڈورنیم۔ کانوں، شکلوں اور ناموں کو جو بڑھاپا ہو بھول جائے، انہوں لفظوں میں لکھتے

وقت غلطیاں کرے، وقت آہستہ آہستہ گزرے، ہر چیز آہستہ آہستہ گزرے۔  
 نیزم کا رب - اعصابی اور جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ بھول جانا - ہنسے جمع کرنے کی نااہلیت  
 جو کچھ بڑھے بھول جائے - صفحہ پڑھتے وقت اس سے پہلے پڑھا ہوا صفحہ بھول جائے - یاد  
 داشت قائم نہ رہے - فقر کے پہلے حصہ کو بھول جائے آخری حصہ پڑھنے تک -  
 لائیو کو لوڈیم - غلط الفاظ اور باتچے - غلط بچے کرے یا الفاظ کے حصے چھوڑ جائے خیالات  
 درہم برہم - نئی چیز دیکھنا برداشت نہ کرے - جو کچھ لکھنا ہے - پڑھ نہ سکے -

سلفر - بہت زیادہ بھولنے والا - نام اور قریب کے واقعات یاد نہ کر سکے - یوتون سا  
 اور گھبراہٹ - بول چال سے اجتناب کرے - بولتے وقت یا لکھتے وقت مناسب الفاظ نہ پا  
 سکے یا الفاظ کو غلط جگہوں پر استعمال کرے، دن کے وقت غمگین اور شام کے وقت خوش خیالی  
 پلاؤ بیکائے اور قیاس کرے لیکن کام نہ کرے - (شیخ چلی جیسا رو تیا)  
 روڈ ٹنڈروں - یادداشت کی کمزوری - لکھتے وقت الفاظ چھوڑے - خیالات کا اچانک غائب  
 ہو جانا جس چیز کے متعلق بات کرے بھول جائے -

رشتا کس - گاتا سوچنے کی نااہلیت - مریض جب ۱۲ لکھنے لگے تو ایک کا ہنڈر لکھ کر دوسرا ہنڈر  
 بھول جائے کر گیا لکھنا ہے -

سٹریمونیم - غلط الفاظ استعمال کرے اسی طرح الفاظ نہ بل سکیں -

## جوا بازی

مرکبوس ولیمو - بڑے جوازی - بعض اوقات بہت زیادہ روپیہ خرچ کرے اور بعض وقت بچوسی ہو۔  
 سلفر - چوری کرنے والی عادت والے جوئے باز - تمباکو استعمال کرنے والے لوگ -  
 مجرم ذہنیت - (دیکھیے توہم - خوف اور مراقی حالت) توہم -  
 غیب دانی - نفرت - بیزاری نفرت - گھر کی یاد کا ستانا -  
 کیپسکیم - گھر کی یاد ستائے کیلئے چوٹی کی دوا ہے - سرخ رخسار - بخوابی کے ساتھ سکول کے  
 بچے مطالعہ یا کام نہ کر سکیں - گھر جانا چاہیں -

آئرس ٹیکس۔ غمگین۔ افسردہ۔ گھر کی یاد ستائے۔

ایسٹ فاس۔ گھر کی یاد کیوجہ سے جو تکالیف ہوں۔

انگیشیا۔ تبدیل ہونے والی طبیعت۔ خاموشی کڑھے۔ غمگین۔ رونے والا۔ صدمہ غم اور

نا ایدہی کے بعد کی حالت۔

مراق۔ (دیکھئے ضعف اعصاب)

ٹکسوامیکا۔ بہت زیادہ چڑچڑاپن۔ بھدا۔ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو مارے کی خواہش  
اپنے آپ کو بھی۔ آوازوں۔ جوڑوں۔ روشنی۔ گرمی اور سردی سے اثر پذیر ہو۔ اپنی خود رک  
کپڑوں میں نقص نکالے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بیٹھے رہنے کی عادات۔ بہت زیادہ خوراک اور  
مشروبات کے استعمال کی وجہ سے خاص طور پر شراب کے استعمال سے۔

اکٹیرسیموسا۔ یہ ایک عورتوں کی دوائی ہے۔ ایام حیض سے پہلے افسردگی اور غمی کے دورے  
خیالی جلاؤں سے ڈرے۔ جو کہ ایک نرس۔ ایک ڈاکٹر۔ ایک دوست۔ ایک چوٹا یا چوہا۔  
ایک بی بی، ایک گتا ہو سکتا ہے۔ زندہ رہنے کے قابل لیکن مرنے سے ڈرے۔

کلکیریا کارب۔ تشویش مندی یا گھرنہ۔ موت کا خوف۔ بے بسی کا خوف۔ پاگل ہو جانے کا خوف۔  
بیمار ہو جانے کا خوف۔ رونے اور آہوں کے ساتھ غمی کے دورے۔ موزوں اور ناخوشگوار چیزوں کے خواب۔

سٹیفسگیریا۔ اعصابی نظام کے لئے بہترین دوا ہے جو کہ دماغ اور جنسی کو متاثر کرے۔  
علیحدگی چاہے اپنے حالات بنانے کیلئے۔ اتنا ہوا چہرہ۔ بے رونق آنکھیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھ  
ٹھنڈے پسینے یہ سب کچھ حلق اور جنسی بے راہ روی کیوجہ سے ذہنی اور جسمانی اظہار خیالات  
سے اثر پذیر ہو۔

فاسفورس۔ بزدل۔ مذہب یا غیر مستقل مزاج، جنسی بے راہ روی۔ یا حلق کیوجہ سے۔  
مریض میں ٹی بی میں بار بار مبتلا ہونے کا رجحان۔ متشدد۔ باتونی۔ ہڈیانی۔ رونے والا غمگین  
ہشربل۔ کم سنور دماغ اور احمق۔

آرم میٹ۔ بہت زیادہ ناامید۔ اپنے آپ سے ناامید۔ خودکشی کرنا چاہے لیکن مرنے سے ڈرے۔ دونوں سوزن سکیں، عورتیں نیند میں سسکیں بھریں۔ ادا آدمی قسین کھائیں۔ اپنے آپ کو طاقت کریں۔ اپنے آپ پر تنقید کرنا بڑی بڑی علاتیں ہیں۔ خیال کرے کہ وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہر کام خلط کرے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کو نظر انداز کر دیا ہے اور اپنے فرائض سرانجام نہیں دیئے۔ اس لئے وہ نجات کے قائل نہیں۔

سیمیپا۔ اپنی صحت اور معمولی معاملات کے بارے میں نگہین۔ غیر ارادی طور پر رونے اور ہنسنے کے دورے بہت زیادہ بڑھ چڑھائی جو لاپرواہی سے تبدیل ہو۔ علیحدہ رہنے سے ڈرے لیکن مجلس میں بہت پرجوش۔ حقیقی یا تصوراتی برائیوں کی پریشانیوں کے ساتھ خوف۔

نیرٹرم میور۔ نگہین اور رونے والے مریض جو کہ بھونکی کرنے کو پسند کرے۔ اور بھونکی کرنے والے سے سخت نفرت کریں۔ نگہین۔ کم سخن، کم گو۔ زندگی سے تھکا ہوا۔ نفرت کرنے والا۔

کینز جو انتقام پرور۔ معمولی معمولی چیزوں سے ہل جائے یا محسوس کرے۔

کونیم۔ جنسی افعال کے سرانجام نہ دینے کی وجہ سے مراق یا مانحو لیا۔

## ہسٹریا۔ باؤگولہ

اگنیشیا۔ بھاتی میں نمایاں کچھاؤ دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ۔ پانی جیسا صاف پیاب بہت زیادہ مقدار میں نہ بیان کی جانے والی بو والا۔ ٹھنوں کا کھینچا اینٹھن اور تشنج کبھی رونے کبھی ہنسنے۔ دورہ کے وقت پہلی طاقت ۵ استعمال کیجئے اور پھر اونچی طاقت۔ ہسٹریا کے لئے جوٹی کی دوا ہے۔ ایک عورت جس کا اپنا بچہ یا خاوند چھین جائے سرور دہو۔ بیخوابی۔ اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ خیال کرے کہ اس نے کوئی فرض پورا نہ کیا ہے۔ یقوتوفی کے کام کرے اور ان پر غور کرے اور وہ ان لوگوں کو دکھائے۔ وہ اپنے جوش میں دھن کی پکٹی۔ اگر تکلیف اگنیشیا دینے کے باوجود دوبارہ ہو جائے تو نیرٹرم میور دے تب جو اگنیشیا دے کہ مرہن ہے۔

اکیٹارسمیوسا۔ یہ پٹھوں کی اور سیٹھرائی اینٹھن کی جس میں اعصاب اور عضلات اور پٹھے متبادل ہوتے ہیں۔ بہت ہی ٹنکین یا جذبات غم میں دبا ہوا۔ ایام حیض شروع ہونے سے پہلے تمام علامات کی زیادتی۔ اس دوران میں تکلیف کا سبب عموماً ایام حیض کی بےقاعدگی یا رحم یا بیضہ دانی کی دوسری بیماریاں ہوتی ہیں۔

ایسا فیڈا۔ جب درد پیٹ میں سے باڈگولر اٹھنے کی وجہ سے ہو۔ دورے کے دوران کھائی ہوئی خوراک کی تپے پیشاب کی تکلیف۔ باڈگولر جو کہ دباؤ کے ساتھ حلق میں پھنسا ہوا یا گلے میں پھنسا ہوا معلوم ہو۔ متلی مریضہ اکثر ننگے کی کوشش کرے۔

سکوٹا وائروسا۔ احساس کے نہ ہونے کے جن میں خیر رادی طور پر پٹھوں کا پھرننا اور دھچکے لگنا۔ خاص طور پر بازوؤں اور انگلیوں کے۔

پلوٹھوکس۔ مدر فکھر کے دس قطرے دیجئے۔ اسٹیریا کی خاص دوائی ہے۔

سنائونم۔ جب دورہ دکاروں، متلی، تپے کے ساتھ ختم ہو تو ایام حیض دوران میں بہت زیادہ اور زیادہ عرصے تک خون حیض جاری رہے۔

میگنیشیا میور۔ تشنج، غش کھانا، باڈگولر غم کے حصہ میں تپنے کی طرت دباؤ، رحم کا تشنج، خون حیض سیاہ درد کر کے ہمراہ، ہر پانچ دن کے بعد لیکوریا، اور رحم کا تشنج، نظام انتہام درہم برہم، دوپہر یا شام کے کھانے کے بعد غش کھانا، دکاروں سے افادہ، ادھر ادھر چلنے سے دل کی دھڑکن کو افادہ۔

سینشواورینس۔ اسٹیریا حیض کے دبنے سے۔

اپریکاک۔ اسٹیریا متلی اور تپے کے ہمراہ۔

ویلیریانہ۔ اعصابی ہیمان، پخلانہ بیٹھ کے یا سکون سے نہ بیٹھ سکے، پھلٹنے والے درد جن کو حرکت سے افادہ ہو۔

نکس ماسکراٹ۔ یادداشت کا کھودینا، پچھلے واقعات کو بھول جائے کہ وہ تمام دن اپنے نیٹے سے باتیں کرتی رہی ہے، جب اسے بھڑا جائے تو یہ بھول جائے کہ وہ ابھی کیا رہی تھی

اونٹھ، غنودک، غشی، مریض کجالت، جراثی و پرتانی عجیب و غریب ماحول، خواب جیسی کیفیت اور بہوشی پیدا کرنے والی حالت سے تبدیل ہو کر غیر حاضر و ماغ۔ نیند آخر کار مدہوشی، جذبات و احساسات کا کھود دینا واقع ہو جاتا ہے۔ بدلنے والی کیفیت، ایک وقت ہنسے اور دوسرے لمحے ٹپکنے ہو جائے۔ مجھنے میں غلطیاں کرے۔ چیزیں اپنے قد سے بڑی معلوم ہوں لیکن جہاں کو مستقل مزاجی سے دیکھے تو صحیح معلوم ہوں۔ سر اور ڈاڑھی و ٹھوڑی کا چھاتی پر گرنا۔ یہ اس طرح گھومتا ہے۔ جسے کر یہ بہت بڑا ہو۔ منہ اور گلے میں خشکی۔ دل کی دھکن بہت اچھا رہے۔

بائیوسائیمس۔ معمولی تشنگ یا بغیر تشنگ کے ہسٹیریا کے دورے۔ دو، دو۔ تین تین گھنٹے پر محیط ہسٹیریا کے لمبے دورے۔ دورے کے دوران مریض بدل بدل کر چلتا ہے اور ہنسے۔ پیٹ پر انگلی تک لگانا برداشت نہ کرے۔

ماسکس۔ موزوں ہے جب مریض جلد ہی بہوش ہو جائے۔ ایک رضا سرخ اور ٹھنڈا دوسرا زرد اور گرم۔ پُرجوش۔ بُرا بھلا کہنے والا۔ بہوش کرنے والی ٹھنڈک صلی اور پُرجوش تشنگ پلاٹینا۔ تشدد کے جنون میں کارآمد دوائی ہے یا مغز و طبیعت رکھنے والے مریض۔

لیٹم ٹگریٹیم۔ ہسٹیرائی عورتوں کے لئے، وہ اچھے طریقے سے نہ بولیں یا اچھے الفاظ بولنے میں استعمال نہ کریں۔ بہت ہی زیادہ چڑچڑی۔ خیالی پلاؤ سے پُر۔ پاگل پن۔ مذہبی جنون۔ اور تصورات دل کی بیماریوں کے ہمراہ بچے کی طرف کھچاؤ جیسے کہ تمام اعضاء بچے کھینچ رہے ہوں۔

کیسٹوریم۔ نامکمل ہسٹیریا سے پہلے اعصابی دورے۔ ٹپھوں کا پھڑکنا۔ بہت زیادہ کمزوری کے ساتھ۔ دباؤ سے تکالیف میں آنا۔

### حیض کا قونچ زرد اور ٹھنڈے پسینے

تھائیرائیڈینم۔ بازوں اور چہرے کی سو جن یا استسقاء ہسٹیریا کے ہمراہ حیض کے وقت ہسٹیریا کے حملے۔ ہسٹیرائی دوروں کے رجحان کے علاج کے مندرجہ ذیل اقیات یا کسمی ہیں۔ زخم و لیڈر ۳۳۔ سپیا ۳۲۰۔ ماکس ۴۶۔ کالی فاس ۳۲۰۔ اور کوسٹیلر یا کچیا ہسٹیریا ڈائلیکشن۔

امونیا کارب :- تنگی تنفس، بیہوشی کے دردوں، بے چینی اور حرکت سے ناتوانی یا شدید کمزوری کے ساتھ ہرٹریا ۲۰۰ یا اس سے اوپر کی پوٹنسی دیکھئے۔

نیریم میور :- اگیشیا کی مزن ہے، جب اگیشیا عمل کرنا بند کر دے تو ریدی جانی چاہیے۔ ادل بدل کر روئے اور ہنسنے۔ اپنی محبت کے جواب کے جذبات کو قابو نہ رکھ سکے۔ شادی شدہ آدمی گھریلو نوکر کو چلان کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ عقلمند نہیں ہے لیکن اس سے بچ بھی نہ سکے۔ اس سے بچ بھی نہ سکے۔ اس دوا کا استعمال اس کے دماغ کو ٹھیک کر دے گا۔

ٹیزنولا اسپانیولا :- گانے اور ناچنے کی نہ رکنے والی خواہش۔ ناچنے کا جنون۔ سر کو مارے، بالوں کو نوچے، پکڑوں کو پھاڑے۔ چیزوں کو تباہ کرے۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو مارے۔ بورسے لوگوں کو منہ چڑائے۔ دورے بیہوشی اور نیند پر منتج ہوں۔

کونیم :- جنسی افعال سے رکنے پر میریا۔  
کاسٹیکم :- دوران حیض مرض میں زیادتی۔ خشک ٹھنڈی ہوا لگنے سے زیادتی مرض۔

## ضعف عقل

ٹیوبرکولینم اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہیے۔ علامات کے ساتھ دوسری ادویات کے ساتھ ۱۔ ایم طاقت پندرہ دن میں ایک دفعہ دیں۔

برٹیا کارب :- ضعف عقل کی چوٹی کی دوا ہے۔ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر بونے اور نہ بڑھیں یا نشوونما نہ ہو۔ پیٹ بھولا ہوا ہو۔ ٹھنڈے جلد متاثر ہوں۔ گلے کے غدود (لوزتین) سوجھ ہوئے۔ یہ ۱۔ ایم ٹیوبرکولینم سے ادل بدل کر دیا جاسکتی ہے

کلکیریا کارب :- پریشان تشویش مند۔ شام کے وقت زیادہ پریشانی۔ دلائل کے نہ ہونے سے ڈرے۔ ہر قسمی سے ڈرے۔ بھولنے والا پریشان کم حوصلہ۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ پریشانی ضد۔ ہٹ۔

برٹیا میور :- جو بچے منہ کھول کر چلیں اور ناک میں بولیں۔ دیکھنے میں بے وقوف۔  
کلکیریا فاس - کمزور۔ ڈبلے پتلے اور خون کی کمی والے مریض چڑچڑے ہر وقت کسی دوسری

جگہ جانا چاہیں۔

سفلیئم۔ درمیان کی دوائی جبکہ شیوہ کو لینم اور بریٹا کارب مکمل طور پر تھانہ دے سکیں  
یا جب وہ غیر مؤثر ثابت ہوں یہ ضروری ہے کہ مندرجہ بالا ادویات کے ساتھ ادول بدل کر یہ دوائی دی جائے۔  
ایستورا۔ ضعیف العقل بچے جو دماغی بھراؤ کی وجہ سے سمجھ نہ سکیں۔ اگر وہ ایک حد تک کسی  
امتحان کی تیاری کر رہے ہوں وہ مزید پڑھائی بے فائدہ محسوس کریں۔ جو کچھ پڑھایا گیا ہو وہ گڈ  
مڈ معلوم ہوا اور یاد نہ رکھ سکے۔

## تحریکات

آئیوڈم۔ گرم مزاج مریضوں میں جو ہمیشہ ٹھنڈی ہوا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے  
شدید تحریکات محسوس کریں، بغیر کسی وجہ کے کسی بیٹنا چاہیں۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کی تحریک  
لیکن مزاحمت کرے۔ کسی کو مارنے یا تباہ کرنے کی نہ کرنے والی اچانک خواہش یا تحریک۔  
آرم میٹ۔ اپنے کو بھنڈی یا کھر مکی سے گرا کر خودکشی کرنے کی تحریک۔ خودکشی کے خیالات  
کو دبانے کی تحریک۔

نیکسو امیکا۔ خودکشی کرنا چاہے لیکن حوصلہ نہ پائے۔ اپنے بچے کو لگ میں گرانے کی تحریک۔  
آر سیٹک البم۔ حجام جو کہ سرد مزاج مریض ہو گرم کمرے میں رہنا چاہے۔ شیوہ کے دوران  
میں اپنے لاکھ کو اترے سے قتل کرنا چاہے۔

آرجنٹم نائٹریم۔ دریا میں جھلاک لگانے یا کھر مکی سے کود جانے کی تحریک۔

لالائی سین۔ اپنے گوشت میں چاقو گھونسنے کی تحریک۔

اسٹیل گوائیم۔ خودکشی کرنے کی تحریک خاص طور پر پانی میں ڈوب کر۔

الیومنا۔ جب تیز دھارا آلا یا خون دیکھے اندر سے خواہش اٹھے اپنے آپ کو قتل کرنے کی۔  
پلاٹینم۔ اپنے بچے کو قتل کرنے کی تحریک یا جوش۔ اپنے خاوند کو قتل کرنے کی نہ کرنے والی خواہش  
جسے کہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہوا اور اطمینان کی ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہو۔

سٹیف سگریا۔ کسی آدمی پر چیزیں دے مارنے کی تحریک جس نے معمولی سی بات بھی طبیعت

کے خلاف کی ہو یا خیالی شخصے سے پرہیز اپن -

ہمیں سلفر - تشدد کرنے کی تحریک یا خواہش اور قتل کرنے کی خواہش بغیر کسی ناراضگی کے اور بغیر کسی وجہ کے اس دوائی اور آرسینک ایلیم میں زیادتی مرض کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دلو ٹھنڈی یا سرد اور ٹھنڈے متاثر ہونے والی ادویات ہیں وہ گرمی اور حرارت چاہتے ہیں جبکہ آئیوڈیم کا مریض گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈے ماحول میں رہنا چاہتا ہے -

مرکبورس سال - جو کوئی اس صورت سے اختلاف کرے اس کو مارنے کی خواہش - مارنے کی خواہش یا خودکشی کی خواہش یا چیزوں پر تشدد کرنے کی خواہش - ڈرے کہ عقل کھو بیٹھے گا - جو تحریک تکمیل کی ہے -

## بے رُخی - بے اعتنائی - بے پرواہی

امبر گریا - ہر چیز سے بے رُخی - خوشی سے، غمی سے، لوگوں سے وغیرہ وغیرہ - ایسی چیزیں جو دوسروں کا دل توڑ دیں، ان سے بھی بے رُخی -

ایسڈ فاس - جب جنسی شافل کی زیادتی سے کمزوری لاحق ہو جانے کے بعد زندگی کے معاملات سے بے رُخی ہو - ہر چیز سے دماغ بے اعتنائی برتے - زندگی میں یلیدرونی دنیا میں دلچسپی نہ دکھائے -

آرنیکا دماغ کی چوٹ

سکوٹا کے بعد بے رُخی

فاسفورس - شراب نوشی کے بڑے اثرات کی وجہ سے اپنے بہت ہی پیارے دوستوں سے بے رُخی اختیار کرے - اپنے بچوں سے بھی بے رُخی اختیار کرے -

سائیکلین - سن یا کس (عورتوں میں ہم سال کی عمر کے بعد جب جین بند ہو جائے) میں دائمی خلل سے بے رُخی -

فلورک ایسڈ - جن کو بہت زیادہ پیار کرتا ہو ان سے بے رُخی لیکن انجنیوں کو پسند کرے - سیسیا - اپنے خاندان اور ان لوگوں سے جن کو بہت پیار کرتا ہے بے رُخی یا بے اعتنائی برتے

## جنون، مایہ نولیا، (جنون یا ضبط بھی دیکھیے)

ہائوسائٹس۔ مریض باتونی، لڑاکا اور اپنے آپ کو ننگا کرنا چاہے۔ وہ کینہ پرور اور مرقاتی ہوتا ہے۔  
 احمقوں جیسی ہنسی ہنستا ہے۔ مضحکہ خیز ہنسی ہنستا ہے۔ مضحکہ خیز اشارے کرتا ہے۔ لوگوں کی  
 طرف چاقو لے کر دوڑتا ہے۔ جو لوگ اسے ملتے ہیں انہیں مارنے دوڑتا ہے۔ جو قتل کرنے کی کوشش  
 کرتا ہے۔ آدمی کو سوہ خیاں کرتا ہے۔ جو مخمور جانوروں کے کاٹے جانے سے ڈرتا ہے۔ مایوسی  
 کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈبو کر خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ خیال کرے کہ وہ غلط جگہ پر ہے۔ احمقوں  
 جیسی ہنسی ہنستا ہے۔ تقریباً ہر وقت خوش خوش، جلدی جلدی بولے اور خوشی کے انداز میں بولے  
 شدید حاسد۔ جسم کو ننگا کرنے کا رجحان اور اجنبی اعضاء دکھائے عشقیہ اور فحش گانے گائے۔

بیسلا ڈونا۔ جب سر میں اجتماع خون ہو۔ آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوں۔ اور مریض  
 بہت ہی غصہ میں۔ کپڑے پھاڑے۔ کاٹتا ہے۔ مارتا ہے۔ دولتیاں جھارتا ہے۔ چھیلا جاتا ہے۔  
 ایسڈ فلور۔ جنون یا ضبط کی ایسی حالت جب ایک کونے میں تمام دن خاموشی سے بیٹھا ہے۔  
 بغیر ایک لفظ بولے جب بلایا جائے تو مشکل بولے۔ (پلسٹیللا)

سٹرامونیم۔ حاد جنون یا تیز تازہ جنون بغیر سر کی علامات کے۔ تصوراتی لوگوں کو مایہ جیزوں کو دیکھے۔  
 مایہ نولیا ڈرا ہوا۔ بہت باتونی۔ روشنی کی خواہش کرے۔ یعنی روشنی چاہے۔ کھانے پینے سے بچے  
 اور کہے کہ ان میں زہر ملی ہے۔ بے چین۔ کانپے۔ بلا ارادہ پانخانہ اور پیشاب خارج ہو۔ محل کے  
 دوران پاگل پن۔

اگیر کیس ایم۔ بے خوف۔ دھمکیاں دے۔ تباہ کرنے کا جنون۔ اپنے اپنے کے خلاف ہو۔  
 اور زخمی کرے۔ جھگڑائیاں کرے۔ شعر کہے۔ خوش و خرم اور لاپرواہ۔ احمقانہ اور گھٹیا باتیں  
 کہے۔ بے موقع گائے اور سٹیاں بجائے۔

آرم میٹ۔ غلط ذہن۔ زندگی سے محبت نہ خود کشی کرنا چاہے۔ دبا ہوا۔ افسردہ۔ مل سکتے  
 ناامید، کم حوصلہ۔ اپنے آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لئے غیر معززوں تصور کرے۔ ہر وقت لڑے

گرم موسم میں افات اور بخندے موسم میں زیادتی مرض -  
 آر جڈم ٹائیر ٹیکم - مجنوں کا بڑھنے والا فالج یا زیادہ ہونے والا فالج -  
 سلیشیا - انفلوئنزہ کے بعد جنون -

ٹیرنٹولا ہسپانیولا - جنون اچانک ذہنی تبدیلی کے ساتھ جس میں وہ اپنے آپ کو یا دوسروں  
 کو مارے، پھاڑے، کھڑے کرے اور تباہ کرے - اچانک شدید اور تباہ کن حرکات - دورے  
 کے بعد انوکس کرے اور معذرت کرے - کسی ہونے والے واقعہ سے ڈرے - کسی چیز سے ڈرے  
 جو کہ موجود نہ ہو - خطرناک چیزیں دیکھے جو کہ وہاں نہیں نہی موجود ہیں - بے قابو ہو کر لپچے اور  
 گائے - سمارے اور بال نوچے - بے چینی، آنکھیں کھلی اور کچی لگا کر دیکھے -

لیکسس - مذہبی جنون - خود پسند - حاسد - نفرت اور ظلم کرنے والا - اپنے سے بے جا  
 محبت - حسد - بدگمانی - جب وہ کسی کو آہستہ آہستہ باتیں کرتے دیکھے خیال کرے کہ وہ اس کے  
 متعلق ہی باتیں کر رہے ہیں -

کینابلس انڈیکا - بہت اونچے خیالات کے ساتھ جنون - دقت آہستہ آہستہ گزرے - جگہ  
 غیر محدود معلوم ہو -

آرسینک ایلیم اور { ہر گھنٹے میں تبدیلی ہو - ایک ہفتہ کے لئے - جب جنون وقفہ دار بخار  
 وریٹرزم ایلیم کے ساتھ ہو - دو ہر چڑھے - مریض غم دار ماحول میں رہے -  
 نیرم سلف - جنون اور دماغی تکلیف سر میں زخموں کے ساتھ

لائی سین ۲۰۰ - جنون پانی اور نہانے کی دماغی علامات کے ساتھ پانی پینے کی بھی خواہش  
 ہو - اپنے گھر کی محبت پر سے کود جانا چاہیے -

کالی بروم - کسی خاص نام کو سکندر اور خاص چیز کو دیکھ کر غصناک ہو جائے -

کاشیکم - شدید بیزان کے ساتھ جنون - دماغی کمزوری - ناامیدی - پھنسیوں پر مرہم دفرہ  
 لگا کر دبانے سے ناامیدی -

برٹامیسو - کسی بھی قسم کا جنون بڑھی ہوئی اور شدید نفسی خواہش کے ساتھ - ٹھوں کی ہمتی ہوئی

کمزوری اور بڑھے ہوئے غم دور۔

سائیکالین۔ جب حیض جاری ہونے پر مایخولیا کو افاقہ ہو۔

سلفر۔ بجھرے ہوئے خیالات، اپنے خیالات کو مجتمع نہ کر سکے۔ جلد باز۔ تیز تر چلے۔ اپنی

خوراک پر تھکے۔ زچگی کا جنون یا پاگل پن۔ بچہ کی پیدائش کے بعد خاندان سے دلچسپی نہ رکھے۔

بچے کو دودھ نہ پلائے۔ خاموش رہنا چاہے۔ ہزار پوٹینسی میں دت بجئے

کروکس۔ شدید غصے میں پھٹ پڑے، اپنے بہترین دوست یا رشتہ دار کو دینا چاہے اور اس کے

فوراً بعد یثیان ہو جائے۔ طبیعت بدلے۔ ہنسنے کے بعد روئے۔

تھو جوا۔ مریض اپنے آپ کو شیشے کا بنا ہوا تصور کرے۔ ایسے اپنی جلد کو محفوظ کرنے کے

لئے کاغذات میں یا کسی دوسرے سامان میں لٹے۔ کسی بھی چیز کو چھونے سے ڈرے کہ وہ ٹوٹ کر

دو حصوں میں نہ بٹ جائے۔

ملی لوٹس۔ یہ دوائی ظاہر ہوتی ہے جب مندرجہ ذیل علامات ایک ساتھ ہوں۔

(۱)۔ مریض بھاگ جانا چاہے، خود کو مارنا چاہے۔ کینڈرور۔ جو قریب آئیں انہیں مارنے کی

دھمکیاں دے۔ خیال کرے کہ اس کے معدے میں شیطان ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اس کی

تردید کرتا ہے۔

(۲)۔ اپنے آپ کو پھپھانا چاہے کیونکہ وہ خیال کرے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

امصابی۔ بڑول۔ اور بچا بولنا چاہے کیونکہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ بے خوابی۔

(۳)۔ پنج نکلے اور اپنے آپ کو مار دینے کا جنون۔

(۴)۔ مذہبی جنون یا مذہبی مایخولیا۔

ورٹیرم ایلم۔ چیزوں کو تباہ کرنا چاہے۔ اپنے کپڑوں کو بھاڑ دینا چاہے۔ نمایاں تشدد اور

تباہ کن۔ اپنے اگھنٹوں پر گھنٹوں دعا میں مصروف رہے۔ یقین کرے کہ وہ بلند مرتبہ جیسی ہے

زچگی کا جنون اور استریوں کے بل ٹھنڈک اور ٹھنڈے سپینوں کے ساتھ۔ یہ ایک تہائی مریضوں

کو ٹھیک کرنے کا امکان ہوتا ہے۔ مذہبی جنون، دلجوئی نہ کی جاسکے۔ کمرے میں ادھر ادھر

دورے۔ زمین پر ہی نظر رکھے یا کونے میں بیٹھ کر کڑھے، گریہ زاری کرے یا روئے،  
 سپیا۔ موقفی حیض کے خون کے ساتھ۔ تنگی نفس اور قبض، گرم طبیعت رخص ۲۰۰  
 پونسی کی خوراک میں دیجئے۔

سٹیفگیریا۔ حلق یا ہاتھری کی وجہ سے پاگل بن یا خون۔ جو کوئی بھی قریب آئے اسے لعنت  
 بھیجے یا گالیاں دے۔

ناسفورس۔ حلق یا ہاتھری کی وجہ سے پاگل بن یا حد سے زیادہ جنسی مشاغل میں مبتلا ہونا۔  
 فق کے نتیجے کی وجہ سے پاگل بن۔ دماغی اور ریڑھ کی زری یا کوئی اور ضائع کرنے والی بیماری  
 ایڈوڈم۔ جنون کے آخری مراحل جب پریشانی دماغ میں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچتی ہے  
 وہ معمول جاتا ہے کہ اس نے ابھی کیا سوچا تھا اور پریشان ہو جاتا ہے۔ دماغ آرام کرتا ہوا نہ  
 دکھائی دے اور دماغ تیز تیز خیالات اس کو پاگل بنا دیں۔ کھانا کھاتے وقت خیالات کا زبردست  
 اجتماع۔ باتونی پن ذہن میں خیالات اتنی تیزی کے ساتھ آئیں کہ وہ گھنٹوں بھوش اور بہت  
 ہی زیادہ اعتماد کے ساتھ بولتا چلتے۔ غیر معمولی بصیرت یا عیب دانی۔

اینا کارڈیم۔ بہت ہی زیادہ دماغی کمزوری کے ساتھ خون پاگل بن۔ ذہن مرکوز کرنے میں  
 دقت، سرد مہری۔ مراق۔ مایحویا۔

آرم آرسینکم۔ متعصبوں کا پاگل بن۔ شرابیوں کا، مذہبی لوگوں کا پاگل بن۔ سخت افسوس  
 کرنے والا۔ باتونی پن اور ہنسنا۔ زندگی سے شدید نفرت۔ شدید چڑچڑاہٹ۔ ہڈی اور  
 آسانی سے ناراض ہو جانے والا۔ اپنے آپ کو غلط کام پر ملامت کرنے والا۔ دوسروں  
 کو تصوراتی زخموں کے لئے ملامت کرے۔  
 بیوفو۔ کاٹنے کی رغبت یا رجحان۔

حسد۔

بائیوسائیمس۔ قتل کی کوششوں، غصے اور بد اعتمادی کے ساتھ، شہوانی جنون کے ساتھ۔  
 حسد کے برے اثرات۔

اپس ملیکھا۔ سورتوں میں بدگمانی اور حسد۔ گرمی۔ گرم کردوں اور گرم پانی سے نہانا جس سے مرض میں زیادتی۔

لیکس۔ ڈراؤنے تصورات کے ساتھ۔ منہ بھرانے کا رجحان بعض کمزیر نظریات یا خیالات تکالیف سے یا امراض سے، بیوی اپنے خاوند پر اور خاوند اپنی بیوی پر اعتماد نہ کرے۔ ہمیشہ ان کے اعمال اور حرکات کی نگرانی کریں۔ تکلیف کی توقع کرے۔ لڑکوں میں بدگمانی اور حسد۔ اپنی دوست لڑکی سے بدگمانی۔

پلسٹیلہ } اگر مندرجہ بالا ادویات  
نکسوامینکا } ناکام ہو جائیں تو ان ادویات  
سٹرمونیم } کو دی گئی ترتیب سے استعمال کرائیے۔

### ناکام محبت

ایسڈ فاس۔ جب ناکامی محبت کی وجہ سے اونگھ آئے۔  
ہیلی بورکس۔ جب ناکامی محبت کی وجہ سے قلت حیض واقع ہو۔  
ہائیو سائیمس۔ مایوسی، امرگی، ہنسے کی طرف مائل یا رجحان۔ مانیجولیا۔ خودکشی کی طرف مائل جس میں اپنے آپ کو ڈبو کر مرنے کا رجحان ہو جسد۔ ناخوشگوار محبت حسد کے ہمراہ۔  
اگنیشیا۔ جب محبت کی ناکامی غم کے ساتھ ہو جب ایک حساس نوجوان لڑکی اپنی محبت کے متعلق سمجھے کہ اس نے غلط محبت کی ہے اور نوجوان نے اسے مایوس کر دیا ہے۔ وہ اس دوائی کا استعمال سے فلاسفر اور سمجھدار بن جائے گی۔

نیرم میور۔ ناکام محبت۔ محبت کا تعلق توڑ دینا چاہے لیکن توڑ نہ سکے۔  
جب اگنیشیا ناکام ہو جائے تو یہ دوا دیجئے۔

### محبت میں گرفتار ہونا۔

نیرم میور۔ محبت میں غلط طور پر گرفتار ہو جانا۔ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ شادی شدہ مرد یا گھر میں ملازم سے جس سے عام طور پر بچے، وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اس معاملہ میں بے عقل ہے۔

لیکن اس سے بچ نہ سکے۔ اس دوائی کا استعمال اس کے دماغ کو صحیح کر دیا۔  
باتونی پن - (دیکھئے بولنا)

## جھوٹ بولنا۔

ادبچم - جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہوں ان کیلئے یہ دوائی مفید ہے۔  
کلکیریا کارب - چوری کرنے اور جھوٹ بولنے کا رجحان۔  
مارفنینم - جھوٹ بولے، چڑچڑاہن، نقائص نکالے، خواب جیسی حالت میں ہو۔

## جنون - (دیکھئے۔ پاگل پن)

برٹیا میور - کسی قسم کا بھی جنون، بڑھی ہوئی شہوانی خواہشات کے ساتھ۔  
ملی لوٹس - بھاگ جانا چاہے یا اپنے آپ کو قتل کرنا چاہے۔ آوارہ جو کوئی بھی تہرب  
جائے تو اسے مارنے کی دھمکیاں دے۔ مذہبی مانجولیا یا مذہبی جنون۔  
سٹر امونیم - شدید جنون قتل کر دینے کے رجحان کے ساتھ۔ پھرتے سے زخمی کرنے یا کاٹنے  
کا رجحان۔ پریشانی کے ساتھ اپنے منہ کو سوراخ کی طرح کھینچتا ہے۔ روشنی اور رفاقت کی خواہش  
تالیاں بچائے۔ حمل کے دوران - مذہبی جنون - ہر وقت دعا مانگنا چاہے۔ فضول اور بے  
سر و پا خیالات کے بولے۔ غریب نظر یا اودام نہ دہائی کیفیت کے ساتھ۔ زچگی کا جنون۔ باتونی  
اپنے آپ کو بے اختیارانہ گرائے۔ روشنی میں کیفیت خراب اور اندھیرے میں افاتہ۔  
کو کو لوس انڈ - جب حیض کے دہنے کی وجہ سے یا رکنے کی وجہ سے جنون لاحق ہو جائے۔  
ہائیو سائیس - مزاج پرے اتار کر نگاہنا ہونا چاہے۔ حسد کے ساتھ جنون۔ احمق۔  
درمیرم ایلم - ہر چیز کو کاٹنا اور بھاڑنا چاہے۔ خاص طور پر کپڑوں کو۔ ہر کسی کو چومنا چاہے۔  
لیکسس - گھر کی تباہی و بربادی کے بعد جنون۔ مرگی کے حملے سے پہلے جنون۔ مذہبی جنون  
برائی اور ظلم سے بھرا ہوا۔ خود کو دھوکہ دے۔ حامد نفرت اور ظلم۔ وہ اپنے رشتہ داروں  
اور دوستوں کو اپنے بُرے افعال کی وجہ سے اپنی روحانی ٹھیکار کی کہانی بنا کر ناراض کرے۔

اوپر - ٹھارڈ نے خیالی تصورات - فحش - ناشائستہ -

سیدیا - بہت زیادہ خوضِ حیض کے دوران جنون یا سن یاس کے وقت جب اپنا ملک  
خونِ حیض کے بند ہو جائے اور خاندان سے دلچسپی نہ رہے -

پلسٹیللا - حیض کے دہنے کی وجہ سے جنون -

بیلڈوفا - ایک ٹیڑھ خوش لیکن دھڑلے طرزِ ارد گرد بیٹھے والوں پر حقو کے یا کاٹنے دڑے - یہ ٹیڑھ  
اور ہائوسائٹس کے درمیان کی دوائی ہے، جو لنگ جاتا ہے - کود جاتا ہے - تندرستے جانے پر گر جاتا ہے -  
مکرویر - جنون، رات کو کپڑے دور پھینک دیتا ہے - کپڑے پھرتا ہے - برا بھلا کہتا ہے - بوتا ہے  
اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتی ہے - اکثر تھوکتی ہے - اپنے پاؤں سے تھوک کو پھیلا دیتی ہے اور کچھ  
تھوک خود ہی چاٹ جاتی ہے - گائے کا گوبر یا جوہڑ کا گار اچاٹتی ہے - کسی کا کوئی نقصان نہیں  
کرتی لیکن جب چھو ا جائے تو زحمت کرتی ہے - اجنبیوں کو ناک سے کھڑکنے کی زبردست خواہش  
جب چل پھر رہی ہو یا سیر کر رہی ہو -

ٹیرنٹولا سپائینولا - جنون - پہلے ڈاک پھر ایک کوگالیاں دے - جس چیز پر ہاتھ پڑے یا جو چیز  
ہاتھ میں آئے تباہ کر دے - اپنے کپڑے پھاڑے، ہنسے اور گائے، بوڑھے آدمیوں کی عمر کی وجہ سے  
منہ بنائے - دورہ بیہوشی کی نیند پر ختم ہو - چاہے کہ ہر چیز حرکت میں ہو - کسی دیکھنا برداشت  
نہ کرے - چاہتی ہے کہ اس کے رشتہ دار گھر کے ارد گرد بغیر کسی مقصد کے گھومیں - وہ نہیں چاہتی  
کہ کوئی بیکار بیٹھے یا سست ہو -

سلفر - فلسفیانہ جنون - کچھ نہ کرنا ہر وقت سوچتے رہنا کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا اور آخر کار  
قدرت پر چھوڑ دینا - اور تب پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا - اسکا باپ کون تھا اور امی طرح -  
اکیڈا سیموسا - اعصابی درد کے غائب ہونے کے بعد جنون -

کیوپریم میٹ - جنون کے دورہ کا خاتمہ پسینہ پر ہو -

پلاٹینا - پریشان کن حالات کے بعد -

آئیوڈم - خاموشی اور سوچ، پجار کے بعد جنون میں افاتہ -

کلکیر یا کارب - مذہبی جنون - مذہب کا پابند جنون کے نتیجہ پر کے طور پر مناسب کی تہذیبی رہے۔  
 کیمفر - زندگی کا جنون آنکھیں ٹکڑی ہوئیں - شرارے بھٹکتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے - زرد  
 چہرہ - اور ماتھا ٹھنڈا - گالیوں کی زبان میں لعنت طامت کرے۔ جلد خشک -  
 نکسو امیکا - بے خوابی کی وجہ سے جنون - منہ کھل لیتا ہوا - اور پر جوش -  
 اسٹیلگو - ہانے کا جنون - خود کشی کرنے کی تحریک خاص طور پر ڈوب کر -  
 مائیو یا (پاگل پن میں دیکھے) - بھول جانا ادماغی غیر حاضری - حافظہ یادداشت -  
 اور سوچنا -

## کنجوس - بنجیل

لائیکو پوڈیم - حرص - طبع یا کنجوسی کی عادت کی چوٹی کی دوائی ہے -  
 پلیٹیل - کنجوس - ناقابل اقدار - غیر دماغی طور پر غیر مامور اور کم حوصلہ -  
 آریسٹیکم ایلیہم - جب مندرجہ بالا ادویات فیل ہو جائیں تو کنجوسی کی عادت ہٹانے کیلئے مفید ہے -

## غلطیاں -

لائیکو پوڈیم - حساب کتاب - حروف تہجی - الفاظ کے استعمال میں ہجوں میں لکھنے میں غلطیاں کرنا -  
 نکسو امیکا - وہ پیمائشوں اور اوزان میں غلط جواب دیتا ہے -

غلزبان  
 نکس ماسٹا  
 پڑولیم

جگہوں یا محل وقوع میں غلطیاں کرنا - دیئے گئے نمبر پر آرائش کیجئے -

نیرم میور - بولنے اور لکھنے میں غلطیاں کرنے کا رجحان  
 کینا بس سٹائیوا - لکھنے اور بولنے میں غلطیاں کرتا ہے جو کچھ پڑھتا ہے یا سنتا ہے -  
 اس میں غلطیاں کرتا ہے -

چائٹا - غلط الفاظ استعمال کرے یا الفاظ کو غلط جگہ استعمال کرے -  
 لیکس - الفاظ لکھتے وقت غلطیاں کرے -

کھوجا۔ پڑھنے اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔ آہستہ بولے جیسا کہ الفاظ کھودے۔  
 زیر وفا شیلم۔ گند ذہن۔ مطالعہ کے وقت ذہن یکسو نہ کر سکے۔ نام بھول جائے۔ الفاظ کے  
 آخری لفظ پہلے لکھے، عام الفاظ کے غلط ہجے کرے۔

الیومنا سلیکٹا۔ بولنے اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔ بھول جائے۔ بے پردہ۔  
 ڈھسل یقین۔ یا غیر یقینہ یقین۔ خیالات کی کمی۔

مذاق اڑانا یا ہنسی اڑانا

دوسرے لوگوں یا رشتہ داروں کا مذاق اڑانا۔  
 دی گئی ترتیب میں دوائی آزمائیے۔

{ یکسس  
 پلائیم

جلد گھبرا جانا۔

کیلیڈیم۔ بہت زیادہ گھبراہٹ۔ اپنے ہی سائے سے گھبرائے۔ شہوانی خیالات کے ساتھ  
 تمام رات جاگتا رہے۔ سونے سے پہلے اندیشہ۔ مستقبل کا ڈر۔ احمقانہ جرات۔ دروازے کا  
 زور سے بند ہونا یا اخبار کے کھر کھرانے سے چونک جائے۔

ایٹوڈم۔ سخت گھبراہٹ۔ چیزوں کو دور پھینک دے۔ اور ان کو توڑ دے۔ بغیر کسی وجہ کے  
 لوگوں کو پشیمان یا مارنا چاہے۔ بھولنے والا۔ کمزوری اور چڑچڑاہٹ۔

ایسٹ فاس۔ پرانے علم کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ زیادہ دماغی کام۔ جنسی مشاغل کی زیادتی  
 جسم اور دماغ پر اعصابی دباؤ۔

کیسٹوریم۔ ٹائیفاؤڈ بخار کے بعد اعصابی کمزوری اور چڑچڑاہٹ۔ اعصابی کمزوری کے حملے  
 جبکہ نامکمل ہڈیا ہو۔ شدید کمزوری کے ساتھ بٹھوں کا پھٹنا۔

ایپس میلیفیکا۔ لڑکیوں میں اعصابی کمزوری۔ بے چینی کے ہمراہ۔ گھبراہٹ۔ بے وقت کی  
 ہنسی، کام کے وقت متلون مزاجی۔ بھدی چیزوں کا ہاتھ سے گر پڑنا۔ اور تب ہنسنا۔

کالی فاس۔ اعصابی کے لئے شاندار اور چھوٹی کی دوا ہے۔

لیک کنسیم۔ ضرورت سے زیادہ حساس۔ مثال کے طور پر ایک مریض کئی دنوں سے انگلیاں علیحدہ علیحدہ کئے ہوئے پڑا ہے اگر وہ جڑ جائیں تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔

نیز کم کرب۔ معمولی سی آواز سے گھبرا جانا یا پریشان ہو جانا۔ درد آواز سے کانور سے بند ہو جانا۔ اعصابی گھبراہٹ اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ تھکاوٹ کے ساتھ۔ کاغذ کا گھر دکھانا۔ دل کی دھڑکن اور چڑچڑاہٹ پیدا کر دے۔ گانا خود کشی کے جھان کا سبب ہے۔ کانیا۔ اعصابی گھبراہٹ۔ بے خوابی۔ رونے کا جذبہ۔ اعصابی درد۔ پٹھوں کا پھرنے۔ دانت درد۔ پھرے کا درد۔ سُرخ چہرہ اور گرم سر خاص طور پر خوشی کی وجہ سے یا اچانک خوشی یا مریض کسی بڑے کام کے لئے محنت کر رہا ہو۔

کالوسٹیکس۔ جھلکا ہٹ یا چڑچڑاہٹ اور اعصابی تھکان۔ کاروبار میں ناکام ہونے کی وجہ سے یا عورت میں جو اپنے خاوند کی دن رات نگرانی کرے دوسری عورتوں سے دور رکھنے کیلئے۔ کو نیم۔ رائڈ عورت اور رائڈ مرد میں اعصابی تناؤ جو کہ اپنے جنسی تعلقات سے اچانک ختم ہو جائیں۔ جسم اور دل کی کمزوری دماغی یکسوئی نہ کر سکیں۔ کانپنا۔ ہلنا اور پٹھوں کا پھرنے۔ اعصابی۔ پڑمڑہ حالت۔ زندگی سے تھکے ہوئے۔

کالی آئیوڈ۔ اعصابیت اور دماغی تھکاوٹ۔ جب آرام کر رہا ہو اور لگاتار حرکت اور چلنے سے مرض میں زیادتی سخت ظالم اور چڑچڑا۔

کروٹیلیس ہوا۔ اعصابیت اور دماغی تھکاوٹ۔ کانپنا ہوا۔ گھبراہٹ ہوا۔ کمزوری۔ قوت حیات کی اچانک اور شدید کمی اور انتہائی کمزوری۔ باتونی۔

آرم میٹ۔ راندہ ہوا، غم سے پُر۔ ہر چیز سے غیر مطمئن۔ مانجولیا۔ تصور کر کے کہ وہ اس دنیا کے لئے غیر موزوں ہے۔ موت کی خواہش کرے۔ جو اس کو خوشی دے۔ لڑاکا۔ جھلکا ہوا۔ شدید معمولی سی بھی اختلاف رائے برداشت نہ کرے۔

کیفہ۔ انتہا پسندی کی دوائی۔ پہلے پہل تشدد۔ جوش اور خون اور بعد میں جوش خائب، ہونا۔ بیہوش اور ٹھنڈا پن۔ شدید کمزوری اور تھکاوٹ شدید۔

نکسوامیکا - لڑاکا - ملامت کرے - تشدد کو بھی، طاقت و خوشنویات - تیز روشنی کوئی آواز  
یا بولنے کو برداشت نہ کر سکے - غیر مستقل مزاج -

کاکولس - ششاش بٹاش دکھائی دے - اپنی صحت کی طرف توجہ نہ دیں - دوسروں کی بیماری کیلئے  
زیادہ متوجہ اور پریشان بہت ہو - اعصابی نظام کی شدید بے چینی - معمولی سی بھی آواز یا حرکت  
آواز ناقابل برداشت، تھوڑی دیر کے لئے بھی بازو سیدھے کئے جائیں اور وہیں رکھے رہ جائیں -  
اور جب ڈھیلے کئے جائیں تو درد کریں - دماغ اور جسم کے کام آست، فالجی کمزوری پیدا کریں -  
تھکریڈون - بہت حساس اعصابی حالت کمزوری و کانپے، ٹھنڈک - پریشانی - غشی کھانے اور  
آسانی کے ساتھ گھبرا جانا -

جیلسمیم - ڈر - مدد اور مشکل کی شکایات - ایک سپاہی جنگ کو جاتے ہوئے بے اختیار  
پاخانہ کر دے - ڈر کی وجہ سے بلا اختیار پیشاب کرے - حیرانی و ڈر کا ہمراہ ہونا -  
آر جیٹم ٹائیٹریکیم - جب کسی دوست یا اجنبی کی ملاقات کے لئے یا ڈرامہ کے لئے کپڑے پہن رہا  
ہو تو اچانک اسپہال کا حملہ - یہ سب اعصابی اگساہٹ کی وجہ سے ہوتا ہے -

کریوزوٹم - ذہنی طور پر بہت چڑچڑا - بہت سی چیزوں کی خواہش کرے لیکن جب پیش  
کی جائیں تو انکار کر دے - کوئی چیز بھی موزوں نہ لگے اور کوئی چیز بھی اسے مطمئن نہ کر سکے -  
ضعف اعصاب - یا اعصابی کمزوری - اعصابی تھکاوٹ، دماغی تھکاوٹ

یا تھکاوٹ - ( دیکھیے دماغی تھکاوٹ اور غمی )

کالی فاس - ضعف اعصاب کے لئے بہترین دوائی ہے - یہ خاص طور پر ان کے لئے  
اچھی ہے جو کم اعصابی طاقت کے ساتھ یا کمزور اعصابی طاقت کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں -  
شرعیلے یا بہت زیادہ رات کو اختلام جماعت کے بعد شدید کمزوری یا جنسی طاقت گھٹی ہوئی  
یہ بڑی بڑی علامات ہیں

سٹرکنیا فاس - یہ دوائی کالی فاس کے بعد اچھی دوائی ہے - اعصابی طاقت کی بے ترتیبی

سے یہ دوائی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ یا بعض دفعہ بہت تھوڑی ذہن اور ٹھنوں پر کنٹرول نہ رہے۔ یہ عام قلتِ خون میں بھی دی جاتی ہے۔

پیکرک الیڈ۔ یہ سرکنڈیا فاس کے بعد مفید ہے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری اس کی رہنمائی بیشی ہے۔ تھوڑی سی محنت ہی سے تھکاوٹ محسوس کرنا۔ بولنے کی خواہش نہ ہو یا کوئی کام کرنے کی خواہش ہو۔ لیٹے رہنا چاہے۔ بھوک کی کمی۔ بے علمی یا بے سعی کا رجحان۔

امبرگر لسیا۔ بہت ہی ناخوشگوار اسٹیڈ کے درمیان رہنا پڑے جو اس کے حواس پر مسلط ہوں اور وہ ان سے ٹھیکار نہ حاصل کر سکے۔ تیز تجسس۔ بہت ہی ناخوشگوار چیزوں کے درمیان رہے۔ جو اس پر مسلط ہوں۔ اعصابی ٹوٹ پھوٹ۔ ٹوٹی ہوئی شخصیت۔ خاندان میں اموات۔ کاروبار میں ناکامی وغیرہ کے صدور کی وجہ سے ذہنی کمزوری۔

نیرم میور۔ ماضی کی تلخ یادوں پر غم و غمش ہو۔ رات کو جاگ کر ان پر ٹھہرا رہے۔ یہ انگلیش کی نرس ہے۔ اس کی تکمیل کرنے والی ہے۔

آر جنٹلم ناٹر ٹیکم۔ جب کافی فاس فیل ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔ خاص طور پر جب کہ ایک جہتی میں کمی ہو۔ اعصاب اور ٹھنوں پر اختیار نہ ہو۔ بازو کاٹنے ہوں۔ جب ملاقات مقرر کی ہو۔ وہ پشیمان ہو جاتا ہے۔ پسینہ پینہ ہو جاتا ہے۔ جب شادی ہو اور اس میں غائیہ ڈرامہ یا چرچ میں جائے۔ پشیمانی کے ساتھ ڈرے۔ یا اسپتال بھی آئیں ٹھائیوں کی زبردست خواہش جو موافق نہ آئیں۔ اعصابی یا نچولیا، پروردہ ٹھنڈک کے ہوا کاٹنے۔ دماغی تھکاوٹ چکر۔ نرم ٹپی اور دباؤ سے تکالیف میں افادہ ہو۔ خلق میں پھانس کا احساس ڈکارا اور گامری طوبت کی تے۔ گیس کی تکلیف جو گرگی سے اور رات کو زیادتی ہوتی ہے۔

زیمکم۔ دماغ اور ٹھنوں کی شدید تھکاوٹ جب یہ مرگی یا اس کے غلط علاج کی وجہ سے ہو۔ یہ کاروبار میں ناکامی کی پریشانی یا طلباء میں بہت زیادہ دماغی محبت کی وجہ سے ہو۔ یادداشت کمزور۔ سوچنے کی نااہلیت۔ چکر دے کے اکثر حملے جن کو لینے پر افادہ ہو۔ مریض بے پرواہ ہوتا ہے بغیر مہرہ ہوتا ہے۔ جنسی زیادتیوں سے نامردی۔ یہ دوائی کافی عرصہ تک پوٹیمی کی تبدیلی کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔

ہائپرکیم۔ اعصابیت کسی بھی قسم کی ہود صدمہ یا جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے یا کار کے حادثہ وغیرہ  
گفتار لائیتی ہوئی اور ہجک کے ساتھ۔ مریض خاموش رہے اور زندگی میں دلچسپی نہ لے۔

اینا کارڈیم۔ اعصابی تھکان۔ زیادہ پڑھائی کی وجہ سے یا مادہ منویہ کے اخراج کی وجہ سے۔  
یادداشت کمزور محسوس کردہ دو ہیں۔ اس کی ہر سمت یا ہر طرف اجنبی ہیں۔ اس کا اپنا بچہ اس کا  
بچہ نہیں ہے۔ ذہن اور جسم علیحدہ علیحدہ ہیں مختلف قسم کے اثرات کا دباؤ اس پر پڑ رہا ہو۔ ایک  
سے کہتا ہے کہ برائی کرے اور اچھائی کے لئے کہے۔ سب خواب معلوم ہو اور اس دنیا میں کوئی چیز بھی  
حقیقی نہیں۔

آرم میٹ۔ انسان کی یادداشت اور ذہن کا بگاڑ۔ دلیل دینے کے نااہل۔ سوچنے کے  
اہل۔ ذہنی صلاحیتوں کی کشمکش کا دوبارہ آدمیوں۔ طلباء پڑھنے والوں اور سوچنے والوں میں۔  
آرم میٹ۔ غم کی وجہ سے تسکلیف۔ ناکام محبت۔ ڈر۔ غصہ۔ اختلاف رائے عزت  
نفس کو بچکنے کی تسکلیف۔ اپنی حالت پر گڑھے اور دنیا سے نفرت کا اظہار کرے۔ اپنی ذہنی  
حالت کسی کو نہیں بتاتا۔ اور تب خود کشی کر لیتا ہے۔

کوئیم۔ ذہنی مشقت کے نااہل۔ یکسوئی کی کمی۔ کسی چیز پر توجہ نہ مرکوز کر سکے۔ آہستہ آہستہ  
ڈبکی ٹیکس۔ خوفزدہ۔ پشیمانی۔ علیحدہ رہنا چاہے۔ غمی۔ ناخوشیا۔ ناامیدی اور بے چینی۔  
فیصلہ نہ کر سکے۔ نبض بے قاعدہ۔ کمزور اور آہستہ۔ اپنے آپ سے کام لینے کی نااہلیت۔  
ہائپرکیم۔ لمبی بیماری سے اعصاب کا دریم بریم ہو جانا۔ چائے کافی کا بے تحاشا  
عادی ہونا۔ الفلوئینڈ کے بعد دماغی ہیجان۔

میگنیشیا کارب۔ زندگی کے تھپیڑوں کی زیادتی سے اعصاب کا تھک جانا۔  
۲۰۰ پونیسی دیکھے۔

زنک میٹ۔ آواز۔ کاغذ کے کھر کھرانے، بولنے یا اپنے بہترین دوست کی بات  
سننے سے بھی حساس۔

میفاٹیس۔ بخلی طاقت میں دینے سے اعصابی نظم کو درست اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔

ایپس ایم۔ اعصابی لڑکیاں، بے چینی اور اشتعال پذیری۔ بے وقت کی فہمی کام کے وقت متلون مزاجی۔ بھدی چیزوں کو ہاتھ سے گرائے اور ہٹے۔

کاربوئیٹک۔ چیزوں کو کھینے کی نااہلیت بلا تیز کردہ خوشگوار میں یا نا خوشگوار میں۔ جب خوفناک چیزوں کے متعلق بتایا تو وہ اثر کرتی دکھائی نہ دیں اور نہ ہی خوشگوار چیزیں اسے خوشی دیں۔ سکول کے لڑکے اور لڑکیاں جوتاہستہ آہستہ مکھیں اور رات کے خوف میں مبتلا ہوں۔ وہ اکیلے نہ سو سکتے ہوں۔ یا بغیر کسی اور کے کمرے میں نہ جائیں۔

سینٹور انگانا۔ احمق پن اور دماغی اتیری مریض ادھر ادھر اور ہر جگہ تیری سے بھٹتا۔ پھرتا ہے۔ کوئی کام شروع کرتا ہے بغیر مکمل کئے پھوڑ دیتا ہے اور دوسرا کام شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ سست اپنے آپکے یکسو نہ کر سکے۔

اگنیشیا۔ سرور کے ساتھ شدید اعصابی تھکاوٹ۔ کانپے بے خوابی کے یا خاوند کے کھو جانے یا موت کے بعد۔ وہ قوی ہے۔ اور سونہیں سکتی۔ اپنے آپ پر قابو نہیں لکھ سکتی۔ اپنے آپ سے شرمندہ ہے۔

ٹیوبوکرولیم لبود۔ محبت کا نہ رہنا۔ اپنے بچے یا خاوند سے محبت نہ کرے۔ ذہنی نااطاقتی۔ یہ علامات ٹی بی ہٹری کے ساتھ۔

کلکیریا کارب۔ مذہب، بغیر مستقل مزاج، ڈرپوک۔ بے چین اور اعصابی ڈرے کردہ ناخواستہ ہے۔ اتیری اور سوچنے کے نااہل۔ اندرونی دباؤ۔ افسردہ دل۔ پریشان۔ عورتوں کی موجودگی میں خوش نہ رہے۔ یا بے چینی محسوس کرے ٹھنڈے مرطوب موسم میں مرض میں زیادتی۔

ناجسا۔ بھول جانے والا۔ غیر حاضر دماغ۔ خودکشی کا رجحان۔ تصوراتی چیزوں پر کڑھے۔ معمولی سے جذبات کی وجہ سے رونے لگے۔ اپنی جنسی نااہلیت پر پریشانی اگرچہ چوڑاوش موجود ہو۔ جیسے کہ ہر چیز غلط کر رہا ہو۔ اور تصحیح نہ کر سکے۔ جو چیز کرنا ہو اس کا بہت زیادہ ادراک اور اسے نہ کرنے کا بے تاب رجحان یعنی اس کو کرنے کا نہ کٹر دل ہونے والا رجحان۔ احمق۔ پریشان۔

جیسی لولا۔ دماغ کا ادارہ پن۔ جیسی ایک چیز پر مرکب نہ رہ سکے۔ ایک چیز شروع کرنا  
 پھر اسے چھوڑ کر دوسری کرنے لگتا ہے۔ صہوک نہ ہو۔ پاش شدہ زبان۔ منہ خشک۔ گرم اور  
 بند کمرے میں زیادتی مرض۔ ایک ایم طاقت میں متبجے۔

کوکولس۔ ایک غیر پسندیدہ موضوع پر خیالات کا اجتماع۔ خیالوں میں گم اپنے  
 متعلق کچھ نہ دیکھے۔ ضعیف العقلی کا ظاہر ہونا۔ دماغ کو رامعلوم دے۔ غلام میں گھومے  
 آہستہ آہستہ آنکھوں کو سوال کرنے والی کی طرف گھمائے۔ بے شکل جواب دے۔ ضعف اعصاب  
 مریض کی لگاتار۔ تیمارداری خاص دلچسپی کے ساتھ۔ خاص طور پر عورت کا اپنے خاوند کا تیمار دار  
 بنایا خاوند کا پیاری بیوی کا تیمار دار بننا۔ پریشانی اور غنیدگی کمی۔ یہ پیشہ ور زبوں پر الحاق  
 یعنی وہ تیمارداری کی وجہ سے ضعف اعصاب میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ اس کا دماغ مست  
 کام کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے ابھی کیا کیا ہے۔ دماغ کی اتہری۔

لیک کینم۔ دل شکستہ۔ ناامید۔ زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس کی بیماری یوں  
 کن ہو۔ دنیا میں کوئی دوست نہ رکھتی ہو۔ رونے والا زان۔ علم کا بوجھ بڑھ چڑھا۔ بچہ ہرقت  
 پیچھے چلائے۔

سٹیفیگر یا۔ جب ایک آدمی اپنے حکام بالائے غیر مطمئن ہو اگرچہ اس نے اچھے  
 کلمات سننے کے لئے بہترین کام کیا ہو اور اپنی تمام طاقت کام کو سر انجام دینے میں صرف  
 کی ہو اس کے نتیجے کے طور پر وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ دوائی اسے فوراً بحال کر دے گی۔  
 ٹائٹلک الیڈ۔ بہت معمولی سی بات پر سیخ پا ہو جائے۔ کام کرنے کا میدان نہ ہو۔  
 بنجیہ کام کی تکمیل نہ کرنا چاہے۔ دماغ کمزور اور آوارہ۔ یادداشت کی کمزوری اور آوارہ اپنے  
 بہترین دوست سے بھی زیادہ ناراضگی۔ بیمار کی تیمارداری سے جسم اور دماغ پر بوجھ یاد آؤ۔  
 ڈر و سیرا۔ بے اعتمادی سے بھرا ہوا۔ جیسے کہ وہ بھڑے آدمیوں کے معاملات کر رہا ہے۔  
 بے چین۔ غلغلیہ طبیعت۔ بداندیش۔ حاسد لوگوں سے دھوکہ دینے جانے کا خیال کرے۔  
 ناموافق بات سننے سے ڈرے۔

سپینا - اعصابی اور کوونے والی - ہر کسی سے اور ہر چیز سے دور جانا چاہیے۔ اندھیرا  
میں ایلی آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا چاہیے۔ اگر وہ کس منٹ کی نیند لے لے تو وہ تبدیل شدہ  
صورت معلوم ہو۔ گند ذہن بے تعلق - تھکی ماندہ - پڑھ چڑھی - وہ احمقانہ اور بھڑکی ظاہر ہو۔  
بکھڑکی کمی، آہستہ سوچے اور بھول جانے والی ہو۔

پلاٹینم - جب ذہنی علامات ظاہر ہوں تو جسمانی علامات غائب ہو جائیں اور اس کے  
الٹ ہو جب دماغی طور پر خوش ہو تو جسم تکالیف میں مبتلا ہو۔ اور جب جسم آرام  
میں ہو تو ذہن متاثر ہو۔

سلیشیا - صبح کے وقت چلائے کر اس کے ہاتھ سوگئے ہیں، صرنبوں اور  
سوئیوں ہی کے متعلق سوچے۔ ان سے ڈرے۔ ان کو تلاش کرے اور احتیاط کے ساتھ گئے  
ہر جگہ پنوں کو تلاش کرے۔

نیوبرکولینم - ہر دم تبدیلی کی خواہش - سفر کی، کسی جگہ جانے کی اور کوئی مختلف  
کام کرنے کی خواہش - پاگل پن کے قریب لوگ۔

تھریڈون - ہر آدمی تمام جسم سے آریا ہوئی معلوم ہو۔ جسمی اور چکر کا بیج۔  
سٹرکولیا - یہ نظام دوران خون کو باقاعدہ کرتی ہے۔ یقوی - اہمال روکنے دل کے نظام  
کو درست کرنے اور اسے باقاعدہ کرتی ہے۔ اور بطور پیشاب آور کام کرتی ہے۔ کمزور دل۔

ایونٹافاس - سوالوں کے جواب دینے اور محفل سے یا لوگوں کی صحبت سے گریز کرے۔  
بہت پریشوش اور بھول جانے والا - غم کے مزن اثرات ایسٹ یہ انگیشیا کے بعد کی دوائی ہے۔  
ذہنی کمزوری - جنسی مشاغل کی زیادتیوں اور بہت لمبی مدت تک دماغی کام سے متغیر ہے۔ کالج  
کی زندگی کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ - ہر وقت لیٹے رہنا چاہے کیونکہ تھوڑی سی محنت یا چلنے  
سے تمام علامات واپس آجاتی ہیں۔ غیر حاضر دماغ اعصابی کمزوری - لا تعلق - غیر مستقل مزاج  
خیالات کی کمی - لمبی ذہنی شقت کے بعد ذہنی تھکاوٹ۔

کینابس سٹائوا - اپنے آپ کو مارنے کی سرگوشیوں کی سرسراہٹ مٹنے بجھ کر یہ اعلیٰ طاقت کی  
طرف سے حکم ہے۔

## ضدی - (ناراضگی بھی دیکھئے)

کیمومیلا - ضدی پختے - جو کچھ انہیں کرنے کو کہا جاتا ہے نہ کریں - چیزیں طلب کریں  
لیکن جب پیش کی جائیں تو لینے سے انکار کریں -  
کلکیر یا کارب - مزاجی دوائی ان بچوں کے لئے مفید ہے جن میں موٹے ہونیکا رجحان ہو -  
سٹیف گیاریا - بد مزاج بچے جو چیزوں کیلے چلاٹیں لیکن جب بجائیں تو انکار کریں -  
نکسوامیکا - دوسروں کی خواہشات کی مزاحمت کرے - پاگل پن - کثرت حیض -  
آرجنٹا ٹریٹیکم - بہت ہی ضدی جب کسی چیز کی تحویز کی جائے تو تعجب و غریب اقلافات  
کے نم کرے میں گھٹن محسوس کرے - عجیب خیالات سے بھرپور - ہر چیز ٹھنڈی چاہے - ٹھنڈی  
ہو - ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی خوراک چاہے -

### چڑچڑاپن

آرم میٹ - چڑچڑاپن، خوشی سے تبدیل ہونے یعنی چڑچڑا اور پھر خوش و خرم -  
لائیکوپوڈیم - اسہال میں یا جاگنے پر چڑچڑاپن -  
کیمومیلا - بچوں میں چڑچڑاپن - دانت نکلنے کے دوران تنگی تنفس کے ساتھ -  
فیرم میٹ - چڑچڑاپن - تردد کو برداشت نہ کر سکے - لڑاکا -  
پٹرولیم - بہت چڑچڑا - کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے مار پیٹ کرے -

### سمجھ - ادراک

کالچیکم - ٹائیٹانیڈ بنجاریں ادراک میں کمی جائے یا سمجھ میں کمی آجائے -  
برٹیا کارب - جسمانی طور پر کمزور بچوں میں سمجھ کی کمی -  
پلمبیم - آہستہ آہستہ سمجھے - آہستہ محسوس کرے - فالجی دیوانہ پن - دماغ کی کارکردگی

مست۔ یہ سب آخر کار نالج پر ختم ہو۔

اگر کمینس میکس لیں۔ کچھ نہ رہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سے لمبے لمبے قدم بھرے یا  
کو دے جیسے کر یہ درختوں کے تنے ہوں۔ ایک ماسوراخ ڈراؤنا گہرا سنگان معلوم ہو۔  
چمچ بھریانی بڑی حسیل معلوم ہو۔

### زہر دیا جانا۔

ایلمیٹ۔ زہر دیئے جانے کا ڈر۔

بائیوسائیمس۔ زہر دیئے جانے کا گمان۔ ایک خوراک ایک ایم طاقت میں دیتے۔  
لیکسس۔ تصور کرے یا فرض کرے کہ اسکے رشتہ دار اس کو زہر دینے کی  
کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ ان سے کھانے والی ہر چیز لینے سے انکار کرے۔

### غزور۔ تکبر

پلاڈیم۔ غزور کو ٹھیس لگی ہو محسوس کرے کہ اس کی عملی یا زبانی بے عزتی کی گئی ہے۔  
پلائینیم۔ ذہنی جوڑ یا فظول کی مار۔ تھوڑی سی بھی اختلاف رائے کو بہت زیادہ  
محسوس کرے۔ گہرے زخم دل تک کٹے ہوئے۔ دل شکستہ۔

لائیکوپوڈیم۔ سخت اور نمود و نمائش والا۔ اپنی ہی بات منوانے والا۔ یا اپنی  
ہی مرضی کے مطابق کرنے والا

لیکسس۔ تکبر کا جنون۔ خوبین۔ حاسد۔ نفرت۔ انتقام اور ظلم کرنا  
نسیاں سلامت ہے۔

فیرم میٹ۔ غزور۔ مطمئن۔

سلفر۔ غزور۔ جب دوسری سب ادویات نیل ہو جائیں تو یہ دوائی بطور  
عمل آئینے کے طور پر کام کرتی ہے۔

( دیکھیے حصہ یا لڑاکا )

## عنی (دیکھئے اعصاب کی کمزوری)

گریٹائٹس - گانے کے دوران غمی کی زیادتی - موت کے خیالات -

پلاٹینا - گھر میں غمی - کھلی ہوا میں آفاقہ

سٹانم - غمی آدمیوں سے نفرت کے ساتھ -

پلمبسم میٹ - غمی - مایہ نولیا - محسوس کرنا کہ کچھ انتہائی خطرناک واقعہ ہونے والا ہے - اس نے

گناہ کیا ہے - اس نے ناقابل معافی گناہ کیا ہے - سوچ زیادہ بیمار کر دے - سوچنے سے بیماری میں زیادتی ہو - بے خوابی -

اگنیٹیا - سخت غم کے بعد غمی

آرم میٹ - غمی اور تصور کر اس نے دوستوں کی محبت کھودی ہے - یا

دوستوں کی محبت سے محروم ہو گئی ہے -

ایکونائیٹ - مستقبل کے متعلق غمی -

ایسٹفاس - غمی کی وجہ سے کمزوری -

آرم فولیٹم - مایہ نولیا - وہ محسوس کرے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کے اہل نہیں -

اس نے بڑی خوشی کے ساتھ موت کی خواہش کرے -

کوکولس - مایہ نولیا اور غمگین - بے عزتی سے حساس - جلدی سے ناراض ہو جائے

معمولی بات بھی اسے ناراض کر دے -

## حیادار - شرمیلا

جیلیمسم - عام لوگوں میں جانے سے جھبک یا شرم محسوس کرے - شرمیلا - ڈرپوک -

دماغ کا کھوکھلا پن -

خود اعتمادی کی وجہ سے شرمیلا پن - ڈرپوک

اور - ڈرپوک

سلفر - بزدلی - ڈرنے کے رجحان کے ساتھ -

بریشا کارب  
کالی فاس

ایومنا۔ بزدلی جو خود اعتمادی سے بدل بدل کر ہو یعنی کبھی بزدل اور کبھی خود اعتمادی۔  
 کوکا۔ شرمیلہ پن۔ ذہنی براہیگتگی کے ساتھ۔  
 پلسٹیلہ۔ بزدلی کے ساتھ شرمیلہ پن۔

نیمند۔

میدورنیم۔ گھٹے چھاتی سے لگا کر سنا۔ نوجوان بھی اسی طرح سوئیں۔  
 کوکولس۔ سونے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اُسے سُنے خواہ خراٹے بھر رہا ہے۔  
 میورٹیک ایڈ۔

اگنیشیا۔ نیند اتنی ہلکی کے وہ سب کچھ سنا ہوا۔ اسی ہی بات کے متعلق تمام رات خواب دیکھے۔

کیٹیمیم { آنکھیں کھول کر  
 اپیکاک { سوئے یا سونے کے  
 لائیکو پوڈیم { دوران آنکھیں کھلی رہیں۔

اُونگھ۔ نیم خوابی

سائیمکس۔ ناقابلِ رکاوٹ۔ نیم خوابی۔  
 سائیکلمین۔ نیم خوابی۔ بد مزاجی۔ کُستی۔ مدہوشی۔ کام نہ کرنے کا رجحان شدید  
 بدلی اور مایہ خویا۔

اندول۔ نیم خوابی سستی کے ہمراہ۔ ہر وقت لیٹے رہنے کی خواہش کا اُن کی خواہش نہ ہو۔  
 نیرٹم سلف۔ پڑھتے وقت نیم خوابی۔  
 فاسفورس۔ غصہ کے بعد یا سننے کے بعد۔ کمزوری سے نیم خوابی۔  
 پلسٹیلہ۔ کھانا کھاتے وقت نیم خوابی۔

آرنیکا۔ ایم { جواب دیتے وقت نیم خوابی یہ حالت عام طور پر  
 پشیشا۔ { مایہ خویا بد مزاجی بھاروں یا الفلوئسزاد وغیرہ

میگنیشیا کارب - کھانا کھانے کے بعد کھڑے ہونے کی حالت -

سلفر - پاخانے کے بعد -

ایتھوزا - پاخانے کے بعد یاتے کے بعد -

ہائیوسائیمس - ذہنی کام کی زیادتی کے بعد -

ناجا - گہری نیند پیش آمدی کی طرح خڑے دار آواز کے ساتھ سانس عام ریگنے والے طور پر طرح -

نیٹرم میور - نیند اور ادنگھ کھانا کھانے کے بعد -

کاسٹیکم - دن کے دوران میں شدید نیند سے بمشکل روکے لیٹ جانا پڑے -

چیلیڈونیم - کھلی ہوا میں ادنگھ اتنی نمایاں کہ وہ چلتے وقت سونے کے قریب ہو -

### بے خوابی -

کافیا - جاگنے کی حالت میں کارآمد ہوتی ہے - آنکھیں بند کرنا نامکن ہوں - ذہنی چستی

کی وجہ سے ہیجان - خوشخبری زیادہ کام کرنے کا موجب بنے - اور خوشگوار حلانی کے بعد لیکن بے

آرامی یا تکلیف کے بعد نہیں - زیادہ دیر سوچ کبدا کر کے یا نشہ آور ادویات یا نشہ آور اشیاء

کے غلط استعمال کی وجہ سے -

سینٹو - رحم کے اپنی جگہ سے ٹل جانے کی وجہ سے بخوابی - رحم میں ہیجان

سن یا کس کے دوران -

سائپر پیٹیم - جب ذہن میں خوشی کے جذبات کی افرقہ دار کی وجہ سے نیند نہ آئے -

چھوٹے بچے اکثر جاگ پڑتے ہیں - اور تمام رات کھلتے ہیں اپنے والدین کیلئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں

میگنیشیا کارب - پیٹ میں دباؤ کی وجہ سے بخوابی یا پریشان کن بے چینی اور اندرونی گرمی

ننگے ہونے کے بہت زیادہ خوف کے ساتھ - پیٹ کی گیس کی وجہ سے بے خوابی -

کالی فاس - بے خوابی کی چوٹی کی دوائی ہے - خاص طور پر رات کے پچھلے پہر - مریض مصل

طور پر ٹوٹا چھوٹا ہوا - کاروباری تفکرات یا دماغ کے زیادہ کام کی وجہ سے -

میوٹرک الیڈ - سونے کی خواہش لیکن سونے سکے - ادھر ادھر سر گھمائے تمام رات خواب کچھ -

اور بے چین و پریشان سوا در پشیمان ہو۔

کاشیکم - خشک رات کی وجہ سے تمام رات بے خوابی، کسی بھی پہلو پر آرام نہ آئے، ادھر ادھر سر گھمائے۔ وہ آرام دہ حالت میں نہ رہ سکے۔

فیرم میٹ - صوف شمال کی طرف بستر کا سر ہاتہ تبدیل کر کے نہ سو سکے۔  
الگیشیا - اتنی ہلکی نیند سوئے کہ وہ ہر چیز سنئے۔ ایک چیز کے تمام رات خواب دیکھے۔  
پریشانی کے خیالات کی وجہ سے بے خوابی - غم - غمی یا افسردہ خیالات کی وجہ سے بخوابی - غمی کی بہر جسم میں دوڑنے سے بے چینی۔

آئرلیکا مائٹ - جسم اور ذہنی کام کی زیادتی کی وجہ سے بے خوابی۔  
ایکونائٹ این - پریشانی - بے چینی - ناراضگی اور ڈر کی وجہ سے بخوابی۔ بچہ ادھر ادھر بے چینی میں رہے۔

آرٹیکلیم الیم - ہوائی عملوں وغیرہ کے ڈر کی وجہ سے بے خوابی یا نیند نہ آئے۔  
اویم - جب کافی فیل ہو جائے تو بے خوابی کے لئے اچھی ہے۔  
سلفر - بے آرامی کی مختصر سی نیند جیسے کر سی پر بیٹھے بیٹھے تمام دن سوئے اور رات کو جاگے۔  
کیٹس - صبح کے وقت یہ احساس کہ ابھی نیند پوری نہیں ہوئی۔  
پیمسی فلورائٹ - بخوابی کی بہترین دوائی ہے یہ مدر کچر کی حالت میں ۱۰ قطرے سے ۲۰ قطرے فی خوراک دینی چاہیے۔

امبرگر لسیا - ذہنی پریشانی کی وجہ سے بخوابی جیسے کہ کاروباری تکلیف، مریض بستر پر معقول تھکاؤ کے ساتھ سونے کے لئے جاتا ہے لیکن جونہی سر ہلنے پر رکھے وہ سو نہیں سکتا اور جاگتا رہتا ہے۔

ٹوبیکم - اعصابی توڑ پھوٹ یا شدید اعصابی تھکان کی وجہ سے بے خوابی۔  
بیلنس اپ - علی الصبح جاگ پڑے یا تڑکے جاگ جاتے پر پھر نہ سو سکے۔ مدر کچر استعمال کیجئے۔  
کوکولس انڈیکا - رات کو تیمارداری کی وجہ سے جاگنا۔ پیشہ ورانہ کام نہیں بلکہ رشتہ داروں کی تیمارداری۔

کے لئے پریشانی اور کسی پشیمانی کے ساتھ۔ دن کے کاروبار کے خیالات سونے میں شامل ہوں۔ یہ  
 نہ سونے دیں۔

سکولیکریالیٹ۔ اعصابی مریضوں میں جو کہ بہت ذہین۔ حوصلہ مند اور جہت ہوں۔ وہ  
 معاشرہ کے سرکردہ آدمی ہوتے ہیں یا کاروباری حضرات لیکن وہ اچھی طرح نہ سوچ سکیں اور متواتر معاشرہ  
 اور کاروباری معاملات پر کھٹے ہوں۔ اعصابی سرور و جودار کی جڑ میں کی وجہ سے بخوابی۔  
 نکسوامیکا۔ شرابیوں کی بے خوابی، کافی، چائے کے غلط استعمال یا معدہ کی خرابی  
 بیلادونا۔ سرنگھٹن کی وجہ سے بہت بے چینی کی وجہ سے نیند۔ آنکھیں بند نہ  
 کر سکے کیونکہ ایسا کرنے پر خوفناک تصورات دیکھے، بچے نیند میں ڈر کر جاگ اٹھیں۔  
 ہائپوسائیمس۔ اعصابی بے چینی کی وجہ سے بے خوابی۔ دماغ ڈراؤنے خواب و  
 خیالات اور تصورات سے پر ہو۔ بچوں میں بخوابی۔ جو پھر کس ڈر کی وجہ سے چلا میں اور کاپٹیں  
 چور پڑے اور جلدی سے برا ٹیکنجہ ہو جانے والے لوگ۔

کیموسلا۔ تکلیف کی وجہ سے بے خوابی۔

جیلسمس۔ دماغی کام کرنے والوں کی بے خوابی۔ کاروباری آدمیوں کے لئے مفید  
 جو بے چینی راتیں گزار دیں۔ صبح سویرے جاگ جائیں اور اپنے کاروبار کے متعلق بہت فکر مند رہیں۔  
 کینالرس انڈیکا۔ خدی قسم کی بے خوابی باقاعدہ نیند کے ساتھ مدہمچر میں قطرے  
 بحساب فی خوراک دیجئے۔

## چوری۔

کلکیریا کارب۔ چوری کرنے اور بھوٹ بولنے کا رجحان۔ روپہ چوری کرنے کی عادت  
 کو دور کرتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کچھ لوگوں سے نفرت کرنا۔  
 آرٹیمیزیا۔ مرگی میں چوری کی عادت۔  
 سٹامونیم۔ جنون میں چوری کرنا۔  
 سیفیگسریا۔ چوری کرنے کی عام عادت۔

سلفر - بمبکونوشوں اور جواہازوں میں چوری کی حادث -  
 اوٹیم - چوری کرنے اور بھوٹ بولنے کی حادث -

### یاخانہ

دریثم الیقیم - اپنا یاخانہ یا پیشاب ننگنے کی زبردست خواہش -

### خودکشی کا رجحان - (محکات بھی دیکھئے)

اینا کارڈیم - گولی سے خودکشی کرنے کا رجحان کسی دوسرے طریقے سے نہیں خودکشی  
 کرنا چاہے لیکن ڈرپوک کہ خودکشی نہ کر سکے - ایک ایم خودکاک دیجئے -

رٹساکس - اپنے آپ کو کھرکی سے کوڈرانا چاہے لیکن موت سے ڈرے - اگر بالی کے  
 قریب ہو تو اپنے آپ کو ڈوبونا چاہے - باوچی خانہ میں داخل ہو کر جلی مزاجا ہے چولے یا سٹو  
 سے - مریض ہر وقت ہلتا رہے اور افسوس کرتا رہے -

کلکیر یا کارب - تیز دھار آئے کے گھونپنے سے خودکشی کرنا چاہے -

کیپسیکیم - ہمہ وقت خودکشی کرنے کے خیالات لیکن اپنے آپ کو ماننا نہ چاہے - اور  
 خیالات کی مزاحمت کرے، وہ خودکشی کی خواہش نہیں رکھتا جب خودکشی کی خواہش ہو تو  
 کوئی اور دوائی دیجئے! یہ کیپسیکیم نہیں ہو سکتی -

الیومنا - ایک کم حوصلہ مریض، وہ شک کرتا ہے کہ وہ خود ہی ہے یعنی اپنے آپ کے  
 ہونے پر شک - اسے برے خیالات آتے ہیں اور وہ اپنی ناقابل برداشت زندگی کو گلا کاٹ  
 کر ختم کرنا چاہتا ہے - چاقو یا خون دیکھ کر خودکشی کا رجحان اُبھرے -

انگس کاسٹس - خودکشی کے رجحان کے ساتھ اپنے خاوند، بیٹے اور جنسی عمل سے نفرت -  
 آرم میٹ - بہت ہی اعلیٰ دوائی پاگل پن کے لئے ہے جو کہ خودکشی کے رجحان کے  
 ساتھ ہو - وہ اپنے آپ کو گولی مار دینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو بلندی سے گر کر ختم کر دینا  
 چاہتا ہے - اپنے آپ کو ڈبو کر خودکشی کرنا چاہے کیونکہ وہ اس دنیا کے لئے کام نہیں ہے، یہ سب

کچھ چپکے چپکے کر دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی تکالیف کسی کو نہیں بتاتی۔  
 انظم کروڈ۔ جذباتی پاگل پن۔ اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی وجہ سے مریض غم زدہ  
 اور چڑچڑاہوا ہوتا ہے۔ اپنی تکالیف کا خاتمہ اپنے آپ کو گولی مار کر یا ڈبو کر کرنا چاہتا ہے۔  
 نیرم سلف۔ خودکشی کے جنون کے لئے ایک اور بہت بڑی دوا ٹی ہے اسے مستقل  
 طور پر اپنے آپ کو منع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے جسم کو کوئی نقصان پہنچا  
 دے۔ وہ گانے سے ڈرتا ہے جو اس کو افسردہ کر دیتا ہے۔ ایسی خودکشی کا رجحان عموماً مہر کے  
 زخم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کا رجحان لیکن وہ ڈرتا ہے کیونکہ وہ مرنا نہیں  
 چاہتا۔ مجلس سے یا لوگوں میں بیٹھنے سے نفرت۔ نہ خود ہون چاہے اور نہ یہ چاہے کہ دوسرے  
 اس کے متعلق باتیں کریں۔

اسٹیلانگو۔ پانی میں ڈوب کر خودکشی کا رجحان۔  
 اگنیشیا۔ کاروبار کے دہم برہم ہونے پر دیاسلامیوں کی ناسمجھوں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہے۔  
 زکیم میٹ۔ مایوسیا اور افسردگی کے ساتھ خودکشی کے خیالات۔ اتنا ڈر لو کہ خودکشی نہ کر سکے۔  
 کسی کو اذیت دینے کی خواہش۔ ایک ایم کی طاقت میں دب جائے۔  
 کینا بس سٹائیوا۔ اپنے آپ کو مارنے کی کھڑچھڑ سننے اور خیال کر کے کیراقتدار اعلیٰ  
 کی طرف حکم ہے۔

آر جیم ٹائٹریکیم۔ جب بلندی پر ہو تو عجیب خیالات۔ جب پل پر سے گزرے وہ  
 سوچے کہ اپنے آپ کو پانی میں چھلانگ لگا کر مار دے گا۔ جب کسی اونچی کھڑکی میں سے دیکھے  
 تو خیال کرے کہ یہاں سے کود جانا خطرناک ہوگا بعض اوقات ایسی تحریکات کر اسے واقعی  
 چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔

جیلسیم۔ کھڑکی میں سے اپنے آپ کو پھینک کر خودکشی کرنا چاہے۔  
 ہیلی بورس ٹائیگ۔ کچھ لوگوں کی طرف چوری وغیرہ کے الزام کے نتیجے طور پر خودکشی  
 کرنے کا رجحان۔ وہ اس الزام کو دل پر لگا لیتا ہے اور اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے۔

ایوڈم - وہ بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے لیکن مزاحمت کرتا ہے۔  
 لیک ڈیک ڈی فلو - یادداشت کا جاتے رہنا۔ سستی اور ذہنی کام سے نفرت جی  
 موت چاہتا ہے اپنی تباہی کے لئے آسان ترین طریقہ کے لئے سوچے۔  
 میٹوڈیزم - خودکشی کا حجام، اپنا پستول لے کر اٹھتا ہے لیکن اندرونی مرضی ایسا کرنے سے  
 روکتی ہے - (دیکھئے مغالطہ یا سلب) توہمات۔

## بدگمانی -

لیکسس - خیال کرے کہ لوگ اس آدمی یا عورت کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ بدگمانی کرے  
 کہ اس کو پاگل خانہ میں ڈال دیا جائے گا یا زہر دے دی جائے گی۔ اپنے آپ کو مافوق الفطرت  
 چیزوں کے قابو میں پائے جو اس کو چوری کرنے یا قتل کرنے کا حکم دیتی ہے، جس کے حکم کی  
 تعمیل کرنا اس کے لئے ضروری ہے۔

## حسد -

بایوسائیکس - زہر دیئے جانے کی بدگمانی۔ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ اس  
 کے مخالف ہو گئے ہیں۔ بدگمانی کرے کہ اس کے خاندان کے آدمی اس کی بخیرانی کرتے ہیں جن  
 کے متعلق اسے منطقی نہیں ہے۔ ہر روز اپنے کپڑے تبدیل کرے تاکہ اسے پہچان نہ لے سکے۔ گھر کو  
 چھوڑنا چاہے۔ بدگمانی کرے کہ اس کی بیوی اس کی غلط نہیں یا وفادار نہیں ہے۔

## ہمسردی -

کاسٹیکم - دوسروں کی تکلیف کے شدید ہمسردی۔  
 نیوفسر - کاسٹیکم ناکام ہو جائے۔

## باتونی

اگر کس ایم - گائے بولے لیکن جواب نہ دے۔ لا تعلق - نڈر - جوش مرت نمایاں۔  
 گانے کے ساتھ شور مچائے۔ شعر کہے اور پیشگوئیاں کرے۔  
 اکیٹا آر - لگاتار بولنا۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع بدل کر جیسا کہ مذاہن کے  
 دوروں میں ہوتا ہے۔

سٹکٹاپی۔ کسی بھی چیز کے متعلق بولنے کی بہت زیادہ خواہش، یہ خیال نہ کرے کہ کوئی سنتا ہے یا نہیں، اپنی زبان کو خاموش نہ رکھ سکے۔

ایو سائیمس۔ بہت ہی بدگانی اور باتونی، فحش اور شہوت پرستی کا جنون۔ جسم کو نکٹا کرے۔ ہر چیز پر فحشے کا رجحان۔ آہستہ بولے، فینڈ میں بولے یا چلائے۔ اپنے آپ سے بولے۔ وہی۔ ایک بات کو بار بار دہرائے۔

کینا بس انڈیکا۔ بے ربط باتیں روحانی کیفیت و سرور میں مبتلا ہونا۔ بہت زیادہ بولنا۔ بے حد ہنسے۔ چند منٹ کے لئے اپنے آپ کو گم کر دے۔ جانے کہ وہ بے عقل کی باتیں کریں۔ لیکن ایسا کہ بغیر نہ رہ سکے۔ شور مچائے فی البدیہہ شہر کے نہ جانے وہ قائم ہے اگر ایسا ہے تو کس مقصد کے لئے۔ شدید باتونی خیالات کی تغیر پذیری کے ساتھ۔

لیکسس۔ باتونی پن کی چوٹی کی دوائی ہے۔ شدید جوش۔ ٹھگین کسی آدمی کے ساتھ ملنے جلنے کی خواہش نہ ہو۔ بے چین دیریشان رہے۔ ہر وقت کسی دلدرد راز جگ جانا چاہے اتنی جلدی بولے جو نہی کوئی بولنے لگے وہ پہلے بولے اور کہانی مکمل کر دے۔ اگرچہ پہلے اس نے کبھی نہ سنا ہو۔ پٹنے ہوئے فقرات کی تقریریں کرے لیکن مختلف موضوعات پر جلا جائے۔ ربط کی کمی بعض اوقات فقرات نیم مکمل ہوتے ہیں اور وہ سمجھ لیتی ہے کہ تم اسے مکمل سمجھتے ہو۔ کروٹلیس۔ باتونی پن بڑبڑانے کے ساتھ، غلط ملط الفاظ کے ساتھ اور اپنے الفاظ پر لڑکھڑائے۔ خاموش حالت جیسے کہ نشہ میں مدحوش ہو۔ لیکسس کا بعض صاف الفاظ میں بولتا ہے غلط ملط اور بڑبڑانے کے بغیر۔

سٹرامونیم۔ نہ رکنے والی بول چال۔ مہنسا گانا قسمن کھانا۔ عبادت کرنا۔ تانہ بندی کرنا۔ جلدی ہی خوشی غمی میں تبدیل ہو جائے۔ اپنی شخصیت کے متعلق تو ہم۔ اپنے آپ کو لمبا محسوس کرے۔ دہرا۔ ایک حصہ گم۔ علیحدگی اور اندھیرا راستہ نہ کر کے۔ روشنی اور رفاقت ضروری چاہے۔

دیکھے چڑانا۔ چوری کرنا۔ غیر ماضدماغی۔ بھول جانا۔

## سوچنا۔

ایتھوزا۔ سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کے قابل ایسے طالب علموں کے لئے بہترین دوائی ہے جو پڑھنے کے لئے دماغ نہ رکھتے ہوں۔

کاجو پیٹم۔ ایک منٹ میں ہزاروں چیزوں کے متعلق سوچے۔

کینا بس انڈیکا۔ آنکھیں بند کر کے سوچنے میں لگن ہو۔

کافیا۔ خیالات سے پُر جب جاگتا ہوا لیٹے ہزاروں چیزوں کے متعلق خیال کرے،  
دور دراز گرجے کے مینارہ کے گھڑ پال کو سنے۔ بھونکنے ہوئے کٹوں کو سنے۔ یادداشت بہت  
تیز۔ خیالات سے پُر سوچنے اور بحث کرنے کرنے کی طاقت بڑھی ہوئی۔

اونسموڈیم۔ دماغ کی یکسوئی کی طاقت کی کمی یا ربط کی کمی

آرجنٹم ٹائپرٹیکم۔ جب سوچنے سے اسہال لگ جائیں۔ نظر کی کمزوری لاحق ہو۔

اوسکیم۔ دوسروں کے حادثات کے خیالات۔ یہ خیالات ان پر مسط ہوں جیسے کہ

دیسے ہی زخم وہ دوسروں کو کرے۔

پیشیا۔ ٹائیفائیڈ بیمار میں سوچنے کی نااہلیت

ایسڈ فاس۔ مجامعت کے بعد سوچنے کی نااہلی۔

ٹیرنیتھنا۔ اعصابی سر درد میں سوچنے کی نااہلی۔

الیومنا۔ سر درد جو قبض کی وجہ سے ہوا اس میں سوچنے کی نااہلی۔

آرجنٹم میٹ۔ سوچنے کی نااہلی یا یادداشت اور انسان کی فہم و فراست درہم برہم سر درد

اور درد۔

ٹائپرٹیک ایسڈ۔ گذشتہ تکالیف کے متعلق سوچنا۔

برائی اونیا۔ خیال کرے کہ وہ گھر سے بہت دور ہے اور گھر جانا چاہیے۔

کروٹن ٹنگ۔ اپنے سے باہر کچھ نہ سوچ سکے۔

## روزنا۔

پلسٹیللا۔ خوشی یا غمی کے واقعات پر روئے۔ جب اپنی علامات بتائے تو رو پڑے۔  
اختلاف کرنے پر روئے۔

نیرم میور۔ رونے کی نمایاں طبیعت، ہمدردی ظاہر کرنے پر زیادتی۔  
کافیا۔ اچانک خوشگوار حیرانی پر روزنا۔ درووں پر روزنا۔ جذبات کے پچھلے جلنے پر روزنا۔  
یانظر انداز کئے جلنے پر روزنا۔

کیمفر۔ خشک آنکھوں کے ساتھ رونے کی خواہش  
سٹر امونیم۔ اونچی آواز سے رونا۔ کمزور دماغ، مزاحمت کرنے کا رجحان اور برا بھلا ماننا۔  
کالی فاس۔ مذہبی جنون میں۔  
پلاٹینا۔ خاموشی سے روزنا۔

سیسیا۔ جب اسکی علامات کے متعلق سوالات کئے جائیں۔ روئے۔  
ایلیم سٹائیوا۔ نیند کے دوران روئے۔  
میڈورنیم۔ روئے بغیر نہ بول سکے۔  
کاربو انیمیس۔ جب کھائے تو روئے۔  
لائیکو پوڈیم۔ جب کسی دوست کو خوش آمدید کہے یا واقف کار سے ملاقات ہو یا  
شکریہ ادا کیا جائے۔

## قوت ارادی۔

اینا کارڈیم۔ جیسے کہ ضمیر پر رکھا ہوا ایک مثبت اور ایک منفی۔ ایک قتل کرنا چاہے اور  
دوسری اس کے برخلاف۔

## مزاجیہ۔

سٹر امونیم۔ جب ایک شخص غصہ مزاجیہ ہو یا ناشائستہ مزاجیہ (دیکھئے غرور، تکبر، زنجی غرور  
اینٹھن۔ لکھنے والے کے ہاتھ کا تشبیہی درد)

میگنیشا فاس - لیکن والوں کے ہاتھوں کے تشنجی درد کی بہتر دوائی ہے جو کہ زیادہ دیر تک انگلیوں اور ہاتھوں کے استعمال کی وجہ سے ہوا رشتہ ہو۔ جبکہ گرمی سے آفاقہ ہو۔ ایک ایسا حکمت میں استعمال کیجئے۔

جلیسیم - ہاتھوں کی اینٹھن اور کانپنے کیلئے پوٹی کی دوائی ہے۔ پٹھوں کو کسٹرول کرنے کی طاقت کی۔ بازوؤں کے پٹھوں کی اینٹھن۔

کرسٹالس - انگلیاں سخت پٹھوں کی نسبت دروں میں زیادہ تکلیف۔ آرام کرنے پر آفاقہ۔ (سوائے سختی کے) اور خشک گرمی سے آفاقہ، جیسے کہ بجلی گرمی یا تہ کی گرمی۔

ایکونائٹ این - بازو اور ہاتھوں کی فالجی کمزوری خاص طور پر لکھتے وقت بھی انگلیوں میں بھجننا ہٹ

کیو پرمیٹ - پٹھوں کا ہلنا اور جھڑکن۔ ہاتھوں کا ٹھنڈے رہنا۔ ہتھیلیوں میں اینٹھن، بازوؤں کی شدید تھکاوٹ۔

سٹرامونیم - معمولی اینٹھن کے ساتھ انگلیوں کی کمزوری

اکیٹیا آئر - لکھتے وقت انگلیوں کا ہلنا۔

زنگم فاس - تمام ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دینی چاہیے۔

میورٹیک ایسڈ - لکھتے وقت دائیں انگوٹھے کے گوشے پر اینٹھن کی طرح درد۔ انگوٹھا ہلانے پر درد ہو جاتی ہے۔

سلیفورک ایسڈ - زخموں کے بعد گنگرین ہو جانے کا رجحان۔

لکھنے والے کے تشنجی درد۔ سیر کے زہر کے بعد۔

فیسر مائیوڈیم - لکھنے والے کے تشنجی درد کے لئے بہترین دوائی ہے۔

دوسرا باب

اعصابی نظام  
کی  
بیمکاریاں

# مرگی

ایکونائٹ این - بھرلو نبض بہت ہی ذہنی اور جسمانی پریشانی کے ساتھ جب سردی اچانک ڈرجانے کی وجہ سے ہو۔ چہرے کی سرخی حملے کے دوران فوج طاقت میں ہر پندرہ منٹ کے بعد دہکتی ہے۔

بیسلا ڈونا - چہرے کی بہت زیادہ سرخی، سر میں اجتماع خون - بھرلو اور تیز نبض آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئیں - پھر طاقت میں دہکتی اور ہر پندرہ منٹ کے بعد دہرائے حتیٰ اگر حملہ رک جائے۔

اوپیم - داغی مرگی - جب بڑے لکھے ہوئے پتلیاں پھیلی ہوئیں - گرم پسینہ - ایک طرف کا فالج - بیہوشی کے ساتھ صبح و شام کے دھند لکے جیسی، چہرے پر سرخی، خراٹے دار سانس - جب اچانک اور بہت زیادہ خوشی ہو - آہستہ اور بوجھل نبض - یہ چوٹی کی دوائی ہے - ہر رفتہ ایک ایم پوٹنسی میں دینی چاہیے۔

اگنیشیا - علم کی زیادتی یا حذرت کے دہنے کی وجہ سے اور مریض اعصابی طبیعت رکھتا ہو۔

لیکس - ذہن کی خیالی باتیں - اجتماع خون کی وجہ سے سر عجائزے - دردیں گہری - دماغ میں خاص طور پر بائیں طرف - جوڑوں کی سختی - چہرہ زرد اور پھولا ہوا پلسٹیل - سست اور کاہل سمجھ کی کمی - سو جا ہوا - اور نیلا ہٹ والا سرخ زرد اور پھولا ہوا چہرہ - مکمل کھانا کھانیکے بعد ہوں - دل کی دھڑکن نبض تقریباً مکمل طور پر دبی ہوئی - فیرم فاس - کمی خون والے اور زرد رنگ والے لوگ - نبض تیز - دھیمی اور تار جیسی - ہیلوناس - دل کی زبردست دھڑکن جو بھاتی اور پیٹ کو ہلاتے - پٹھوں کی پھر کن کے ساتھ ہونشی۔

جیلسمیم - اونگھنے والا نیم خوابیدہ - آہستہ حرکت کرے - زبان کا فالج ہو - نبض دھیمی بھرلو رکن ترم - پتلیاں پھیلی ہوئیں۔

سٹرکٹیا فاسٹ<sup>۲۸</sup>۔ پٹھوں میں چربی کا جزو بدن بننا جب تو تھرا یا دھبہ دل کی طرف آیا ہو۔ اور دل بڑھا ہوا ہو۔

آرٹیکا مائٹ۔ زخم کی وجہ سے مرگی جسم ٹھنڈا اور سرگرم جب مریض ہوش میں آجائے تو یہ دوائی دینی چاہیے۔ تمام جسم میں درویں اور دکھن۔

فارمیکا۔ اگر دماغ کی کمزوری کی وجہ سے مرگی ہو یہ دماغ کو طاقت دیکر دوروں کو روکتی ہے۔

لارڈ میرکوس۔ بغیر اطلاع کے اچانک مرگی کا دورہ۔ دھکن کے ساتھ ٹھنڈی مندار جلد اور چہرے کے پھول کی حرکت تیز یا جھنڈا ہٹ۔

اعصاب کی مرض جسمیں بے اختیار پٹھے پھڑکیں۔

**رعشہ۔** (ہیٹریا بھی دیکھئے)

اگنیشیا۔ ڈر۔ دھکی۔ سنا اور بُری خبر کی وجہ سے رعشہ۔ غم یا جذبات کے بعد بازوؤں میں جھنجھناہٹ۔ جوڑوں میں درد۔ ضدی اور چڑچڑا۔

کیویرم میٹ۔ انیٹن یا تشنج میں مبتلا بچے کو نیز کے نیچے گھستے دیکھ کر رعشہ کی حرکات مزمن حرکت انگلیوں اور پنجوں سے شروع کر بازوؤں تک پہنچ جاتی ہے۔ ہونے دوران افاتہ لیکن جب جاگے تو شدید توڑ مروڑ اور فضول حرکات شروع کر دے۔

سٹرامونیم۔ رعشہ جس سے پہلے رونے کا رجحان ہو، ہنسنے اور خوش طبعی کا رجحان۔ سر کے اوپر بازو گھمائے اور سر پر ہاتھ بچائے۔

نکسوامیکا۔ ریڑھ کا رعشہ بے ڈھنگی، چال کے ساتھ پاؤں کو گھیسے قبض کا شیکم۔ جب دائیں طرف زیادہ متاثر ہو۔ بائیں طرف کی نسبت چہرے کے پٹھے۔ زبان بازو اور ٹانگیں سب ملوث ہوں یا متاثر ہوں۔ جب بولے تو لفظ تھرتھرائیں مریض متواتر یا ہمہ وقت اپنی پوزیشن بدلے متکھ تھک کر سو جائے۔ بچے جنہوں چلنا سیکھ لیا ہو

آسانی سے گرڑیں اپنی چال میں۔

مائیکل - ریشہ کے غیر پیچیدہ کیسوں کے لئے جب بیٹھا ہونا نیکیں حرکت میں ہوں یا کھینچی جائے جب چلنے کی کوشش کرے۔

اگر کیس مس - داغی ریشہ، آنکھ کا ڈھیلے اور پلکیں پھڑکیں اور تشنج ہو۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی تشنجی حرکات کی مخالف طرف ہوں یعنی یہ ایک طرف کا اوپر والا حصہ کو متاثر کرے اور دوسری طرف کے نیچے والے حصہ کو متاثر کرے۔

ٹیسٹو لائٹس - داہنے بازو اور دہنی ٹانگ کی مزن حرکت جورات کو بھی جاری رہے۔ ڈر - غم وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ ریڑھ کے خاص ہونے کی وجہ سے بے چین اور کانپنے بریض چلنے کی نسبت اچھا دور سکے۔ داغی انتشار خاص طور پر گانا بلیٹ افادہ ہو۔

زنکم میٹ - پاؤں کی لگاتار حرکت جورات کو بھی جاری رہے خاص طور پر جب چلنے پھنسیوں کے دے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوئی ہو۔

اکیڈیا لیسوسا - ریڑھ کی ہڈی کی سوزش گھٹیا کے ہمراہ خاص پر عورتوں میں بلوغت اور موقتی حیض پر جنونی، باتونی - اکثر ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر چلے جانا۔ ٹپھوں کا جھٹکے کھانا۔ چلتے وقت یا ٹھنڈے وقت جس طرف لیٹے یا داؤ ڈالے جھٹکے عموماً کرنا ٹپھل کاٹن ہو جانا یا جھٹکے کھانا۔

تھیسپیم - ریشہ، ہڈیاں، مرگی، خود کشی کرنے کا رجحان - افسردہ، ہنسے اور روئے بدل یعنی کبھی روئے کبھی ہنسے۔

فرم آسنیکم - قلت خون کی وجہ ریشہ (کی خون)

رہوڈنڈرون - بائیں ٹانگ کا ریشہ - بازو اور چہرہ کا ریشہ جو طوفان کی آمد پر بدتر ہو یا زیادتی ہو۔

ایونیا سٹامیوا - بوڑھے آدمیوں کے اعصاب لرزہ یا تھرتھراہٹ۔

بازوؤں کا سوجنا - جیسے کہ فالج میں مبتلا ہو

وکرم البوم۔ ریشہ کے چکر کے لئے بہترین دوائی ہے۔  
 ہائیوسائیس۔ بازو ٹھنڈے کا پتہ ہوئے اور سوجائیں۔ جھنجھوڑنے والی  
 حرکات اور ہلٹی ہوئی آنکھیں نمایاں اور ابھری ہوئی۔ چلائے، دانت جیسے۔ علامات کھانے  
 اور پینے کے بعد نمایاں طور پر ظاہر ہوں۔  
 لاروسیراسس۔ لگاتار جھکے۔ پھر کن پھلانے۔ بیٹھنے دے عجیب علامات۔  
 ہانپنا۔ ماتھے کی ٹھنڈک۔ یا ماتھا ٹھنڈا۔ سر کی چوٹی پر وزن۔ شدید اوصابی۔  
 آریسٹیکم ایلیکم۔ ہاتھ پاؤں کا کانپنا۔ خاص طور پر بازوؤں کا۔ شرابیوں میں ہاتھ پاؤں  
 کا کانپنا۔ ہاتھ پاؤں سن یا بے حس ہو جائیں۔ جیسے کہ مرنے ہوں۔ لاغری۔  
 غشی یا کوما۔

بریٹاکارب۔ مرگی میں  
 انٹرمٹارٹریکم۔ ہوا کی نالیوں کے زکام میں نیند سے جاگ جائے گھٹن محسوس کرے  
 ادیپیم۔ غرائے دار سانس لینا۔ بلا ارادہ پیشاب اور پانسانہ نکل جائے۔ پیشاب  
 میں کھارائے۔ نبض بھرپور اور سست۔  
 ایسڈ ہائیڈروسائیکم۔ مرگی کی گرفت کے بعد دماغ میں اتھلا خون اپنا کلمہ دینے والی حرکت۔  
 زکیم میٹ۔ دماغی تھکاوٹ سے۔ بھرپور بھوڑے پھنسیوں کے غائب ہونے پر۔  
 جلیسیم۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڈیوں کی جھلیوں کی سوزش۔  
 گلوتائین۔ سوزج کی دھوپ میں۔  
 ہیلی کورس۔ دماغ کی چوٹ۔

پیشانیائی  
 فاسفورس  
 آرنیکا  
 ٹائیفا ئیڈ بخار میں۔

کروٹیلس ایچ - تعفن کی وجہ سے بخار میں - مرگی میں -

بیوفو - مرگی کے دورے کے بعد جن لوگوں نے حلق کے ذریعہ یا ہتھ رسی کے ذریعے جنس کا خلط استعمال کیا ہو -

ٹیرنٹینا - غشی جہیں صحت ہلانے سے اٹھایا جا سکے لیکن فوراً دوبارہ غشی میں مبتلا ہو جائے - لڑکھڑانی چال جیسے شرابی ہو - ہاتھ پاؤں کا سن ہونا -

ایلو مینیم میٹ - ذیابیطس یا شوگر میں ۲۰۰ طاقت میں دیجئے!

سلفر - مرگی کے دورے سے پہلے یا مرگی کے دورے کے دوران -

پلاٹینا - زنگی کی پھل کے دوران میں -

زنکولس لیب - شدید پینے سے مرگی کے دورے میں غشی -

اجتماع خون - تشنج ( دیکھیے سوزش )

بسیلا ڈونا - تشنج کی چوٹی کی دوائی ہے - سرگرم اور نیکن والی درد گھورنے والی

آنکھیں اور پستیاں پھیلی ہوئی - بھرپور کو دتی پھیلا گئی نبض - دانت نکالنے کے دوران تشنج - بچہ اچانک سخت ہو جاتا ہے - بچوں میں تشنج ہوا چانک آئے - سرگرم بازو ٹھنڈے

۲۰۰ طاقت میں دیجئے اور ہر چوتھے روز دوائی دہرائیے -

کاکولس - بے خوابی کے بعد تشنج

جیلسیم - تشنج بیمار کے ہلرہ بکر اور گردن کی سختی کندھوں میں دردوں کے ہلرہ

آنکھیں ایک طرف سے دوسری طرف گھومیں - مریض بے چین اور شدید گرم ہندار -

سنا - لمبی آنت میں سوزش - کیڑوں یا بد ہضمی کی وجہ سے سوزش و تشنج - بچہ سخت

بد مزاج اور بد لہنے والی جھوک والا - یعنی کبھی کم جھوک اور کبھی زیادہ - لمبی آنت کی سوزش

کی وجہ سے جلد کا رنگ غیر صحت مند - جلد کے ٹھنوں کا پھڑکنا -

ہائیوسائیمس - اچانک زمین پر گر پڑے - چیخوں اور تشنج یا اینٹھنے کے ساتھ

بچوں کا تشیخ خاص طور پر ڈر کی وجہ سے کھانا کھانے کے بعد انیٹن۔

کلیک یا کارب۔ سوکھا، مسان یا ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے تشیخ۔ دانت نکالنے کے دوران یا مونیا کی وجہ سے تشیخ۔

ایٹھوزا۔ بچوں میں تشیخ بہت زیادہ لاغری اور کمزوری اور منہ کے ساتھ۔ پانازہ اور تے کے بعد اوٹھنے کے ساتھ تشیخ۔ آنکھیں نیچے اوپر اور اطراف کی بجائے نیچے کی طرف گھوم جائیں۔ چہرے کے اندر دھنسنے کے آثار۔ اوپر کے ہونٹ کی سفیدی ناک کے سرخ کی باہر والی لائن سے منہ کے زاویہ تک صاف ہو۔

یہلی بورس۔ پھنسیوں کے دہنے کی وجہ سے تشیخ۔ جیسے کہ جھپک کے دہنے سے۔ تواتر چلانے کی حرکت ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی حرکت خود بخود ہو۔ سر کو سرمانے گھسیٹنا۔ بے ہوش۔ پیشاب کا دب جانا یا پیشاب کی کمی۔

سکونا اور دوسا۔ سر، بازو اور ٹانگوں میں تشیخ کے جھٹکے۔ بازوؤں میں زبردستی تھپوڑ۔ سر جھپکے کو کندھوں پر جھک جائے۔ ٹھوں کے جھٹکے۔ چہرہ گرا سرخ، ہونٹ نیلے اور غوطی جھاگ منہ سے آئے۔ تشیخ اوپر سے نیچے کی طرف پھیلے اور مرکز سے کناروں کی طرف مٹے۔ تھوڑا سا چھونے یا ہلانے سے تشیخ ہو۔ ہوش میں آنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے کچھ بھی نہ یاد رہے۔

زخم فاس { کاروباری آدمیوں۔ طلباء، عیاش اور مرگی  
آرم میور { کے شکار اور اس کے غلط علاج کے بہانے والے آدمیوں میں

دلانا اور حرام مغز کے دم کی وجہ سے تشیخ کی وجہ سے یہ دی گئی ترتیب میں دی جائیں۔  
کیو پرم میٹ۔ نیلے چہرے جھپنے ہوئے انگوٹھے کے ساتھ تشیخ۔ تشیخ کے دوران تے۔ زنگی کے تشیخ، میضہ میں۔ تشیخ کا حملہ۔ بازوؤں اور ٹانگوں کے ہلنے اور پھرنے سے ہو۔ جس کے بعد آنکھوں کے ٹیلے گھومیں جو بالآخر پھریں جائیں۔ یا منہ ہو جائیں اور اوپر کی طرف گھوم جائیں۔ اخراجات کے دہنے یا پھنسیوں کے دہنے کی وجہ سے تشیخ۔ بازوؤں سے سنٹر کی طرف تشیخ۔ ٹھنڈے مشروبات سے انفاذ اگر ابتداء ہی میں دے دی جائیں تو بیماری میں انفاذ۔

سلفر۔ جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوائی کاٹھیں دیکھئے۔  
نیکسوامیکا۔ ہوش کے ساتھ تشنج بد بعضی کی وجہ سے۔ جڑوں کو جانے کی حرکت شراب  
کے غلط استعمال کی وجہ سے۔

کیموسیلا۔ والدہ کے غصہ کی حالت میں دودھ پلانے کے بعد بچوں میں تشنج۔ دانت نکلنے  
کے دوران اگر سیلا ڈونا۔ ناکام ہو جائے۔

اوپیم۔ والدہ کے اجانگ ڈر جانے کے بعد دودھ پلانے کے بعد بچوں میں تشنج۔  
بچہ ڈر کر جائے۔ چنے پلانے حتیٰ کہ تشنج ہو جائے۔ گرمی سے یا گرم پیوں سے زیادتی۔

گلونائین۔ بچوں میں دانت نکلنے کے دوران گرمی کی وجہ سے یا سر میں اجتماع خون کی  
وجہ سے تشنج۔ اگر سیلا ڈونا ۲۴ ناکام ہو جائے تو یہ دینی چاہیے۔ تشنج کے دوران آنکھیاں اور آنچے  
علیحدہ علیحدہ ہوں۔ سانس لینے میں دقت اور سنی جانے والی دل کی دھمکن۔  
گریشی دالا۔ تشنجی حالت ہوش گم کئے بغیر۔

آرنیکا } پچھلیوں کے ساتھ بچہ کی پیدائش کے فوراً بعد تشنج یا بچہ کا سر کافی دیر تک  
ہائپرکیم } سر پھینے رہنے کے بعد تشنج۔ دی گئی ترتیب میں ایک تا تھار کی طاقت دینے  
تھے اگر آرام آجائے۔ ہر ایک کی چار غور کریں دیتے۔ آرنیکا کی صورت میں سر گرم  
اور باقی جسم کا حصہ ٹھنڈا۔

سبکل کار۔ تشنج اور جسم کے مختلف حصوں کے پھوں کا پھرن۔ اسکیلیں کافی دور  
دور ہوں۔ جسم کی سختی جو بعض اوقات نرمی سے تبدیل ہو جائے۔

سٹر امونیم۔ شدید تشنج جس میں جسم کا ہر ٹیٹا ملوث ہو اور پیچھے کی طرف مڑ چکے۔  
شدید تھوڑے مروڑ۔ بازوؤں کا سکڑنا۔ زبان کا ٹٹنا۔ ڈر کی وجہ سے تشنج یا ہوش کے ساتھ  
ڈراؤنے خواب چمک دار روشنی میں آنے سے تازہ ہو جائیں۔ پانی دیکھنے پر۔ روشنی یا  
مشینہ یا کوئی چمک دار چیز تشنج کا موجب ہو۔ تہائی اور اندھیرا برداشت  
نہ کر کے۔ پچھلیوں کی وجہ سے ان کا دب جانا تشنج کا باعث بنے۔

## ہذیان

بیللا ڈونا۔ شدید ہذیان خون کی طرح سرخ آنکھوں کے ہمراہ۔ مریض کپڑے پھاڑتا ہے۔ ٹھوکر مارتا ہے۔ کتے یا بھیڑیے کی طرح چلتا ہے۔ چمکتا ہے اور خیالی یا تصوراتی آدمیوں سے دور بھاگ جانا چاہتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ سر گرم۔ تمام جسم پر گرمی اور جلن۔ بھاگ جانا چاہے۔ تشدد کی وجہ سے کھڑکی میں سے کود جانا چاہے۔ تشنگی کی وجہ سے کاٹنا چاہے۔ اجتماع خون میں۔ بخار۔ بد صورت۔ مغفرت یا ڈراؤنی خشکیں دانت نکلانے کے دوران میں توڑ مروڑ۔ دانت پیسے۔ مارنا چاہے۔ ننگے میں دقت رسول کے غائب ہونے پر۔ چوہے چوہیاں دیکھے۔

ہائوسائیمس۔ سختی کے ساتھ چوری کا الزام لگنے کے بعد۔ چمکدار آنکھوں کے ساتھ بہت زیادہ جسمانی طاقت کے ساتھ۔ حسد سے بولتا ہے۔ بیڑیا سے۔ تصوراتی غلطیوں سے۔ اپنے آپ کو ننگا کرنا چاہے۔ شدت میں بیللا ڈونا اور سٹراونیم کے درمیان کی دوائی ہے۔ غش گانے گائے۔ ہذیان۔ مدہوشی کے دوروں کے ہمراہ ہذیان۔ اپنے آپ سے بولے۔ سٹراونیم۔ ہذیان کی تین دوائیوں میں یہ تیسری دوائی ہے۔ پہلی دوائیاں بیللا ڈونا اور ہائوسائیمس ہیں۔ کسی کو ہمدردی کے اظہار کے لئے بلائے۔ ڈر کر جیسے اس پر کتے حملے کر رہے ہیں۔ غصے والا ہذیان لیکن ایسے غصے والا نہیں جیسے کہ بیللا ڈونا یا ہائوسائیمس میں ہوتا ہے۔ گھر والے یا تو ساتھ رہنے والا مردہ یا پھڑپھڑے ہوئے لوگوں کو کچا رہے جو دماغ حاضر نہیں ہیں۔ بصوت دیکھے یا ان کی آوازیں نے خوشی سے جھنجھوش سے پاگل۔ شرابلا چھپ جانا چاہے۔ گناہارہنے سے موقوفوں کی طرح۔ تالیاں بجائے اور آنکھیں کھولے۔ وہم یا فریب نظر کی وجہ سے شور مچائے۔ بے ربط بڑبڑانا۔ تمام ادویات خوف اور دہشت پیدا کریں۔ سرخ چیزوں کی بجائے سیاہ چیزیں نظر آئیں۔ پیشاب رکھا ہوا یا دبا ہوا۔ اگر کیس ایم۔ بہت زیادہ ذہنی جوش۔ خوشی۔ دلیری۔ بولے۔ بے ربط بات چیت مانگولیا۔

نقلیں بنانے اور پیشگوئیاں کرنے کا رجحان کے ساتھ اور راسخیتوں کو چھوڑنا چاہیے۔  
 لیکسس - بڑے بڑے والا ہڈیاں - کھوپڑی کا منہ جادو - آنکھیں بند کرنے پر سر پہر  
 میں یا تیسرے پہر میں یا سونے کے بعد ہڈیاں کے دورے - جھپکے کے دہنے کی وجہ سے  
 بیہوشی - زرد خناق میں چمکے تلبت خون کے ساتھ غمی کا اظہار - سانپوں اور دوسرے ڈروٹے  
 چیزوں کو دیکھنا - گھر میں گھٹن کا احساس - نیند میں اچانک اٹھ کھڑے ہونے کی وجہ سے خواب میں  
 بیوقوف - ہڈیاں اسہال کے ہمراہ -

پلجسم - ہڈیاں جو در در قریب سے ہل کر ہو - ہڈیاں اس جیل سے کہ اس کی زندگی قائم  
 محلے یا زہر دینے جانے کی وجہ سے خطرے میں ہے اور اس کے ارد گرد کوئی قاتل ہی ہے -  
 کیو پرم میٹ - بیض میں ہڈیاں - بھاگ جانا چاہیے - اخراجات یا پھنسیوں کے دہنے  
 کی وجہ ہڈیاں -

درمیشم وراثیڈ - بچے کی پیدائش کے دوران میں ہڈیاں - بخار یا زچگی کا ہڈیاں پیٹ  
 پھولا ہوا - گھورتی ہوئی آنکھیں اور وحشی پن - دونوں ہاتھ متواتر حرکت میں - نبض کمزور -  
 دل کی دھڑکن شدید -

آریکیم ایلم - افسردگی - بے چینی - موت کا ڈر - اکیلے رہ جانے کا خوف خود کشی کے  
 رجحان کے ساتھ ہڈیاں - دماغ اور جسم میں تلبت خون -

اکٹیارسمیوسا - ہر قسم کی چیزوں کو مختلف رنگوں اور حالتوں میں دیکھے، جیسے کہ  
 چوہے - سانپ - شیر - کبوترے - مکھیاں وغیرہ دیکھے - بالونی ایک موضوع سے  
 دوسرے موضوع پر تبدیل ہوتا رہے - چڑچڑاپن - بے چینی اور بے خوابی نمایاں علامات -  
 نکسوا میکا - جبکہ مریض ناراض و خفا - چڑچڑا - مجبور یہ سب کچھ شراب نوشی کی  
 وجہ سے ہو -

پیشیا - خناق - ہسرو پن -

اویم - پرانے پاہیوں جو زیادتیوں کی وجہ سے اپنی صحت خراب کر لیں کمرے کے مختلف  
 حصوں مختلف جانوروں کو نکلتا دیکھے - بھوت پریت غیث رو میں دیکھے جن کے ساتھ باتیں کرے -

کینا بس انڈیکس - برغور غلط خیال، جگہ اور وقت کے متعلق غلط سمجھے۔  
 کینتھرس - شدید بنیائی کیفیت جنسی خیالات اور باتیں - فحش گیت گائے - انسانی  
 اعضائے ناسل - پیشاب پاختہ کے متعلق باتیں کرے۔

کلکیر یا کارب - رلیف جونہی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے وہ خوفناک چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ بات  
 اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر رکھے۔ اعصاب کی وجہ سے جانور دیکھے اور ان کھیلے  
 چائنا - جب آنکھیں بند کرے تو لوگوں کو دیکھے لیکن غائب ہو جائیں - جبکہ آنکھیں کھولے  
 شدید کمزوری، بھوک کمی اور کھانا کھانے کے اور نذر کرنے والی سونے کی خواہش یا بے خوابی بدل  
 بدل کر - قلت خون۔

نرکم میٹ - بہت زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ ہڈیاں - بیہوشی اور بازوؤں کے ٹھیکے۔  
 کوکولس - حیض شروع ہونے پر دماغی علامات کے ساتھ ہڈیاں اور دم جیسے کچھ  
 زندہ دیواروں، فرشوں پر اور کرسیوں پر رنگ رہا ہے اور اس پر بھی رنگ لگا۔

## سوزش دماغ

جلیسیم - کمرے سردی کی بہرہ نچے کی طرف جائے جو اس صورت کو ملامت دے۔ لمبی اور  
 تھکا دینے والی گرمی - سرد در - گردن اور کندھوں کے پٹھوں کی دھکن - کندھیں - چکر  
 لا پر دہی - سرگردانی - ناک سے پانی جیسا سادہ مادہ کا اخراج - چہرہ گرم، بھاری - سرخ  
 پلکیں درنی - نظر کمزور - پٹھوں پر کمزور گرفت۔

آر سینکیم ایلیم - جب دماغ یا کسی اور حصہ جسم میں تباہ کن تبدیلیاں ہو رہی ہوں۔  
 ہائوسائیمس - دماغی سوزش گرمی، سرد اور چہرہ میں اجتماع خون، شدید تپکن،  
 سر چکرانا - شدید دم۔

سٹرامونیم - دماغ کی سوزش - گرمی اور کھوڑی میں تپکن کے ہمراہ - اپنی  
 شخصیت کے متعلق دم - روشنی اور رفاقت دونوں ضرور چاہے۔

ایسی بوس۔ دماغ کی سوزش احمق پن کے برابر۔ یادداشت کی کمزوری۔ مایوسیا۔ اندکھ۔  
 آرجنٹم نامٹر کیمک۔ بلغمی تھلی پر عمل کرتی ہے۔ خاص طور پر معدی نالی۔ یہ دماغ پر گہرا اثر رکھتی ہے  
 جلیسیم کی نسبت زیادہ کورمپٹر اعصاب کی زیادہ تباہی، لیکن اس کا عمل پٹھوں کے نظام پر کم اثر کرتا ہے۔  
 پیٹیشیا۔ آوارہ۔ بڑبڑائے۔ ہڈیاں۔ مدہوشی۔ بات چیت کے دوران سو  
 جائے۔ دماغی گجھراٹ۔ سرد کھے۔ بہت بڑا۔ سانس متعفن۔ ناگوار۔

کاسٹیک۔ بونٹ کی عمر پہنچتے ہی مرگی بے قاعدگی حیض کی وجہ سے یا بھڑے  
 پھسیوں کے دہنے کی وجہ سے یکسی ڈر کی وجہ سے نئے پائندہ پرزائی قیام۔ بلا ارادہ  
 پیشاب کا عمل جانا۔ ٹھنڈا پانی پیئے سے آفاقہ۔

پیمسی فلوراٹک۔ حملے حیض شروع ہونے پر ہوں چھاتی میں گھٹن کا عجیب و غریب احساس۔  
 اوٹھتی کر دیکھا۔ اچانک اور مکمل بیہوشی خطرناک تشنج کے ساتھ۔ نوجوان لڑکیوں میں  
 حیض کا ظاہر ہونا جس کے نتیجہ پر مرگی اور تشنج۔ زیادتی اس وقت جب حیض شروع ہونا  
 چاہیے۔ خاص علامات تھ، اچھارہ اور حملے دوران نیم ایسا لگی، سو جا ہوا سرخ چہرہ  
 منہ میں جھاگ کے ساتھ۔

پلمبم۔ جب دماغی نخعی یا گومرین اور فالج کا احساس حملے سے پہلے اور اس کے  
 اکثر فالج اور خراٹے۔ سخت قبض۔

بیللڈونا۔ صرف تازہ کیسوں میں تشنج صرف بازوں میں شروع ہوا اور چہرہ آنکھیں  
 اور منہ تک پھیلے۔ دن کے وقت تھوڑے وقت کیلئے کئی دفعہ دورے ادا اچانک گڑبٹائیں  
 آرجنٹم نامٹر کیمک۔ ڈر یا حیض کے وقت ہوں۔ حملے سے دنوں یا گھنٹوں پہلے تپلیاں  
 کا پھیلنا اور حملے کے بعد معتدوں کا کاپنا اور بے چینی۔ تیز جھج۔ پٹھوں کی شدید معرکین  
 خاص طور پر گلگی۔ مکمل بیہوشی منہ میں جھاگ کے ساتھ، اکثر اپنی زبان کاٹ۔ تباہی  
 فینڈ تقریباً تین گھنٹے۔ میٹھے پھل کھانے پر دورہ پڑے۔

کیوپرم میت۔ ٹانگوں میں احساس شروع ہو زیریں پیٹ کے حصہ تک پہنچے۔

جب سپیشل - تشنج اندازہ میں جھاگ مائل ہو - حملے کے دوران مریض گاتا زبان باہر نکالے - اور اندر کرے - گرم کرے میں زیادتی حملے سے پہلے دباؤ والا سر درد -

نیٹرم سوڈم - حملے سے پہلے اور دوران میں ٹانگوں کا پھڑکنا - کندھنی - سوچنے میں دقت اندوگ اور چڑچڑاپن - احساس بازوؤں میں شروع ہونے یا ایسے محسوس ہو کر ٹانگ پر چوڑا پڑھے بیٹھ کے دائیں طرف - حملے سے پہلے چکر - نیند میں دانوں کا پیسنا - قلی اور تپے پر نہ میں جھاگ کانپے - جسم کے ٹھنڈے ٹانگیں جلدی اور کھینچ جائیں - ہاتھ بند انگلیوں اندر کھینچ جائیں - بازوؤں اور ٹانگوں کا ٹھنڈک - جھض کے دوران زیادتی مرض - سورا کے اثر کے پرانے کیس بدل ہوئی حالتیں -

نکسوا میکا - ہوش کے ساتھ تشنج - تشنج جس میں پیچھے کی طرف مڑ کر ٹھیک سرخ چہرے اور آنکھیں بند - چھوٹے سے جذبات سے ہلنے سے بدھنسی نے زیادتی مرض - تشنجی سختی کے ساتھ تشنج - دورے کے دوران بے اختیار پلٹنا اور پیشاب - جوت نکم کے بالائی حصہ پر احساس حملے کے بعد گہری نیند - کھلی ہوا میں زیادتی -

کالی بروم - سبب دورے نئے چاند پر ہو - تو دورے کے بعد سرد - دماغی کندھنی - انہما خیاں میں کستی چکر غریقی چال - بد مزاج اور سونے والا - لونا - مرگی پرے چاند پر -

یوفو - جب حلق یا ہتھری یا جنسی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہو - جماعت کے دوران دورہ ہو جائے - پیٹ میں شدید پریشانی کا احساس اور تب اچانک ہوش کا جاتے پہنا پٹیلیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی اور حملے سے پہلے روشنی سے متاثر نہ ہوں - احساس جنسی اعضا پیٹ سے شروع ہو - حملے سے پہلے نہ کھلا ہوا - حملے کے بعد جڑا لٹکا ہوا - حملے کے بعد پیشاب بلا ارادہ خارج ہوگا - بریٹا موٹر کیم - لاعظی اور غشی کے دورے - موسم بہار میں شکایات سکالیف میں زیادتی - تمام جسم میں سرسراہٹ -

آرٹیمین ریادی - شدید جذبات کی وجہ سے دورے پڑیں - تشنج کے دورے قریب پڑیں -

تب آرام کا کافی وقفہ ہو۔

ایونفا۔ دورے عام طور پر پاخانہ خارج کرتے وقت پڑیں۔

انسٹم۔ جب دورے سے پہلے کانپے جکڑ اور گرانی۔ حملے کے بعد یادداشت کی کمی یا جلتے رہنا۔ ڈرنگھو یا چھوٹی طاقت میں دتجے۔

اگنیشیا۔ مرگی کے دورے جذبات کو خمیس لگنے سے یا بہت زیادہ غصے اور پرزیدہ غم پریشانی پریشانی سے یا ناکام محبت سے۔

تھوجا۔ ٹیکے لگانے کے بعد جب پورے ہو سکے کیوجہ سے بن جائیں غائب ہو جائیں نتیجہ کے طور پر حملے سے پہلے کان سن ہو جائیں۔ ایک ایم طاقت میں دتجے۔

اگنیشیا۔ مرگی کے دورے جذبات کو خمیس لگنے سے یا بہت زیادہ غصہ و غم پریشانی یا ناکام محبت کیوجہ۔

سٹانم۔ دانت نکلنے کے دوران مرگی کے دورے، پیٹ کے کیڑوں کی علامات کے ساتھ۔  
چہرہ زرد ہاتھوں اور آنکھوں میں کھنچاؤ۔ بازو ہلانے کے ساتھ۔  
لائیکوپوڈیم۔ ضدی آدمی جو فلسفیانہ ذہن رکھتے ہوں۔ جن کو بیوقوف سمجھنے ان سے  
حکمرانہ سلوک کرے لیکن آپ خود اعتمادی سے محروم ہو۔ شام کے وقت زیادتی۔

سلیٹیا۔ ڈبلے پتلے لمبے۔ مانوے رنگ۔ افسردہ۔ معزور۔ پیاس نہ عمر میں کرنے والا۔  
چھچھے پاخانے کے ساتھ پسینہ والی۔ ہتھیلیاں اور غیر تندرست جلد سے اور پورے چاند میں رات  
کے وقت دورے پڑیں۔

وسکم البم۔ مرگی کیلئے جب دورے کے بعد جکڑ رہیں۔

کلیکریا کارب۔ بچوں میں مرگی کھلے تالو کے ساتھ اور دیر سے دانت نکلیں۔ سرگردن پر  
پسینہ۔ حملے سے ڈرے اور اس کے لئے افسردگی پیدا کریں۔ پھنسیوں کے دبنے کیوجہ سے مرگی۔  
مشت زنی یا خمی بے اعتدالی بازوؤں میں کچھ چلنے کا احساس یا معدے کے گھرمے سے پیچھے کی  
طوت چکروں کا اچانک حملہ۔ لجز تشنج کے ہوش کا کھودنا۔ حملے سے پہلے منہ کی چبانے کی حرکت

یادداشت کی کمی اور ابتری۔ سرد۔ سرگزانی حملہ کے بعد۔ پیاس اور بھوک۔

سکوتا اور سردی۔ اپناک سختی جس کے بعد بھٹکے اور شدید توڑ موڑ۔ سانس کا دب جانا۔  
بہرہ گزیر، منہ بھاگ۔ دانتوں کا بند ہو جانا یا دند سڑ۔ پیچھے کی طرف گردن کا جھکنا۔ حملے  
کے بعد شدید کمزوری۔ مرگی کا دورہ سوزش معدہ کے ساتھ۔ انگوٹھے انگلی کی طرف مڑ جائیں دھڑے  
کے دوران میں۔ حملے کے بعد کچھ بھی یاد نہ رہے ایک ہی چیز پر نظر جا کر متواتر کھڑے۔ اگر وہ اپنے  
سر کو دوڑ گھمائے تو بے ہوش جائے۔ صفوڑا سا بھی چھوٹے ہی یا پھٹنے سے دورہ سخت ہو جائے۔  
تھیمیم۔ سیٹیا۔ مرگی اور ریشہ خود کشی کے رجحان کے ساتھ۔ ہنسنے اور بدلے  
بدل کر رہے۔ ریشہ خاص طور پر نیند کے دوران میں ہونٹوں کی چلبلیٹ۔ بازوؤں میں  
لنگرائن اور تشنج اینٹنٹن۔ مردوں میں جماعت کے بعد کستی۔ عورتوں میں بائیں بچہ دانی  
میں درد۔ حیض کی کمی کے ہمراہ۔

بائیوسائیمس۔ تشنج اور بھٹکے منہ پر بھاگ کے ہمراہ اور زبان کاٹنے کے ہمراہ۔ حملے  
سے پہلے بھوک۔ ڈر کی وجہ سے مرگی کا دورہ۔ دورے سے پہلے چکر۔ کانوں کا بجنا۔ آنکھوں  
کے آگے شرارے اور کاٹے والی بھوک۔ دورے کے دوران چہرے کا رنگ اوڈا یا ارغوانی۔  
آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی۔ چیخنے۔ دانت پیسے۔ خیر وادی طور پر پیشاب نکل جائے جس کے  
بعد گہری نیند اور خراٹے۔

اگر کیس ایم۔ مرگی میں جب دورے کے بہت بعد، بہت زیادہ خیالات آئیں۔  
اور دورے میں مریض بہت بولے۔ ہر ساتویں روز مرگی کا دورہ۔ جمائیوں سے شروع ہو۔  
فیرم فاس۔ مریض جو میل ڈونا کے مخالف ہوں، یعنی قلت خون والے۔ کمزور اعصابی  
اعصابی چہرہ زرد۔ بلغی جھلی زرد۔

گلوٹائٹ۔ بہت شدید ٹیکن والا اور دہانے والا سرد۔ ۳۶ گھنٹے یا ۸۶ گھنٹے،  
دورے سے پہلے یا دورے کے بعد۔ یہ گرم کمرے یا گرم اشیاء لگانے سے زیادہ ہو سکتا  
کی دھڑکن تمام جسم میں محسوس ہو۔

سلفر۔ یہ دوائی درمائی عمل انگیز کے طور پر دینا چاہئے خاص طور پر جب مرگی کا سبب دھاتی ہو۔ یہ ایک ایم طاقت میں دی جانی چاہئے۔ یہ ٹی بی میں مبتلا ہونے کے رجحان والی طبیعت والے آدمی میں منظر ہوتی ہے اور پٹنٹیوں کے دہنے سے۔  
 نیکم فاس۔ یہ دوائی دماغی تباہی جو کہ کسی بھی قسم کی مرگی کی وجہ سے ہو جہاں برو مائیڈ کی لمبی لمبی خوراکیں استعمال کی گئی ہوں۔

## غش کھانا۔

مکس۔ معمول سے جوش سے، اگر میٹر یا ہے۔  
 اوپیم اور ایکونائٹ۔ جب ڈرجائے۔  
 سلفر اور فاسفورس۔ بھوک سے۔  
 سلفر کو نیم اور پوڈوفائیلیم۔ پاخانہ کے بعد۔  
 میگنیشیا کارب۔ جب کھانا کھانے کے بیٹھے۔  
 الیومنا۔ جب کھڑا ہونے کے لئے مجبور کیا جائے۔  
 کلر پوڈنج۔ جب بیٹھنے کیلئے مجبور کیا جائے۔  
 لائیکوپوڈیم۔ تھوہا۔ میوریکس۔ حیض سے پہلے اور پچھے لیٹنے سے۔  
 ایسٹیک ایسڈ۔ غشی کے دورے کمزور۔ قلت خون والے۔ سرد دوالے۔ زردرو  
 اور روم کے رنگ والے جہرے۔ نکیر اور نہ بکھنے والی پیاس۔  
 امونیا کارب۔ کوئلے کے بخارات کی وجہ سے۔  
 اوپیم۔ کوئلے کی گیس میں سانس لینے سے غش کھانا۔ اذگھنے والا۔ مدہوش اور  
 بغیر تکلیف کے۔  
 ایسائیڈ۔ انزال کے بعد غش۔  
 اگریکس۔ مجامعت کے بعد  
 سپیا۔ شدید سردی اور زیادہ کام کی وجہ سے۔

نکسوسا رکنا۔ جب دیر تک کھڑا رہے یا بغیر کسی نگاہری وجہ کے قبض اور بلوہ کر جان،  
جب ایک آدمی خون دیکھے یا کسی کو شدید تکلیف میں مبتلا دیکھے۔

پٹرولیم۔ دل کی دھڑکن کے بعد  
بریس و لگرس۔ گاڑی میں سواری کرنے پر۔  
سپاچیلیا۔ دل کی تکلیف کی وجہ سے۔  
آرنیکا مانٹ۔ مشینی زخموں کی وجہ سے۔  
کوکس۔ نلکے سے خون بہنے سے  
چائنا۔ اگر خون بہنے کی کمزوری سے۔

**سردرد۔** آدمی سردرد۔ (درد اعصاب بھی دیکھئے)

بیلادونا۔ تپکن والا درد اور پھٹنے والا درد سر۔ کنپٹیوں میں آگ کی طرح سرخ اور گرم جڑ۔  
چہرہ خون سے بھر پور۔ تکلیف جتنی جلدی آئیں اتنی ہی جلدی جائیں۔ سوزج کی گری کی وجہ سے  
سردرد۔ اچھلتی ہو بھر پور نبض کے ساتھ بیہوشی۔

جیلسم۔ تکلیف گدڑی سے شروع ہو کر سر کو جائیں۔ ماتھے اور ڈیلے میں پھٹ  
جانے کا احساس ہو۔ عموماً کمرے جیسے کمر بھر پڑا ہے اور بڑا ہو گیا ہے۔ بیہوشی جیسے کمر  
کے گرد سخت پڑا یا پیٹی لپٹی ہوئی ہے۔

گلوٹائین۔ گیس کی روشنی میں کام کرنے سے سردرد سوزج کی دھوپ میں جبکہ دھوپ  
سر پر پڑے۔ سر بہت ہی بڑا ہو۔ ٹوگنا اور سوزج کی وجہ سے سردرد بغیر بیہوشی کے۔ ٹھنڈی  
چیزیں لگانے سے یا کمر کو اونچا کرنے سے یا لمبی نیند سے لیکن تھوڑی سی نیند بعض اوقات  
زیادہ کر دیتی ہے۔ شدید درد سراسر کی وجہ سے کھڑکی سے کو جانا چاہے۔

تیرٹرمیور۔ جب سردرد سوزج کے بڑھنے کے ساتھ بڑے اور دن کے گھٹنے سے سردرد  
گھٹے۔ پسینہ کے ساتھ سردرد۔ جتنی زیادہ سردرد اتنا ہی زیادہ پسینہ۔ سکول کے لڑکے اور لڑکیوں  
کا سردرد جس کی زیادتی آنکھوں پر درد دینے سے ہو۔ سردرد سے پہلے ٹہرے ٹہرے شراب

تھوڑے لگے جیسا سر درد جیسے کہ سر پر تھوڑے لگ رہے ہوں پھٹنے والا۔ دہانے والا جیسے کہ بانک میں کسا جا رہا ہو۔ تنگی میں کسا جا رہا ہو۔ جیسے کہ کھوپڑی ٹیکل دی جائے گی۔ نظر کی ابتری کی وجہ سے سر درد۔

سپائجیلیا۔ سر درد صبح کے وقت دماغ کی جڑ میں شروع ہو۔ سر پر پھیل جاتے آنکھ کے گوشے تک جاتے اور پھر بائیں کینٹی تک چلا جائے۔ آنکھوں کے ذیلیوں میں دبانے والا ناقابلِ برداشت درد ہو۔ درد شام کے وقت غائب ہو جائے۔ احساس جیسے کہ سر چوٹی کے ارد گرد بندھا ہوا ہے۔

نیرم فاس۔ سر درد جو خون جیض کا ڈرے۔ دھڑکے دار۔ گہرے جو صرف ایک دن تک جاری رہے کہ جاری ہونے پر۔ پتے کی پتھری کا درد۔ پاؤں ٹھنڈے۔ خود کشی کرنے کا رجحان۔

سینکونیایا۔ سپائجیلیا والی علامات سوائے اس کے کہ یہ دائیں طرف کی دوائی ہے۔ صفراوی سر درد بغیر زرد راک کے۔ خیرامیں اور کینٹیاں سوجی ہوئی۔ مریض اندھیرے کمرے میں کھنچا جائے اور اسے لینا پڑے۔ صفراوی قیاس کرے جو آفاقہ دیتی ہیں۔ تھیلیوں اور تیلیوں میں گرمی۔ پھٹنے والا سر درد جس کی زیادتی سوزج کی بلندی سے ہو۔ بھولی ٹھوک خوراک کے متعلق سوچنے اور سوچنے سے نفرت ہو۔

پلاٹینا۔ تشنجی درد۔ درد دہائی آنکھ سے پیچھے کی طرف بڑھے جو کہ تیزی سے شروع ہوتا ہے اور بہت زیادہ پانی سکھاتا ہے۔ ایک ہزار طاقت میں دی جائے۔

سیدرن۔ شدید ناقابلِ برداشت درد جو ہر درد ۶ بجے شام لوٹ آئے۔ تشنجی درد۔

برائی ادینا۔ بھلنے پر سر درد جیسے کہ ماتھے میں سے دماغ پھٹ کر نکل جائیگا حرکت پر زیادتی سر درد پھیلنے یا کھیل دیکھنے پر شروع ہو۔

مٹی لوٹس۔ شدید اجتماع خون والی اعصابی سر درد جو ٹیکیز ہونے پر کم ہو جائے یا جس کو ٹیکیز ہونے پر آفاقہ ہو۔ اجتماع خون والا سر درد جیسے کہ دماغ ماتھے میں سے پھار کر نکل جائے گا۔

کالسنوینا۔ اگر بواسیر اور قبض کے ہمراہ سر درد ہو۔

چائنا آوف۔ سر درد۔ اجتماع خون۔ ٹیکن والا اور کینٹیوں پر تھوڑے لگیں بلکہ چوڑے

کالی بائی - اگر سرد درد منہ کی نظر کے ساتھ ہو - سرد دھبے پر نظر ٹھیک ہو جائے -

کالی ساغیٹم - مکمل کھانا کھانے کے بعد -

کالی کارب - سرد درد موجب نزلہ میں اخراجات بند ہو جائیں خواجہ شروع ہو کر سرد درد کو آفت -

لیک ویک - سرد دردمندی اور قبض کے علاوہ یا حیض کے دوران جس کو زیادہ پیشاب کرنے پر آفت ہو -

روٹا - سرد درد جو پٹھنے اور آنکھوں پر دباؤ ڈالنے سے ہو - آنکھوں پر دباؤ ڈالنے کیلئے مچھلی کی دوا -

اولین ٹمر - جیسے کہ سر کی کھوپڑی پر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے، جو سر کو کچل رہا ہے

جس کو اطراف اور بھینگنا دیکھنے سے آفت ہو -

آئرینک ایم - جب سرد درد کیوجہ سے ہو - تکلیف اور درد - خراش مٹوانے کیلئے دوا -

میں میخیں گاڑی جارہی ہو - دماغ کی اتہری - درد کی تکلیف میں سر کو پانی میں ہلانے سے زیادتی

سر کو اونچا کرنے پر آفت -

ہائپرکیم - ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ کیوجہ سے سرد درد - یہ آئرینک کی تکمیلی دوائی ہے نہایت

کو دور کرتی ہے جب آئرینک اجتماع خون اور خراش پر قابو پالیا ہو -

نکسوامیکا - شراب یا دوسرے محرکات میں ملوث ہونے پر سرد درد پر سرد تکلیف

جیسے کہ پیشاب ہو - دباؤ والا - بھاری - کندہ بن - پریشان چکر - دھواں اور سکتہ جوناگوار اور کھٹے

مادہ کی قحطی اور قے کے علاوہ پاخانہ نامکمل خواہش - شام کے وقت سرد درد میں آفت -

کیمومیل - بڑے چڑے پن کے ساتھ سرد درد - بلغم ناراض اور غصے میں ہو - عام طور پر

یہ سرد درد ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آدمی زیادہ مقدار میں شراب استعمال کریں اور اس کے اثرات

کو زائل کرنے کے لئے افیم استعمال کریں - یا جو سخت کافی استعمال کریں - اعصاب کو سہلانے

کے لئے یا اعصاب کو سکون دینے کیلئے -

چینیم سلف - کوئین کے غلط استعمال کیوجہ سے کانوں کا بھنا - بھنسا ہٹ گرج

دونوں کانوں میں مائع اور آنکھوں میں شدید تکین والا درد - خوراک ایکڑا طاق کی دیکھائے -

کالی میور - جب چینیم سلف فیل ہو جائے تو یہ دوسری دوائی ہے کوئین کے غلط استعمال

کے لئے سر میں بھیج کر دل کے لئے جیسی آوازیں آئیں۔ ۱۰۰ طاقت میں دی جائے۔  
 ایٹوڈم۔ سردرد جیسے کہ سخت پی سے سر باندھا ہوا ہو۔ گرم کرے یا آگ  
 کے نزدیک جانے پر زیادہ ہو۔ ٹھنڈے کرے اور ٹھنڈی ہوا اور کھانکے دوران میں آفاقہ ہو۔  
 بیسکس کو اردھنویا۔ سر کے پھیلنے کا احساس ریڑھ کی ہڈی کی طرف سے سرد شروع ہو  
 فائوٹولا کا۔ سننے کی جس کی زیادتی کے ساتھ سردرد کی زیادتی۔  
 کلکیر یا فاس۔ سکول کے لڑکے، لڑکیوں کا سردرد جو غور سے کتابیں پڑھیں۔ خاص  
 طور پر وہ جو تیزی سے پڑھیں۔ جن کی ذہنی بڑھوتری جسمانی بڑھوتری کے مطابق نہ ہو۔  
 تھو جا۔ سردرد جیسے کہ کھوپڑی میں میخ گاڑی جا رہی ہو۔ یا پیشانی کی چڑھائی میں۔  
 کافیا۔ درد سر جیسے کہ کھوپڑی میں میخ گاڑی جا رہی ہو۔  
 پیکرک الیڈ۔ تھوڑی سی بھی ذہنی مشقت سے دماغ کی نرمی کی وجہ سے سکول کے لڑکوں  
 میں سردرد پڑھنے کے بعد، امتحان کے بعد طالب علموں کا سردرد۔  
 رویمینیا۔ صفرادی سردرد گیس کی علامات کے ساتھ۔ معدہ میں درد۔ کھینچتے  
 اور تیزابیت محسوس کر لے کہ سر ابلتے ہوئے پانی سے بھرا ہوا ہے۔  
 کلورٹیم۔ خوفناک۔ گند۔ بھاری پیشانی کا سردرد جو کئی روز رہے۔  
 ٹیرنٹولا اسپانیہ۔ جیسے کہ ہزاروں سوئیاں سر میں گاڑی جا رہی ہوں۔ شور مچھونے  
 سے اور سخت روشنی سے زیادہ ہو۔ مالش سے آفاقہ ہو۔  
 لیک ڈیفلمو۔ درد حقیقتاً تھکے سے شروع ہو کر کھوپڑی تک جائے۔ تپکن کے  
 ساتھ ملتی تھکے۔ اندھا پن اور ضدی قبض حیض کے دوران میں زیادہ شیا پر کرے سے آفاقہ۔  
 ویرٹیم ایلیم۔ اعصابی سردرد جس کے ساتھ نظر ماتی رہے۔ جھولی پر بہت ہی ٹھنڈک  
 سرد چیزیں لگانے پر آفاقہ۔ ۲۰ طاقت میں بیچے۔ سردرد جو چہرہ کو بدل دے تقریباً بالکل بنائے۔  
 وائٹولا اور ڈورٹیا۔ سردرد اچانک ظاہر ہو بغیر کسی وجہ ظاہری کے  
 نلسمین بگاڑ کے ساتھ۔

بیچو تنھیں - درد شقیقہ کی خاص دوائی - بے پرواہ اور بے حس - دھما - پیشانی کا درد -  
 ناک بڑھ پانچھوں کے اوپر کنپٹیوں میں سے جو ٹھکنے پر اور ہٹنے پر زیادہ ہو - ٹھکچھا استعمال کیجئے -  
 پلو تھیں - ہسٹیریائی سردرد کے لئے -

ایلمیٹ - سردرد جس میں حیض شروع ہونے پر اتفاق اور اس کے بعد زیادہ -  
 گلکیریا ایٹ - یہ خوش کرنے والا پیشانی کا درد - کام بند کرنا پڑے اور نہ جانے کہ وہ کہاں تھا  
 اپنی نگاہیں - اعصابی سردرد جس میں متواتر تھوکنے کی علامت ہو - متحرک چھپا پانچیم کا ٹھکا -  
 سردرد جس میں جھوٹ ہو -

انیشیا - غم کے بعد اعصابی سردرد - بہت زیادہ پیشاب آنے پر بند ہو جائے یا ختم  
 ہو جائے ہسٹیریائی سردرد - درد الیا کر جیسے سوئی یا نیچ میں گڑی جا رہی ہے -  
 لوبیلیا انفلیٹا - دماغی جھلیوں کا درد - ۶ طاقت دو تین قطرے ہر دو گھنٹے کے بعد  
 دن بھر میں ۶ مرتبہ ضرور دیجئے -

لائیکوپوڈیم - ننگا کرنے پر اتفاق ہو -  
 آرم میٹ - پاگل کر دینے والا سردرد جیسے کہ اس پر ہوا چل ہو اگر سپردہ کوئی جھونکا  
 محسوس کر رہا ہو - ٹھنڈے بہت زیادہ حساس - اپنا سر لپیٹا جا ہے  
 سلیشیا - سردرد کو لپیٹنے اور ڈھلپانے سے اتفاق ہو - اندھیرے میں زیادہ روشنی  
 میں اتفاق - اعصابی سردرد جو سکول میں زیادہ پڑھائی کرنے پر ہو -

اوسموڈیم - دباؤ یا آنکھ پر دباؤ - پیکر اعصابی سردرد - ضعف اعصاب -  
 اکیٹاریسموس - پیشانی کا اکھوڑی کا سردرد - آنکھوں کے ٹریوں میں درد - دباؤ سے  
 اتفاق - تھوڑی سی حرکت سے بھی زیادتی -

بکس اسکاٹا - تعویذ اسامی کھانا کھانے سے بہت زیادہ درد -  
 پلیٹلا - آئیں کریم کھانے سے سردرد - گیس کی وجہ سے سردرد جو گرمی سے زیادہ ہو -  
 سپیا - سردرد ہٹنے والی تکلیف - سر کے داہنے طرف چہرے کے اور پیشانی کی ہڈی

تیزی سے بڑھنے والی تکلیف۔ اور بچانے والے درد۔ بائیں کنبی میں۔ بائیں آنکھ کے اوپر سے کھوڑی تک بڑھنے والی۔ سر درد چوٹی پر۔ ٹیکن والی محسوس کرے جیسے کہ سر اوپر سے کھل گیا ہو۔ شور سے زیادہ۔ قبرسم کی خوراک سے نفرت۔ معدہ میں خالی پن کا احساس۔ کھانا کھانے کے بعد آفاقہ اور نیند کے بعد آرام۔

ٹیوبرکولیم۔ ٹی بی کی ہسٹری والے خاندان میں آدمیوں کا سر درد۔ درد کی نینت ایسی ہو کر جیسے سخت لوہے کا چھلا سر کے گرد مڑھا ہوا ہو۔ ریڑھ کی ہڈی پر گیتے تکلیف دہ کپڑوں کا احساس۔ آرم آرس۔ برف کی طرح سرد اتھا، ٹانگیں اور پاؤں۔

سٹیف گیگیا۔ بڑا گوشت (گائے کا گوشت) کھانے سے سر درد۔ کانوں میں گرج کے ساتھ سر درد۔ سر درد جو پاگل بنانے والی ہو خاص طور پر پیشانی میں۔ تکلیف اندرونی و بیرونی طرف دبانے والی معمولی سا چھوٹے سے سر درد اور تکلیف بڑھیں۔

کلیریا آئیوڈ۔ سر میں درد جس کو بالوں کو باندھنے سے زیادتی ہو۔ کرڈیس میور۔ درد حقیقہ بہت بڑی مقدار میں صفر اک تے۔ داہنی طرف نہ لیٹ سکے یا کر کے بن نہ لیٹ سکے۔ بغیر سیاہ صفراوی تے کے۔

اینا کارڈیم۔ سر درد کو کھانا کھانے سے مکمل طور پر آفاقہ ہو جائے۔ حرکت اور کام کے دوران زیادہ۔ گیس اور اعصابی سر درد۔

جیلیڈونیم۔ شدید پاگل بنا دینے والا سر درد جو ریاض کو اپنے ہاتھ کاٹنے پر مجبور کرے۔ کوکولس۔ سر کی پشت پر درد جیسے کہ یہ جھٹے یکے بعد دیگرے کھل اور بند ہو رہے ہوں۔ سر درد سائے کی طرح آئے۔ نیند کے دوران میں جو کچھ ہو رہا ہو سن سکے خواہ خراٹے لے رہا ہو۔ اعصابی سر درد گرانی کے ساتھ متلی اور جکڑ۔ سر کی گدی کو درج شدت کی وجہ سے پکڑے۔ ٹیلیائی۔ صفراوی سر درد۔ جلد چہرہ میں جلنے کا احساس، سانس بھی تھنوں کو ملے۔ آرمس در۔ صفراوی سر درد جلنے اور تیزابیت کے ساتھ ٹیکن اور شدید درد۔ نظر میں خوب تے سے درد کو آفاقہ ہو جو کڑوی ہوتی ہے۔

سورائیم۔ بھوک کی وجہ سے سردرد۔ کھانا کھانا چاہے لیکن مطلوبہ مقدار حاصل نہ کر سکے۔  
 ایومنا سیلیکیٹ۔ بال باندھنے سے سردرد میں اضافہ۔ دانتوں کو ایک دوسرے سے لگانے  
 سے یا کٹنے سے جھڑ سے پہلے یا دوران میں۔ بجاری پن سے قدم اٹھانے سے سردرد میں اضافہ  
 ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی بیسوں۔ سرکوشیوں سے باندھنے سے سر ملانے سے اور چلنے سے سردرد  
 میں آفت ہوتا ہے۔

فلینڈیریم۔ درد جیسے کہ سر کی چوٹی پر وزن ہو۔  
 کینا بس انڈیکا۔ احساس جیسا کہ سر چوٹی پر سے کھل اور بند ہو رہا ہو۔  
 بیڈیاگا۔ ۲ بجے ۷ بجے شام کے درمیان شدت کی سردرد۔ چکر اور سر کا بھراؤ  
 ٹھنڈک سے زیادتی اور گرمی سے افادہ۔  
 کالیا لیٹیفولیا۔ چوٹی میں سردرد سورج طلوع سے غروب آفتاب تک۔ کھڑے ہونے سے  
 اضافہ، چکر اور گھبراہٹ۔

جبرائیل۔ سردرد ہر روز بوقت دوپہر۔ متلی سے تھکنا اور پسینہ۔  
 نیٹرم سفیوریکم۔ سر کی جڑ میں درد جیسے کپکپا گیا ہو۔ سر میں زخموں کی وجہ سے دماغی  
 تکلیف جگہ۔ کانوں میں سوئیاں جھنجھیں۔ کنپٹیوں میں سوراخ ہوتے ہوئے محسوس۔ گانے  
 اور مرطوب ہوا میں اضافہ ہو۔

سیلینیم۔ چاء یا شراب کا عادی ہونے کی وجہ سے سردرد۔ گرم موسم۔ زیادہ مطالعہ اور  
 تیز خوشبوؤں سے اضافہ۔ سردرد کے دوران پیشاب بڑھ جائے۔  
 پولوڈو فائیلیم۔ جب سردرد اسہال سے بدلے۔

پلمبیم۔ پیشانی یا سر کی چوٹی کا عام طور پر قبضہ اور صفراوی تے خاص طور پر جب  
 سردرد کے ساتھ ہو۔ گلے میں سر کی طرٹ گولہ اٹھنے کا احساس ہو۔  
 فاسفورس۔ سردرد کو ٹھنڈی بیسوں سے اضافہ ہو اور گرم کمر اور گرم بیسوں سے افادہ  
 دماغ کی جڑ میں ٹھنڈک کا احساس۔

پٹرولیم۔ سرکی کھوٹری کا مندی قسم کا سرد، متلی اور تے کے ہمراہ۔

لیکسن۔ حیض کے دوران میں شدید سرد، خاص طور پر جب حیض کا ہواؤ کم ہو۔

سرد درمیں درد حیض کی طرح حیض کے بہنے سے آفات۔ پھٹنے والا، پھوٹے لگے کی طرح کا

سرد۔ سرکی طن خون کا زیادہ بہاؤ۔

کونیم۔ شراب کے مشروبات کی وجہ سے سرد اور چکر تیز چلنے والی چیزوں کو دیکھنے سے متفرق۔

الیومنا۔ سرد و متلی اور تے کے ساتھ۔ زکام میں مبتلا ہونے پر سرد و زکام

خشک اور بند۔ بڑے سرد و بدبودار پھلکے ناک اندر پانی جیسا اخراج آنکھوں سے اور مثانی

میں درد کے ہمراہ۔

سٹس کین۔ ہاتھ پر ٹھنڈے پسینے آنے سے سرد میں اضافہ۔ جتنا زیادہ پسینہ

آئے اتنا ہی زیادہ ٹھنڈا ہوا اور سرد میں اتنی ہی زیادتی ہو۔ کھانا کھانے سے آفات ہو۔

کلیر یا آرمینکم۔ اس دوائی کی یہ خاصیت ہے کہ درجس پہلویشا ہوا اس سے دوسری

طرف جس پر لیٹا ہوا نہ ہو چلی جاتی ہے۔ اور مریض متواتر اپنی حالت بدلتا رہتا ہے۔

امبرگرولیا۔ سرد و پیچھے کی طرف دبانے والا۔ اور پھاٹنے والی تکلیف کپٹیوں سے شروع

ہو۔ جب ناک صاف کرے سرد ہو۔ دہنی آنکھ اور دہنی پلک میں جلن۔ کھانا کھانے کے بعد

اضافہ یا زیادتی سرد۔

فلورک الیڈ۔ پیشاب کی خواہش کو پورا کرنے پر سرد۔

اگر کیس مس۔ پیشاب میں کمی اور قرض کی وجہ سے پافاٹہ آنے پر آفات۔ دفعوں سے کھینچنے

اور پھاٹنے والی پیشانی میں درد۔

الیومن۔ سرکی چوٹی پر درد آگ جیسی جلن کے ہمراہ اور یہ اس کو دباے جیسے کہ کھوٹری کچل

دی جائے گی۔ سخت دباؤ اور برف جیسی ٹھنڈی پٹیوں سے آفات ہو۔

امونیا کلرب۔ سر میں اعصابی اور گنٹھیاوی دردی۔ کپٹیوں میں پھاٹنے والی درد۔

لودمٹا۔ داغ میں گہری درد اس احساس کے ساتھ کہ سر سوجا ہوا ہے اور بہت بڑا ہے۔

اس کے ہمراہ حیض درم برہم - اور دل کی دھڑکن اور دل بھی بڑھا ہوا محسوس ہو۔  
 کلکیر یا کارب - موٹے آدمیوں میں مرن سر درد چہرے - چہرے پر پسینے کے دھبوں کے  
 ساتھ - برف کی طرح ٹھنڈا اور ہاتھ پاؤں کا انداز ہونا۔

لائیکو پر سپیکم - تمام سر میں شدید درد لیکن آنکھوں کی پشت اور کنپٹیوں پر جم جائے یا  
 ٹھہر جائے بہت شدت کے ساتھ، تمباکو کے دھوئیں سے مکمل آفاقہ گرم کرے میں یا باہر کی گرمی سے۔

## سر میں رطوبت کا بھر جانا۔

میڈرائٹیکس - صرف ایک قطرہ ایک غوراک دیجئے۔ دوسری صبح ناک کے راستے مانت  
 مواد کا بہاؤ ظاہر ہوگا اور صرف ایک غوراک آرام دے دیگی - دوسری غوراک دیجئے اگر دوبارہ کا خط ہو۔  
 ایپیس ایم - تالو کا ابھار چہرہ بھولا ہوا اور زرد - مریض لا پرواہ - اُونگھنے والا۔  
 خاموش - بعض اوقات تیز بیچنے کے ساتھ چونک جائے - سرخ بخار کے بعد۔

زنگ میٹ - مریض اپنے سر کو گھمائے اور نیند سے جاگ جائے جیسے کہ ڈرا ہوا ہو چوٹی  
 گرم، پیشانی ٹھنڈی - دانت پیسے - آنکھیں روشنی سے حساس یا متاثر ہوں - منجندہ  
 گھورتی ہوئی آنکھیں - ناک خشک - نیند کے دوران ٹھوکر کا پھڑکن۔

ہیلی بروس - دماغ کی افسردگی نمایاں علامت ہے سر کو گھمانا اور تکیے میں گھسیڑنا ہے  
 سر درد کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے - اگر شدید تشنج ہوتا ہے - دماغی جھیلوں کی سوزش اس کی  
 پیچیدگی ہوتی ہے - پیشاب کم ہو جاتا ہے اور آنکھیں روشنی سے متاثر نہیں ہوتیں۔

کلکیر یا کارب { پہلی دوائی پہلے نرم مریضوں کے لئے ہے - جن میں تالو کھلنا غیر معمولی  
 کلکیر یا فاس { بڑا سر جلد پھیلی لگی ہوئی سر پر پسینہ - دوسری دوائی (کلکیر یا فاس) کے

کے متعلق چھوٹے تدر کے کمزور بچوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ وہ ناراض اور چڑچڑاہوتا ہے۔ لیکن  
 چیزوں کے بہت خواہشمند ہوتے ہیں - پیٹ کے پٹھانڈ مٹنے ہوئے ہوتے ہیں۔

کالی آئوڈ - یہ دوائی وہاں کامیاب ہوتی ہے جہاں خاندان میں سفلس کی تاریخ پائی

جاتی ہے۔ جبین کا پین۔ لمبے سانس لینا اور تشنج پٹلیوں کا علاج اور بہت زیادہ پھیلتا۔ بازوں کا خود بخود حرکت کرنا۔

مرکب سال۔ جبکہ اور سرخ سٹھاس کے بعد دماغ کی جھلیوں میں پانی پڑنا۔ بچہ سر کو ادھر ادھر دلاتا ہے۔ بچہ سر پر پسینہ کے ساتھ کراتا ہے۔

بیلٹا ڈونا۔ حاد کیسوں میں چوٹی کی دوائی ہے۔ بخار، بخوٹا ہوا سی اور ہڈیان۔ شدید سر درد سرخ اور خون آمیز آنکھوں کے ہمراہ۔

سلفر۔ خنازیر۔ کندھالا میں مبتلا بچوں کے لئے مفید ہے۔ سوچ پسینہ۔ بازوؤں کا ہلنا اور خاندانی مریضوں کے لئے۔

ایپوسائٹیم۔ دماغ کی جھلیوں میں پانی۔ ماتھا آگے کی طرف نکلا ہوا۔ سر کی جڑ کھلا۔ رطوبت رسنے کی نوبت۔ مدہوشی۔ ایک بازو اور ٹانگ کی بلا ارادہ حرکت۔ ایک آنکھ کی نظر ضائع۔ اخراجات کم خاص طور پر پیشاب اور پسینہ۔

## پانی سے ڈرنا (مرگی)

لافی سین۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہیے۔ ۲۰ طاقت کی ایک خوراک دے کہ ۴ گھنٹے کے بعد علامات کے مطابق درج ذیل ادویات دینا چاہئیں۔

بیلٹا ڈونا۔ شدید ہڈیان۔ مریض شدید غصے میں۔ ماتھا بے کتا ہے، جھلک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی غافلت کی جائے تو شیطان کی طرح لڑتا ہے۔ گلا خشک، برش پاش کیا ہوا اللہ پر درد۔ کھانسی۔ روشنی اور ہلنے سے اضافہ پہلے درجے کی دوائی ہے۔

سٹر امونیم۔ وہی علامات جیسے کہ بیلٹا ڈونا میں لیکن اس سے کم یا بالکل۔ سٹر امونیم میں پانی پینے میں اضافہ نہیں بلکہ پانی دیکھنے ہی سے اضافہ مرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس مرض کی نمایاں علامات ہے۔ آہستہ آہستہ بڑھوتے کاندھیلین۔ دوسری سٹیج کی دوائی ہے۔ پاگل جانوروں کے کاٹنے کا علاج ہے۔

ہائوسائیمس - جب متواتر بے خوابی ہو۔ گلے کے پھوٹوں کی متواتر نرمین عرض حرکت ہو۔  
 کینٹھرس - شدید غصے کا ہڈیان۔ مجنوں مشتعل۔ شدید غصے کے دورے  
 بھونک۔ پریشان جبے چینی جو غصے پر منتج ہو۔ حادثہ پاگل پن۔ یہ سب بڑھیں، جب اضافہ  
 مرض ہو۔ ملق کو چھوٹے اور ٹھنڈا پانی پینے ہو۔ نگلنا مشکل ہو۔ درد کے ساتھ ملکی۔  
 جلتے ہوئے بخکی۔ شدید بخار۔

## خون کا دماغ کی طرف بہت زیادہ چڑھنا

بیلادونا - شدید تکین والا درد سر۔ سرخ چہرے کے ساتھ۔ ٹھنڈی پیٹیوں سے یا  
 سر کو نچا او نچا کرنے پر افادہ۔  
 ایکونائٹ این - سرگرم۔ جلد خشک۔ تیز چھوٹی باریک تار جیسی نبض بہت  
 پریشانی اور بے چینی۔ سب سے پہلے اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔  
 ہائوسائیمس - سرخ آنکھیں اور شرارے نکلے ہوئے کے ساتھ ہڈیان۔  
 گلوانٹن - سر میں بھاؤ کے ساتھ تکین دار سرد دردمورج کی گرمی سے زیادہ اور ہلے سے  
 زیادہ ہو۔

جلیسیم - معمول خون سرکھڑا تھا ہوا۔ بہت زیادہ بھرا ہوا کٹھن۔ لا پرواہ۔  
 چہرے سے لا پرواہی کا اظہار۔

ورم درائٹڈ - دماغ کی بڑیں اجتماع خون۔ سرگرم۔ آنکھیں خون کی طرح  
 سرخ۔ ایک کے دو دکھائی دیں۔ نبض نرم اور سست۔

## ورم اعصاب

ایکونائٹ این - دماغ میں اجتماع خون سوزج کی گرمی کی وجہ سے جذبات کی  
 اپانک براہیغکی۔ ورم اعصاب کے پہلے درجہ میں۔ شور اور روشنی میں زیادتی مرض۔

بیلادونا۔ اجتماع خون اور دماغ کی سوزش یا ہیجان سرگرم اور ٹھنڈے پاؤں کے ساتھ۔ گردن کی شریانوں میں تپکن دار اسرور۔

گلوناٹن۔ احساس کہ سر بہت بڑا ہے اور خون سے بھرا ہوا ہے۔ پیچھے کی طرف بھٹکنے سے زیادتی۔ حرکت اور ننگا کرنے سے آفاقہ۔ امیں بیلادونا سے جو پیچھے کی طرف بھٹکنے سے آفاقہ اور سر کو ڈھانپنے سے اور حرکت پر زیادتی سے تفریق کی جا سکتی ہے۔

ہائوسائیکس۔ درم اعصاب تپکن کی ہر سر میں۔ سر کو ہلانے سے اور آگ کو سر کر کے بیٹھنے سے آفاقہ۔ بیلادونا کے خلاف۔

الیومنا سلیکیٹ۔ درم اعصاب درد والے حصوں کے سُت ہونے کے ساتھ۔ میگنیشیا فاس۔ دماغ میں اجتماع خون جب اچانک اسہال رک جائیں۔ اعصابی اور گنٹھیاوی سرور۔

(دیکھیے فالج۔ حرکت کی نااہلیت)

## دماغ کی جھلیوں کا درم

بیلادونا۔ شدید ندیان۔ لڑے تاکہ تصوراتی چیزوں سے بچ کر نکل جائے۔ سرخ خون کی طرح آنکھیں۔ گردن کی شریانوں کی پھر کن۔ نیند اس وقت ٹوٹے جب مریض ڈر کر جھنجھٹے شور اور روشنی سے متاثر ہو۔ نبض تیز اور اچھلتی ہوئی۔ درجہ حرارت اونچا۔ ڈھانپنے ہوئے حصے مندار۔ دانت پیسے۔

برائی ادنیا۔ یہ بیلادونا کے بعد اچھا کام کرتی ہے لیکن بدل بدل کر کبھی نہیں دینا چاہیے۔ جب بیلادونا بخار کو کم کر دے اور نبض کو دھما کر دے، کھانسی کم ہو جائے۔ یہ گنٹھیاوی مریضوں کے لئے بہت بہتر ہوتی ہے۔ سُت ہونے کا احساس۔ احقانہ اظہار۔ گردن کی سختی۔ پیٹ بھولا ہوا۔ ٹیوبرکولیم۔ یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے علاج کے شروع میں دی جا چاہیے یہ ایک جمانی ساخت کے مطابق دوائی ہے۔ یہ ٹی بی میں جھلیوں کے درم کا علاج بھی کرتی ہے اور

حفاظت بھی کرتی ہے۔ ۲۰ ملاقات کی ایک خوراک دیجئے، ۶ سے ۱۲ گھنٹے تک کوئی اور دوائی نہ دیجئے  
حتیٰ اگر مریض حالت علامات کے مطابق کوئی اور دوائی نہ چاہے۔

ایپس ایم۔ ٹی بی میں درم کی جھلیوں کی سوزش میں یا عاوا اخراج مواد جو پھپھوں کے  
بنے یا ناسکل ہونے کی وجہ سے خازج ہو رہا ہو۔ مریض نیند میں جھج کے ساتھ چلا تا ہے۔  
ہیملی بکرس۔ جب ماتھے میں ٹمکن، پٹلیاں پھیلی ہوئی اور پچلا جڑا گرے۔ ایک بازو اور ایک  
ٹانگ کی خود بخود حرکت یا بلا ادا درہ حرکت۔ ماتھے پر شدید پسینہ۔ مریض پانی پینے میں لاپرواہ کرے۔ وہ  
پچھ کو دانتوں سے پکڑے جب اس کے منہ میں پانی ڈالا جائے۔ آنکھیں روشنی سے متاثر نہ ہوں۔  
مکمل بہوشی۔ ٹی بی والی درم کی جھلیوں کی سوزش۔ مکمل یا نیم بہوشی۔ ہستی۔  
کیو پریم میٹ۔ جب اونچی آواز سے جیسے جس کے بعد شدید تشنج۔ اور انگوٹھے پچھ جائیں۔  
خیلے ہونٹوں کے ساتھ چہرہ زرد۔ ڈیلے متواتر گھومیں۔  
ہائیو سائیمس۔ یہ دوائی اس وقت دینا چاہیے جب تشنج دب جائے۔ اور مریض لالعلقی  
اور بہوش پڑا ہو بلکہ ہڈیاں کے ساتھ۔

گلوٹامائن۔ درم دماغ کی وجہ سے جھج (جیسے کراپس میں) اس احساس کے ساتھ کہ  
سر بہت بڑا ہو گیا ہے۔ تشنجی قے شدید اجتماع خون اور سر کی ٹپکن کے ساتھ۔ سوزش کی گرمی  
اور عام گرمی سے۔ دماغی جھلیوں کی سوزش۔

نزیک میٹ۔ دماغی سوزش میں بچہ ڈر کے ساتھ جاگ جائے۔ سر کو ادھر ادھر گھمائے،  
چلائے۔ نیند میں چڑک جائے۔ قلت خون دلے پتوں جن میں پھوڑے پھنسیوں کا رجحان ہو۔  
سکھوا وائروسا۔ تشنج کے ساتھ۔ بازوؤں اور تمام جسم میں ڈرانے والے جھٹکے بہوشی کے  
ساتھ۔ تشنج جیسے پیچھے کی طرف مڑے، تھوڑا سا چھونے سے، شہر سے یا ہلنے سے دور شروع ہو جائے۔  
مرک سال۔ دماغ کی سوزش، چوٹ کے مابعد اثرات۔ سوزش دماغ جو کان میں سے  
اخراج کے دینے کی وجہ سے ہو۔ اس دوائی کے استعمال سے ۲۴ گھنٹے کے اندر اندر اخراج  
دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں اور تمام تکلیف رک جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہیں۔

ایکونائٹ - سوزش دماغ کے ابتدائی مرحلے میں - دماغ میں اجتماع خون، غصہ یا دھوپ لگنے کی وجہ سے، ڈر کے ساتھ بخار، بے چینی، خشک جلد اور شدید پیاس جیلمسیم - پھول کی مکمل یا نیم مکمل کمزوری کی وجہ سے (اپنا کام چھوڑ جانا کمزوری کی وجہ سے) نظر کی کمزوری - بولنے کی کمزوری -

اگنیشیا - ہشٹائی مریضوں میں غم کی وجہ سے نصف سر کا درد - کئی دفعہ شب یا زیادہ کم مقدار میں -

میلاڈونا - دہائی وکثر خون والے اور تندرست آدمیوں میں سر درد - نظام دوران دن میں اتنی کی وجہ سے سر درد - سر درد شدید - اچھلنے والا اور تپکن والا ہو - آئرس ٹینکس - سر درد جو ہفتہ کے روز اٹھنے سے پہلے شروع ہو جائیں یا نیند کے شروع ہونے سے پہلے شروع ہو جائیں -

## حرام مغز کی بتی کی سوزش

فالج بھی دیکھیے -

میلاڈونا - جب حرام مغز کی بتی کا اوپر والا حصہ ملوث ہو - گولی لگنے کا سادہ جو چھرا گھونپنے جیسا درد پھول کا پھڑکنا، جیسے کہ بجلی کے شرارے سے چھوٹے جارے ہوں - شدید بخار -

برائی اونیا - سوئی گڑے جیسا درد، حرام مغز کی بتی میں بھاڑنے والا درد جو حرکت سے زیادہ - پھول کی سختی اور سس ہونا -

آرنیکا ایم - حرام مغز کی بتی میں درد اور سوزش جب کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے ہوتا ہے - ہو - معمولی سی حرکت سے بھی درد - چھونے سے بہت زیادہ حساس - بھڑکے ہونے یا پلٹنے کی کوشش سے ڈرے -

پلمسم - ریٹھ میں شدید درد - بخار اور تشنج -

اگر الٹک الیڈ - ٹانگیں سخت اور پُر درد -  
 سکوتا دایر سا - جب مریض چلائے تو شدید تشنج -  
 کیو پریم آر سینکم - اینٹھن کے درد کو پاؤں سے دہلنے سے افادہ - سُن اور ٹانگ میں  
 فالج کا احساس بار بار مِشیاب کی خواہش -  
 سٹرکٹیا ماس - حوام مغز کی تہی کی سوزش جس کے ہمارے دل -  
 الیومنا سیلیکٹ - رانغ میں اجتماعِ خون اور تہی اور رُطوبہ کے اعصاب، نمایاں ملن  
 اور ڈنگ لگنے جیسی درد -

### اعصاب - (انگیوں کا سُن ہونا) متفرق میں دیکھئے

اکونائٹ این - سُن ہونے اور جھنجھٹا ہٹ کی تازہ تازہ تکلیف -  
 پلاٹینا - چھوٹی جگہوں میں سُن ہونے کا احساس خاص طور پر شام کے وقت اور ستر میں -  
 دانتوں کا سُن ہونا - زبان پر جھنجھٹوں کے ریگنے کا احساس - جب بیٹھے تو رُطوبہ کی ہڈی کے  
 اتھری ہرے کے سُن ہونے کا احساس - کانپنے کا احساس - سُن ہونے - چونٹیاں ریگنے اور  
 اینٹھن کے دورے -

ہائیڈرو سائٹک الیڈ - احساسات کا اپانک اور مکمل طور پر کھوجانا -  
 کوکا - ہاتھ اور پاؤں کا اندرونی حصہ سردی کے احساس کے ساتھ سُن ہونا - بازوؤں  
 - اور ٹانگوں کی کمزوری -

آر سینکم - ہاتھ اور پاؤں میں ریگنے کا سُن جانے کے ہمراہ -  
 مارفینیم - کھڑے ہونے کی کوشش پر اُگنے پر ٹانگوں اور پاؤں کا سُن ہوجانا - بائیں  
 تلوے کا برف کی طرح سُن ہوجانا - اینٹھن یا تشنج -

جیلیمیم - بازوؤں کی کمزوری اور سُن ہوجانا - فالج کے اثرات، پٹھے کڑورے - اور مرضی  
 کے مطابق کام نہ کریں - تمام پٹھوں کے نظام کی کمزوری - حرکت کرنے تمام اعصاب کے ساتھ -

اگر کس ایم۔ جسم کے حصے ٹھنڈے اور نیلے مردہ ہونے کا احساس ہے کہ ٹھنڈے جسم کے ہونے۔  
سوچنے جیسا احساس، جیسے کہ چونکیاں رنگ رہی ہوں۔

سیکل کار۔ انگلیوں کا سن ہونا۔ انگلیوں کے سروں میں سوئیر کا چبھنا۔ سن ہونا ہے  
جس اور ٹھنڈک۔ ریگنے کا احساس۔ گرمی سے زیادہ ہونا مرض کا۔

لیکسس۔ ہاتھوں اور انگلیوں کا سن ہونا۔ وتر یا بندھنی کا سکر جانا۔ صبح کے وقت  
اٹھے پران مریضوں میں جو باتونی ہوں اور رات کے وقت یا صبح سویرے زیادہ ہوا اور جوں جوں  
دن گزرتے اچھے ہوتے جائیں۔ گرمی اور نیند کے بعد مرض میں زیادتی۔

اگرز الیڈ۔ بازوؤں کی پشت کا سن ہونا۔ انگوٹھے کے گونے کا سن ہونا  
اور سوچنے کا احساس۔ کندھے سے لیکر انگلیوں کے کنارے تک کا سن ہونا۔

پلمبسم۔ مڑھ پن اور بے حسی خاص طور پر دائیں طرف کی۔ اعضاء کے کام ڈھیلے پڑ جائیں  
اعصاب بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پیغامات نہ پہنچائیں۔ جلد کا بے حس ہونا۔

سکونا و امروسا۔ بازوؤں کے سن ہونا، تمام جسم کا سن ہونا۔ ہاتھوں کی ٹھنڈک۔

اگنیشیا۔ چلتے وقت ایڑیوں کا سن ہونا۔ اور مڑھ ہونا۔

کونیم۔ تمام جسم پر سن ہونے کا احساس۔ شدید کمزوری۔ کانپنا جھکے کھانا اور ٹھوکر کا اینٹھن۔

ریلفینس۔ ہاتھوں اور پاؤں کی تھیلیوں کا تلیوں کا سن ہونا۔

بیوفو۔ جلد پر مکرٹے بے حسی کے

کیڈیم سلف۔ جلد اور اعضاء اور پاؤں کے ٹھوکر میں گہرائی میں چونٹھوں کے ریگنے کا

احساس جھونکا دھون کی صورت میں سن ہونا۔ نالیج زدہ حصوں کے ریگنے کا احساس۔

امبرگریٹا۔ تمام حصوں کی گھٹی ہوئی جس۔ کمزور دوران خون۔ موسیقی ناقابل برداشت

دکھن۔ ٹھنڈاپن۔ اور کانپنا اور بانڈوں کی سختی۔

الیوفنا۔ اعصاب کی پیغام دینے کی جس کمزور۔ جب ایک سوئی بھرنی جائے تو ٹانگوں

اور بازوؤں پر چوس نہ ہوتے اگر دوسری بار یا اسی طرح پھر اور بار بار۔ پاؤں کی تلیوں کا سن ہونا

ہاتھوں اور پاؤں کے بے ربط ہونا۔

ناسفورس۔ جب سُن ہونے کی وجہ جلق ہو۔ برائش کی مرض ہو یعنی چناب میں چربی آئے  
سوئیاں بچھنے کے ساتھ جسم کا سن ہو جانا۔ بازوؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا اور بے حسی اور  
انگیلیوں کے سروں کا سن ہو جانا۔

## اعصاب کی زود حسی

کافیا۔ بچوں میں زود حسی۔ زبلی کے بخار میں بازوؤں اور ٹانگوں میں ٹھنڈی تھوڑی  
سی حرکت کو بھی زیادہ محسوس کرے۔ چھونے اور شور سے بہت زیادہ حساس۔ نظر۔ سننے  
سوئگھنے۔ چھونے سے حساس۔ دردیں شور سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ زنانہ اعضائے خاس  
کی شدید حساسیت۔ اکثر ہمتیری یا جماعت نہ کرے۔ رحم کی گرمی اور حساسیت کی وجہ سے  
کیمومیللا۔ جب کافیا ناکام ہو جائے تو یہ دوا موزوں ہوتی ہے۔ درد کے لئے  
بہت حساس۔ درد کی وجہ سے جسم حساس۔ ڈھانچے میں ہر دوڑ جائے۔ انٹھن اور تشنج  
اسارم لیور۔ انگلی یا ناخن سے لنن۔ سسک پر کھرجنا۔ کاغذ کا کھرٹکھڑانا اور می  
طرح چیزیں بہت ناگواری کا احساس پیدا کرتی ہے اور وقتی طور پر اس کے تمام خیالات اور  
کاموں کو بچھڑاتی ہیں۔ ٹھنڈا۔ ہر حرکت سے کانپنے، تصور کرے کہ وہ ہوا میں ایک روح  
کی طرح متعلق ہے۔ چلتے وقت پھسلنے کا احساس ہو۔

نکسوامیکا۔ بیرونی اثرات کے لئے شدید حساس، مارشنی، شور اور خوشبوؤں کیلئے  
بیلادونا۔ معمولی سے شور یا بلنے سے شدید حساس ان میں سے کسی کو بھی برداشت  
نہ کر سکے۔ کھوڑی حساس۔ بالوں کی کنگھی یا برش نہ کرنا چاہے۔

سلفر۔ گندی بدبوؤں سے شدید حساس، لیکن خود گندی اشیاء کو کھائے اور انگلیے۔  
تھریڈون۔ احساس کہ درد کی صورت میں ہر اس کے جسم سے گزر رہی ہیں اس کے  
بعد تلی ہو عجیب و غریب قسم کی۔

ہمیں پلغز، نقوش سے حاس، ماحول سے حاس اور درد سے حاس۔ سردی بحاس۔ جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ ضرورت سے زیادہ گرم کمرہ چاہے۔ نرم ذراکی مریض ایک کیم۔ ذکی الحس، روشنی اور شور سے ذکی الحس۔ جب پڑھ رہا ہو تو صفحہ پر صاف نظر نہ آئے۔ اندھیرے میں اپنے سامنے چہرے دیکھتی ہے۔

حکسوامید کا۔ بیزنی نقوش سے ذکی الحس۔ روشنی، شور، خوشبوؤں، ہوا کے معمولی جھونکے اور اپنے ماحول سے ذکی الحس۔ اپنی خوراک کے معاملے شدید ذکی الحس۔ بہت قسم کی خوراکیں اسے پریشان کر دیں۔ محرکات کی شدید خواہش رکھے جو اس کو مستعد رکھیں۔ نڈرخی جلدی نادر اض ہونے والا۔ گوشت سے نفرت اور اس سے زیادتی مرض ہو۔ اگر اس کے راستہ میں کسی آبلے تو اسے دور پھینک دے۔ اگر کپڑے اتارتے وقت کپڑے کے کسی حصہ میں ٹہن پھنس تو وہ اسے توڑ دے یا بعض اوقات کپڑے ہی پھاڑ دے۔ نڈرخی کی ذکٹرول ہونے والی حالت۔ اپنے طریقے لوگوں پر چھری شعورنا چلے۔ جب کسی چیز کی جزئیات یا کسی چیز کی تفصیلات بتانی جائیں تو نڈراض ہو جائے اور دُور جانا چاہے۔ چیزوں کو توڑے اور پھاڑے۔ بُرا بھلا کہے۔ اپنے گھر چلا جائے اور گھر میں بیٹھ کر باتیں کرے۔ وہ لڑتا ہے۔ لعنت ملامت کرتا ہے۔ حد تک وجہ سے تو بین کرتا ہے اور اس کے کچھ حصہ کے بعد بلند آواز سے روتا ہے۔

آرمیک ایلیم۔ سونگے اور پھونے سے ذکی الحس۔ کمرے کے ماحول سے شدید ذکی الحس۔ انتہائی ذکی الحس اور نازک مزاج چلے کر کمرے کی ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ کوکولس۔ سن ہونا اور بازوؤں میں فالج کا احساس بعض اوقات ایک بازو سن بیٹھے کر سوجائے اور بعض اوقات دو سر بازو سوجائے۔

سلیشیا۔ ہاتھ اور پاؤں کام کے دوران سوجائیں، شور سے ذکی الحس۔ ایوفنا سلیسکٹ۔ اکیلے حصوں کا سن ہونا اور درد والے حصوں کا سن ہونا۔ گرمی کی ہری سسکی طرف۔ گرمی کا صبر میں اجتماع۔

بائیو سائیمس۔ جلد کے اُصحاب کا ذکی الحس ہونا جس کے نتیجے میں برفانی نگاہوں کی خواہش کرے۔

اوپیم - شور سے ذکی الحس - بکھیاں دیوار پر چلتی مٹن کے اور دُور کے گھر ٹال کی آواز مٹے۔  
 بیوقوف - جلد کی کچھ نکر لوں کا زیادہ حساس ہونا - دوسرے حصوں پر مٹن ہونے کا حمل۔  
 پلمیم - جلد کا انتہائی ذکی الحس ہونا - جس کے ہمراہ فالج اور طاق کا کم ہر جانا - وہ بھڑا  
 جانا برداشت نہیں کر سکتا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے - حادثہ تکالیف میں جلد ذکی الحس  
 اور مزین تکالیف میں جلد کی جتنی -

مقرر یون - اعصاب کا ذکی الحس ہونا - لفظ یا سلب پر کھڑا یا کاغذ کا کھڑا کرنا  
 ناقابل برداشت - علامات آنکھیں بند کرنے پر مٹھیں -

گریفائٹس - سردیوں میں سردی سے ذکی الحس اور گرمیوں میں گرمی سے ذکی الحس -

## درد اعصاب

آرٹیکلیم - جب درد اعصاب بلیریا کی وجہ سے ہو - اور دورہ باقاعدہ وقفوں  
 ہو جن نمایاں علامات ہے - بائیں حلقہ چشم اور بائیں ٹانگ کا عرق النساء یا لنگری کا درد  
 کا عام طور پر اعصاب پر اثر ہوتا ہے -

میگنیشیا فاس - یہ دوائی دائیں طرف کو ترجیح دیتی ہے - یہ کسی بھی حصہ اعصاب  
 کو متاثر کر سکتی ہے، آنکھ، کان، رحم اور ٹانگ، یہ ایک دورے کے خلاف دوائی ہے پھول  
 کے سکرٹنے کے ساتھ شدید تکلیف - گرم بیٹیوں سے دباؤ سے اور اندھیرے میں جانے  
 سے اتفاق ہو جاتا ہے -

اگر کیس ایم - یہ چہرہ کے عصبی درد اور دوسری قسم کے چہرہ کے دردوں کے  
 مفید ہے - دریں ہمیشہ - پھلانے والی - بھالانگے جیسی تیز اور شدید ہوتی ہے - دریں  
 معمولی سے پھرنے سے بھی بڑھ جاتی ہے - ہمیشہ پھول کی اینٹھن کے ہمراہ جن پھول میں  
 اینٹھن ہو وہ ٹھنڈے ہوں اور ان میں سختی ہو -

سیلاڈونا - جب اعصابی درد کے سبب اچانک آئیں اور اچانک ختم ہو جائیں - شور،

روشنی اور چوڑی اور ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادتی ہو۔ چہرے کے مصعب کے پانچویں جوڑ کا درد۔ داہنے اوپس کے اور پچھلے جبڑے کے حصے میں کاٹنے والا درد۔

کیموسٹیل۔ اس دوائی کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب مصعب، مانیٹن، کوکین یا صوف کالی کا تعاضا کرے جس سے وہ محروم ہو چکا ہے۔ دانت درد اور جسم کی ناقابل برداشت تکلیف کے لئے۔  
آر جینٹم میٹ۔ جوڑوں اور اعصاب پھاڑنے والی دردیں اور کڑی ہڈی میں جو ٹھنڈی اور طوفانی موسم میں زیادہ ہوں یا بڑھیں۔ حرکت کرنے پر آفاقہ، اگرچہ تھکا ہوا اور ناتوان لیکن تکلیف یا دردیں اتنی شدید ہوتی کہ مریض چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔

آر جینٹم ٹائپریم۔ پھاڑنے والی دردیں ٹانگوں کی پنجے کی طرف سے حرکت کرنے کی نااہلیت میں۔ برہمی ٹکھنے جیسا اور گولی ٹکھنے جیسا درد۔ ٹھنڈی ہوا۔ ٹھنڈا کھانا۔ آئس کریم جیسی ٹھنڈی اشیاء پسند کرے۔ گرمی زیادتی درد۔

سٹائم میٹ۔ اعصابی دردیں جو کہ اچانک شروع ہوں اور تدریجاً بڑھیں اور تدریجاً کم ہوں۔ اگر درد دب جائے تو یہ دق کی شکل میں ظاہر ہو۔ (یعنی درد کو ہانے سے سل ہو جائے) یہ عورتوں کی دوائی ہے، جہاں شدید اعصابی درد بند ہوا اس کے بعد کثیر مقدار میں زردی مائل لیکور یا شروع ہو جائے۔ اس کو دق یا سل سے پہلے ہوئے۔

کالوسٹیکس۔ پیٹ کے اعضا کے اعصاب پر بہترین عمل کرتا ہے۔ دردیں کاٹنے والی مردہ ڈنڈے والی۔ پیسنے والی جن کو دبائے سے، دہرا ہونے سے اور چلنے سے آفاقہ ہو۔ درد اعصاب کے پچھلے کھانے سے، اگلے جلے مشروبات خاص طور پر ٹھنڈے مشروبات سے۔ سر میں درد اعضا آنکھوں میں ریڑھ کی ہڈی۔ انٹرویوں میں غصہ کے بعد یا بڑی طوالتوں کے بعد۔ بعض کیسوں میں سن ہو جانا۔ سوئیاں چھبنا اور جھنجھٹا ہٹ کی طرح، متاثرہ حصہ میں جیسے چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ ننگری کا درد بائیں جانب ۲۰۰ طاقت استعمال کیجئے۔

چائنا آف۔ اعصابی درد بار بار کے اخراج خون سے۔ زیادہ عرصہ تک درد دھڑلانے سے یا وقفے دار بخار کے بار بار کے حملوں سے یہ دوائی محفوظ رکھتی ہے۔ جب درد آنکھوں کے

گھیروں کے نیچے جڑے کے اوپر بائچوں اعصاب میں ہو۔ یہ معمولی سا چھوٹے یا ہوا کے جھڑکے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دورہ دار ہونا اس کی نمایاں علامات ہیں۔

تھو جہا۔ شدید سونیاں لگنے کی طرح کی درد اعصاب کے ساتھ اور دانتوں میں منہ میں ٹھنڈک کے احساس کے ساتھ اور اوپر کے ہونٹ میں تشنج۔ بائیں طرف کا چہرہ کا درد اعضاء۔ زخمی فائیلیم۔ گولی لگنے کی طرح کی اعصابی درد جیسے کہ بجلی سے تمام بازوؤں میں جسم کا درد۔

مزیریم۔ پلوں کے درد کے لئے بہترین دوائی ہے جس کے بعد ہونٹوں اور آنکھوں کے گھیروں پر داد نمودار ہو جب وجہ دانت کا نامور ہو۔ درد والے حصے کا سن ہو جانا۔ زخمی کے ٹھنوں کی اینٹھن میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ حرارت اور چھوٹے سے زیادتی ہو۔

فاسفورس۔ چہرے کا درد اعصاب پر جب دماغ کی بہت زیادہ محنت یا جذبات کی بڑھ چکی دردیں جلد انداز بھارتنے والی اور کھینچنے والی۔ منہ کے ٹھنوں کی ہر حرکت درد کو بڑھاتی ہے چکر اور ہر قسم کے شور درد لائیں۔

برائی اونیا۔ یہ دوائی دائیں بازو کی اندرونی ہڈی کے اعصاب درد کے لئے خاص ہے۔ زیادہ نور لگنے اور حرکت سے تکالیف بڑھتی ہیں۔ کہنی سے اوپر بازو میں مسلسل درد اعصابی درد غیر معمولی سردی کے ساتھ غصہ کے بعد یا پیٹ میں بُری رطوبات۔

نیرٹرم میور۔ جب دورہ آئے اور انہجے کے دوران لوٹے۔ ضدی قسم کی قبض اور جلد کی خشکی۔ ساحل سمندر اور زیادہ نمک کھانے سے زیادتی ہو۔

کیپسکیم  
پلسٹیل  
وربیکم

آرنیکا  
شیفگیئر۔ پلانٹیکو۔ { دانت کے درد کے لئے  
دانت کے درد کے لئے۔

سکوتیلیر یا۔ اعصابی سردرد کیلئے مفید ہے۔

کالی سائینٹم۔ کنپٹیوں کے حصہ بگولوں کا دائرہ اور جڑے میں شدید درد۔ اوپر والے بائیں جڑے کی درد کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ دماغ میں گورٹکی وجہ سے شدید منہ زور درد سر۔ ایک ہزار طاقت یا اونچی طاقت میں دیکھو۔

کالی آئوڈ۔ بائیں آنکھ پر اعصابی درد سر، دھکن کے ساتھ۔

میگنیشیا کارب۔ حاملہ عورتوں میں متلی کے ساتھ دانت کا درد۔

سپائنجیلیا۔ بائیں طرف کا اعصابی درد بائیں آنکھ۔ بائیں کان گرٹھا۔ بائیں بازو کے

اعصاب میں درد میں گولی کی طرح۔ جلندار بھاڑنے والی جیسے کہ چہرہ اور گردن میں گرم سوئیاں گذر رہی ہوں۔ گردن اور کندھے کی تکلیف گرمی سے کم ہوتی ہیں آنکھوں کی تکلیف سردی سے اچھی ہوتی ہیں۔

رسمکس۔ اعصابی درد کھل ہوا میں آنے کی وجہ سے یا پسینے کے بعد پانی پیگنے سے

حرکت شروع کرنے پر زیادہ تکلیف اور اس کے بعد حرکت کرنے پر درد میں افادہ۔

نکسوامیکا۔ شراب پینے یا شراب کے غلط استعمال کی وجہ سے اعصابی درد۔ دریں شدید۔

ازیت بخش۔ کاٹنے والی۔ پکڑنے والی اور کھرچنے والی۔ بد ہضمی قے۔ ڈکار۔ اسہال اور قبض ٹھنڈے پانی سے اور صبح کے وقت درد میں زیادتی۔ چہرے کا درد۔ گھنٹیا دی۔ آدمی میں ٹھنڈے کے احساس کے بہار۔

کالی بائی۔ درد اعصاب ہر ہڈی ایک مقررہ وقت پر۔

پلمبیم۔ مختلف اعصاب کا درم شدید کھینچنے والے اور انٹھن والے درد جو بڑے سے

شروع ہوں اور جسم کے ہر حصے کو جاتیں۔ پاخانہ سخت بھیڑکی میٹگنیوں جیسی گولیاں۔

سینکونیہ یا سی۔ دائیں طرف کا اعصابی درد سپائنجیلیا جیسی علامت کے ساتھ۔

روٹا۔ ڈنگ لگنے والا۔ پھاڑنے والا اور جلندار دریں۔ ٹھنڈ اور لیٹنے سے زیادتی ہو۔

عام طور پر مزمن دریں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

لائیکوپوڈیم۔ لنگڑی کا درد ۲۰ طاقت یا سی ایم پوٹنسی میں دیکھو۔

نیفا لیم۔ لنگڑی کے درد کیلئے نھنھوی دوائی، آرام کرنے اور پہلی حرکت پر شدید دردیں ہوں یا لمبیں۔  
 نیز ٹرم سیلف۔ سائیکوٹک اعصابی درد۔ پتھر کے جوڑ میں چلتے وقت درد اچانک ہو۔  
 ویلیمریائیہ۔ اعصابی درد جو کہ آرام کرنے پر بڑھے۔

سٹرائیم کارب۔ چھ پھاڑ کے صدوں کے لئے بہترین دوائی ہے۔  
 ہورابرارٹینس۔ ایک عجیب و غریب علامت کہ جتنی زیادہ تسکین ہو مریض ہنستا ہے اس  
 ہنسنے کو اعصابی درد کہا جاسکتا ہے۔

مکی کی فیوگا۔ شدید درد جو غروب ہونے پر بڑھ جائے لیکن جو فوجی سوزج اُبھرے دوبارہ  
 شروع ہو جائے۔ ایک خوراک ۲۰۰ طاقت میں دیجئے۔ مریض افسردہ لیکن باتونی ہوتا ہے شراب سے  
 زیادتی مرض ہو۔

## سُن ہو جانا۔

(دیکھئے اعصاب کا سن ہو جانا۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکالیف۔ حرکت کی نااہلی۔ آدھے دھڑ کا فالج فالج)  
 جیلیم۔ جھٹکے۔ تشنج۔ بجلی کی دردیں۔ سر درد۔ ڈکھن۔ لنگڑاپن۔ ایک کے دو دکھائی  
 دیں۔ آنکھ کے بالائی پھپر کا فالج اور فالج کی دوسری اقسام، ہاتھ پاؤں کا تھک جانا۔ گردن کا سخت  
 ہونا۔ ذہن سست اور پٹھوں کا نظام ڈھیلا۔ دماغ اور جسم کا جزوی ادھر گ یا فالج۔  
 اولینڈر۔ بغیر درد کے فالج۔

امبرگریسیا۔ تمام میں جس کی کمی۔ کمزور دوران خون۔ غیر متوازن۔

الیومنا۔ جب اعصاب کا پیغام بجا نوالے نظام میں اتنی کمزوری آجائے کہ ہاتھ پاؤں  
 جسم میں پہلی دفعہ سوئی چھوڑنے سے محسوس ہو۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد جیسے کہ سرخ لومہ ریڑھ  
 کے نچلے ہرہ میں داخل کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی طرح کی دردیں مکراد سپیٹ میں سے باہر کو جانیں۔ ٹانگوں  
 کا اتنا بھاری پن کہ انہیں مشکل سے ہلایا جاسکے۔ چل نہ سکے صرف دن کے وقت چل سکے اس وقت  
 بھی احتیاط سے قدم اٹھائے۔ متر کی جلد پر دباؤ جیسے کہ انڈے کی سفیدی منہ پر چٹک ہوئی ہوئی۔  
 ہو۔ شدید جنسی خواہشات۔ بلا ارادہ منی کا اخراج۔ قبض۔ ایڑیاں یا سن ہوں یا شدید جلن ہو کر  
 کریں۔ بچوں کا ٹانگوں کا فالج۔

پلمبسم۔ فالج یا نیم فالج۔ قبض۔ دماغی اتہری کے بعد فالج۔ کانپنا۔ ٹھوں میں دورے گولی لگنے۔ برہمی لگنے جیسے درو جلد کا انتہائی حس ہونا جھڑا بھی برداشت نہ کر سکے کیونکہ یہ اسے کلیف دیتا ہے۔ بازو کے ٹھوں کے فالج کی وجہ سے کھڑیاں نیچے گر پڑیں۔ یہ پاؤں کے فالج کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔

سلفر۔ جب اکونائٹ زیادہ مقدار میں کھانے سے فالج ہو جائے تو یہ کام آتی ہے۔ حیض کے دب جانے سے خاص بہیمان۔

آزینیکا انٹ۔ پیدائش کے وقت کا فالج۔ چھوٹے بچوں میں پیدائش کے وقت زخم ہونے کی وجہ سے جس کے نتیجے کے طور پر فالج ہو سکتا ہے۔ یہ دماغ یا ریڑھ کی ہڈی کے پیدائش میں استعمال ہونے والی جڑی کے زیادہ دبانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

رٹاکس۔ متاثرہ حصوں کا سن ہو جانا۔ جھجک جانے یا زیادہ کام کرنے کے بعد یا ٹھنڈی زمین پر لیٹنے سے۔ وضع حمل یا بچہ جنمنے کے بعد۔ جنسی بے اعتدالیوں۔ تب لرزہ یا تب محرقہ۔ بازو کے جزوی فالج یا ادھرنگ۔ آنکھوں کے چھپر کا فالج یا گر پڑنا۔ ٹھنڈا پن۔ سن ہونا۔ جھینسا ہٹ۔ اعصاب کے زخم کے دباؤ کی وجہ سے فالج۔ آزییکا کے ناکام ہو جانے کے بعد استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فاسفورس۔ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ بلن کے ہرہ چیونٹوں کے ریگنے کی غصوں علامات کے ہرہ۔ جنسی بزرگیتگی جو پہلے پہل ہو کر ٹول نہ کی جا سکے لیکن بعد میں نامردی میں مبتلا ہو جائے۔ دماغ میں چربی کی تنزیل جو کام کرنے کے۔ مطالعہ کرنے کے بعد یا توجہ مرکوز کرنے کی قوت کالی ایسڈ۔ آتش کی ہٹری والے متاثرہ اعصاب اور غددوں والے اشخاص میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ کا گوڑا اور اکثر جگر اور دوسرے غدد دیا غدد دی اعضاء۔ بجلی کی طرح کی تکلیف اکثر سر میں زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت ٹانگوں کے یہ دردیں گرمی اور متاثرہ جگہ سے بل لینے سے زیادہ ہوتے ہیں۔

پیکرک ایسڈ۔ جب دماغی اور جنسی بے اعتدالیوں یا خون کی کمی کے سبب ہو۔ جنسی خواہشات کا وقت گزر چکا ہو۔ شدید کمزوری لاحق ہو۔ درد کو دماغی کام ٹھما جائے۔ کمزور حکما ہوا۔

اور ٹانگوں میں بیماری پن کا احساس جس کی وجہ سے چلنا دو بھر ہو جائے۔ بے حسی نمایاں ہو۔  
 پکریٹ آف آرٹرن۔ پکرک ایسڈ کے متبادل دی جا سکتی ہے۔ جب بے حسی کے عہرہ  
 شدید قلتِ خون بھی ہو۔ او

اوپیم۔ گلے کا کام نہ کرنا یا اس کا فالج جس کے نتیجے کے طور پر شربات غلط راستے پر چلے  
 جائیں اور ناک سے باہر چلے آئیں۔

کیو رارے۔ عصب حرکت کا فالج۔ غیر شعوری عمل یا اضطرابی عمل کم ہو جائے یا ختم  
 ہو جائے۔ عام فالج۔ اعصابی کمزوری۔ سرگرائی۔ تنگی تنفس۔ چکر۔ پلکوں کا گرنا۔ پٹھوں کا فالج  
 یا اعصاب کو متاثر کئے بغیر۔

مائیپریکم۔ اعصابی مددے کا برا اثر۔ سر کی وجہ سے دور سے جبکہ زخم ہوں۔ یا تشنج۔ یہ  
 چشمی کے ذریعے پیدا شدہ بچے کے چہرہ کے فالج کو بخوبی درست کر دے گی جب تک کام ہو جائے  
 لا تھیرس سٹائیوٹا۔ بازوؤں اور ٹانگوں کا فالج خاص طور پر ٹانگوں کا فالج۔ تشنجی فالج  
 ٹانگیں کمزور۔ ٹانگیں نیلی۔ سوجی ہوئی جب نیچے کو لٹکی ہوئی ہوں۔ گھٹنوں اور ٹخنوں کا انگرہ این۔  
 نیچے فرش نہ چھوڑے یا نیچے فرش سے اوپر نہ اٹھیں اور ایڑیاں فرش یا زمین پر نہ لگیں۔ مریض  
 آگے کو جھک کر بیٹھتا ہے۔ مشکل سے سیدھا ہوتا ہے۔ عموماً کرے کہ ٹانگیں ذنی اور فرش ناہموار اس لئے  
 زمین کو دیکھنا پڑے تاکہ پاؤں کی اسٹائی کر سکے۔ چھوٹے پر اور عمدہ موسم میں زیادتی۔

بیسلیٹیم۔ درمیانی مغل انگیز دوائی ہے جب بہترین منتخب شدہ ادویات کا کام ہو جائے تو ۲۰۰  
 طاقت کی ایک خوراک خالی پیٹ دیجئے۔

کاسٹیکم۔ اکیلے حصوں کا فالج۔ آواز کے اعضاء حلقوم اور گلا۔ زبان۔ پلکوں۔ چہرہ۔ بازو۔  
 ٹانگوں اور شانہ۔ عام طور پر دائیں جانب ٹھنڈی ہوا لگنے سے۔ جھونکے سے۔ تپ محرقہ کے بعد۔  
 ٹائیفس یا خاق کے بعد۔ سیسے کے زہر کے بعد فالج ٹائپ۔ ترتیب دینے والوں کا ٹائپ کے لفظ  
 ہونٹوں میں پکڑنے کی وجہ سے زبان کا فالج۔ ایکٹ ایم طاقت میں دیجئے یا اس سے اوپر کا قوت  
 دیجئے جب کوئی افادہ نہ ہو یا افادہ ٹھہر جائے۔

آرٹھرمائٹسٹیکم۔ جیسلم وال علاوہ رکھتی ہے۔ یہ وہاں پتھیلی دوا کے طور پر دی جاتی ہے  
 جہاں جیسلم کام کرنے سے رک جاتی ہے۔ پاگلوں کا فانیج۔ بیوقوف۔ آسانی سے برا بھلا  
 ہونے والے۔ ایک لمحے خوش خرم دوسرے لمحے پاگل، بنیاد یا خفا یا فرط ہوئے۔ کمزور دماغ  
 ایک فقرہ بھی نہ لکھ سکیں۔ بچوں کی اینٹھن کی وجہ سے تیز جھنج۔ مرگی۔

ایکساویموسا۔ رحم کی خرابیوں کی وجہ سے ریڑھ کی تکالیف کی صورت میں اضطرابی۔  
 اعمال کے لئے خاص طور پر منوزوں ہے، جہاں کہیں کمر کا حصہ خاص طور پر متاثر ہو۔  
 اگر کیس مریں۔ ریڑھ کی ہڈی میں جھنجھناہٹ اور جلن جیسے کہ انتہائی سردی یا  
 برف کا ٹر رہی ہو۔ جسم کے مختلف حصوں میں پٹھوں کا تشنج یا اینٹھن خاص طور پر پٹھوں کا  
 احساس جیسے کہ برف کی سوئیاں جلد میں چھوئی جا رہی ہوں۔

زخم میٹ۔ ریڑھ کی ہڈی کا، سوجان۔ کمر میں ہر وقت درد جو چلنے سے اچھا ہو یا  
 جس میں چلنے سے آفاقہ ہو۔ ریڑھ کے ساتھ ساتھ جلن۔

فائیسوٹیکما۔ جب ریڑھ کی ہڈی کی ہر عصب پر سوجان ہو، جلندار ہو اور اینٹھن کا  
 احساس کرتا ہو۔ ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا۔ اینٹھن دار دروین۔ کمر کے پٹھے سخت۔ بائیں  
 طرف کا فانیج۔ ہاتھ پاؤں میں گولی لگنے جیسا درد۔

کوکولس اند۔ چھوٹی کمر میں فانیج دروین۔ پیٹ میں چپکیوں کا احساس۔ ایڑیوں کی سختی۔  
 تھوچا۔ چپکے ٹائیک لگنے سے بازوؤں کا فانیج اور دھن۔ ایک ایم طاقت کی دوائی  
 صبح و شام ایک خوراک دیجئے۔

سفلیسنیم۔ ڈکھڑائی چال کے لئے عمل انگریز کے طور پر جو عموماً آتش کی دجوات سے ہو۔  
 آرم میٹ۔ جزوی اور ہلکا فانیج جسم میں خود کشی کا رجحان ہو، اپنے سے، ہر کسی سے  
 سرچنے نفرت کرے۔ خواہشات اور نفسی حد درجہ کی یا انتہائی درجہ کی شدید۔

آرٹھرمائٹسٹیکم۔ ریڑھ کی ہڈی کا دق۔ جلندار اور گولی لگنے جیسا درد جسم کے ہر حصہ میں  
 گرم سرخ سوئیوں کے چھٹنے جیسی درد۔ گرم پیڑوں سے آفاقہ ہو۔ یا گرم چیزیں لگانے سے آفاقہ۔

کونیم۔ فالج پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کو جاتا ہے۔ جسے پھرنے پر ٹھنڈے محسوس  
بلغم کو باہر نہ نکال سکے اور نگل نہ سکے۔

کو کولس۔ ریڑھ کا نرم ہو جانا۔ چلنے میں دقت۔ ریڑھ کے کمر کے حصہ کی تکالیف چھٹی  
لمر کی کمزوری۔ جسکے فالج ہو گیا ہو۔ رانیں درد کریں۔ پاؤں کی تلیاں سوئی ہوئی محسوس ہوں۔  
ہاتھ اور بازو سو جائیں۔ بازوؤں کو سیدھا کرنا اور وہاں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرا ہونے تکلیف  
ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ پلوں کا فالج۔ گلے کا فالج۔ جسمیں نگلا نہ جاسکے۔ بیٹھنے پر تلیاں ہولیں۔  
ڈرو میرا۔ ریڑھ کا ناسور جس کے بعد انگلیوں اور گھٹنوں کا ٹی بی ہو جائے ہر پندرہ روز  
کے بعد ایک غوراک دیجئے۔

ایومنا میلکٹا۔ ٹانگوں کا بلا تکلیف فالج متاثرہ حصوں میں درد بھی۔ بازوؤں میں  
تند۔ تمام بازوؤں، ہاتھوں اور پاؤں میں جھنجھٹا ہٹ۔

زیمک فاس۔ حرکت نہ کر سکنے کے شروع شروع میں تیز بھالا لگنے جیسی درد۔ ہاتھ پاؤں  
کی شدید کمزوری۔ خاص طور پر ٹانگوں کی۔ ریڑھ کی بڑی گرمی کو حساس۔ نیند کے دوران میں  
بے ہوشی۔ ہاتھوں اور پاؤں کا ہلانا۔

رعشہ۔  
جلیسیم۔ اس دوائی کا پنا سب سے بڑھ کر علامت ہے۔ سر کے پھول کی کمزوری اور فالج  
خاص طور پر ہوتی ہے۔ لڑکھرائی چال۔ رعشہ کی چوٹی کی دوائی ہے یا دداشت کمزورہ دماغ غمت  
اور ٹھنڈوں کا نظام ڈھیلا۔

آرجنٹم نائٹرک۔ یہ دوائی جلیسیم کی تکمیلی دوائی ہے۔ یا دداشت کمزورہ جلد ہی  
سیخ پا ہو جائے اور ناراض ہو جائے۔ اچھا اور سبزا سہاں۔

اگر کیس مں۔ کانپنا۔ خارش اور ہلنا یا تھکے لگنا۔ ٹھنڈوں کی سختی۔ جلد کی متاثرہ جگہ  
خارش اور ریڑھ کی بڑی بہت ہی حساس۔ لمس کو برداشت نہ کر سکے یا چھو یا جانا برداشت نہ کر سکے۔  
ایسٹیم۔ زبان کا رعشہ اور دل کا رعشہ۔

کو کولس۔ کھاتے وقت یا اور پٹھلتے وقت سر کا پٹا ہے۔ گھٹنے کمزوری کی وجہ سے نیچے  
 ڈوب جائیں چلتے وقت لڑکھڑائے، ایک طرف کو گرنے کا رجحان۔ جب چلے تو گھٹنے آواز پیدا کریں۔  
 میگنیشیا فاس۔ کانپتے۔ ہاتھ کا ہٹنا۔ ایک ہزار کی طاقت ہر منہتہ ایک خوراک کافی ہے۔  
 لتھائرس۔ بازوؤں میں عرشہ کے ہمراہ ٹانگوں میں نالی کی کمزوری محسوس کرے کہ ہاتھ پاؤں  
 سخت اور سکتے ہوئے۔ ہاتھ پاؤں بھاری محسوس ہوں۔ محسوس کرے کہ فرش غیر ہموار ہے اور اسے  
 آنکھوں کو زمین پر رکھنا پڑے تاکہ پاؤں کی لڑبھائی نہ کیس۔  
 رٹاکس۔ جب عرشہ چلنے پر تکلیف سے شروع ہو جس کے چلنے پر آفاقہ ہو۔ متاثرہ  
 جگہوں پر سختی ہو۔

فائٹوسٹگما۔ ریشوں اور پٹھوں کا نمایاں عرشہ اور تشخ۔ حرکت سے زیادہ ہو یا ٹھنڈا پانی  
 لگانے سے زیادہ ہو۔ دل کی دھڑکن اور پھر مکمل تمام جسم میں محسوس ہو۔  
 امبرگریا۔ سن ہو جانے کے ساتھ عرشہ تھوڑی سی حرکت سے بھی ہاتھ پاؤں سو  
 جائیں۔ ہاتھ پاؤں کی ٹھنڈک۔ ٹھنڈک اور سختی۔ انگلیوں کے ناخن ٹوٹنے والے اور پٹھوں  
 ہیلوڈرما۔ ہاتھ پاؤں کے اعصاب کا کا پٹنا۔ تھکا ماندہ محسوس کرے، بہت کمزور اور  
 بے چین۔ غش کھائے، سُن ہونے کا احساس۔

زنکم۔ تمام جسم کا شدت سے کا پٹنا۔ (اینٹھن) ذہنی برائیچنگ کی کے ساتھ بچوں کی اینٹھن  
 عرشہ۔ ہاتھ کا فالج، پاؤں کا فالج۔ لکھتے وقت ہاتھوں کا کا پٹنا۔

لررزہ پٹھوں کی بڑھتی ہوئی کمزوری۔ ریشوں کی سختی (دیکھیے فالج)

میںڈورنیم۔ عام طور پر سوزاک سے یا سوزاک کے دہنے سے، ایک ایام طاقت میں دیجے۔  
 پیلیم۔ ریشوں کی سختی کے لئے بہترین دوائی ہے۔ پٹھوں کی ملی ملی سختی۔ ایک طاقت ہر سفر  
 ایک خوراک دیجے۔

ٹینٹولاہسیا۔ پٹھوں کی ملی ملی سختی کانپنے کے ہمراہ۔ اینٹھن اور بھگے۔ ٹانگوں کا سس ہونا۔

اگر انک الیڈ - داغ اور ریڈھ کی ہڈی کی ملی جلی سختی - بھلا گئے جیسی گولی لگے جیسی اور  
جھکوں والی - تکالیف مختلف حصوں میں - سوزش ریڈھ - پھوں کی کمزوری -

ذو وحی - ذکی الحسی - دیکھئے انھن - تشنج -

کمزاز - بدن کا اگر کمر کمان کی طرح ہو جانا -

ہائپرورسائینک الیڈ - پھوں کی مستقل اکرن - خاص طور پر چہرے کے پٹھے جبڑے  
اور پیٹھ کے پٹھے - نظام تنفس درہم برہم - منہ پر نیلے داغ اور منہ سے بھاگ نکلنے کے ساتھ بازوؤں  
کی سختی اور پیچھے کی طرف جھکا ہوا -

لیکسس - تشنج کی وجہ سے منہ بند ہو جانا - (دند سکڑی) اور منہ کا تشنج - ٹنگی تنفس -  
کی وجہ سے نیلا پن اور مرضی دورے میں ہی سو جائے -

دریٹرم ایلم - تشنج کی وجہ سے منہ بند ہو جانا - سانس کی نالی کے منہ کے تشنج کے ہمراہ -  
چھاتی میں دباؤ ہو تقریباً تقریباً سانس بند کرنے کے قریب ہو یا گھٹن محسوس کرے - ہاتھ اور  
پاؤں اندر کی طرف کھینچ جائیں اور تپیلیاں سکڑ جائیں - یہاں تشنج کم ہوتے ہیں - شدید کمزور  
کرنے کی نسبت جب کہ سر گھٹا میں تشنج اول ہو -

میلاڈونا - چھوٹے پھوں میں کمزاز - انھن - اچانک در جانا یا چونکنا پتیلیاں پھیلی  
ہوئیں - گھورنے والی آنکھیں - شدید تشنج لگے پھوں کی سختی - تشنج میں کچھ کچھ کھینچ جائیں -  
سٹرامونیم - کمزازی تشنج چھوٹے سے اور ردنی سے تکلیف بڑھے - داغ جنوں کی وجہ سے  
درہم برہم ہو -

کیمفر - یہ کمزازی تشنج میں مفید ہے جبکہ منہ کے پٹھے کھینچ جانے سے دانت نظر  
آئیں - شدید ٹھنڈک -

کیورپرم میٹ - تشنجی دورے میں ہوشی کے ہمراہ جو کہ چوٹ یا تیزاب کے زخموں کی وجہ سے  
بازوؤں میں جھٹکے سے ہوں - چہرہ زرد - جبڑے سکڑے ہوئے - منہ میں بھاگ - تشنج کی وجہ  
سے پیچھے کی طرف جھکا جائیں -

مسٹر کلنیم۔ تشنج جس میں چھاتی میں گھٹن اور دباؤ جب نکس وایکا ناکام ہو جائے تو یہ دوائی کی استعمال کرائی جائے۔

انگچور ادیرا۔ کنراز جو چٹ یا اسی طرح کی دھوئیں سے ہو۔ جب دوسے وار تشنج یا پٹھوں کے جھٹکوں۔ سکتے جسم کے پیچھے کی طرف جھٹکے ہونے کے ساتھ تشنج یا انٹھن۔ جھٹکے کر کے ساتھ ساتھ بھی کے جھٹکوں کی طرح۔

فائیسوٹگما۔ کنراز تشنج۔ چلنے میں دقت یا فقدان حرکت۔ فالج زدہ حصوں کا سن ہو جانا۔ انٹھن دار درد بازوؤں میں۔ ریشوں کا عرشہ یا لرزہ۔

پیسٹی فلوراٹمک۔ کنراز کیلئے خاص دوائی ہے۔ اس کی مدد کر کے دس قطرے فی نوک دینے چاہئیں۔ گردن اور کندھوں کے ٹھنوں کی انتہائی سختی نکلنے میں تکلیف کے ہمارے نمایاں علامت غیر ارادی طور پر مسکرانا اور جھنجھنا۔

سکوتا وائروسا۔ اچانک سخت جھٹکوں کے ہمارے شدید توڑ مروڑ اس کے بعد شدید کمزوری، ٹھنوں کی اکڑن جو چھوٹنے سے دوبارہ جاری ہو جائے۔ سانس لینے کے لئے شدید دباؤ منہ کا بند ہو جانا۔ چہرہ گہرا سرخ منہ پر جھاگ۔ تشنج جھین پیچھے کی طرف مڑ کر جھٹکے۔ بہوشی۔ پیپ نکلنے والے زخموں میں یا جب بہتی ہوئی پیپ رک جائے۔

آرسنیک الیم۔ کنراز۔ لٹک کر خودکشی کرنے کے ہمارے خطرناک تشنج ہاتھ پاؤں میں توڑ مروڑ کے ہمارے نمایاں بخار۔ زہریلے مادوں کی وجہ سے۔

ایکونائٹ این۔ ڈر۔ پریشانی۔ ٹھنوں پر دباؤ۔ جھینٹھا ہٹ اور سن ہو جانا۔ ہائپریم۔ زخموں میں شدید دردیں۔ یہ نوزائیدہ بچوں میں حفظہ اتھم کے طور پر دی جاتی ہے جن کی ناک غیر تندرست ہو۔

سیلشیا۔ پیپ لایز زخموں میں یا جب پیپ کا اخراج بند ہو چکا ہو۔ نکسو امیکا۔ کنراز وار تشنج جس میں مریض پیچھے کی طرف مڑ کر جھٹکے۔ آنکھوں کی بد وضعی۔ چہرہ کی بد وضعی۔ تنگی تنفس کے ہمارے تھوڑے سے چھوٹے سے روشنی سے، شور سے دور شدہ جہاں اس کے متعلق خاص طور پر سوچنا چاہیے جب ہوش، حواس قائم ہوں۔ (دیکھئے عرشہ کا مینا)

## دماغی رسولیاں۔

ٹیوبو برکولینیم۔ علاج شروع کرتے وقت ۲۰ طاقت کی ایک خوراک دینا چاہئے۔ یہ مرض کو تباہ کرنے لگی اور سرد درد دماغی رسولی میں جو کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ٹھیک کر دے گی۔

کلکیئر یا کارب۔ سر گھمانے پر سرد درد اور جکڑ۔ بھاری پن اور درد والا دباؤ جو کہ ناک تک چلا جائے۔ پریشانی جیسے کہ سر بہت بھرا ہوا ہے۔ کھوپڑی میں سوئیاں چھبھنے جیسی درد۔ ٹھنڈے اور سرد موسم میں زیادتی۔ سر میں اور سر کے اوپر شدید ٹھنڈک۔

کلکیئر یا فلورس { جب کلکیئر یا کارب ناکام ہو جائے  
کلکیئر یا فاس { تریہ دوائی دی جانی چاہئے۔

مرک آئیوڈائیڈ۔ سر کے یا کھوپڑی میں یہ دماغ کی ہڈیوں کی رسولی کو تحلیل کرتی ہے اور تندرست کرتی ہے۔

کالی آئیوڈائیڈ۔ سر کے طرفین میں بجلی کی طرح کی دردیں۔ آنکھوں اور ناک پر سر ملنے کی گری سے زیادتی۔ آنکشی تاریخ۔

ماپیریکم۔ آہستہ آہستہ بڑھنے والی رسولیاں جو چوٹ بڑھنے میں سے تیز ہو جائیں۔ تھو جا۔ دماغ کی رسولیاں، شدید سرد درد اور آدھے سر کے درد کے ہمراہ۔ مریض جذباتی ہوتا ہے، حساس۔ چڑچڑا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے میں لطف اندوز ہو۔ کھٹی اور نمکین اشیاء پسند کرے۔ ہیٹ میں گیس گھونسنے کے ہمراہ قبض۔ ماتھے اور بازوؤں پر پسینہ۔

مرگی۔ بیہوشی۔ (ہیٹریڈکٹے)

لیکسس۔ دماغ میں خون چھپنے کی وجہ سے بے چین اور پریشان۔  
ایلی بوکس۔ مکمل بیہوشی۔ ہونٹوں اور کپڑوں کو کاٹتا ہے۔ ہلکی باندھ کر دیکھتا ہے۔  
بلا ارادہ آہیں بھرے۔

اوہم - مکمل بے ہوشی - قبض - خراٹے دار تنفس -  
 ہائیڈرو سائیک لیڈ - ہر چیز کے ڈر کے ساتھ بیہوشی -  
 فاسفورس - جب نڈیان کے ساتھ اول بدل کر -  
 آرنیکا مانٹ - بیہوش مگر سوالات کا صحیح جواب دے - جب اس سے بولا جائے زخم  
 ہونے کے بعد بے ہوشی -  
 سکوبا اوٹرسا - تشیج کے دوران بیہوشی -  
 سننا - کھانسی کے دورے سے پہلے بیہوشی -  
 گلوناٹن - سن ٹروک ، سورج کی گرمی لگنے سے سردی کے دوران بیہوشی -  
 نکس ماسکٹا - بیہوشی بائیں ٹانگ نہ ہلا سکنے کے ساتھ -  
 ایتھوزا -

کینا بس انڈیکا - ہر چند نشوں کے بعد اپنے آپ کو گم پانا یا ہوش دھواں کھودنا -  
 بیلا ڈونا - بیہوشی کے براہ تشیج جیسے مرض پیچھے کی طرف مڑ چکے -  
 ہائیو سائیکس - بیہوشی - نڈیان سے جاگ جلتے جب اس سے بولا جائے -  
 کاسٹیکم - بیہوشی کا حملہ نیٹھے ہونے کے دوران میں اقلیت خون کیوجہ سے

## خون کی نالیوں کا پھیلاؤ

فیرم - دل کی نسلوں کا تیز اور اچھلندہ چہرہ میں زیادہ خون کے براہ نبض تیز اور کمزور لگن پانا  
 قلت خون تنگی تنفس اور سانس پھوٹنا ہونا - چہرہ پر سرخی - سرخ چمکدار -  
 گلوناٹن - چھاتی میں دل کی دھڑکن ہی نمایاں نہیں بلکہ جسم کے ہر حصہ میں دھڑکن کا ہر اک  
 چہرہ سرخ ، لیکن اتنا چمکدار نہیں جتنا کہ فیرم ناس میں ہوتا ہے -  
 بیلا ڈونا - نظام دوران خون پر تیزی سے اور انتہائی شدت سے عمل کرتی ہے - چہرہ  
 سرخ - ٹیکن دار خون کی نالیاں - ایک حالت سے دوسری میں جلدی جلدی تبدیلی -

خون حیض بہت زیادہ بہت جلدی اور بہت گندی ہو والا۔

**چکر**

چینیٹم سلف - کان کی نس کی خرابی کی وجہ سے ماتھے میں درد اور چکر کانوں کا بھنا اور

گرج بہرہ پن کے ہمراہ -

کو کولس - چکروں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے - بیٹھے اور سواری کرنے سے زیادہ چکر -

تے بھی ہو سکتی ہے -

چینیٹو یوٹیم - سمعی نالی کے سن ہو جانے کی وجہ سے اچانک چکر نیم بہرہ پن جو کہ اونچی آواز میں بہتر ہونے کی بجائے آواز کے لیکن انسانی آواز کے لئے زیادہ - کانوں میں گھنٹیاں نہیں گریٹاٹس - صبح کے چلنے پر چکر - شام کو چلنے پر چکر - اوپر کی طرف دیکھنے پر اٹھنے پر ٹیڑھا کھڑے ہونے پر - لازمی لیٹنا پڑے - آگے کی طرف بھٹکنے کا رجحان -

نیرٹم سلف - چکروں کے ہمراہ کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں -

میگنیشیا کارب - جب نیرٹم سلف ناکام ہو جائے - یہ دوائی دی جانی چاہئے -

بیلادونا - پرخون مریض میں کیروڈ شریانوں میں تپکن کے ساتھ - بستر میں مرنے یا سر ہلانے

سے اس کو سر کو اوپر اٹھا سکے - چیزیں گومتی معلوم ہوں - بستر میں پڑا ہے -

گلونائٹن - کھوڑی میں درد کے ساتھ چکر - سر کو ہلانے کے ساتھ چکر - خمار کا احساس

جب ٹیڑھا کھڑا ہو -

جیلسمیم - آنکھوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے چکر - ایک کے دو دکھائی دیں -

خمار کا احساس جب ٹیڑھا ہو - لڑکھٹانے کا رجحان -

نیکسو امیکا - گیس کی وجہ سے چکر - ایک جو کھانا کھانے کے بعد آٹس یا صبح کے وقت چکرات

کی عیاشی کی وجہ سے -

فیرم فاس - قلیت خون کی وجہ سے چکر - سر کو ہلانے کی وجہ سے چکر - خمار کا احساس جب

خون بننے کی وجہ سے چکر - چہرہ زرد - پٹھے ڈھیٹے ڈھالے - حملہ کے دوران سرخ چمکدار خون دل

کی دھڑکن تیز -

تھو جا۔ جب آنکھیں بند کی جائیں۔

لیکس۔ جب بائیں طرف گرنے کا رجحان ہو چکے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے پر چکر۔  
دوبنے کا احساس۔

سکولونڈرا۔ جب اندھے پن کے ہمراہ چکر ہوں۔

تھیرڈیون۔ آنکھیں بند کرنے پر حرکت سے بیڑھا کھڑے ہونے پر۔ جہاز پر سوار کرنے  
سے۔ چکر جو حسی کا باعث بنیں۔ اور اندھا پن کے قے اور آنکھوں میں درد۔

سیلینیم۔ بستر یا نشت پر سے اٹھنے پر۔ ادھر ادھر چلنے پر حسی کے ہمراہ قے اور بہوشی  
کھانا کھانے کے بعد۔

نایٹرک الیڈ۔ صبح سویرے اٹھنے پر لازمی لینا پڑے۔

لیک ویک ڈیف۔ جب سوئی میں دھاگہ ڈالنے کے لئے اپنے ہاتھ اپنے اٹھائے  
جب بستر میں مڑے یا سر ہانے پر سے سر ہلائے۔

کونیم۔ شراب کے پینے سے چکر سے کہ ایک دائرہ میں گھوم رہا ہو اگرچہ خود کھڑا ہو بیٹھا ہو  
یا بستر میں ہو۔ بستر یا کرسی چکر کھاتی ہوئی محسوس دے۔ چکر زیادہ سراطرف کو گھمانے سے بستر میں  
موڑنے پر چکر سراطرف میں ایک دائرے میں محسوس ہو کہ گھوم رہا ہے۔

کیڈیم سلف۔ جب کمرہ میں ہو بستر ادھر دگھوے۔

امبراکریسیا۔ چند یا پر وزن کے احساس کے ہمراہ۔ سونے پر زیادہ خاص طور پر صبح کے  
وقت کھانا کھانے پر زیادہ۔ لیٹ جانا پڑے چکروں کی وجہ اور معدہ میں کمزوری کے احساس کی وجہ  
سے عمر کی زیادتی کی وجہ سے چکر۔

سکواواٹروسا۔ چکر اٹھنے پر چیزیں آنکھوں کے سامنے گھومیں تب آنکھوں کے سامنے  
اندھیرا آجائے۔ تب اسے دوبارہ لیٹ جانا پڑے۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں۔ رخسار زرد۔  
قوتِ ماعت کمزور۔ تنفس تکلیف سے۔ بھوک کی کمی اور بستر گیل کر دے یا بستر پر پشیماب کرے۔  
کیڈیم۔ آنکھیں بند کرنے پر چکر۔ آنکھیں بند کر کے کھڑا یا چل نہ سکے۔

لیک کینیم چکر جن کے ساتھ ہوا میں اڑنے کا احساس ہوا جب لمبی ہوئی ہو محسوس کرے  
 کردہ بستر پر نہیں ہے۔

لارو میر وکسس - کھلی ہوا میں چکر۔ اسے لازمی لیٹ جانا پڑے۔

ایومنا - پاؤں کی تلیوں کے سن ہونے کے ساتھ چکر۔ لڑکھڑائی جال۔ دوسرا غصاء  
 یعنی بازوؤں سے بے ربطی۔

مارفنیم - سر کی پھول سی حرکت سے بھی چکر۔

اسارم یورپ - چکر جسے کو شراب بنی رکھیں ہو۔ ہوا میں متعلق محسوس ہونا۔

مرکویلیس پریس - سیڑھیاں اترنے سے چکر۔

کلیریا سلف - ہمت ٹھنہ پر یا شام کے وقت چکر کھلی ہوا میں آفاقہ مثل کے ہمراہ چکر۔

اگرکیس ایم - چکر کے وقت چکر دن میں تھوڑے تھوڑے وقفوں سے چکر۔ زیادہ دھوپ سے

چکروں میں تیزی۔ چکر کا حملہ۔ لڑکھڑائی جال کے ساتھ کھلی ہوا میں۔

فاسفورس - اوپر کی طرف یا نیچے دیکھنے پر چکر کھلی ہوا میں، کھانا کھانے کے بعد شام کے وقت۔

مینوٹھس - خطرناک چکر دائیں طرف مڑنے پر، بائیں طرف لینے سے چکر۔ ہوں۔

ٹیلیائی - سر چکرائے، متواتر مثل اور قے کے ہمراہ۔ چکروں کے ہمراہ ٹانگیں ڈالوں ڈول۔

ایلیٹھس - سر چکرائے مثل کے ہمراہ۔ ایکالی یا تے کی کوشش اور کچھ قے۔ لڑکھڑائی جال بجلی

کی ہر کی طرح سے شردح ہو کر ساتھ پاؤں تک آئے۔

ارجنیم نائریٹیکم - گلی میں اپنے مکانات دیکھ کر سر چکرائے۔ یہ اسے لڑکھڑا دے وہ اوپر

نیچے نہ دیکھ سکے۔ آنکھیں بند کرنے پر چکر۔

کلیریا کارب - اونچی جگہ پر چڑھے تو چکر۔ بیڑھیوں پر چڑھنے سے۔ پہاڑی پر چڑھنے سے،

اینانک سرائٹھانے سے یا گھمانے سے جبکہ آرام کر رہا ہو۔ یا چل رہا ہو پھلجی طرف یا اطراف کی طرف گھبراہٹ

میوٹریک ایسٹ - کھلی ہوا میں گھومتے اور ڈالوں ڈول جال جب چلے تو لڑکھڑائے۔

رانوں کی کمزوری کی وجہ سے۔

سٹیفنگس گیر۔ چکر جب بیٹھا ہوا ہو۔ گول دائرہ میں چلنے سے آفاقہ۔  
 ایکونائٹ این۔ ڈر کی دہر سے چکر۔ اچانک ڈر سے۔ ڈر کا خوف رہے کہ کتا اس کا  
 پیچھا کر رہا ہے یا چور پیچھا کر رہا ہے یا دائیں طرف لڑکھڑانا۔ متلی کے ہمراہ چکر خاص طور پر جب  
 اٹھے۔ سر بلانے پر زیادتی جس وقت آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔  
 آئیوڈم۔ چکر صرف بائیں طرف جو تک لگا کر یا ٹھک کر کھڑے ہونے سے زیادہ ہوں۔  
 پلیسٹیل۔ چکر جن کو چلنے سے آفاقہ ہو۔ چکر جیسے کرنٹ سے ہوں۔ خاص طور پر میٹھے ہونے  
 کی صورت میں۔ سر بھاری۔

رہوڈ ڈینڈرون۔ بستر میں چکر جب ادھر ادھر چل رہا ہو تو آفاقہ ہو۔  
 سیلسک الیڈ۔ بائیں جانب گرنے کا رجحان کے ساتھ چکر اور ارد گرد کی چیزیں دائیں  
 طرف گرتی معلوم دیں۔ کان کی نس کیوجہ سے چکر۔  
 ایومنا سلیکیٹ۔ چکر صبح و شام، میٹھے ہونے کی صورت میں۔ چلتے وقت۔ اچانک مرکز  
 موڑنے پر۔ آنکھیں بند کرنے پر۔ جن کو لینے سے آفاقہ ہو۔  
 برومیم۔ چکر پیچھے کی طرف گرنے کے رجحان کے ساتھ۔ پل عبور کرتے وقت اور چلتے  
 ہوئے پانی کو دیکھ کر یا اپنے سامنے تیز حرکت ہونے پر چکر۔  
 بریٹاکارب۔ ہر چیز اس کے ساتھ بلے جیسے کہ جہاز میں۔



تیسرا باب

آنکھیں  
اور  
نظر

## آنکھیں اور نظر، پھوڑا

آنکھ کے پردے کا پھوڑا۔

گلکیر یا میور۔ آنکھ کے پردے کا پھوڑا۔ (دُھند۔ نظر کی کمی۔ دیکھئے نظر)۔

## تسکلیف دہ بینائی۔

{ سنا آرٹھینا بول } آنکھ کا دور و نزدیک دیکھنے کیلئے غیر معزوں ہونا یا سیٹ نہ ہو سکتا۔ مطالعہ کرنے پر آنکھوں میں درد ہو۔ الفاظ دُھند لے معلوم ہوں۔ نظر کی جگہ بادل سا چھایا رہنا۔ ملنے پر تسکین ہو۔ (عصب بینائی، آنکھ کا پردہ شبکی بھی دیکھئے ناکارہ ہونا)۔

نکسوامیکا۔ آنکھ استعمال کرتے وقت یا دیکھتے وقت پردہ شبکی کا کُترنا۔ شدید تسکلیف کے ساتھ۔ روشنی کا برداشت نہ کر سکتا۔ صبح کے وقت زیادہ تسکلیف۔

فاسفورس۔ عصب بینائی کا موتیا بند کے ساتھ ناکارہ ہونا۔ آرسینک الیم۔ عصب بینائی کا تباہ کنوشی اور تباہ کو جانے کی وجہ سے ناکارہ ہو جانا۔

## پلکوں کی سوزش و سوزش

پٹرولیم۔ پلکوں کی سوزش۔ پلکوں کے کناروں کی سوزش۔ پلکوں کا گر جانا۔ کرسٹوفاریم ایسٹ۔ پلکوں کی سوزش۔ پردہ قرنیہ کا درم۔ روشنی سے خوفزدہ، اندرونی x ۳۰ طاقت استعمال کیجئے۔ بیرونی طور پر ہم گرین ایک اونس دیزلین میں ملا کر ہم بنا کر لگائیں۔ مارسلینیم۔ چمپک کے بعد چمپک کے بُرے اثرات کی وجہ سے پلکوں کی سوزش ہو۔

گر لفاٹس - پکوں پر ٹھنسیاں جو سرخ ہوں - ان کے کنارے پتھروں اور پھکوں سے ڈھانپا ہوا ہو۔ پکیں موٹی، پکیں سرخ اور سوچی ہوئی پکوں میں چرنے یا چھدنے اور خون ہنسنے کا رجحان۔  
مرک کار - خاص طور پر جب آتش کی وجہ سے پکیں موٹی، سرخ، سوچی ہوئی اور پھینک دالی گری، سردی اور چھونے سے زبردست کھلی ہو یا ٹھنڈی پٹیوں سے زیادتی - آنکھ کے ڈیوں میں درد اور خارش۔

ہیپر سلفر - حاد کیسوں میں سہلی حالت گزر جانے کے بعد جب پیپ بننا شروع ہونے والی ہو یا شروع ہو چکی ہو۔ پکیں سوچ جاتی ہیں۔ لیکن دار درد کے ساتھ چھونے پر زبردست ہوں، گرمی سے زیادتی اور سردی سے اناقت ہو۔

ایو مفا - مزمن دانے دار پکیں - یعنی بھتیاں موٹی - آنکھوں کے پھر کا نیچے گرنا۔ حصے مکمل طور پر بالوں سے ننگے ہو جائیں۔

پلسٹیل - آنکھوں کی سوزش، امیرانہ زندگی اور چھیلی خوراک سے پہرہ پر دانے گونا گونا نکلنے کا رجحان۔ آنکھوں سے بے ضرر اور بہت زیادہ رطوبت کا اخراج۔

کلکیر یا کارب - غیر صحت مند پتھروں کی آنکھوں کی سوزش، ترن کی طرح کے پیٹ والے پتھے۔  
خازیر میں مبتلا رہنے والے پتھے جن کے سر پر بہت زیادہ پسینہ آئے پکیں سرخ اور سوچی ہوئیں۔  
کلکیر یا آئیوڈ - پکوں کی سوزش، خاص طور پر ٹانگوں کے بڑھنے کے ہمراہ۔  
رسٹاکس - پکوں کی سوزش جس کے ہمراہ بہت زیادہ گید ہو۔

میزیریم - پکوں کا اور سر کا اگر کیا جیس بہت زیادہ موٹے پھلکے اور سخت ہو۔  
کونیم - پکیں سخت، موٹی اور وزنی، پکوں کا، ناک کا اور رخاؤں کا کینسر۔  
نظر بھی دیکھئے اور اندھا پن۔

بیلی بلورس - جب وجہ نامعلوم ہو۔

سلیشیا - جب اچانک چھوڑے ظاہر ہوں۔

فیرم میٹ - بستر یا میں۔

فانسورس - بجبلی کی ضرب کے بعد -

جلیسیم - آنکھ کے بالائی چھپر کا فالج یا پٹلیاں پھیلی ہوئی، ہٹیر یا سے یا نم سے۔ آنکھ سے خون  
سنسنے کی وجہ سے اندھاپن -

بودکشا - عصب بینائی کے فالج کی وجہ سے اندھاپن -

کالی میور - جب برف کی وجہ سے اندھاپن ہو - ہر طرف دھواں اور دھند کھل دے -

گلونائین - سر کے، دماغ کی جھلیوں کے درم کے دوران یا بعد میں اندھاپن -

مصلفر - یہ دوائی ۷۲۰ کی طاقت میں بطور عمل انگیز دی جاتی ہے

لایکوپوڈیم - رات کے اندھارتے کے لیے چوٹی کی دوائی ہے - سب سے پہلے یہ دی جانی چاہیے -

اچانک اندھاپن کاٹنے والے درد کے ساتھ -

چائٹ آف - اگر لایکوپوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے محسوس کرے کہ آنکھوں میں ریت ہے -

پیرا سیلینیم - آنکھوں کی سوزش کے ہمراہ اندھاپن -

فائیو ٹنگما - رات کا اندھاپن یا سبوتیا یا دور کی نظر کمزور کے ہمراہ یا اسکے بغیر -

زنکس بیکس - حاملہ عورتوں میں رات اور دن کا اندھاپن -

ہائیو مائیکس - رات کا اندھاپن، تھمر تھراپٹ اور جھبکوں کے ہمراہ -

گلونائین - دماغ کی جھلیوں میں درم -

کالی بائیکرومیکم - سر درد سے پہلے اندھاپن - نظر ابھی ہو جاتی ہے جو نہی دروازہ ہوتی ہے -

مانسی نیلا - شدید سوزش کی وجہ سے اندھاپن -

آنکھوں کا چھپکنا -

لایکوپوڈیم - احصاب کی کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کا چھپکنا - مریض زرد رنخ ہوتا ہے

اندھے سے دلتا ہے - ایکے چھٹے جانے سے چہرے کے پٹھوں کے تشنج یا انٹھن سے -

بیلاڈونا - پُرغون مریضوں میں آنکھوں کا چھپکنا -

یوفریزیا۔ آنکھوں کا گھٹا نہ جھپکنا۔

کالی بائیکروٹیکم۔ مرگی کے مریضوں میں لگاتار آنکھوں کا جھپکنا۔

کردکس { پڑھنے کے دوران میں یا

گلکیریا کارب { بعد میں ہلکوں کا جھپکنا۔

چمک۔

بودشا۔ آنکھیں بغیر چمک کے۔

یوفریزیا۔ آنسوؤں اور گید کے ساتھ جلن اور کاٹنا اس لئے آنکھیں چپکے۔

ایلم بیسا۔ جلن جیسے کہ دھوئیں سے ہو۔ آنکھوں کو ملنا چاہے، آنکھوں سے پانی کی طرح بہنا۔

روٹا۔ محسوس کرے جیسے کہ آنکھوں میں رات کے وقت آگ کے گرنے ہیں۔

کرلوزوٹ۔ گید کے ساتھ جلن جس میں زیادتی چمکدار روشنی سے ہو۔

آئرس ٹیلنیکس۔ بغیر آنسوؤں کے جلن آنکھوں میں۔

کاسٹیکم۔ آنکھوں میں جلن جیسے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چمکتا ہوا کوئلہ رکھا ہوا ہے۔

اگرکیس ایم۔ آنکھوں میں جلن جو آنکھوں کے پوٹوں کو آپس میں جوڑ دے۔

موتیا بند۔

کاسٹیکم۔ دور کی نظر کے شدید کمزور ہونے کے ابتدائی مرحلے میں (ایک ایم طاقت کی

خوراک دیجئے) شبکہ کا پردہ بھیج نہ آنا۔ اور قریب کی چیزوں کا صحیح نظر نہ آنا۔ سر کے درجہ ہونے

بٹھوں کی کمزوری۔

گلکیریا فلور اور سلفر۔ بعد کے مراحل میں سلفر ۲۰۰ طاقت پندرہ دن کے بعد ایک خوراک

دی جائے اور اس سے ایک دن پہلے اور بعد میں کوئی دوائی زد دی جائے۔ باقی ماندہ دن گلکیریا فلور

۳۰ دن میں تین دفعہ پانچ گھنٹے کے وقفے سے دیں۔

فامفورس۔ موتیا بند کے لیے ایک اچھی دوائی ہے۔ آنکھوں کے سائے سیاہ تر تے ہوئے ہوتے۔

نظر کے آگے رنگ۔ آگ کی گرمی سے آنکھیں سوزش زدہ معلوم ہوں۔ آنکھوں کے آگے دھندراہ

ایک ایم کی خوراک مرث ایک بار دیجئے۔

سلفر۔ موتیا بند پٹ میں ڈوبنے کے احساس کے ہمراہ۔ گرمی بہرہ تک چڑھے۔ ہٹانے کو جاتے ہوئے غشی کا احساس ہو۔ کلکیر یا فلور کے ساتھ ہر نپیرہ دن کے بعد بطور عمل انگیز دوائی دیکھائی، سلفر آئیوڈم موتیا بند۔ سخت زبان کے ہمراہ جو کارڈ بورڈ کی طرح سخت ہو۔  
 آئیوڈیم }

آرم میٹ۔ اوپر نیچے کی طرف دبانے والی درد یا باہر کی طرف سے اندر کی طرف یا آنکھوں کی ہڈیوں کے ارد گرد تکلیف چھوڑنے پر زیادتی اور روشنی سے حساس۔

کالی آئیوڈ۔ آنکھ کے سیاہ پردہ کی آنکھ کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف کی ماہ بہترین دوائی ہے۔ خاص طور پر جہاں دھند یا آنکھ کے سفید گارھے مادہ جو حد کے پیچھے آنکھ کے غلاف کو پھرنے ہوتا ہے کا دھندلا پن۔

مرک کار۔ آنکھ اور آنکھ کے ارد گرد درد شدید۔ آنکھ کے سیاہ پردے کا دم جبکہ پردہ عینہ یا انگری پردہ بھی ملوث ہو۔

فاسفورس۔ جب چند حیوان یا درختی سے خون کے ہمراہ چیزوں کی مختلف شکلیں اور رنگ جن میں سرخ نمایاں رنگ دکھائی دے۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے آئیں۔

پروٹس سپن۔ شدید درد جیسے کہ آنکھوں کے ڈیٹے کڑے کڑے کر کے دبانے جارہے ہیں۔ تیز گولہ لگنے جیسی۔ کھلنے والی، کاٹنے والی درد، آنکھ میں سے اسی طرف کو مرک جائے۔

ایپر سلفر۔ جب آنکھ کے سیاہ پردے میں پیپ بننا شروع ہو چکی ہو۔ آنکھیں چھوڑنے سے زور دینا ہو۔ دردیں شدید اور یکپن دار جن کو گرم پٹیوں سے افاقہ ہو۔

فائیو لاکا۔ بلیکس بہت سخت سرخ سوچی ہوئی اور آنکھ کے اندر پیپ۔

ڈبوسیا۔ آپٹک ڈسک اور پردہ شبکی کی گریں بڑھی ہوئی اور تکلیف دینے والی۔ آپٹک ڈسک

میں اجستار خون

ٹیوٹر کو لینم۔ جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ بطور عمل انگیز کام

کرتی ہے۔ صرف ۲۰۰ کی یا اس سے اونچی ایک خوراک دیجئے۔

## پلکوں کی بیماریاں

جبرامٹی - پلکوں کو جم آہنگ کرتے ہوئے تشخ کے دورے یا پلکوں کے پٹھوں کا ہیمان -  
 کچھنا صلا پرستہ متعیشیوں کے بغیر ہر چیز دھندلی محسوس ہو اگرچہ قریبی چیزیں صاف طور پر نظر آئیں  
 نظر بدلتا رہتا رہتا ہے - آنکھیں استعمال کرنے پر تلی اور جکڑ -  
 فائیسوگما - آنکھوں کے ارد گرد اور پلکوں میں اینٹھن - پلکوں کے پٹھوں کا تشنجی عمل -  
 اگر گیس ایم - اگر پلکوں کا تشنج اور عام روش کے برابر پلکوں کی اینٹھن ہو -

## رنگ دار دیکھنا - فریب نظر -

فاسفورس - رنگوں کے اندھے پن کے لئے ایک بہترین اور عام دوائی ہے -  
 سٹرامونیم - اشیاء اس طرح نظر آئیں کہ انہیں خون کی آلائش ہو یا خون کا رنگ نظر آئے -  
 آرسنک البم - اشیاء سبز نظر آئیں -  
 کیسکیم - اشیاء سیاہ نظر آئیں -  
 اکیٹا سیٹا - اشیاء نیلی نظر آئیں -  
 کیمنفورا - اشیاء چمک دک والی نظر آئیں -  
 انیسولیم - نظر رنگدار شدید چمک دک  
 سٹرامونیم - سرخ کی بجائے چیزیں سیاہ نظر آئیں اور سیاہ چیزیں بھوری نظر آئیں -  
 سنا - اشیاء زرد نظر آئیں -

اگر گیس ایم - آنکھوں کے سامنے رنگوں اور شکل و صورت کا دھوکہ -  
 ڈیجٹلیس - زرد اشیاء سفید نظر آئیں -  
 کاربونیم سلف - سرخ اور سبز اشیاء سفید نظر آئیں -  
 ہائیوسائیمس - اشیاء سنہری نظر آئیں -

بیللا ڈونا۔ سُرخ اشیاء زرد نظر آئیں۔  
 کوئیم۔ اشیاء سُرخ نظر آئیں۔ توی و قرح کے رنگوں جیسی۔ پیسوں والی۔ دودھ نظر  
 آئیں، روشنی سے نفرت۔ نظر کی کمزوری

آنکھ کے سفید پردے کا درم۔ آشوب چشم  
 (دیکھئے آنکھ کا درم)۔ تھیلی جوف۔

گلکیر یا فلور۔ پکوں پر تھیلی۔ ۶ یا ۲۰ طاقت میں دیکھو!  
 ٹائٹل الیڈ۔ جب گلکیر یا فلور ناکام ہو جائے تو یہ دوائی دی جانی چاہئے۔  
 سیٹیفیکریا۔ گونا گونیوں کے بعد پکوں پر تھیلی نما ابھاروں کیلئے بہترین دوا ہے  
 پردہ شبکی کا علیحدہ ہو جانا۔ ایک کے دو نظر آنا۔ آنسو۔ پانی جیسے اخراجات  
 رنگ بدل جانا۔

سیٹیفیکریا۔ نیلے یا سیاہ حلقے آنکھوں کے ارد گرد۔  
 سائیکلین۔ آنکھ کے گرد نیلے حلقے۔  
 چائنا۔ قلت نمون کیوجہ سے آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔  
 دریرم البسم۔ ہیضہ کے حملہ کے دوران میں یا بعد نیلے حلقے۔ یہ بزرگ ملقوں کو بھی  
 ٹھیک کرتی ہے۔

نیرم کارب۔ زرد چہرے کے ساتھ نیلے حلقے  
 فاسفورس۔ حیض کے بعد نیلے حلقے۔  
 سننا۔ پیٹ کے کپڑوں یا قلت خون کی وجہ سے نیلے حلقے۔  
 نکسوامیکا۔ زرد حلقے  
 سیکل کار۔ آنکھ کے ڈیلے گڑبھوں میں دھنسے ہوئے اور نیلے ملقوں سے گھری ہوئی۔  
 اکتیا آر۔ آنکھیں بڑی۔ دھنسی ہوئی اور سیاہ ملقوں سے گھری ہوئی۔

برہمیں دی۔ آنکھیں دھسی ہوئی۔ نیلے یا سیاہ حلقے گہرے بھورے۔  
مینسی نیلا۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔

## آنکھوں کے ڈیلے

آئیوڈیم { آنکھوں کے ڈیلے کا بہرہ  
لائیکولس ویربر { نکلے ہونا۔ دی گئی ترتیب  
کالی میوور { میں دوائی استعمال کیجئے۔

اگیشیا۔ آنکھوں کے ڈیلے گھڑی کے پنڈولم کی طرح۔ ادھر ادھر حرکت کریں۔ اگرچہ دم  
پرایک جگہ پر جانے کی انتہائی کوشش کرے۔ یہ حرکت من سونے پر ہی کرتے ہیں۔  
دیکھئے آنسو۔ بالوں کا گزنا۔ چلیس۔

## آنکھوں کا کبھی کھلنا، کبھی بند ہونا۔ جھپکنا

اگرکس ایم۔ { یہ ادویات دی گئی  
سائیکلیمین { ترتیب میں دی  
نیزم میوور { جانی چاہئیں۔ (دیکھئے گورٹریڈ سولی۔ ریشیڈر اگاؤ۔)

## سبز موتیا۔

فاسفورس۔ سبز موتیے کی چوٹی کی دوائی ہے اگر یہ ناکام ہو جائے تو لایکولوپڈیم  
اور ایشیا دیجئے۔

سپائیجیلیا۔ بائیں طرف کے شدید سرد در کیوجہ سے سبز موتیا ہو۔  
پروٹس سپائینوا۔ اگر سپائیجیلیا ناکام ہو جائے تو یہ استعمال کرائی جائے۔

ایپریلفر۔ { دانے دار چوٹے دی گئی  
گرفیائیس۔ { ترتیب میں استعمال کرائیے۔

بوریکس - دانے دار پوٹے جب پلکس آنکھ کے اندر کی طرف مڑ جائیں اور اُسے تھوم کریں۔  
 پوٹوں کی بلغمی جھلی کا ٹوٹا ہونا۔ پچلے پوٹے مکمل طور پر پلٹے ہوئے۔ پوٹوں کو کھولنے میں تکلیف  
 پلسٹیل - جب بوریکس ناکام ہو جائے تو پلکوں کے اندر کی طرف مڑنے کیلئے اچھی دوائی ہے۔  
 جلیسیم - سبز موتیہ کیلئے مخصوص دوائی جبکہ سر درد گردن کی گڑی سے شمرج ہو۔

اوکسیم - سبز موتیہ میں جب مریض قوس قزح کے رنگ دیکھے۔ آنکھ کے اوپر پانچے گید  
 کے برابر شدید درد۔ روشنی کے گرد سبز کالیر یا دائرو۔ آنکھ میں بڑا ہوا دباؤ۔ روشنی سے خوف۔ نظر  
 نذر۔ آنکھوں اور سر میں تیز یا شدید درد۔

سلفر - جب اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ بطور عمل انگریز  
 کام کرتی ہے۔ پیٹ کے گڑھے میں جلن۔

کالو سنٹس - لنگڑی کے درد اور معدہ کی گیس کے برابر سبز موتیا۔  
 (دیکھئے پلکوں کی سوزش۔ پوٹے کے دانے)

**خون بہنا۔**

کروٹیلس ہور - آنکھوں سے خون بہنا۔ پردہ شبکی سے بغیر سوزش کے خون بہنا۔  
 ایکس - آنکھ کے پردہ شبکی سے آنکھ کے اندرون خانہ خون بہنا۔ یہ نکلا ہوا  
 خون جذب کر لے گی۔

جلیسیم - خون کا نکلنا جس کے نتیجے کے طور پر اندھا پن لاحق ہو جائے تو اس کے  
 یہ بہترین دوا ہے۔ ۲۰۰ کی طاقت صبح و شام دن میں دو دفعہ دی جائے۔

فاسفورس - جلیسیم کے ناکام ہونے پر دی جائے۔

آرنیکا ایلم - جب زخم کی وجہ سے خون بہے ... (کی طاقت ہر روز صبح کے وقت خالی پیٹ  
 ایک دفعہ دیجئے۔

سلفر - پوٹوں سے خون بہے۔

آنکھوں کے بالوں کا گرنا۔

کالی کارب۔ آنکھوں کی جھنڈوں پر سے بالوں کا گرنا۔

آنکھوں۔ جب کالی کارب ناکام ہو جائے تو جھنڈوں کے بال گرنے میں یہ دوائی دیکھائے

ایلوڈنا۔ پلکوں کے بالوں کا گرنا۔

ریشاکس۔ پلکوں کے بالوں کا گرنا۔

پلیٹیلہ۔ آنکھوں میں بال کا احساس۔

آنکھ کے سفید پردے کا ورم۔

ہزنوٹیا بھی دیکھیے۔

اکوٹائیٹ نیپ۔ ٹھنڈک سے۔ زخم سے۔ گرد و غبار سے۔ جراثیمی سے۔ خنازیر کے بڑھے

ہوئے غدودوں کے ہزارہ۔

الٹیک الیڈ۔ جب سخت مواد آنا مشکل ہو۔

سیلا ڈونا۔ جب آنکھیں خون کے گولے کی مانند اور بہت ہی سرخ ہوں۔ کافی سوچی

اور پُر درد۔

مرک کار۔ آنکھوں کے دکھنے کے لئے یہ بہترین دوائی ہے۔ یہ مادیا عزم کیسوں میں

کچھ وقت کے لئے دی جائے تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔

یو فریزیا۔ آنکھوں سے تیزابی یا پھیلنے والے پانی کے اخراج کے ساتھ۔

آر جینٹامائیریکیم۔ بہت زیادہ پیپ والا اخراج۔ قرنیہ دھندلا۔ پلکیں دکھنے والی۔ موٹی

سوچی ہوئی اور زخموں سے پُر مسج کے وقت جڑی ہوئی۔ رطوبت نظر کو روکتی ہے جھلک اکثر پونچھ جاتی

ہے۔ نزلاؤں زخم بنانے والی۔ قرنیہ کی دھندلاہٹ۔ ٹھنڈی ٹیٹل لگانے سے آفاقہ۔

کالی آیوڈ۔ آنکھوں سے بہت زیادہ گاڑھا ہوا اخراج

کریوڑوٹ۔ سوچی ہوئی سرخ، آسانی سے خون بہے۔

ماربلینیم۔ چپک میں مبتلا رہنے کے بعد۔  
 اپس میلیفیکا۔ پوٹوں کی سوزش ڈنگ لگنے جیسے درد کے ساتھ گولی لگنے جیسے  
 درد کے ساتھ۔ روشنی سے خوف۔

رشاکس۔ گاڑا بیپ دار اخراج۔ بہت زیادہ سوزش۔ بہت زیادہ گرم۔ گید بے چینی  
 اسی رات کے بعد شدت۔

آرم میور۔ وراثتی آتشک کی وجہ سے سوزش۔ جلن دار گید۔ روشنی سے کچھ خوف۔  
 روٹاجی۔ آنکھوں میں زیادہ دباؤ کی وجہ سے درد جو ٹھنڈک پر زیادہ ہو۔  
 (آر جنٹم نائیریکیم کے الٹ)

سلفر۔ پوٹے سو جے سو جے ہوئے اور آسانی سے خون ہے۔  
 الیومنا سلیکیٹ۔ آنکھوں میں درد شام کے وقت آنکھوں میں جلن۔ جیسے گرد عین  
 میں درد ہو۔ کھلی ہوا میں سوزش خارش کے ہمراہ پوٹوں میں جلن۔ آنکھوں میں درد جیسے کہ  
 ریت کے ذرات سے ہو۔

مینسی نیلا۔ آنکھوں کی شدید سوزش جو کچھ دنوں کیلئے اندھا کر دے۔  
 امپیر سلفر۔ آنکھوں کی سوزش۔ بدبودار۔ گاڑھے پیپ دار اخراج کے ساتھ قرنیہ  
 کے زخم۔ خونی اور بدبودار اخراج کے ساتھ۔

پردہ قرنیہ کا ورم۔ آنسو۔  
 قرنیہ بغیر زخم کے موٹا ہونا۔ آنسوؤں کے نیچے بھی دیکھیے۔

گلکیریا کارب۔ ٹھنڈ لگنے سے آنسوؤں کی نالی بند ہو جائے  
 اندر کی طرف بڑھنے والی پلکیں۔  
 بورکیس۔ پلکوں کا اندر کی طرف جھکنا۔  
 پلیٹیل۔ پلکوں کا اندر کی طرف جھکانا جب بورکیس ناکام ہو جائے۔

گر لفاٹس۔ پکلیں قابو میں نہ رہیں اور اندر کی طرف ادا آنکھ کے سفید پردہ پر سوزش پیدا کریں۔

دور کی نظر کی کمزوری۔ (نظر کے تحت بھی ادویات دیکھیے)

کلیک یا کارب۔ آنکھوں کے بہت قریب ناک کو چھونے ہی کے قریب ہی پڑھ سکے۔

فائیسوسکما۔ جب پلکوں کے تشنج کیوجہ سے ہر ہنرموت یا دور کی نظر کی کمزوری کیلئے جوئی کی دوائی ہے (دیکھیے رات کا اندھا پن)

چائنا آف۔ ٹائیس بخار کے بعد دور کی نظر کی کمزوری اسپہال کے ہمراہ۔  
اگر کیس ایم۔ پلکوں کے پٹھوں کے تشنج جو پوٹوں کو چھو نہیں۔ دور کی نظر کمزور۔ نظر کی عسل۔

ہر چیز دھندلی سی نظر آئے جیسے کہ یہ مکڑی کے جالے سے دھانچی ہوئی ہے۔

فاسفورس۔ موسمِ بقی کے گرد الیاد اترے نور۔ سیاہ العکاس یا شرارے اور آنکھوں کے سائے سیاہ دجے۔ صبح کے وقت اچھا نظر آئے یا آنکھوں پر اتھکا سایہ کرنے پر اچھا نظر آئے۔

نائیرٹک الیڈ۔ دور کی نظر کی کمزوری جس کے ساتھ سیاہ دجے آنکھوں کے آگے ناچیں۔  
آتشک یا پارے کے غلط استعمال کیوجہ سے دور کی نظر کمزور۔

کاروبوٹیم سلف۔ دور کی نظر کمزوری۔ تکلیف دہ بینائی۔ قوس قزح کے بنیادی

رنگوں میں تمیز نہ کر سکتا۔ مختلف قسم کے رنگ نہ دیکھ سکتا۔ دھندلا پن اور عصبی پٹھوں کی کمزوری۔  
کلیک یا فلور۔ قرنیہ کے لئے چھوٹی کی دوائی ہے۔ کافی عرصہ تک استعمال کرائی جائے۔  
نیفتھیلین۔ قرنیہ اور عدسہ آنکھ کے لئے۔

میکینشیا کارب۔ ناسور یا زخم کے بعد قرنیہ کے لئے۔

سیلٹیا۔ چھوٹی چیمپک کے بعد قرنیہ کے لئے کافی عرصہ تک استعمال کرنا چاہیے۔

ارجنٹم نائیرٹیکم۔ ناسور یا زخم کے بعد قرنیہ کی دھندلاہٹ۔

آسٹوٹ چشم۔ آنکھوں میں درد (آنکھ میں سوزش)

روٹا۔ مطالعہ کی وجہ سے درد۔

بیلا ڈونا۔ سوزش کی وجہ سے۔ سرخ خون رنگ آنکھیں۔ شدید درد۔  
 سپا بھلیا۔ جب سر کی بائیں جانب درد ہو بائیں ڈیلے میں جائے۔  
 سینگو نیریا۔ جب سر کی بائیں جانب اور دائیں ڈیلے میں جائے۔  
 نیٹرم میور۔ سر درد جب ایک طرف سے یا دونوں طرف سے آنکھ کے دونوں ڈیلوں میں جائے۔  
 بیڈرن۔ بائیں آنکھ کے اوپر درد، جماعت کے بعد۔  
 اوسمودیم۔ آنکھوں میں دباؤ کا احساس جیسا کہ باریک پرنٹ سے ان پر دباؤ ہو۔  
 خواہش کر دور کی چیزیں دیکھی جائیں۔

### روشنی سے خوف (نور ترسی)

بیلا ڈونا۔ روشنی برداشت نہ کر سکا۔ خشک اور دھنسی ہوئی آنکھیں۔ آنسوؤں کے بغیر۔  
 روشنی سے خوف کے لئے یہ چوٹی کی دوائی ہے۔  
 گریفا ٹیس۔ سوزش کی روشنی میں روشنی سے شدید خوف، بہت زیادہ آنسوؤں کے ہمراہ  
 نکسوامیکا۔ شراب نوشی یا رات کی عیاشی و بدکاری کے بعد روشنی سے خوف کیلئے  
 نمایاں دوائی ہے۔ کثرت شراب نوشی عصب بعمرین خراب پیدا کر دے جو اس دوائی سے ٹھیک ہو جائیگی  
 دماغی بیجان اور عصبی بیجان کا اس سے علاج کیا جاسکتا ہے۔  
 مرکوریس۔ آگ کی روشنی آنکھ کو بہت خیر کرتی ہے یا چندھیاتی ہے۔ آنکھیں آگ یا دن کی روشنی  
 برداشت نہ کر سکیں۔

اکونائٹ این۔ سردی کی وجہ سے تکلیف دہ سوزش اور روشنی سے خوف یا کسی تیزابی چیز  
 کے آنکھوں میں پڑ جانے سے۔  
 رسٹاکس۔ روشنی بالکل ہی برداشت نہ ہو سکے حتیٰ کہ رات کو بھی آنکھیں نہ کھولی جاسکیں  
 تیزابی اخراج اور سرخی کے ہمراہ استقامتی سوزش آنکھ۔  
 گلونائٹن۔ جب بیلا ڈونا نام کام ہو جائے تو یہ استعمال کرنا چاہیے۔  
 یوفرنیریا۔ روشنی سے بہت زیادہ خوف۔ بہت زیادہ جلن دار پانی آنکھوں سے بہے مصنوعی روشنی کو  
 برداشت نہ کر سکے۔

کلکیر یا کرب - عام قسم کی روشنی کو بھی برداشت نہ کر سکے - سوزج کی روشنی میں کھڑے ہونا ممکن -

## آنکھوں کے آپریشن کے بعد کی تکالیف -

آئرکامانٹ - آپریشن کے بعد اثرات کیلئے بہت ہی کامیاب دوائی ہے -  
ایکس ایم طاقت میں دیجئے -

اگنیشا - کنپٹیوں میں شدید درد -

رسٹاکس - سر میں گولی لگنے جیسی در دیں -

لیڈرم پال - آنکھ کے اگلے خانے سے خون بہنا - انگوری پردہ کاٹنے پر -

برائی اونیا - سر درد قے کے ہمراہ -

اسارم - جھنگوں والی درد قے کے ہمراہ -

کرڈکس - آنکھوں میں تھوڑے لگنے اور جھکے دار درد -

تھوجا - کنپٹیوں میں ڈنگ لگنے جیسے درد -

سینا - عرصہ چشم کے زائد ملبر کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے

سٹرانٹیا - چیزیں ایسی نظر آئیں جیسے کہ خون میں ڈوبی ہوئی ہوں -

## آنکھ کے بالائی پھیپے کا فانیج - لقوہ -

جیلسمیم - آنکھ کے بالائی پھیپے کا لقوہ - پلکیں ذری - مریض انہیں شکل سے کھول کے

آنکھوں کے ذیلیہ دھکیں حرکت پر زیادتی خناق کیوجہ سے - دماغ کی جھیلوں کے درم کی وجہ سے

جذبات یا ٹھنڈا تر موم کیوجہ سے پھول کا فانیج -

رسٹاکس - گنٹھیاوی مریضوں میں گیلے یا تر ہونے کی وجہ سے -

سیپیا - جب حیض کی بے تاخیرگیوں سے منسلک ہو -

کالمیا ایل۔ گنٹھیاوی مریض میں جب پلکس سخت معلوم ہوں۔  
 کاسٹیکم۔ گنٹھیاوی مریضوں میں جب آنکھ کے پٹھے سرد و رکاوٹ ہوں، خشک ٹھنڈ  
 لگنے سے۔ جلیسیم سے کرفالچ کرتی ہے اور رسا کس سے زیادہ فالچ کرتی ہے  
 ایومنا۔ بڑی آنت کے جمود یعنی کام نہ کرنے کے نتیجے میں قبض کے ساتھ منسلک ہوتی  
 ہے۔ یعنی قبض مذکورہ بالا کے ساتھ۔

کوکولس۔ آنکھ کے چھپر کا فالچ ڈفھر یا کے بعد جب جلیسیم ناکام ہو جائے۔  
 آنکھ کے عصب کی بیماریاں۔

### پرودہ شبکی

ڈبوسیا۔ پرودہ شبکی میں اجتماع خون۔ پرودہ شبکی کی سوزش۔ پرودہ شبکی کی رگیں بڑی  
 اور تکلیف دہ خاص طور پر دریدیں۔ آنکھ کے چھوٹے چھوٹے اُبھار سوجے ہوئے۔ پرودہ شبکی  
 میں سے خون کا اخراج۔ آنکھ کے ڈیلے کے اوپر کے حصہ میں درد۔

فاسفورس۔ پرودہ شبکی میں اجتماع خون۔ آنکھیں روشنی سے پرجس اور لمبی یا لمبی روشنی  
 میں نظر تیز۔ روشنی کے ارد گرد مار۔ پرودہ شبکی کی سوزش۔

پلسٹیللا۔ آنکھ کے عصب اور پرودہ شبکی میں اجتماع خون اور سوزش، سر میں شدید  
 درد کے ہمراہ جس کو کھلی ہوا میں افادہ۔

برائی آونیا۔ پرودہ شبکی کی شدید سوزش یا اجتماع خون نظر کے سامنے نیلا ہٹ کی  
 جھلک تیز درد آنکھ میں سے اور اس کے اوپر۔ حرکت سے زیادہ۔

مرک کار۔ آنکھ کے پرودہ شبکی کی سوزش، خاص طور پر رات کو زیادتی۔ آگ کی چمک  
 سے حساس۔ البیون والی سوزش۔ پرودہ شبکی کے لئے۔ چوٹی کی دوائی۔ چوبیلی تنزلی۔ آنکھ  
 کے کسی حصہ میں سے یا کمزور دریدوں میں سے خون بہنا یا دیگر جسمانی تبدیلیاں یا گروسے میں  
 ایسی تبدیلیاں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

اگر کس ایم۔ آنکھ کے عصب کی لاغری کی بہترین دوائی ہے دن میں ۶ دفعہ کافی مقدار میں۔

**ایپس میلینیکا** - البیومن والی سوزش پرودہ شبکی ہوٹوں کی سوزش اور عام استقامتی حالت، مریض اذیت محسوس کرے۔ سوئیاں کم اور کم پیشاب۔ پرودہ شبکی کے نیچے مواد۔ آنکھ کے ٹیلے کے پچھلے حصے میں درد پُر خون چہرہ کے ساتھ۔ آنکھوں میں دگم لگنے جیسی درد سوجھے ہوئے ہوٹوں کے ساتھ۔ پرودہ شبکی کا الگ ہونا۔

**آرٹھریک الیم** - البیومن والی سوزش جب مریض بے چین ہو خاص طور پر رات کے بعد تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس کے ہمراہ۔ پیشاب مقدار میں کم اور چربی یا البیومن والا۔

**جیلیسیم** - البیومن والی سوزش پرودہ شبکی محل کے دوران میں سفید دھبے اور پرودہ شبکی میں سے خون کا بہنا یا نکلتا نظری کمزوری اچانک ظاہر ہوتی ہے۔ پرودہ شبکی زخم یا دور نظری کی وجہ سے الگ ہونا۔ ہر سہفتہ  $\times 2$  طاقت کی ایک خوراک دو ماہ تک دیں اور پھر ایک ہزار طاقت کی ہر چہرہ دن بعد ایک خوراک دیں۔

**لیکس** - پرودہ شبکی میں خون بہنے کی چوٹی کی دوا ہے۔ اس کے استعمال سے خون کا بہاؤ اور تیزی سے سوزش غائب ہو جاتی ہے۔ آنکھ کے عصب اور پرودہ شبکی کی سوزش اور اجتماع خون۔

**کروٹیلکس** - یہ دوائی پرودہ شبکی میں خون کے بہاؤ کو جلدی سے جذب کر لیتی ہے جبکہ کاٹنے کی وجہ سے ہو۔ یہ پرودہ شبکی کی سوزش کو مٹاتی ہے۔

**بیلادونا** - پرودہ شبکی کی سرگی یعنی اس کے اچانک کام پھوڑ دینا خاص طور پر

جب سرد اور اجتماع خون کی وجہ سے سرد درد۔ آنکھوں اور پرودہ شبکی میں مسلسل درد۔ آنکھ کے عصب کا درد سوزش کے ہمراہ۔ روشنی سے خوف۔ تپکن والا درد۔

**آرم میٹ** - پرودہ شبکی کا الگ ہونا۔ اوپر والا حصہ سیاہ نصف جسم سے ڈھانپا ہوا ہوا اور نیچلا نصف دکھائی دے۔ پرودہ شبکی میں مسلسل درد اور سوزش، نظر میں دھندلاہٹ ہو سر میں درد اور آنکھوں کے ارد گرد درد اور دھکن۔

**چائنا** - پرودہ شبکی کی قیامت خون  
**نیرم فاس** { جس کی وجہ سے نظر کی کمزوری۔

کو نیم۔ روشنی کے لئے شبکیہ کا رد ورس ہونا، آنکھوں میں گہرے درد کے ہمراہ نظر کی کمزوری  
 آرم ماٹ۔ زخم کی وجہ سے پردہ شبکیہ کا الگ ہو جانا۔ پردہ شبکیہ میں خون کا بہنا۔  
 نیفقتھالین۔ پردہ شبکیہ کا الگ ہو جانا۔ ریم مویا بند۔ پردہ شبکیہ سے آنکھ کے کالے  
 پردہ پکوں میں رطوبت کا اخراج قرنیہ کی دھندلاہٹ پردہ شبکیہ پر نیچ کا پہنچ جانا۔ پردہ شبکیہ  
 پر رطوبت کا جمنا۔

نیٹرم سیلیسیکم۔ پردہ شبکیہ پر نیچ کے ذریعہ خون کا بہنا۔ پردہ شبکیہ سے البیمن والا  
 خون ہے۔

بھیننگاپن۔ (دیکھیے اینٹھن۔ تشیح)

جلیسیم۔ بھیننگاپن کے لئے بھولی کی دوائی ہے۔  
 سائیکلیمین۔ اگر جلیسیم نام کام ہو جائے تو یہ دوائی آزمائی جائے۔  
 ہائیوسائیمیل۔ جب دماغی امراض کی وجہ سے بھیننگاپن ہو۔  
 ڈونٹھرنیم۔ جب زہر کے علامات ادویات کھانے کے بعد اثرات کیوجہ سے بھیننگاپن ہو۔  
 توسی ایم طاقت دیکھئے۔

میگنیشیا فاس۔ آنکھ کے ڈیلے کا متواتر حرکت کرتے رہنا۔ بھیننگاپن۔ تشیح بھیننگاپن  
 آنکھ کے اندے کا باہر نکل آنا۔

کاسٹیکم۔ آنکھ کے اندے کا بڑھ جانا قرنیہ کا باہر گوا بھارا کمزور نظر۔  
 ایکس اکوفولیم۔ قرنیہ کی سوزش۔ آنکھ کا اندہ گوشت کا لوٹھڑا دکھائی دے۔ آنکھ  
 کے حلقوں میں درد کی رات کے وقت زیادتی۔ آنکھ کی گٹھیاوی سوزش۔ مدد کیچر پونسی میں  
 دی جائے۔  
 ایپس ایم۔ قرنیہ کا ابھار۔

## گوما بنجیاں۔

پلسٹیل۔ گوما بنجیاں خاص طور پر لپسکے پوٹے پر  
سٹیفنگیر یا۔ گوما بنجیوں کے لئے بہترین دوائی ہے جو کہ عام طور پر پلسٹیل کے ناکام  
بار بار ہونے والی گوما بنجیوں ہونے پر دی جاتی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق میں نے یہ دوائی  
گوما بنجیوں کے ہر قسم کے کیسوں خواہ حاد ہو مزمن، خواہ چھلے یا اچر والے پوٹے پر۔ پوٹوں  
کے کناروں پر سکڑی ہوئی۔

میسرلفر۔ جب بار بار گوما بنجیوں کے نکلنے کا رجحان ہو اور جب سٹیفنگیر یا ناکام ہو جائے۔  
ایوناسلیکیٹ۔ گوما بنجیاں سو جے ہوئے پوٹوں کے ساتھ۔ آنکھوں کی سُرخی آنکھوں  
میں درد دھکن جیسے کہ بہت ہو۔ (گندے مادے کی تھیل) بھی دیکھے جب گوما بنجیوں میں سختی  
پیدا ہو جائے۔

## انسو۔

یوفسرنزیا۔ جب اخراج خواہ شدہ اور آنکھوں میں ہرچان پیدا کرے۔  
ایلمپسیا۔ جب اخراج بے ضرر ہوں۔  
رٹساکس۔ جب آنسو بہت زیادہ ہوں۔ ناک اور آنکھ سے آنسو لانے والی نالی کے بند  
ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں جلن  
مرک کار۔ سوزش کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہے۔  
سلیشیا۔ آنسوؤں والی نالی کی سوزش یا رکاوٹ کی وجہ سے جب رٹساکس ناکام ہو جائے۔  
پٹرولیم۔ آنسوؤں والی نالی کی سوزش پیپ کے ہمراہ۔  
فلورک ایسٹ۔ پھوڑا یا رکاوٹ آنسوؤں والی نالی میں۔  
(دیکھیے آنکھ کی سوزش۔ ٹکڑے)

رسولیاں -

زخم میٹ - اوپر والے یا نیچے پوٹوں پر ناڑی جال  
کلیر یا کارب - جراثیموں کی تھیلیوں والی رسولیاں -

کونیم - { پوٹوں پر دلنے  
سٹیف گیر یا -

کالی بالی - پالی پس - کثیر سوراخوں والا پھوڑا پوٹوں کے نیچے -

تھو جھا - آنکھ کے پوٹوں پر گومر جب تک ٹیکوں کی وجہ سے دب گئے ہوں یا  
جب ٹیکے اتر نہ کریں -

کیلیڈیم - بہت زیادہ تبا کو نوشوں، جہاں تبا کو نوشی بھول جانے کا باعث بنے -  
داغی یا غیر جاغری - یہ گومر کو آرام دیتی ہے اور تبا کو نوشی کی حادث کو دور کرتی ہے -

تشنج  
اگر کس ایم - آنکھوں کا تشنج اور جھٹکے - ڈھیلوں کی پنڈلم کی طرح کی حرکت کا بھی علاج  
کرتی ہے - نیند کے دوران یہ تمام حرکات بند ہو جاتی ہیں... اکی طاقت میں دیتے!  
ریفنس - پوٹوں کا مسلسل تشنج جو آنکھ کے ڈیلوں کی محوری گردش کی وجہ سے نظر کو  
تقریباً بند کر دیتے ہیں -

میزیریم - پوٹوں کا تشنج - دائیں خشار اور معدہ کے پھوٹوں کا تشنج - تسکین دہ تشنج -  
میگنیشیا فاس - آنکھوں کے قریب تشنج اور جھٹکے یا بہت زیادہ دیر تک پھوٹوں کی اگرن -  
جس کی وجہ سے بھیدنگا بن -

قرنیہ کے ناسور یا پھوڑے -

ایپسلفر - قرنیہ اور آنکھ کے اگلے طبق میں پھوڑا - شدید تکین والی درد کے ساتھ پھوٹ  
کا گنا سڑنا - روشنی سے شدید خوف -

مرکس سال - سلمی یا گہرے ناسور یا پھوڑے کا سرایت کر جانا۔ زیادہ مقدار میں پھیلنے والا مواد ہونا۔  
 میلشیا - قزنیہ کے گلے ٹٹنے والے زخم یا پھوڑے۔ مزمن پھوڑے۔ پردہ قزنیہ کے درم  
 کے بعد نظر کو دھندلا ہٹ۔

گریفائیٹس - گارمی کریم کی پیپ کے ساتھ پھوڑے یا ناسور۔  
 پلسٹیللا - آنکھ کے نیلے حصہ میں زخم یا پھوڑے ناسور مریض نرم طبیعت اور  
 گیس کی نکالیت والا ہوتا ہے۔

## نظر - اندھاپن - (دور کی نظر کی کمزوری)

فاسفورس - ٹائیفاؤئڈ بخار کے بعد۔ جنسی بے اعتدالیاں۔ رطوبات کا اخراج اور  
 آسمانی بجلی کے حملہ کے بعد کا اندھاپن۔ نظر کے اعصاب کے نالیج کی وجہ سے اندھاپن۔  
 فائیسوسٹگما - رات کا اندھاپن۔ سبوتیا۔ اور دور کی نظر کی کمزوری۔  
 پائیلوکارپس - اس دوائی سے دور کی نظر کمزوری درست ہو جاتی ہے۔ پھوڑے  
 سے استعمال کے بعد آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ آنکھوں میں گرمی اور جلن۔ پپولوں میں  
 اینٹھن۔ آنکھوں پر معمولی دباؤ سے بھی سوزش یا ہیجان۔  
 زینکولس بلب - حمل کے دوران میں عورتوں میں دن رات کا اندھاپن۔  
 سائیکلیمن - خارش کو دبانے سے نظر کا کم ہو جاتا۔ بادل یا پردہ آنکھوں کے آگے  
 حائل ہونا۔ آنکھوں کے آگے دھند یا دھوئیں کا ہونا۔ نظر کے دائیں نصف حصہ کا میچ نہ ہونا۔  
 آئیوڈم - نظر کا اچانک جاتے رہنا۔  
 کوکولس انڈ - نظر کمزور اور نظر کا درہم برہم ہونا۔ آنکھ اور نظر کو سیٹ کرنے والے  
 پٹھوں کی نالیج کی وجہ سے کمزوری۔

لوڈسٹا - عصب بینائی کے نالیج کی وجہ سے اندھاپن۔  
 امبرگریسا - آنکھ کے کسی ظاہری نقص کے بغیر آنکھ کی نظر میں اعصابی کمزوری۔

سلف۔ آنکھوں کے سامنے بادل یا پردہ ہو، دھواں یا دھند صبح جاگنے پر زیادتی۔

نیرم میور { چیزوں کا ایک نصف نظر آئے یعنی یا تو دایاں نصف حصہ  
چینم سلف { نظر آئے یا بایاں نصف حصہ نظر آئے۔

اگر کیس ایم۔ کمزوری کم نظری یا نزدیک بینی۔ نظر کا دُندلا پن۔ غیر واضح نظر۔ ہر چیز دھندلی نظر آئے۔ آنکھوں کے جھٹکے اور شیش جو بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ نظر کے آگے دھند اور مکرئی کے جانے کا احساس۔ آنکھوں کے آگے رنگوں اور چیزوں کا دھوکہ۔

گریشی داولا۔ سر کی طرف خون کے اجتماع کی وجہ سے نظر کا جاتے رہنا۔  
میفاٹیس۔ نزدیک بینی الفاظ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں۔ باریک لکھائی نہ پڑ سکے۔

لیتھم کارب۔ چیز کا دایاں نصف نظر نہ آئے۔

آرم میٹ۔ بخلا نصف یا اوپر والا نصف نظر نہ آئے۔ اوپر کا نصف سیاہ جسم سے ڈھانپا ہوا۔ اور بخلا نصف سیاہ جسم سے ڈھانپا ہوا اور بخلا نصف دکھائی دے۔ بڑے الفاظ میں فرق نہ کیا جاسکے۔ آنکھ کے آگے زرد اجسام تیریں۔

یسیا۔ مادہ منور کے اخراج کے بعد نظر میں دھندلاہٹ۔ سگری ہوئی تپلیاں،

جس کی وجہ سے نظر میں دھندلاہٹ و کمزوری، کوئی سا نصف حصہ نظر نہ آئے۔  
گریفاٹیس۔ عام فانیج کی وجہ سے اندھا پن۔ نظر سے دُور آگ کے ٹٹاتے ہوئے میڑھے میڑھے راستے۔

لائیکولوڈیم۔ رات کا اندھا پن۔ کسی چیز کا صرف نصف حصہ نظر آئے۔ نیند کے دوران آنکھیں نصف کھلی ہوں۔

چائنا۔ پردہ شبکیہ میں قلعہ خون کی وجہ سے رات کا اندھا پن۔ آنکھوں کے گرد نیلا رنگ۔ آنکھوں میں دباؤ۔

بوٹھرپس لانسیموٹیس۔ دن کا اندھا پن۔ پردہ شبکیہ میں خون بہنے کی وجہ سے

اندھاپن۔ سورج نکلنے کے بعد مشکل اپنا راستہ دیکھ سکے۔

ایکونائٹ این۔ اجتماع خون کیوجہ اچانک اندھے پن کے دورے۔ یہ دوائی ابتدا

میں دی جانی چاہیے۔

کاسٹیمک۔ اچانک اور اکثر نظر کا بند ہونا جیسے کہ آنکھ پر باریک پردہ تنا ہوا ہو۔ نظر کی دھندلاہٹ جیسے کہ دھندلایا آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔

جیلیمیم۔ سرگزانی کے ساتھ اچانک اور مکمل اندھاپن۔ آنکھیں بوجھل اور دھندلی نظر۔

حلق کی وجہ سے نظر کا نہ رہنا۔ نظر کے میدان کا اوپر والا نصف نقص دار۔

لیکسٹھس۔ جب تکلی باز دھڑکری چیز کو دیکھا جائے تو نظر دھندلا جائے۔ جب

بھروسہ کتنے دائرے نظر آئیں۔ آنکھیں چمکدار اور تپتیاں پھیلی ہوئی سُرخ رُخاروں کے ہمراہ۔ مکرئیورکس۔ اندھے پن کے چند لمحوں کے دورے۔ آنکھیں روشنی یا آگ کی چمک سے

بہت زیادہ حساس۔

سکوٹا وائروسا۔ شدید سرگیگزانی کے ساتھ نظر کا غائب ہو جانا۔ دماغ کی غیر حاضری۔

کی وجہ سے خاص طور پر طے وقت جب پڑھائی کے دوران الفاظ ادھر ادھر نظر پڑے ماعدہ نظر آئیں۔

ٹائپلینیم۔ شروع میں صرف نصف چیز نظر آئے۔ تمام کار حجاب۔ نامردی بجماعت کے دوران سرعت انزال کے ساتھ۔

پلسٹیللا۔ احساسِ کنظر کی دھندلاہٹ دور کی جاسکتی ہے آنسو تپتیاں سکڑی ہوئیں۔

سیلنٹیا۔ پرانے کیوں میں بھلا مطلوب صحیح منتخب کی گئی مستقل اثر نہ کریں۔

الیومنا سیلیسیکٹ۔ دھندلی نظر۔ رات کے وقت مصنوعی روشنی یا نظر کے زیادہ

استعمال سے کم نظر آئے۔ دھند جیسی۔ کمزور نظر۔

ڈیوبوسیا۔ آنکھیں ٹھنڈی محسوس کریں۔ تھکی ہوئی ہوں۔ چیزیں اوپر کو اٹھی ہوئی نظر

آئیں۔ ہر طرف دیر سے چہرے نظر آئیں۔ نظر کے دہم یا نظر کا فریب۔ ایک کرسی کو اپنا انتظار

کرتی ہوئی محسوس کرے جبکہ کرسی نہ ہو۔ تصور کرے کہ اندھیرا ہے جبکہ صاف چمکدار دن ہو اپنی گمشدہ

گھڑی کو اپنے سر کے اوپر ہوا میں سے بچنے کی کوشش کرے۔ دونٹ کے فاصلہ پر سے نہ پڑھ سکے۔ کمی رنگ مثلاً نیلا۔ پیلا اور سرخی مائل بھورا نظر آئیں۔ عصب بینائی میں اجتماع خون عصب بینائی کا فالج شرانیں سکھی ہوئی۔

سنا۔ جیسے کہ جالی میں دیکھ رہا ہو آنکھیں پونچھنے پر آقا تہ ہو۔

دریٹم ورائیڈر۔ اجتماع خون کی وجہ سے نظر کی گزوری یا عصب بینائی کے ایمان سے۔ موم جی کے ارد گرد بزدانہ سے ظاہر ہوں جو چکراتے پر سرخ ہو جائیں۔

روٹا۔ دوران مطالعہ آنکھیں آسانی سے تھک جائیں۔ زیادہ مطالعہ کی وجہ سے نظر میں دھندلاہٹ۔ مطالعہ کے دوران گرمی اور جلن محسوس۔ مطالعہ کے دوران آنکھوں کے اندھوں میں درد۔ مطالعہ کے بعد یا باریک مینی کے بعد نظر دھندلا جائے۔

مینڈورینم۔ آنکھوں کے آگے جھللاہٹ۔ دھندلی نظر سیاہ یا بھورے دھندلی نظر آئیں۔ چیزیں یا تو دگنی نظر آئیں یا چھوٹی۔ آنکھوں میں ریت یا لکڑی کی ٹکڑیوں کا احساس۔

کونیم۔ جس وقت کسی چیز کو دیکھا جائے یا چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر ڈالی جائے نظر جمی رہے لیکن جو نہی نظر بھڑائی تو سب کچھ دھندلا اور گڑبڑ محسوس ہوتی کہ مضبوطی سے چیزوں کو پکڑا جائے۔ لائیں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوں۔ چیزیں سرخ نظر آئیں۔

کیوبیرم میٹ۔ اخراجات کے دینے یا پھوڑے پھینکوں کی وجہ سے اندھا پن اس کے ساتھ تشبیہ بھی ہو سکتا ہے۔

فیرم میٹ۔ رات کے وقت چیزوں کو اندھیرے میں دیکھنے کی اہلیت۔

کاروینیم سلف۔ ہر چیز دھندلی سی نظر آتی معلوم ہوں۔ جیسے کہ چیزوں پر مڑی کا بالا تنا ہوا ہو۔ بزدانہ سرخ۔ دائیں آنکھ کا اندھا پن اور بائیں آنکھ کی نظر کی بہت کمزوری کے ہمراہ۔ عصب بینائی کی لاغری۔

ایسڈ فاس۔ دور کی نظر کی گزوری۔ آنکھوں کے آگے سیاہ پٹیاں اور صفحہ قریب پڑی ہوئی چیزیں حرکت کرتی معلوم ہوں۔

نوٹ:- مندرجہ بالا اندرونی استعمال کی ادویات کے علاوہ دوزخ ذیل آنکھوں کی  
درزشیں کرنے کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ نظر کو اچھا کیا جاسکے۔

(۱) - ہٹانے دھونے کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈے پانی میں کھولا اور بند کیا جائے۔

(۲) - دن کے کسی وقت آنکھوں کو جان بوجھ کر چھپکا جائے خاص طور پر زیادہ دیر تک  
آنکھوں پر دباؤ پڑنے کے بعد۔

(۳) - آنکھوں، پپوٹوں کے نیچے آہستہ آہستہ بھینچنا دن کے خاتمہ پر۔

(۴) - آنکھ کے گوشوں میں آنکھوں کو متواتر ملانا۔

## ایک کے دو نظر آنا

کاسٹیکم - آنکھ کو دائیں طرف گھمانے سے ایک چیز کو دو دیکھے۔

جیلیمیم - آنکھ کو بائیں طرف گھمانے سے ایک کے دو نظر آئیں۔ لیکن سر کو یہ صاف کرنے پر ایک نظر  
آئے۔ آنکھ کے بالائی پتھر کا نالی بھی ہو سکتا ہے۔

ہائوسائیمس - نظر کا دھوکا مریض ایک کے بجائے دو دیکھے۔

الیومن - موم جی کی روشنی میں چیزوں کو دوہری دیکھے۔ پپ دارا شوب چشم۔  
آنکھوں کی متواتر دھکن۔

سٹیکام - دوہرے نظر آنا نیچے کی طرف جھکانے سے آتا۔ دونوں آنکھوں سے دیکھنے  
پر دوہرے نظر آئے لیکن جب ایک آنکھ سے دیکھے تو ٹھیک نظر آئے۔

گرفیٹس - جب لکھے تو الفاظ دوہرے نظر آئیں۔ الفاظ ایسی جلیں جاب مطالعہ کریں۔

پلمیم - جب دونوں آنکھوں سے دیکھے تو دوہرے نظر آئے۔ لیکن جب ایک آنکھ سے  
دیکھے تو صحیح نظر آئے۔

سٹرامونیم - الفاظ یا چیزیں دوہری نظر آئیں۔

در شرم و ریشہ۔ ایک کے دونوں آئیں۔ سر میں اجتماع خون کی وجہ سے سر درد کے برابر۔  
 آرم فوئٹم۔ ہر چیز دہری نظر آئے ایک چیز دوسری میں گڈ مڈ معلوم دے آنکھوں میں شدید دباؤ  
 آرم میٹ۔ دہری چیزیں نظر آئیں اور چیزیں ایک دوسری میں ملی ملی معلوم دیں۔  
 چیزوں کا رنگ دار نظر آنا۔ نظر کا دھوکہ

بائیو سائیمس۔ آنکھوں کے آگے سُرخ دھبے۔  
 روٹا۔ موم تہی کی روشنی سرخ بالے سے گھڑی ہوئی محسوس ہو۔  
 تھوہا۔ آنکھوں کے آگے تنگے اڑتے نظر آئیں  
 اٹروپن۔ جس کی چیز پڑھی دیکھے سائیز نظر آئے۔ نظر کے دھوکہ کو ٹھیک کرے ہر چیز اپنے  
 قد سے بڑی نظر آئے۔

سائیکلیمین۔ آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلے اور چمکدار شرارے۔ آنکھوں کے جلنے  
 اور جھلمانے کی وجہ سے پڑھ کر نہ سکے۔ دُھندلی نظر۔ چیزیں جیسے کہ دھوئیں اور دُھند میں نظر  
 آئیں۔ ایک کے دو دکھائی دیں۔

امونیم کارب۔ آنکھوں کے آگے زرد دھبے نظر آئیں۔  
 فاسفورس۔ آنکھیں بند کرنے پر آگ کا سمندر معلوم ہو۔ مطالعہ کے وقت الفاظ سُرخ معلوم ہو۔  
 سلفر۔ سیاہ دھبے آنکھوں کے آگے تیریں۔ قریب کی چیزیں کافی دور معلوم ہوں۔  
 بیلارڈنا۔ آنکھوں کے آگے شعلے۔ آنکھوں کے آگے تیز روشنی۔ چیزیں لمبی یا الٹی نظر آئیں۔  
 سیڈرن۔ چیزیں رات کو سرخ اور دن کے وقت زرد نظر آئیں۔  
 سٹراٹونیم۔ چیزیں سیاہ کی بجائے سُرخ نظر آئیں۔ چیزیں بہت چھوٹی نظر آئیں۔  
 چیزیں سیاہ۔ ٹیڑھی ٹیڑھی دور اور تر بھی نظر آئیں۔  
 ایلنٹھس۔ رات کے وقت آنکھوں کے پوٹے بند کرنے پر آنکھوں کے سامنے چمکدار روشنی۔  
 ارجنٹم ٹائیٹریم۔ جھورے اور لہر آنکھوں کے سامنے سے اتر دہا کی صورت آنکھوں کے سامنے  
 سے گزریں۔

آدمیٹ۔ ایک کے دو نظرائیں اور دوسرے میں گھس جائیں حب چیزوں پر دیکھے تو شدید درد۔ آنکھیں بند کرنے پر کم تکلیف یا درد میں افاتہ۔

نایٹرک ایسڈ۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے ناچیں۔

دریٹرم درائیڈ۔ بڑے بڑے بنزدائے موم بنی کے ارد گرد ظاہروں جو پکڑائے پرکسرخ بن جائیں۔

ایومنا۔ موم تہی کے گرد زرد ہالہ۔ آگ جیسے دھبے دیکھے۔ سفید تارے۔ جیسے کہ دھند یا پر میں سے دیکھے۔

کالی کارب۔ آنکھوں کے آگے بہت سے رنگ یا مختلف رنگ اور چمکدار دھبے چیزیں زرد پر سے میں لپٹی ہوئی معلوم ہوں۔

مرکوریس۔ دائیں آنکھ کے آگے ہر شب سیاہ کیڑے یا مکھیاں مارتی نظرائیں۔ آنکھوں کے اندر دھند۔ نظری کمزوری یا دھندلاہٹ۔ آگ کی روشنی کو برداشت نہ کر سکے جو چکاچوند ہو۔

سیپیا۔ آنکھوں کے آگے آگ کے دھبے جب روشنی پر دیکھے جھللائے۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے۔ آگ کے ٹپے میڑھے شعلے۔ رنگوں کا پڑچ بھگٹا۔

سنا۔ نظر زرد۔

گرفیٹس۔ جب لکھے تو الفاظ دوسرے معلوم ہوں، وہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں جس وقت مطالعہ کریں۔

میڈورنم۔ آنکھوں کے آگے جھللاہٹ۔ دھندلی نظر۔ سیاہ یا بھورے دھبے آنکھوں کے آگے ایک کی دو چیزیں نظرائیں۔

دیکھے آنسو۔ آنکھوں سے پانی بہنا۔



یہ تھا باب

کانوں اور سُننے  
کی  
نیمساریاں

## جلن۔

آرم میٹ۔ جب ٹھنڈی ہوا میں چلے تو کانوں میں جلن ہو۔  
 سینگو نیا۔ سرخ رخساروں کے کانوں میں  
 مرک مال۔ جلن گہری بائیں کان میں زیادہ۔  
 امونیا میور۔ جب ٹھنڈی ہوا میں چلے تو کانوں میں جلن۔  
 اگر کیس مس۔ کانوں میں جلن، سرخی اور خارش جیسے کہ شدید ٹھنڈی زد میں ہوں۔  
 بہرہ پن۔ (دیکھئے پکڑ)

کالی میور۔ بہرہ پن کے لئے عمومی دوا ہے۔  
 ہیمپلر۔ کان میں سوراخ یا پھوڑے کی وجہ سے بہرہ پن۔  
 فیرم پیکریم۔ مٹوں کیوجہ سے یا شور والے علاقے میں رہنے کیوجہ سے اعصابی  
 بہرہ پن۔ خون کی نالیوں میں تبدیلی کے بغیر۔ نالیوں کا بہرہ پن۔  
 مرک ڈلس۔ بڑی عمر کے لوگوں میں نزلاوی بہرہ پن اور کان دھلق کے درمیان  
 نالی میں رکاوٹ سے بندار موسم میں زیادتی۔

سکوٹا اور وسا۔ دماغ کی جھلیوں کے درم کی وجہ سے بہرہ پن  
 ہائیڈرو سائٹک ایسڈ۔ { کافی عرصہ تک ہر ہفتہ ایک خوراک بدل کر دیجئے۔  
 پائیلو کارڈینیم۔ جب کان کے اندرونی حصہ میں خرابی کیوجہ سے بہرہ پن ہو۔ شور میں جیسے  
 ککڑی میں اچھا سنائی دے۔

گریفائٹس۔ ایسا بہرہ پن جس میں شور کے اندر اچھا سنائی دے۔  
 میزیریم۔ کان میں آگرمیا کے بعد یا جب مزمن نزلا کی وجہ سے کان اور دھلق کے  
 درمیان نالی میں رکاوٹ سے کان کا پردہ کھینچا ہوا یا زخم زدہ پردہ کی جھلی موٹی ہوئی ہو ہر

کھانے کے بعد یا پہلے ۳ طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔ جب بہرہ بن اگرزیا کے دہنے کی وجہ سے ہو تو خالی معدہ صبح کے ایک خوراک دیجئے۔

پلسٹیل - سردی کی وجہ سے یا چھپک کے بعد یا سرخ بخار کے بعد، خمدار موسم میں زیادتی نزلہ کی وجہ سے کان اور سلق کے درمیان نالی کی بندش یا رکاوٹ، کوئین کے غلط استعمال سے آئیوڈم - کان اور سلق کی نالی میں رکاوٹ کی وجہ سے سنجہ میں تکلیف اور گکے بیٹھنے کیساتھ برٹیا کارب - کم سنائی دے اور جھٹنے کی آوازیں -

کالی آرٹھیکم - کئی سال پرانا بہرہ بن -  
مینفاکس - نرین بہرہ بن یا پیدائشی بہرہ بن اس سے ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ ۲۰ طاقت سے علاج شروع کر کے اونچی طاقت تک استعمال کیجئے۔ یہ کم از کم ۶ ماہ یا ایک سال تک دی جانی چاہیئے۔ ٹیبرکولینم کی ۲۰۰ x طاقت کی ایک خوراک ہر ماہ دینی چاہیئے بطور عمل انگیز کے۔ اس سے دودن پہلے اور دودن بعد کوئی دوسری دوائی ہرگز نہ دی جائے۔

ورٹیکم - کان میں رکاوٹ کی وجہ سے بہرہ بن محسوس کرے کہ کان دھابنا ہوا ہے۔  
کاسٹیکم - جب خمدار موسم میں اچھا سنائی دے - کان کے اعصاب کے فائدے کی وجہ سے بہرہ بن۔  
سیلشیا - بہرہ بن جس کی زیادتی خمدار موسم میں ہو  
لیڈم - کان سے بہتے ہوئے مواد (زکام) کے دہنے کی وجہ سے بہرہ بن۔  
وسکم البم - نزلہ دی بہرہ بن کانوں میں آواز کے ہمراہ۔  
آرٹھیکم ایوڈر - بہرہ بن جس کے ہمراہ افسردگی ہو جس کی زیادتی رات کے وقت ہو۔  
میگنیشیا کارب - بہرہ بن جو ڈیریا ٹھنڈ کی وجہ سے ہو۔  
میڈورٹینم - تقریباً دونوں کانوں کا مکمل بہرہ بن - نیم بہرہ بن یا غیر مستقل بہرہ بن۔  
محسوس کرے کہ دائیں کان میں کیڑا لڑکھڑاہوا اور کان کی نالی کی اندرونی دوار میں سوراخ کڑا ہے۔  
سیلیسک الیڈر - کانوں میں آوازوں کے ساتھ بہرہ بن کان کے عصب کے پکڑ کے ساتھ۔  
فاسفورس - بہرہ بن خاص طور پر انسانی آواز کے لئے۔

چینی نو لودیم اینتھمر۔ زیادہ اونچی آواز مئے لیکن انسانی آواز کے لئے تقریباً بہر انسان کی آواز اچھی طرح سے جب کار یا پرتھورس میں سوار ہو۔ خاموش کرس میں رسن سکے۔  
 لوبیلیا افلیٹا۔ اخراجات کے دینے یا اگر نیا کے دینے کی وجہ سے بہر بن۔  
 گلے میں گولی لگنے جیسی درد۔

در طیم ایلیم۔ بہانے کا بہر بن۔

**اخراج۔ کان کا درد** | دیکھے کان کا بہنا۔

اکونائٹ۔ سردی سے کان درد

پلیٹیل۔ جب اکونائٹ ناکام ہو جائے اور گاڑھا سادہ اخراج زردی مائل (نہر دیا بڑی مائل) کانوں سے نکلے۔

بیلڈوٹونا۔ کھودنے والی۔ سوراخ کرنے والی اور پھارنے والی درد جو اچانک لے اور شدید ہو۔ یہ دوائی اس درد کے لئے جو پلیٹیل کے لئے شدید ہو۔

سیلشیا۔ کان سے بدبو دار پیپ کا اخراج جس کے ہمراہ ہڈیوں کا گلنا مڑنا اور ہڈیوں کے پھوٹے پھوٹے ٹکڑے۔

کیمپسلفر۔ جب کانوں میں پھنسیاں اور پھوٹے ہوں۔

اکلیا سپکٹا۔ جب ناقابل برداشت درد ہو۔ ناک صا کرتے وقت پھینکتے وقت اینٹھن درد۔ کیموٹیل۔ ناقابل برداشت درد جو گرمی سے زیادہ ہوا اور رات کے وقت زیادہ ہو تقریباً پنجوں کے کان درد کے لئے مخصوص دوا ہے۔

جیلسمیم۔ موٹنی حیض پر کان درد۔ کان بھرے ہوئے اور گرم محسوس ہو۔

ٹیسر ٹولاسپانیہ۔ جب جھپٹا مارتی ہوئی کان درد سچکی کے ہمراہ۔

کالی میور۔ کان کے غدد دسوجے ہوئے۔ کوڑکڑکی آواز جب کوئی چیز ٹکل جائے۔

میگنم۔ جب درد کان سے نکل کر دانت تک پہنچے۔  
 پایجیلیا۔ جب کان کی میل کے جمع ہونے سے جو کان کے اعصابی پٹے کو دبائے۔  
 کیپسیکم۔ کان درد رات کے وقت شدید ہو۔ چکلی دار پھوڑا۔ کان کے درمیان حصّہ  
 کی سوجن۔ کان کی جلّتی کے چھٹنے کے ہمراہ کپنی کی بڑی کے بنیادی حصّہ کی دکھن اور پھٹنے والا  
 سر درد کے ہمراہ اور سردی۔ کان گرم درد گئے تک جائے۔  
 اوسیم۔ جب تک صاف کی جائے تو کان درد ہو۔

میگنیشیا فاس۔ خالصتاً اعصابی کان درد کے لئے مفید ہے۔  
 آرم آر سینکم۔ کان سے بدبودار، گندہ پیپ دار۔ کارٹھا زرد اخراج۔ کان درد  
 کان کے پیچھے۔ کان کے اندر جلن اور چھین دار دردیں۔ بہت اچھی طرح سنائی دے لیکن  
 بعد میں کم سنائی دے لیکن آخر کار بالکل ہی سنائی دے۔  
 ایٹھوزا۔ کان میں انگلی ڈالنے یا انگلی سے کان کے سوراخ کو چوڑا کرنے پر فاقہ۔

## شور

کالی میور۔ گٹھی کے چلنے شور اور پرندوں کی آوازوں کیلئے چوٹی کی دوائی ہے نکلنے  
 پر یا ناک پر چھٹنے والی درد اور کرکن۔  
 کالی آئیوڈ۔ گانے اور سول سول کی کانوں میں آواز جیسے کہ چھت پر بارش برس رہی  
 ہو یا قریب دریا بہ رہا ہو۔

کالی سلف { چباتے وقت کانوں میں شور۔  
 بریٹا میور {

کرپوز ٹم {  
 پیروٹیم { دفران حیض کانوں میں شور۔

لیڈم پال۔ کان میں گھنٹیاں بجنے یا طوفان کی آواز جیسا شور کانوں میں ہوا طرح کی گرم۔

فیرم میٹ

دریٹرم ایلمیم خون حیض آنے سے پہلے کانوں میں شور۔

الیومنا۔ چہاتے وقت کانوں میں کرکر کا شور۔

ایلو۔ اچانک بھٹانا اور کھانا بائیں کان میں بستر میں جانے سے قبل جیسے کر شیر ٹوٹے

ایک خاص علامت ہے۔

ولکم الہم۔ کانوں میں شور نزلادی بہرہ بن کے بہراہ۔

نایٹرک ایسڈ۔ کانوں میں گرج۔ جب چہاتے تو کرکن۔

مانسنیلا۔ محسوس کرے جیسے کہ کان بند ہوں۔ گھنٹہ الہ بجے۔ گرجنے اور دھول کی

آواز جیسا شور اور کان میں آوازیں۔

میورٹیکم ایسڈم۔ کانوں میں سن کی آوازیں اور شور۔

گرفایٹیس۔ دھماکہ یا بندوق کے سطلے جیسا شور۔

بریرٹیکم ایسڈ۔ جب تک صاف کرے تو شور کی گونج۔ دھماکہ دار شور بہرہ بن کے بہراہ۔

کینا بس انڈیکا۔ کانوں میں شور۔

ڈاکا مارا۔ رات کے وقت کانوں میں جھنجھٹا ہٹ کا شور۔

کاسٹیکم

لائیو کوٹوٹیکم

فاسفورس

سیپیا

گونیج اور صدائے بازگشت

اپنی ہی آواز کی گونج سنے

اور صدائے بازگشت سنے

کان درد

کان درد بھی دیکھے۔ کان کے اخراجات۔

کالی بائیکرومیکم۔ جب کان کا اخراج پھکنے والا ہو۔

ہمپٹر سلفر۔ جب کان میں چھوڑے کی دج سے اخراج ہو، کان میں سوراخ بھی اس سے

ٹھیک ہو جاتا ہے۔

سورائیم۔ جہاں مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے۔ کان بدبودار اخراج  
آرم میٹ۔ جہاں کان سارا دھول ضائع ہو جائے یا بڈیوں کا گلن ہو۔ گندی بدبودار مواد  
ہندی اخراج۔ کان میں جھنجھٹا ہٹ اور سرسراہٹ کے ساتھ کان میں اخراج۔

ٹیلیویریم۔ اس کی ۶ طاقت بہت دیر تک دینے کا کان بہنا ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ زیادہ  
طاقت ناکام ہو جاتی ہے۔ بدبودار اخراج پھیلی کے چدرے جیسی بدبودار خون کے ساتھ ملا ہوا۔  
پتلا اور پانی جیسا اخراج جو چھیننے والا اور جلن دار ہو۔

پلسٹیللا۔ جب اخراج سادہ ہو زرد یا بنری نائل رنگ کا ہو۔  
گرگرافیاٹس۔ چپکنے والا۔ بدبودار چھپنے والا۔ شہد کے رنگ کا جلد کو چھیننے والا  
جہاں جلد پر لگے۔ بعض ٹھنڈے اور رنگا ہونے سے زیادہ مواد کے اخراج میں اور نائلز  
میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

سکارلیٹیم۔ جب سُرخ بخار کے بعد اخراج ہو۔  
سٹریپٹوکوکین۔ جب سٹریپٹوکوکین کے اثرات کی وجہ سے اخراجات ہوں۔ ۲۰ طاقت  
میں دیکھئے۔

گیٹرٹز۔ متعفن حالات میں جبکہ بچہ پتلا کمزور اور ڈھیلے ڈھالے پٹھوں والا اور زرد  
چہرے والا، ذہنی طور پر بے چین۔ اندھیرے میں اور اکیلا بہنے سے ڈرے۔

ہائیڈرائٹس۔ چپ دار پیپ کا اخراج جس کے ہمراہ یا جس سے پہلے تمام بطنی مایوں  
سے نزلہ ہو۔

وائیولا اوڈورٹیا۔ کانوں میں جھنجھٹا ہٹ اور گدگدی۔ رُکے ہوئے اخراج کو بچہ  
شروع کر دے یا اخراج کو چند دنوں میں ٹھیک کر دے (دونوں کانوں سے اخراج بہترین  
کے ہمراہ مدرٹنچر کی ایک خوراک میج کر دے۔

کلکیر یا کارپ۔ سفید رنگ کا پیپ دار وسادہ اخراج۔  
سیلشیا۔ بڈیوں کے ناسور کی وجہ سے بدبودار اخراجات۔ ان میں بڈیوں کے

چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔

مرکب کوکس - درمیان کان سے پیپ کا بہاؤ، پتلے اور پھیلنے والے اخراجات خاص طور پر  
آئسکی نوعیت کے - ٹانسز کی سوزش کی وجہ سے کم سائی دے۔ زیادہ مقدار میں سبز گارھی،  
خراشدار پیپ دار اور بدبودار اخراج کانوں سے۔

ایتھمورا - دائیں کان سے زرد اخراج جھنسنے والی درد کے ہمراہ جس کو کان میں انگلی ڈال  
کر ہلانے سے افادہ ہو۔

نائیرک ایسڈ - کانوں سے زردی مائل سفید اخراج - آنکھوں سے آنسوؤں کے ہمراہ  
پھولا ہوا جہرہ اور گھوٹے کے پنیاب جیسی بودار۔

سینی کولا - مچھلی کے ٹککین پانی کی طرح کان سے اخراج۔

ایپس کورٹیس - کانوں سے زرد یا سبز اخراج کان سے۔

کلکیر یا سلف - کانوں سے بدبودار اور پیپ دار اخراج گارھی اور خون آمیز پیپ کے ہمراہ۔

کاربوئیم سلف - کانوں سے خون آمیز بدبودار - ناگوار اور پیپ دار اخراج - کان سرنج  
کانوں کے پیچھے پھنسیاں - کانوں میں شور۔

کالی آئیوڈ - کان سے کافی مقدار میں گارھا سبز اخراج - مریض گرم ہوتا ہے جو ٹھنڈی  
افادہ عکس کرتا ہے۔

## کان کے پردہ میں سواخ

سیلشیا × ۲۰۰ - ہر پندرہ دن کے بعد یہ دوا دی جائے۔

ہیرپرفر - یہ چار چار گھنٹوں کے وقفوں سے چار دفعہ دی جائے سوائے سیلشیا والے

دن کے یہ کافی لمبے عرصہ تک یعنی چھ ماہ سے آٹھ ماہ تک دی جائے۔

میل -

کوئیم - کانوں میں میل کا اجتماع۔

پانچواں باب

# ناک اور گلے کی بیماریاں

ہنجرہ - حلق - گلا - اور - ناک وغیرہ !

بیلیئم - اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہئے اور ہر ہندپرہ دن کے بعد ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک دی جانی چاہئے۔ دوسری علامات کے مطابق ادویات کے ہمراہ جس دن یہ دوائی دی جائے اور اس کے دو دن پہلے یا دو دن بعد کوئی دوائی نہ دی جائے۔ اگر لیفنس نیوٹنس - غدود نماؤں کے لئے بہترین دوائی ہے یہ ۲ طاقت میں دی جانی چاہئے۔

کلکیر یا کرب - زرد موٹے بچوں میں جلن کے پاؤں ٹھنڈے اور رات کو سر پر پینے آئے کلکیر یا فاس - پتلے اور کمزور بچوں - زرد چہرے والوں - ہومیو پیتھک میں اس کی بہت سفارش کی جاتی ہے۔ بچہ چڑچڑا اور خدی ہو، بغیر کام کے پھینکے۔ کلکیر یا ایوڈ - بعض کیسوں میں ابھی یا سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ مرک ایوڈ - ایک اور دوائی جو غدودوں کے علاج میں یاد رکھنی چاہئے۔ بائیڈرائسٹس - غدودوں کے لئے مخصوص دوائی۔ بلغمی جھلی زرد اور اس کی بہت زیادہ لمبائی بریٹیا ایوڈائیڈ - اگر بچہ ذہنی طور پر کمزور ہو تو غدودوں کے لئے بہت کارآمد دوائی ہے۔ سٹس کین - کنڈھ مالا یا بخو یا خضاریر کی سوزش اور گلے کے غدود سے پیپ آنا۔ کوسے کے پیچھے شدید مین، خشکی دور کرنے کے لئے ننگے

### بیرونی علاج

بائیڈرائسٹس مدرنگہ ..... ۱۰ گرام

خالص کلیرین ..... ۴۰ گرام

مندرجہ بالا آمیسز سے ابھی طرح بھگوئے ہوئے روئی کے بھائے یا بڑے رات

کو سوتے وقت ناک میں دیئے جائیں یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے اور یہ خدو دھول کو کمزور کریں۔

## ناک سے خون بہنا

برائی اونیہ - یہ شاندار دوائی ہے سب سے پہلے دی جاتی ہے۔

ملی فولیم - یہ نیکیر کی عمومی دوائی ہے جبکہ اس کی وجہ معلوم نہ ہو اور جب برائی اونیہ ناکام ہو جائے۔

ٹریٹیم - ناک سے خون بہنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ جبکہ خون چکدار سرخ یا گہرا ہو اور لوٹھڑے دار ہو۔ اس کا مدر ٹنگو بہتے ہوئے خون کو جو ناک یا دانت میں سے بہہ رہا ہو اس کو بند کر دے گا۔

آرنیکا مانٹ - جب چوٹ کی وجہ سے ناک کا ٹھنڈا پن۔

امونیا کارب - صبح کے وقت منہ دھوتے وقت ناک سے خون بہنا۔

گرفیا ٹیس - جب خون نکلنے سے پہلے چہرہ اور کے ہلکے گردن پر سرخی ہو یعنی سر کی طرف خون کا اجتماع ناک سے خون بہنے کے ہمراہ۔

کوکولس - گہرا نارخون۔

ہیما میلس - جب خون گہرے رنگ کا ہو۔

میلی لوٹس - چہرے پر سفید اور شدید سرخی۔

فاسفورس - اکثر اور کافی زیادہ خون بہنا۔ خون بہنے والی طبیعت یا رجحان۔

آرم ٹریٹلم - متواتر ناک کو چھوڑتے رہنا حتیٰ کہ خون بہنا شروع ہو جائے۔

وائیرا - ناک سے خون بہنے کی بڑی دوائی اگرچہ بہت مدت سے خون بہہ رہا ہو۔

فیڈرم سلف - حیض سے پہلے حیض کے دوران میں اور بعد میں ناک سے خون بہے۔

کروٹیلس میور - بوڑھے اور تباہ شدہ صحت والے لوگوں میں ناک سے خون بہے جب

دوسری ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جا سکتی ہے۔ خون میں نقص سپرہ پر رُسغنی کے ہمراہ چکر اور بے ہوشی۔

امونیم میور۔ تھنوں سے خون کے پھیلنے۔

اگر کیس۔ ناک صاف کرتے وقت خون بہے۔

یو پی او نم۔ ناک سے خون بہے جب حیض رگ جمائے۔

آر سینک ایلم۔ ناک سے بہت خون بہے۔ جلندار درد اور ایمجان کے ساتھ۔

ایسجیورک۔ آچکدار سرخ خون اور جسم کے ہر حصہ پر اجتماع خون کیلئے مخصوص دوائی ہے۔

پلسٹیللا۔ دبے ہوئے حیض کے ساتھ ناک سے بہنے کے لئے کارآمد دوائی

ہے۔ ناک میں رکاوٹ اور سوزش، ذائقہ اور بوجھ جاتی رہے۔

مرک سال۔ ناک کی درد کرنے والی سوزش۔ گندی ناک والے بچے۔ اکثر اور بہت زیادہ نکیر۔

تھلاپی برسا۔ آہستہ ناک سے خون بہے۔ ناک کی جڑیں معمولی درد۔ خون اور مواد کافانی بہہ جانا۔

بووسٹا۔ صبح سویرے ناک سے خون بہے۔ ناک اور سر میں گر ٹرٹ۔

رسٹاکس۔ رات کے وقت ٹیڑھا کھڑے ہونے پر۔

## زکام۔ ٹھنڈ۔

دیجئے زکام حاد و مزمن۔ بخار کا ہی اور آتشک۔

اگر کیس۔ بغیر زکام کے ناک سے صاف پانی بہے۔

نیٹرم میور۔ پانی کی طرح کے شفاف اخراجات جو آبلوں کی طرح کی چھپیاں

پیدا کریں۔ ذائقہ اور بوجھ جاتی رہے۔

اکونائٹل - شروع میں یہ بہترین دوائی ہے، لیکن یہ حالت بغیر علاج کے گزر جاتی ہے  
ابتدائی درجہ مریض بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور ناک میں خشکی اور بھنجنا ہٹ کے ساتھ بے چینی -  
برائی اونیا - سر میں اجتماع خون کے ساتھ ناک بند - ناک سے سانس نہ لے سکے -  
چھاتی میں خشک کھانسی کے ساتھ درد فلو کے لئے شاندار دوائی ہے -

فیرم فاس - سردی زکام کے لئے مخصوص ہے، ابتدائی درجہ اور ۲۰ x ملا دی جائے -  
جیلسمیم - ناک سے سادہ گارٹھا مواد ہٹنے کے لئے اچھی ہے - اس میں چھینکیں،  
سرد درجہ کمر میں ٹھنڈک اور مسلسل درد مریض کست اور کمزور ہوتا ہے -  
آرسینک البم - اس میں پانی کی طرح جلد تار اور پتے اخراجات چھینکیں اور جیلسمیم  
کی طرح بازوؤں میں در دیں - فلو کے لئے بہترین دوائی ہے -

کاربو قچ - معدہ کی خرابی کی وجہ سے زکام - جب زیادہ گرم کمرے میں جائے تو  
چھینکوں کے ہمراہ زکام -

ایلیم سیپا - جب ناک سے جلن دار پانی اور آنکھوں سے سادہ پانی بہے - ٹیچوں کی  
دکھن اور تھکاؤ دش محسوس کرے - کھلی ہوا میں آفتاب اور گرم کمرے میں زیادتی - پھولوں کی خوشبوؤں  
اور حین لڑکیوں کے لئے محاسن -

یو فریزیا - ایلیم سیپا کے الٹ - دونوں میں آنکھوں اور ناک سے مواد کا اخراج -  
یو فریزیا میں آنکھوں سے اخراجات جلد تار اور ناک سے سادہ -

سورائینم - اس دوائی کے متعلق مزین زکام میں سوچنا چاہیے اور ا - ایم طاقت میں  
دی جانی چاہیے - اگر بہتری ہو تو کوئی دوسری دوائی دینے کی ضرورت نہیں - ناک سے  
پانی کا سا اخراج - گرد اور تبا کو کے دھوئیں سے زیادتی - ناک میں گدگدھری اور خارش -  
لائیکوپرسیم - گھرے باہر زکام میں زیادتی -

اپیکاک - دم گھٹنے کے دوران کے بعد زکام - زکام سے آواز کا مکمل جاتے رہنا -  
بخار کی آواز کی جھلیوں میں اجتماع خون -

لیٹھا مائینر۔ مزمن زکام جس کے ساتھ ناک کے پچھلے حصہ میں نزلہ کا لگنا۔ ناک کا گڑبڑ اور ناک کا بند ہو جانا۔

ڈلکا مارا۔ خشک زکام تھوڑی سی کھلی جگہ میں جانے سے زکام ہو جائے۔ بھیگنے سے یا اندازہ جگہوں پر رہنے سے کھلی ہوا اور رات کے وقت زیادتی۔ ٹھنڈے، اندازہ موسم میں ناک بند ہو جائے۔

پلسٹیللا۔ جب ناک سے گاڑھا زرد مواد ہے۔ یہ عموماً پٹکے ہوئے زکام کے لئے مفید ہوتی۔ پیاس کا نہ ہونا اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ زکام جس کے نتیجہ کے طور پر بڑا اور ذائقہ جاتا رہے۔

آرٹھریک آئیوڈ۔ یہ دوائی آرٹھریک آلبم کے آخری درجوں میں مفید ہوتی ہے۔ دونوں دوائیوں میں فرق کمی و بیشی کا ہوتا ہے۔ جبکہ آرٹھریک آلبم کا مریض گرمی میں یا گرم مٹی میں افادہ محسوس کرتا ہے۔ اور آرٹھریک آئیوڈ کا مریض گرمی سے شدت محسوس کرتا ہے۔

ہائیڈرائسٹس۔ اس دوائی کے تحت مواد گاڑھا۔ نہ بہنے والا۔ رسی دار۔ زرد خون آمیز اور جلن دار ہوتا ہے۔ ناک میں پھنسیاں یا ناسور ہو سکتے ہیں۔ کھلی ہوا میں افادہ ہوتا ہے۔ ناک بند۔ رسی کی طرح کا مواد ناک کے پچھلے حصہ سے گلے میں کھینچا جاتا ہے۔

سٹامپس۔ مزمن زکام کے لئے۔

سمبل۔ ناک اور حلق کا زکام۔

سینکلوئر یا نائٹ۔ ناک کے پچھلے حصہ کا زکام۔ سانس کی نالیوں اور منہ پر کا مزمن زکام۔

کلکریا سیلف۔ زکام کے پرانے کیس۔ کھلی ہوا میں افادہ۔ خشک زکام۔ ناک سے خون آمیز، پھیلنے والا، بدبو دار۔ پیپ دار، گاڑھا، زرد یا سبز مواد خارج ہو۔ ناک سے گندی بدبو۔

مرک کار۔ ناک کا زکام۔ گاڑھا۔ جلندار، چپکنے والا۔ اور خراش دار۔

**تھیرپون** - ناک کے نکام - فدی - کارٹھے زرد یا بنری اُبل زرد اخراجات - پھینکنے کے شدید۔  
**سلیٹیا** - پاؤں کا پسینہ دہنے کی وجہ سے نکام ناک -  
**سائپنس نائیگرا** - حاد زکام پھیکیوں اور آنسوؤں - ناک اور آنکھوں میں جلن - ناک میں خشکی یا  
 جلن دار اخراجات -

**ایوٹوم** - کارٹھا بنری اُبل ہنر مواد کا ناک سے اخراج - یہ جلاتا ہے اور پھیلتا ہے - مرض  
 فوڈا ہی لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے - جیت نکالیت ہوتی ہیں اور بہت بھوکا ہوتا ہے - دماغ کی  
 کھوپڑی میں ناک کی مانی میں سوزش - سونگھنے کی حس کا ختم ہونا - ناک اور حلق کی مانی کا بند ہونے  
 کی وجہ سے بہرہ بن - گلا بیٹھ جانا - ٹانسلر کا بڑھنا - چھوٹی خشک بھونکنے والی کھانسی - آدھنے  
 جیسا نفس - جلن اور دم گھٹنا -

**کالی ٹائیڈرو ایوٹ** - کارٹھا زردی اُبل اخراج - گرم کرے میں زیادتی - ناک میں کچا  
 زخم اور جلن - بیرونی ناک دبائے سے بہت دکھے - سارا چہرہ درد کرے اور مرض بہت بے چین  
 ہوتا ہے - کھلی ہوا میں چلنا چاہے - جو لے تھکاتی نہیں - اسے بری نہیں لگتی -  
 نکسو امیکا - گرم کرہ میں نگ بند ہو جانا -

**کاجوٹیم** - تھوکنے کا مسلسل حیران - کافی مقدار میں سفید کارٹھے مواد کو تھنوں سے  
 حلق کے راستے کھینچے -

**ٹائمرک الیڈ** - ناک کا نزلہ - ناک میں شدید خارش اور بندش کے ہمارہ - اخراج جلن دار  
 پانی جیسا رات کے وقت زرد - بدبودار - جلانے والا - اوپر کے ہونٹ کی سوزش کے ہمراہ  
 ہر سردی کے موسم میں نکام - جو نہی ایک زکام سے آرام کرتا ہے مدد لیتا ہے -  
 کافی -

**سٹس کینا** - مزمن ناک کا نزلہ - زیادہ مقدار اور شدید پھیکیوں کے ہمراہ جو سرد موسم میں  
 شدید اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے زیادتی - پیڑ کی زبردست خواہش - یلغی بھیلو پر اثر کرے  
 جو کارٹھا، زرد اور بدبودار مواد خارج کرتی ہیں - پرانا اور تکلیف دہ زکام - ناک اور بھاتی کو مٹا

کرنے کے بعد زخمی عسوی کرے۔ جب چھاتی اور ناک دوبارہ مواد سے بھر جائیں تو افاقہ ٹھکی ہو۔  
 میسپا۔ خشک زکام۔ نتھتے دکھیں۔ سوچے ہوئے، پھوڑے پھنسیوں والے، ٹپے بن  
 بند کرنے والے مواد کا اخراج، شور سے گانے اور خوشبوؤں سے بہت حساس۔ چیزوں کے  
 پکے کی بو سے جی متلائے۔

انٹم ہارٹ۔ چھاتی کا زکام جو سردی آنے پر مفید بلغم کے اخراج۔ کمزوری پسینہ اور ٹھنڈ۔  
 چہرہ کی زردی نیلاہٹ کے ساتھ۔

میسر پلفر۔ ناک۔ کان۔ گلا بچھو اور چھاتی کا زکام۔ کوئی بھی بلغم جھلی اس سے مستثنیٰ نہ ہو۔  
 زرد اور بدبو دار اخراج۔ نزلہ پھیکیوں۔ جب ٹھنڈی ہوا میں جائے تو پھیکیوں کے پہرہ بہتا ہوا نزلہ  
 ناک سے پانی جیسا بہتا ہوا نزلہ شروع ہو۔ اور آخر کار گارٹھے۔ زرد اور بدبو دار اخراج پرتشع  
 ہو۔ یا ختم ہو جائے گلے میں نکلے ہوئے درد ہو۔ جیسے کہ ککڑیاں چفتیاں ہوں۔ ہاتھ یا پاؤں  
 لمبرے باہر نکلنے سے تکالیف میں زیادتی ہو۔

میدو ریغم۔ ۲۰۰۔ ناک خد زکام۔ ناک پھیلے حصہ میں رکاوٹ بو کے نہ آنے کے ساتھ۔  
 سفید یا زرد مواد۔ یہ اس وقت آزمائی جائے جب دوسری ادویات ناکام یا ناکام ہو جائیں۔  
 مرک سال۔ گارٹھا بنری نائل زرد۔ جلن دار۔ متعفن اخراج جو ناک ہڈیوں کو متاثر کرے  
 ناک سے خون بہے۔ خون آمیز اخراج رات کے وقت زیادہ اور دن کے وقت افاقہ ہو۔

آرم آرمیکم۔ پرنے سخت زکام میں بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ ناک ہڈیوں کا نامور۔ نزلہ زکام  
 بہنے والا ہو یا خشک۔ خونی اخراج۔ متعفن۔ بدبو دار۔ بنری نائل۔ پیپ دار۔ گارٹھا یا پانی جیسا  
 پتلا۔ زرد رنگ کا۔

میگنیشیا کارب۔ خشک زکام جس میں منہ کے راستہ ہی سانس لیا جاسکے۔  
 امونیا کارب۔ خشک بند زکام جو رات کو زیادہ ہو۔ مریض منہ کھول کر سانس لیتا ہے،  
 ناک نہ صاف کر سکے۔ چھاتی کا زکام جو سردی کے موسم میں زرد بلغم کے اخراج کے ساتھ ہے۔  
 نیفتھلین۔ حاد زکام زیادہ مقدار میں پھیلنے والے اخراج کے ساتھ اور بہت زیادہ پھیکیں۔

فائٹولا کا۔ بہت زیادہ پریشان کن اور کافی دیر عرصہ سے زکام۔ طویل بخت، پرانا زکام۔  
 ناک ٹڈیوں کی تباہی کے ساتھ ناک کی مکمل بندش۔ جب سواری کرے تو لازمی منہ سے سانس لے۔  
 ایلنٹھس جی۔ نزلہ بہت زیادہ خراشدار پھیلنے والا۔ جلد زہاں بھی چھوئے تھکے دیکھیں اور  
 بچھ جائیں۔

کالی آئیوڈ۔ آنکھوں، ناک اور گلے کا مزمن نزلہ زیادہ ہنر پیپ کے اخراج کے ہمراہ جو  
 بعض اوقات بہت بدبو دار ہوتے ہیں۔ زکام تھوڑی سی سردی سے دوبارہ لگ جاتا ہے جس سے  
 ناک سرج ہو جاتا ہے۔ اور سوج جاتی ہے۔ ہڈی کا سوراخ۔ ناک میں سے بولے۔ بیٹھی ہوئی آواز یا  
 گلابیٹھا ہوا آواز بالکل ہی نہ رہے۔ گرمی سے اور لبتہ کی گرمی سے زیادہ ہو۔

کالی کارب۔ ناک کا کھلی ہوا میں کھل جانا۔ جلن اور سردی کے ہمراہ جو بہت شدید ہوتا  
 ہے ناک گرم کمو میں بند ہو جاتی ہے۔ جب ناک صاف کی جاتی ہے تو ناک صاف کرنے پر پردہ  
 سے افادہ محسوس ہو۔

کیڈیم ملٹرف۔ ناک کا نزلہ زکام جو ناک کی ہڈی کو ناسور کی وجہ سے تباہ کرنے تک پہنچتا  
 ہی جائے۔ ناسور، ہڈیوں میں دردیں، چھینک۔ زکام۔ پھوڑے اور پھنسیاں۔  
 بروٹیم۔ حاذ زکام، بہت چھینکیں۔ ناک میں جلن۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے  
 ٹھنڈ کا احساس۔ ناک سے خون بہے۔ ناک میں پھنسیاں۔ یہ جون جولائی کے زکام کے لئے  
 مفید ہے یعنی گرم موسم کا زکام۔

ایوٹن۔ زکام نزلہ کا رجحان جو گلے میں گرے، جو لوگ متواتر نزلہ زکام میں مبتلا رہوں  
 اور جن کے ناسلز بڑھے ہوئے ہوں اور سخت ہوں۔

یالم پیرو۔ سانس کی نالیوں کا نزلہ زکام۔ بہت زیادہ پیپ دار بلغم کا اخراج۔ کمزوری،  
 اور تپ دق۔

سینا۔ بار بار چھینکیں جو یا تھک کو گرم کردیں۔ ناتوانی اور خشک سے سانس لیں۔  
 ایوٹنا۔ مستقل نزلہ زکام کی حالت، ناک اور گلاب خشک اور بند۔ آنکھوں کے اوپر

ماتھے میں درد۔ ناک میں بڑے بڑے سبز پھلکے۔ نرسن نزلہ۔ نظر میں کمزوری جیسے کہ دھوئیں یا جھند  
میں دیکھ رہا ہو۔

## بخار کا ہی۔ بخار جو ناک اور گلے کو متاثر کرے (دیکھیے نزلہ کلام)

نیو بزرگوں کو لینیم۔ بخار کا ہی میں سب سے پہلے اس دوائی سے علاج کرنا اچھا ہوتا ہے، بعض  
اوقات حملہ کو کم کر دیتا ہے اور بعض اوقات مکمل صحت مند ہو جاتا ہے۔ پندرہ دن میں ایک ہی  
خوراک دیں۔ اس کے بعد چار شور رگیس دیجائیں۔ اس کے بعد ہر چھ ماہ بعد دی جائے۔  
تقریباً ۲ سال تک ۲۰۰ طاقت میں دی جائیں۔  
سورائینیم۔ جو مرضی سردی سے متاثر ہوں، ان کے لئے مفید ہے۔ ۲۰۰ طاقت کی ایک  
بطور عمل ان کے دوسری ادویات کے ہمراہ دی جائے  
سباڈیلا۔ زیادہ بہنے والا نزلہ اور شدید پھیپھیں جوڑنے کا نام نہ لیں۔ ٹھنڈ میں زیادتی۔  
دسے کی قسم کا بخار کا ہی۔

شکلا پلیمیریہ۔ جب براکٹیس کا رجحان بھی ہو۔  
سیکسینم ۲۰ ایک یا دو گزن پانی کے ۱۲ چلے گئے چھوٹے میں حل کریں۔ ایک چمچ ہر  
دو گھنٹوں کے بعد۔

آرسینک آئیوڈ۔ بہت زیادہ پھیپھیں اور کافی مقدار میں ناک سے جلندار پانی جو نوٹ  
کو جلاتا ہے۔ آنکھوں سے آرسینک الیم کی طرح جلندار پانی لیکن آرسینک الیم کا مریض گرم بیٹیوں  
اور ناک میں گرم پانی لے جانے سے اتفاق محسوس کرتا ہے۔ آرسینک آئیوڈ گرم کمرہ میں زیادتی محسوس  
کرتا ہے اور کھلی ہوا اور ٹھنڈی بیٹیوں سے اتفاق ہو۔

آرسینک الیم۔ پانی جیسا پتلا ناک سے اخراج، میحان اور پھیپھوں کے ہمراہ۔ بے چینی۔  
کوزنیکو کالی سلف۔ بہت زیادہ پھیپھوں کے ہمراہ۔ آنسو پانی جیسی رطوبت۔ ناک کی  
سرخی، بعض اوقات برانکائی دمر۔

مرک کالی آئیوڈ۔ پانی جیسی بہت زیادہ رطوبت۔ ناک سے پھینکوں۔ کھانسی اور آنکھوں سے پانی بہنا کے ہمراہ۔

سناپس ٹائیگر۔ بخار کا ہی زکام کے ہمراہ پھینکیں۔ آنسو۔ آنکھوں میں غارش اور جلن خشک ناک یا غشاء دار مواد ہے۔

کاربوئیج۔ پانی جیسا اخراج ہیجان کے ہمراہ جو پھاتی تک جائے، بیٹھے ہوئے اور دیکھے ہوئے لگے کے ساتھ۔

ایلیم سپیا۔ جب ناک سے پھیلنے والا اور آنکھوں سے سادہ پانی ہے۔ ایسا احساس جیسے کہ سحر ہو یا جحر کے نیچے کانٹے ہوں۔ گرم کرہ میں زیادتی۔

نیفتھلین۔ بخار کا ہی کے لئے مخصوص بطور حفظ یا تقدم اور علاج کے لئے۔ آنکھوں اور ناک سے پھیلنا رانی، پوٹے سو جے ہوئے۔ دئے کا رجحان۔

سلفر۔ بخار کا ہی یا آنڈوں، مکھن۔ جانوروں کی چربی پھلی وغیرہ سے الزحی کی وجہ سے دم۔ یہ دوائی بطور عمل انکیز استعمال کی جائے جبکہ اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔ پروں سے یا پروں والا سر بانہ استعمال کرنے سے بخار کا ہی۔

سپیا۔ صبح کے وقت بستر میں پھینکیں۔ بادل والے موسم میں، مجلس میں یا چھبڑی ظاہر کی جائے زیادتی۔ رشتہ داروں سے لاپرواہ۔ فرض شناس۔ پیاس نہ ہو۔ ٹھنڈی زیادتی۔ رشتہ داروں۔ بدبو دار سانس۔ چہرہ زردی مائل۔

یوفرنیریا۔ آنکھوں سے زیادہ مقدار میں جلن دار اخراج اور ناک سے سادہ پانی کا اخراج۔ آیوڈم۔ ناک سے گاڑھا بھری مائل زرد مواد۔ یہ جلاتا ہے اور پھیلتا ہے۔ مریض علامات ظاہر ہونے پر کمزور ہو جاتا ہے اور بہت جھوک ٹھوس کرتا ہے۔ بخار کا ہی کی دم والی علامات۔ سینگو نیریا۔ پھول مونگھنے یا خوشبوؤں سے بخار کا ہی۔ پھولوں سے حساس۔ ہاتھ پاؤں جلیں مریض انہیں آرام کے لئے بستر سے باہر رکھے۔

شیفگییر یا۔ پھینکیں زکام کے ہمراہ یا اس کے بغیر پہلے پہل گاڑھی رطوبت پھرتی رطوبت

ناک سے نکلے۔ عارض۔ سینے کی ہڈیوں میں تیز مار یک پھانسیں۔ پھاتی ہیں نگی۔  
 کلکیر یا فاس۔ بغیر زکام کے پھینکیں۔

کالی ہائیڈرو آئیوڈیم ناک کی دھکن اور جلن کے ہمراہ گارڈھا زردی مائل اخراج جس کی زیادتی  
 گرم کمز میں ہو۔ باہر سے ناک دباؤ سے بہت دکھے۔ تمام چہرہ بہت درد کرے اور مریض بہت  
 بے چین ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں چلنا چاہتا ہے جو اسے تھکاتی نہیں۔ بخار کا ہی کی دہر والی علامات۔  
 اوزینا۔ ناک مزمن بیماری بدبودار اخراج جس کا انحصار ناک پھنسیوں یا ناسور پر ہو۔  
 آئنگ کی ادویات کے نیچے بھی دیکھے۔

آرم میٹ۔ یہ چوٹی کی دوائی ہے۔ لشو کی گہرائی میں تباہی ناک ہڈی کا ناسور۔ بدبودار  
 اخراج پھیلانے والی درد۔ رات کو زبلیتی۔

آرم آر سینکلم۔ ناک کی مزمن بیماری ناک میں عارض اور نیش کے ساتھ۔ ناک ہڈیوں  
 میں درد، جلن اور پھیدنے کے ساتھ ناسور جیسی درد۔ اکثر پھینکیں۔ ناک سوچی ہوئی۔  
 ایپوزیم۔ ناک کی کڑی ہڈی کے ناسور کے مزمن کیس میں تھنوں کے درمیان کا گلا سٹرا  
 پرہ۔ تھنوں کے زچ کی ہڈی اور ناسور کی ہڈی۔

تھوجا۔ پتلے زردی مائل سبز اخراجات کے ساتھ مزمن نزلہ  
 مرک کار۔ ناک میں ناسور پھیلنے والا اخراج۔ خاص طور پر گارڈھا چپکنے والا ناک سے  
 اخراج ہو جو ہمیشہ جلندار درد کے ہمراہ ہو۔

مرک وائیو۔ ہڈیوں کی دھکن کے ہمراہ

میزریم۔ ناک اور چہرہ کی ہڈیوں میں جلندار درد کے ہمراہ

پٹرولیم۔ ناک کے پہلو میں ٹھوس یا پھلکے اور چیرے۔

پلسٹیل۔ زرد سادہ اخراج کے ہمراہ جس کی شام کے وقت زیادتی ہو۔

ہائیڈراسٹس۔ بہت زیادہ اور خونی اخراج پھنسیوں کے رجمان کے ساتھ۔

کلکیر یا کارب۔ ناک کی جڑ پر سوزش اور پھنسیاں۔ گارڈھے پیدا بدبودار اخراج کیساتھ۔

ٹیوبو کو لینم۔ یہ بطور عمل انجیزوی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات مرض ناک کی ٹیبا کی وجہ سے ہوتی ہے۔

کالی آیوڈ۔ آتشکی مزین نزلہ۔ ناک کی ہڈیوں کا گلنا شروع ہو چکی ہو جاتی ہیں۔ ناک کا کافی مقدار میں ہنہ اخراج۔

## ناک کا گوڑ

لمنا مائٹز۔ ناک کے گوڑ کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ ۹ طاقت میں استعمال کیجئے!

ٹیوبو کیلم۔ اگر ایک پہلو پر لیٹے تو ناک بند ہو جائے۔

سینگکو میز یا سی۔ جب بیمار سرد درجہ کے ہوا۔

تھوجا۔ ناک کا گوڑ۔ ناک کی لمبی نالی سوزش کے ہوا۔ بُری بو۔ پتلے ہنہ اخراج کے ہوا۔ جس میں سونگھنے کی جس نہ رہے۔

کلیر یا کرب۔ یہ دوزں بھی ناک کے گوڑ کے لئے  
نائٹرک ایسڈ۔ انتہائی مفید ہیں۔

الیومن۔ بایس طرف کی ناک کی نالی کا گوڑ۔

## ناک کی نالی کی شکل کا چھوڑا۔

کالی بائیکارب۔ سلیشیا۔ ۲۰۰ طاقت ہر پندرہ روز بعد دیجئے۔ دو دن پہلے اور  
سلیشیا۔ دو دن بعد کوئی دوائی نہ دیجئے۔ وقفے کے دوران سے

کالی بائیکرو میکم۔ ۲۰ طاقت دن میں چار دفعہ ہر چار گھنٹے کے بعد دیجئے۔

آیوڈیم۔ ناک کی نالی کا چھوڑا۔ گولی لگنے جیسی تھوڑے لگنے جیسی سر میں درد کے ساتھ اور نچلے جبڑے میں خاص طور پر نزلہ زکام کے حملہ کے دوران میں جس کی زیادتی آگے کی طرف جھکے پہرہ۔

کالی آیوڈ۔ ناک کی نالیوں میں پھارنے والا اور جھکے سے چبھنے والا۔ کھودنے والا اور مسلسل درد والا نزلہ زکام بار بار ہو۔ ناک سرخ اور سوجی ہوئی۔ اخراج گاڑھا سمندر اور بدبودار۔

## گندی بو

اینا کارڈیم۔ بو بدترین۔  
سیلشیا۔ ناک کے زکام میں۔  
ہمپسلفر۔ پرانے پنیر کی طرح کی بو۔  
مرک سال۔ حلق کا زکام نزلہ۔ پرانے نزلہ زکام میں۔  
کالی بایکارب۔ گندی بو پانی جیسے اخراج کے ہمراہ۔  
آرم میٹ۔ جب ناک صاف کرے تو گندی بو آئے۔  
سلفر۔ گھناونی بوؤں کا نکار۔ گھناوانا سانس یا گندا، بہت ہی بدبودار یا خاندہ۔  
اعضائے تناسل سے گندی بو۔ جو اس کے کپڑوں کے علاوہ کمرے میں سونگھی جاسکتی ہے۔  
تمام اخراجات بدبودار اور خراشا دار۔ گندی شدید بدبو کے ہمراہ۔ دھونے کے باوجود نفل میں سے چبھنے والی گندی بو آئے۔

## لوکم ہو یا نہ ہو

الیومنا۔ بو کی حس گھٹی ہوئی۔ بہنے والا زکام نزلہ۔ ناک کے سر کی نوک چری ہوئی  
نتفخہ دھکیں اور سرخ ہوں، بھونے پر زیادتی۔ گاڑھے زرد مواد کے ہمراہ پھلکے۔  
آرم میٹ۔ پوشیدہ آتشک کی وجہ سے ناک کی خرابی میں بو کی حس گھٹی ہوئی۔ مزمن نزلہ۔  
آر جنیم ٹائٹریم۔ ٹائیٹائیڈ بخار میں بو کی حس گھٹ جائے۔

مینریم - ناک کی خشکی کے ہمراہ بو کی حس جاتی رہے۔  
مرکلا - گلے کی دھن کے ہمراہ گلے کی دھن۔

پسٹیل - زکام کی وجہ سے بو کی کمی  
نیٹرم میور - جب گاڑے مواد میں پسٹیل ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔  
کیوپرم میٹ - پیشانی میں نزلہ زکام۔  
الیس - برانے نزلہ میں ناک کی بھلی کی سوزش۔

تھوجا - ناک سے بدبودار سبز اخراج کے ہمراہ ناک کی نالیوں کا پھوڑا،  
بو کا جاتے رہنا۔ ٹھنڈے درم ناک۔  
بنیزواک الیڈ - سونگھنے کی حس کا نہ رہنا، احساس جیسے کہ ناک پر ٹپیں کیڑا رہے۔  
کالی آیوڈیم - بو کی حس کا نہ رہنا۔  
میگنیشیا میور - نزلہ زکام کے بعد واقعہ بو کی حس کا نہ رہنا۔

### بو سے بہت زیادہ حساس۔

گرفایٹس - پھولوں کی خوشبو سے حساس۔ خوشبو بہت زیادہ معلوم ہو۔  
کالچیم - خوراک کی بو اسے آپے میں نہ رہنے دے اندوں کی بو متلی اور قے لاتی کرے۔  
بیلادونا - تمباکو کی بو۔

سلفر - عمل انگریز دوائی کے طور پر عموماً بہت ہی حساس خوشبوؤں کے لئے۔  
فاسفورس - تیز خوشبو میں کھانسی کا باعث نہیں۔ پھولوں کی خوشبو سے بہوش ہو جائے۔  
سیسیا - پکانے کی بو متلی کا باعث بنے۔

سلیفوک الیڈ - کافی کی بو کے لئے بہت ہی حساس۔  
نکس و امیکا - پھولوں کی خوشبو سے جکڑے۔

## بُو کے وہم

سلفر۔ بُو کے وہم کے لئے اس دوائی سے کشورج کیجئے! اگر یہ کام نہ کرے تو

مندرجہ ذیل علامات کے مطابق دی جاسکتی ہیں۔

گریفائیٹس۔ جملے ہوئے بالوں کی بوکا وہم۔

اینا کارڈیم۔ جملے ہوئے اسفنج اور مرغیوں کی پیٹھوں کی بوکا وہم۔

کروٹن ٹانگ۔ پاخانہ کی بوکا وہم۔

چائنا۔ مُردار کی بوکا وہم۔

بیلادونا۔ گھٹے مڑے اندوں کی بویا مچھلی کے چورے کی بو۔

پلسٹیللا۔ پرانے بدبودار نزلہ کی بوکا وہم۔

کلکیریا کارب۔ گلی مشی کھاد کی بوکا وہم۔

یوفوریم۔ چوہے کی بوکا وہم۔

سینی کولا۔ بچے کے اعضائے تناسل سے مچھلی کے چورے کی بوکا وہم، نہانے کے بعد

بچے کے حصّہ مچھلی کے چورے جیسی بو دیں۔

چھینکیس، خراٹے۔ (دیکھئے بخلا کا ہی)

لمنا مائزر۔ ناک میں بندش کیوجہ سے خراٹے۔ ناک کی ہڈیوں کی بڑھوتری کی وجہ سے

ہیپوزیم۔ ناک کی سوزش اور سُرخی۔ خراٹے۔ ہندئی نزلہ زکام کے ہمراہ۔ کڑی ہڈیوں کا

ظاہر ہونا۔ ریڑھ کی ہڈی کا ناسور یا اس کا بڑھ جانا۔

اوپیم۔ درمیں مرگی میں غشی۔ زچگی کے تشخ۔ کھلے منہ کے ساتھ۔ چہاتی میں اجتماع

خون کے ساتھ خراٹے۔

پلسٹیللا۔ بے قاعدہ درد زہ کے تشخ کے بعد خراٹے۔

## دھبے

سلفر - بھورے اور سیاہ دھبے ناک پر۔  
سپیا - ناک پر زرد کاٹھی۔

## حلق - گلا۔

دوسرا حصہ

تنگی تنفس اور گلے کی دکھن دیکھئے۔ گھٹنا یا بند ہونا۔  
کیمومیللا۔ جب حلق میں کوئی چیز پڑھتی ہوئی معلوم دے۔ جیسے کردہ دم گھٹ جائے۔  
سپائیللیا۔ ناک کے پھلے حصہ سے کافی مقدار میں مواد کی وجہ سے دم گھٹے۔  
لیکس۔ جیسے کہ کسی نے پکڑ رکھا ہو جس کی وجہ سے دم گھٹے صبح اٹھنے یا  
بیدار ہونے پر زیادتی۔ دورے دار۔ گرم مشروب نگلنے پر گرم جائے نگلنے پر اگر گرم شراب  
نگلنے پر زیادتی۔

کیکٹس۔ دل کی تکلیف کے ہمراہ دم گھٹے۔

مینفائٹس۔ کھاتے وقت یا پیتے وقت دم گھٹے۔

ایسڈ نائٹرک۔ کھاتے وقت یا پیتے وقت پھوٹا سا ذرہ حلق میں چپکے جیسے کہ  
حلق ہو گیا ہو۔ دم گھٹے۔ بڑی مشکل سے نکلے چہرے کو بگاڑ دے اور سرینچے کی طرف ہٹ جائے۔  
سکوما داٹروما۔ حلق میں تیزی ہڈی کے ٹکڑے یا کسی اور زخم کی وجہ سے گلابند ہو جائے  
گلا گھٹے اور دم گھٹنے کا ڈر ہو۔

میگنیشیا فاس۔ گلے میں دورے دار تنگی کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس۔ پہلے  
ٹانسا لہ کا بڑھ جانا تب چھت کی سرخی خشکی مشکل سے نکلے۔

میڈوریئم۔ سانس کی نالی کے تشنج۔ بخیرہ میں کٹ کٹ کی آواز کے ہمراہ۔ ہوا مشکل سے  
باہر خارج کی جائے لیکن اندر لے جانی جائے۔

برومین - سانس کی نالی کا تشخ -

## کروپ کھانسی

غیر خفاتی -

درم ہنجرہ بھی دیکھئے

کونائٹ نیپ - مرض کے شروع میں - نکلنے وقت گلے میں تکلیف خشک گہری  
جھونکنے والی کھانسی - تیز بخار - بے چینی - ڈرا ہوا - گلے اور ہنجرہ میں جلن - ٹھنڈے پانی  
کی چاہت یا خواہش جس کو نکلنا مشکل ہو -

سپونجیا - گلابیٹھا ہوا کروپ کھانسی - درم ہنجرہ کے ساتھ کھانسی ایسے عسوس ہو -  
جیسے کہ لکڑی تیز پر آراجل رہا ہو -

کالی بانیکرو میکم - تنگی و تنفس گلابیٹھا ہوا - کھڑوری کھانسی - سانس کی آواز جیسے  
کہ دھات کی نالی میں سے ہوا گزر رہی ہو -

بیلادونا - جھونکنے والی کھانسی جب کھانے تو ہنجرہ سرخ ہو جائے - جلد گرم خشک  
بھر پور تیز نبض - سو جے ہوئے سرخ ٹانسنز -

سیلگونیر یا سی - جب ہنجرہ میں جلن اور خشکی ہو - بھاری کروپ کھانسی - غر خراپٹ اور  
سیٹی دار سانس - سیٹی دار کھانسی -

ہیمپریسلفر - ٹھنڈی ہوا لگنے سے کروپ کھانسی اور درم ہنجرہ کے اکثر حملے - گلابیٹھا ہوا -  
خشک جھونکنے والی کھانسی - سیٹی دار سانس - کھڑکھڑاتی ہوئی اور دم گھٹنے والی کھانسی - صبح کے  
وقت زیادہ - بچہ کا کھانسی کے دورے کے وقت دم گھٹے -

فاسفورس - جب گلا کافی دیر تک بیٹھا رہے - مرض دورے کے آثار دکھائے -  
انٹیمٹارٹ - ٹھنڈا جھرو - نیلا - جو ٹھنڈے پینے سے تیز ہو - نبض سست آواز بے آواز  
آرا چلنے جیسا تنفس جیسے کہ ہوا کے راستے رطوبت سے پر ہوں جو باہر نہ نکلے -

سمبوکس - آدھی رات کے وقت کروپ کھانسی کے دورے شدید غر خراپٹ والی کوسے

کی مٹی آواز والی اور دم گھٹنے والی کھانسی۔

لیکس۔ گلے کا ناسور۔ سرخ، سیاہی مائل، دھندلا سا۔ خالی نگلنا مشکل نسبت  
خصوص چیزوں کے بچھڑے پتے تکلیف محسوس کرے۔ شدید کمزوری۔

## خُتاق

لیکس۔ ناک سے تھلا خراشدار پانی ہے۔ گلا گہرا سرخ۔ گہرا بھورا نیلا ہٹ کے  
ساتھ۔ جھلکی بائیں طرف نمایاں جب مرض دائیں طرف کو جائے۔ گردن کے غدودوں کی سوزش  
اؤنگھ۔ بغض باریک۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ سونے کے بعد زیادتی۔ تپل مشروبات اور تھوک کا  
نگلنا مشکل۔ ہر دو گھنٹے کے بعد ۲۰ طاقت میں دیجئے۔

لیک کینیم۔ لیکس کے خلاف سیاہی اطراف بدلتی رہتی ہے، اکثر بائیں طرف کو۔ دکھن  
اور سوزش۔ اچانک مخالف سمت میں چلی جاتی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد پہلی جگہ آجاتی ہے۔  
بھلی بصورتی زرد اور دہی کی طرح۔ اگر بھنپیاں بن جائیں تو وہ شیشے کی طرح چمکیں گلے کا مایہ  
پس مشروبات پینے پر ناک میں پلے جائیں۔

میلادونا۔ گلے کی سوزشی حالت کے لئے۔ شدید تکین والی درد، سرد درد۔ تسخ

اور اینٹھن۔

کروٹیلکس۔ جب متواتر خون ناک سے بہے۔ جو منہ کی بلغمی جھیلیوں سے خون نکل اور سترائے۔

ناجا۔ جب بچھڑے پر حملہ ہوا ہو۔ مریض گلے کو کپڑے دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ۔

بدبودار سانس۔ چھوٹی گلا بلغمی ہوئی کھانسی، بچھڑے میں دکھن کا احساس یا نالی کے اوپر کا  
حصہ دکھن محسوس کرے۔

لائیکوپوڈیم۔ ۴ بجے سے ۸ بجے شام زیادتی مرض۔ دائیں طرف زیادہ متاثر ہوتی ہے۔  
بچہ نیند سے ڈرا ہوا اٹھتا ہے۔ ناراض اور جڑ پڑا ہوتا ہے۔ نفعوں کی بکھوں کی طرح حرکت  
اس کی نمایاں ترین علامت ہے۔ گلے میں تنگی کا احساس، کوئی چیز نیچے نہ جائے۔ خوراک اور

مشروبات واپس ناک تک جائیں۔

ایپس۔ جب گلے میں سوزش ہو، ڈنگ لگے۔ جیسے درد کے ساتھ۔ یہ شدید درد والی یا بغیر درد کے سوجن ہو سکتی ہے۔ گرمی سے زیادتی۔ زبان کے کنارے پر دھبے۔ اونگھ اور بے ہوشی۔ بڑھا ہوا کوا۔ پھولا ہوا چمکدار، سُرخ چمکدار جھٹے۔ پیشاب کم مقدار میں آنے لگے۔ سوجن بڑھ کر مرگ سائٹس۔ نقصان رسانی میں سخت بُرے کیسوں میں۔ اچانک خناق کا حملہ شدید کمزوری۔ حالت نزع۔ پھوٹی تیز اور وقفہ وار نبض۔ بھلی بڑی مائل اور کافی جگہ گرتی ہوئی ناک تک پھیل جائے۔ ایکس ایم یا سی ایم طاقت کی طرف ایک خوراک دے مگر برومسم۔ جب زیادہ گرمی یا گرمی کے موسم میں بچے کو لیٹنے سے رات کے وقت۔

دقیقہ ہیرسم۔ یہ بطور عمل انگریز دوائی کے استعمال کی جگہ چاہیے۔ علاج اسی دوائی شروع کرنا چاہیے۔ یہ ۲۰ طاقت میں دی جانی چاہئے۔ ناک سے خون ہے شدید کمزوری کے ہمراہ شروع میں تقریباً حالت نزع جیسی حالت۔ نبض کمزور۔ تیز اور قوت حیات کمزور۔ بغیر تکلیف کے نکلے۔ لیکن مشروبات تے کر دے یا ناک کے ذریعہ واپس کر دے۔ سانس اور اخراجات بہت ہی بدبودار۔ فائیمولا کا۔ جب درد گلے سے کانوں تک جائے۔ نکلے وقت۔ جب نکلے تو زبان کی بڑ پر بہت درد۔ جلن جیسی محسوس ہونے کو ملے یا آگ یا گرم سُرخ لوبے سے ہو خشکی نکلے میں مشکل کا نپتے ہاتھوں کے ساتھ۔ گلے میں گولے کا احساس۔ لگاتار نکلنے کی خواہش، گہری سُرخ نیلی یا راکھ کے رنگ جیسی بھٹی۔ گرم مشروبات نہ پنی سکے۔

جلیسمیم۔ خنقی فالج کے لئے شاندار دوائی ہے۔ تکلیف خواہ کہیں بھی ہو خناق کے نتیجے پر جلن کا فالج۔

آرم ٹرافلیم۔ جلن اور تنگی منہ اور گلے کی دکھن۔ ناک سے خواہشدار اخراجات جو نتھنوں اور اوپر کے ہو کو پھیل دے۔

کینتھرکس۔ کئی بار پیشاب کرنے سے پہلے، دوران اور بعد میں جلن۔ پیشاب میں البیومن۔ خون یا بھلے سے ہوتے ہیں۔

کالی بائیکرو میکم۔ جب چھیننے والی، وقفہ دار، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والی بہت چھوٹی جگہ پر کوزر ہو سکیں۔ زبان زردی مائل بھوری، فرے ڈھانچی ہوئی ہو۔ کوٹھیلہ گلے میں ڈاٹ کے احساس کے ساتھ۔

میوٹرک لیڈ۔ پھیلی ہوئی گلے گہری سرخی۔ ٹانسل اور حلقوم یا زخرو سوجا ہوا۔ نکلنے کے ناقابل آواز بیٹھی ہوئی۔ پچھلے جڑے کے غدد سوجے ہوئے۔ گہرا سٹرا ہوا خون ناک سے اگرچہ بخار زیادہ نہیں ہوتا لیکن کمزوری بہت ہوتی ہے۔  
 ٹائٹرک لیڈ۔ کھانا پینا علی طور پر ناممکن۔ رسا ہوا مواد کوٹے کو ڈھانپ لے چھین جیسے کے نوکدار لکڑی سے۔ شیشے کے ٹکڑے سے یا گرم تار سے۔ تھوک، بخار، کمزوری اور کھانسی۔ پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب جیسی تیزبو آئے۔

## آواز کا بیٹھ جانا۔ حاد

آرٹیکا مانٹ۔ آواز کے استعمال کی وجہ اس کا بیٹھ جانا جیسے کہ داغلوں میں لگانے والوں میں اور مقررین میں۔

آرم ٹرائفلم۔ زیادہ کام لینے اور زکام لگنے۔ پبلک کے مقررین بولی دینے والے۔ اداکار اور گلنے والے۔ اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے۔ ہوا کے بھونکنے سے زکام میں مبتلا ہو جائیں اور آواز بیٹھ جائے جو کہ اس دوائی سے فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔  
 سپونجیا۔ جیسا کہ آرم ٹرائفلم میں۔ ہنجرہ پھونکنے سے حساس اور نکلنے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان علامات کے ساتھ سپونجیا اور آرم ٹرائفلم میں اول بدل کر دیکھ جاتی ہے کھلی ہوئے آواز کا جلتے رہنا۔

جیلیسیم۔ جب ہنجرہ مکمل طور پر نالغ زدہ ہو جائے۔ ہسٹریا یا کسی اور وجہ سے اعصابی طور پر آواز کا بیٹھ جانا۔ حیض کے دوران آواز کا بیٹھ جانا۔

پلمیم۔ جب چٹسیم ناکام ہو جائے تو اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ کاسٹیکم زیادہ مدد نہیں کرتا۔ آواز کے پٹھوں کے نالاج کی وجہ سے۔ آواز بیٹھ جانے کے پرانے کس۔

بیلڈرونا۔ گلے میں اجتماع خون کی وجہ سے، درم برہم شدہ آوازیں تکلیف کیوجہ سے۔ کاسٹیکم۔ آواز کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ آواز کے بیٹھنے کی تکلیف زیادہ صبح کو تھوڑا سا سہوڑا۔ سوزش اور مواد کے اکٹھے ہونے کیوجہ سے آواز میں رکاوٹ۔ کھلی ہوا لگنے سے آواز کا نہ ہونا۔ بہت زیادہ لیسڈار سپینڈ اور جلد کے انتہائی ریمان کی وجہ سے۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ شام کے وقت آواز زیادہ بیٹھے۔

ریو میکس۔ سخت لیسڈار مواد کے زیادہ اکٹھے ہو جانے کی وجہ اور بخیرہ کے متواتر ٹھہرنے کی وجہ سے۔

برومیم۔ زیادہ گرمی لگ جانے سے آواز کا بیٹھ جانا۔

مرک سال۔ آواز بیٹھنے کے مخصوص دوائی ہے۔

اپریکاک۔ آواز کا مکمل طور پر بیٹھ جانا یا بخیرہ میں مواد لگنے کی وجہ سے۔

انٹم کرڈ۔ گرمی لگ جانے کی وجہ سے آواز کا جاتے رہنا۔

اگنیشیا۔ ہسٹریائی کیسوں میں آواز کا جاتے رہنا۔

کالی میور۔ زکام کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا۔ چپکنے والی سخت مواد۔ خشک اکٹوپ

اور بھونکنے والی کھانسی۔

بریا ایوڈ۔ رکاوٹ کی وجہ سے آواز کا جاتے رہنا۔

سڈیگا۔ تنگی تنفس کے ہمراہ آواز کا بیٹھ جانا۔ البیومن والے مواد کا زیادہ جمع ہو

جانا۔ چھاتی میں جلن۔ درد اور سوئیاں چھنا۔

لیکسس۔ صوتی پٹھوں کے نالاج کیوجہ سے آواز کا بیٹھ جانا۔

مینٹھا پیرٹیا۔ اونچا بڑھنے سے آواز کمزور ہو جائے۔ یہ گانے والوں کی مدد کرتی

ہے تاکہ آواز بیٹھنے نہ پائے۔

الیومنا۔ گانے والوں اور بولنے والوں میں آواز کا بیٹھ جانا۔ رکام، نزلہ کے گلے میں  
گرنے سے جب بولے یا گائے، آواز کا پھٹ جانا یا بیٹھ جانا یا آواز کے زیادہ کام کی وجہ سے۔  
الیومن۔ آواز مکمل طور پر جاتی رہے۔ آواز کا مزمن طور پر جاتے رہنا۔ یہ سب تازہ رکام  
کی وجہ سے ہو۔

رستاکس۔ آواز کا بیٹھ جانا جس کو بولنے سے انا قہر جھپائی میں پھیلنے کا احساس۔  
سانس دبا ہوا اور شدید پھینکیں۔ آواز کچھ دیر استعمال کرنے پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بولنے  
یا گانے کی صرف ابتدا میں آواز کا بیٹھ جانا۔  
کار بوقرچ۔ بخار کا ہی کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا اور گلے میں دھن۔ پانی کی طرح کا  
اخراج جھاتی تک پیمان کے برابر۔

سمبوس نایبگرا۔ آواز کا بیٹھ جانا۔ گہری خالی کھانسی کے برابر۔ جھاتی میں دباؤ۔  
اکثر جھاتی جمائیاں لے سبے چینی اور پیاس۔  
پلسٹیللا۔ جب آواز مکمل طور پر جاتی رہے۔ ڈھیلی سی کھانسی کے برابر ناک سے گاڑھی  
زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج۔

کوکا۔ آواز کا جلتے رہنا۔ بولنے کے بعد آواز بیٹھ جائے۔ ہر نصف گھنٹہ کے بعد پانچ یا  
چھ قطرے درنیکھر کے دیکھ آواز کو استعمال کرنے ۲ گھنٹے قبل یہ عمل شروع کریں۔  
میلنڈریم۔ چھوٹی چھپک یا بڑی چھپک کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا۔  
اکونائٹ این۔ سرد خشک ہوا لگنے سے آواز کا جلتے رہنا۔

سنا۔ آواز کا بیٹھ جانا جب ٹھنڈی ہوا لگے۔ جب اکونائٹ، ناسفون اور سوئیچا نام ہوائیں  
سٹر امونیم۔ بولنے کی طاقت نہ رہے۔ صرف ڈھیلی ہوئی، ٹوٹی چھوٹی آواز جو دھن کے  
ساتھ ہوسے بدل کر بول کے۔ کوپ بھونکنے والی کھانسی۔ شدید تشہق جو کچھ کچھ لگے۔  
ابروینیم۔ گتھے کی وجہ سے بخوروں، کانٹھوں میں درد کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا۔  
آر جنٹلمیٹ۔ مقررہ کی آواز کا بیٹھ جانا یا پیشہ ور گانے والوں کی آواز کا بیٹھ جانا۔

گانے والوں کے حلقوں کی مزمن سوزش۔

کلکیر یا فاس۔ آواز کا بیٹھ جانا، مریض کو بولنے سے پہلے یا گانے سے پہلے حنجرو سے طوبت صاف کرنا پڑے۔

آر جنٹم ٹائٹ۔ گانے والوں میں ہنجرو کی مزمن سوزش۔ اونچی آواز نکالنے پر کھانسی۔  
میگنم۔ اگر آر جنٹم ٹائٹ کے حکام ہو جائے تو مقررہ دنوں اور گانے والوں کے لئے حرجان کن  
دوائی ہے۔ گلے میں طوبت کا اجتماع جتنی صاف کرے اس سے زیادہ بن جائے۔

انگرا لک السیڈ۔ دل کی تکالیف کے ساتھ آواز کا جاتے رہنا۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ  
اول بدل کر آواز کا جاتے رہنا۔

## آواز کا بیٹھ جانا۔ مزمن

بریٹیا کارب۔ آواز کا بیٹھ جانا۔ آواز کا بیٹھ جانا کھانسی کی وجہ سے۔ ہوا کی نالیوں  
میں بلغم کا اجتماع کی وجہ سے آواز کا جاتے رہنا۔ زبان کا فالج۔ مزمن کیس۔

کاربو ورج۔ ضدی قسم کے کیس۔ صبح و شام اور بولتے وقت زیادتی۔

ہیمپ سلفر۔ آواز کا مزمن طور پر بیٹھ جانے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ خاص طور پر

جب مریض میں پارہ کی اندویات، دوران علاق استعمال کرائی گئی ہوں۔ آواز کا جاتے رہنا اور  
خشک کھانسی جھونکنے والی، جوانوں میں صبح و شام یا جب ٹھنڈی ہوا میں جائیں۔

سلفر کیس کو مکمل کرنے کے لئے

کلکیر یا کارب دیئے جانے چاہئیں، بعض کیسوں

سلیشیا۔ میں یہ ناگزیر ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کو آزیایا جاسکتا ہے۔

سینشو آرس۔ حیض کے دنوں سے آواز کا بیٹھ جانا۔

فالج

ڈیفیریا۔ ڈیفیریا کے ساتھ گلے کا فالج جب شروبات پیئے تو ناک کھراتے واپس آجائیں۔

## حلقوم کی سوزش

بیلادونا۔ نیبون اور کوس کا مہیلا ہو جانا۔ گلے میں کالی مچھلی کا احساس ہونا۔  
سینگونیر یا نائٹرکیم۔ دائیں طرف کی گلے کی سوزش زیادہ۔ غزن کیسوں میں گلے کی سوزش۔  
گوانیکم۔ بعض اوقات یہ درد ختم کر دیتی ہے۔

زنکم میٹ۔ جب گلے کی سوزش شراب، تمباکو یا کسی اور سبب سے ہو۔  
فائیولا کا۔ گلاب مرخ یا نیلا مرخ، کھڑا، تنگ اور گرم محسوس ہو۔ کانوں میں گولی  
لگنے جیسی درد، پانی بھی نہ پی سکے یہ گنٹھیاوی دردوں کو بھی دور کرتی ہے۔  
ٹمس کیناڈینس۔ یہ گلے اور ناک سے نکلتی ہوئی سوں سوں کی آواز کیلئے بہت اچھی ہے۔

لڑی بلغم کا اخراج۔ حلق میں بلغم کا گرنا اور اسے کھرتے رہنا۔ بعض اوقات گلے میں ریت کا  
احساس۔ گلے کی خشکی اور گرمی۔ مریض کو اکثر پانی پینے کے لئے مجبور کرتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں  
سانس لینا تکلیف کو زیادہ کرتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے متاثر ہونا اس دوائی کی نمایاں ترین علامت ہے۔  
سینگونیر یا کین۔ بلغمی تھلی کی سُرخ اور ہموار پن۔ چمکدار اور دائرش شدہ ہونا۔ تھوک کی  
کمی کے ساتھ۔ یہ دوائی مندرجہ بالا علامات کے لئے جو مادی ہوں یا مزین بہترین دوائی ہے۔  
کالی میور۔ کیسوی سوزش گلا کے لئے بہترین ادویات میں سے ایک ہے۔ بھوری یا  
سفید مواد نکلنے کے ہمراہ۔ ٹانسلز سوجے ہوئے اور پھولے ہوئے ناسور کے پھولے ہوئے ہمراہ

الیومنا { یہ دونوں ادویات خشک زکام،

الیون { گلے کی سوزش تھوک کی کمی کے ہمراہ۔

لائیکوپوڈیم۔ خشک زکام کے لئے بہترین ادویات میں سے ایک ہے۔ ناک رات  
کو بند ہو جائے۔ تھوک یا مواد نہ ہو۔

سکسپال۔ سادہ اور مزین خشک زکام، ناک کی جڑ میں دباؤ اور بھڑکے احساس کے  
ہمراہ، ناک صاف کرنے کی مستقل خواہش۔

و تھیا۔ مزمن گلے کی سوزش اور حلق کی سوزش، جہاں صاف ہونے کے لئے متواتر گلا صاف کرنے کی خواہش ہو۔ بہ طاقت میں دی جائے۔

سیسیا۔ ننگے پر گلے میں چھنے والی اور خراش دار درد۔ جب بولے اور گائے تو آواز بیٹھ جائے۔ بلغم کا کافی اخراج بعض اوقات خون ملی بلغم یا خونی لکیر والی بلغم اور مشکل اور زور لگا کر اکھاڑی جاسکے۔

کالی بائی۔ گلے کے زیادہ بڑھ جانے کے لئے بہترین دوائی ہے۔ بھلی کی ہڈی کا احساس گلے میں کھنگارنے کے ساتھ۔

### حلق کی سوزش۔ مزمن

مرک سال۔ دکھنے والا۔ پرورد۔ جھمن دار دلد اور جلنے والا گلا۔ موسم کی تبدیلی پر پھنسیاں سی ظاہر ہوں۔ متواتر ننگے کی خواہش۔ آواز کا جاتے رہنا۔ بلبو دار ناس۔ مرک کار۔ گلا سرخ خشک سوجا ہوا۔ سخت گھٹن کے احساس کے ہمراہ، کواٹو ماہوا۔ ننگے میں وقت۔

آر سینکم آیوڈ۔ جب غیر موافق حالات ٹی بی کے پس منظر کے ساتھ۔

کالی بروم۔ حلق کی نامافقی کی حالت میں۔

کالی آیوڈ۔ حلق میں شدید پھیپھان کے ساتھ۔

آر جنٹیم میٹ۔ گانا گانے والوں کے گلے کی مزمن سوزش۔

کالی بائیکرومیکم۔ مزمن گلے کا ناسور۔

### نزلہ وی۔ نزلہ کی وجہ سے گلے کی سوزش

آر جنٹیم ٹائٹرکیم { یہ دی گئی ترتیب میں دی جانی چاہئیں۔  
الیومنا۔

کلکیر یا آئیوڈ - خناری اور موکھاسان کی طبیعت والے لوگوں کے لئے۔

بیٹیشیا - گرمی کوئی نکلے۔ ہڈیوں کے یا نکلپوں کے نکلنے کا احساس۔ مریض ہمیشہ اپنے گلے میں ہڈیوں اور مچھلی کی ہڈیوں کا احساس کرتا ہے جو کہ وہاں نہیں ہوتا۔ بیٹیشیا اس احساس کو مٹا دیتا ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے تو درج ذیل ادویات دیجئے۔

انگیشیا - یہ گلے میں رکاوٹ کے احساس کے لئے شاندار دوائی ہے۔  
سٹس کینا - حلقوم - گلے اور ناک میں ٹھنڈک کا احساس۔

## گنٹھیاوی گلے کی سوزش

لائیکو لورڈم - حلقوم یا گلے چھوٹے پٹھوں کا گٹھیاوی درد۔ نکلے میں تخیف یا دقت یا گلے کو تھوڑا سا جھنجھٹانے سے، بلغمی بھلی زرد۔ سوزش نہیں ہوتی۔ گلے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن گنٹھیاوی تاریخ، تشخیص مرض کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

سوچا ہوا - دکھتا ہوا

بیلا ڈونا - حاد کیسوں گلے میں اجتماع خون اور مرنجی۔ گلے کی خشکی۔ ٹانسلز بوجھے ہوئے اور بڑھے ہوئے۔ دائیں طرف کی سوزش اور دھن اور درد دائیں کان تک بڑھے۔ سب باڈیلا۔ گونے یا کسی اور چیز کا احساس جس کو مریض متواتر نکلنے کی کوشش کرے۔ گرم مشروبات سے آفاقہ ہو۔

میگنیشیا کارب - گلے میں پھنسیاں حمض کے دوران۔ پھنسیاں بائیں سے دائیں، یا دائیں سے بائیں منتقل ہوں، حمض کے بعد غائب ہو جائیں۔

لیکس - گلا دکھے یا سوزش گلا۔ ٹانسلز بڑھے ہوئے۔ خناق۔ ٹھوس خوراک آسانی سے نکل سکے، لیکن مشروبات نکلنے میں مشکل ہو۔ گرم مشروبات سے زیادتی مرض۔ گلے میں گولے کے چھنے ہوئے کا احساس۔

سٹس کینا ڈینس - ٹھنڈی ہوا نکلنے یا ٹھنڈا سانس لینے سے زیادتی۔ گار بھی زرد بلغم

زرد جھاک جیسی بلغم جو منہ مقامی ذرائع سے ہی صاف ہو۔

مرک بن آئیوڈ۔ جب مرض بائیں طرف سے شروع ہو۔ خالی نکلنے یا خوراک نکلنے سے زیادتی۔

کالی آئیوڈ۔ پزلنے یا سوز گلے میں جو تمام نرم نسجوں۔ کوتا اور نرم تالو کو تباہ کر دیں۔

لیکسیتھس۔ گلے میں سوزش یا دکھن۔ گردن کی سختی کے ہمراہ۔

فائٹولا کا۔ جب درد کان تک جائے۔ کوتا بڑھا ہوا۔ بھٹی گہرائی سرخ یا رکھ کے رنگ

کی گرم مشروبات سے زیادتی۔ دائیں طرف گلے کی سوزش اور درد دائیں طرف کان تک بڑھے۔

مشکل سے نکل سکے۔

گوائیکم۔ گلے کی دکھن۔ سب سے حساس۔ گرمی سے زیادتی مرض۔

اگر کیس مس۔ گلے میں تشنج اور گلے سے ایک عجیب قسم کی بے اختیار آواز نکالے

جو دم گھٹنے جیسی ہو۔

ایس میل۔ تب محرقہ میں یا خناق کے بعد پھول کا طاقت کھو بیٹھنا۔ حلقہ کی کڑی

ہڈی کے ہیمان سے۔ گلے میں سوجن کے ہمراہ۔ دنگ لگنے والے درد۔

اوییم۔ فالج میں۔

ہیمیریلکفر۔ تیز بخشی جیسی دکھن گلے میں۔ ٹانسز کی پیپ اور پھوڑے۔

نکسوامیکا۔ تمباکو نوشی کے پڑھان گلے۔ شرابیوں اور واعظوں کے گلے کی تکھن۔

اور تمباکو نوشی، شراب نوشی یا واعظ کی دگر سے گلے میں خراش۔

اگیشیا۔ محسوس کرے کہ ہڈی نکل رہا ہے جو ادھر ادھر لٹک رہی ہے زچگی میں۔

سٹر امونیم۔ پھول کی سکرٹن یا تشنجی سکرٹن۔ تشنج کے ہمراہ۔ گلے کی خشکی بچلے بچلے

کے خورہ میں تکلیف۔ دماغ کی جھلیوں میں درم میں۔ بیٹھی ہوئی۔ چھٹی ہوئی آواز میں

بات کر کے جو دکھن میں تبدیل ہو سکے۔

لیکس۔ خناق میں ٹانسز کے بڑھ جانے میں۔ گلے کی خشکی میں۔ بہرہ سوز رز رکھوٹ

بڑھ جائے۔ دائیں طرف سے شروع ہو۔

لوہیلیا الفلیٹا۔ کوئی چیز دل سے اٹھتی ہوئی معلوم ہو جو خوراک کو پیسے جانے سے روکے۔

لائی سین۔ شروباتِ ناک سے بہہ نکلیں گلیں میں سوزش اور دکھن سے کالی کارب۔ خوراک راستے میں ہی وجہ، منہ بند ہونے کی وجہ سے ادرتے کی وجہ سے ادرتے کی وجہ سے (خوراک کی نالی کی گھٹن کی وجہ سے)۔  
آرم ٹرائفلم۔ ایکسٹریوڈ یا فنکاروں۔ بولی دینے والوں اور مترژوں کے گلی کی سوزش۔  
برٹاکارب۔ مزین ناسل کے بڑھنے سے۔  
آئیوڈیم۔ جھجھ میں گھٹن۔ بھراؤ اور دباؤ کے ہمراہ دکھن۔

### سوزش۔ سوالونگ

دفتھر نیم۔ جب شروبات پیتے وقت ناک سے واپس آجائیں۔  
لائیکو لوڈیم۔ جب خوراک یا شروبات ناک کے ذریعہ اُلٹ دی جائیں۔  
لیک کنٹیم۔ جب پیے تو شروبات ناک کے ذریعہ واپس آجائیں۔ نگلنے کا عمل مشکل تقریباً نامکن اور تکلیف کا نون تک جائے۔  
نایٹرک ایسڈ۔ نگلنے کا عمل بہت مشکل۔ چہرہ کو بگاڑنے اور سر کو نیچے گرائے ایک جمیع بھر شروبات بھی نہ نگل سکے جو کانوں تک جانے والی شدید درد کا باعث بنیں۔  
اکونائٹ این۔ مشکل سے نگل سکے حتیٰ اگر کھاتے وقت گردن کی پشت کو ماتہ سجھا کر اپڑے گردن میں جلن اور درد۔ کان کے پچھلے حصہ میں درد اور جلن۔  
رسٹاکس۔ تھوکن نگلنے میں دقت۔ جھوٹی جھپک میں سرخ بخار میں۔ خناق میں تقریباً نگل ہی نہ سکے۔

سٹراہونیم۔ گلے کے شدید تشنج کی وجہ سے نگلنے میں دقت۔  
لیکسس۔ شروبات کی نسبت ٹھوس اشیاء آسانی سے نگل سکے۔ گرم شروبات رکاوٹ پیدا کریں۔

بیلادونا۔ گلے کی کھن اور نوزش کی وجہ سے یاٹھوس یا مشروبات نگلنے میں دقت وہ بعض اوقات ناک میں یا ناک سے باہر نکال دیئے جاتے ہیں۔

بائیوسائیمس۔ گلے زبان۔ حلقوم اور گلے کی کڑی ہڈیوں کے پٹھوں کا سخت ہو جانا، مشروبات ناک سے باہر آجائیں یا ہوا کی نالی میں چلے جائیں۔

جیلسیم۔ خوراک کی نالی کا نالی نگلنے کی طاقت نہ رہے۔

کاسٹیکم۔ خوراک غلط راستے پہنچ جائے یا ہوا کی نالی میں چلی جانے یا ناک کے پھلپھلہ میں حلقوم اور خوراک کی نالی کے نالی کی وجہ سے۔

سکونماوا اثر و ما۔ خوراک کی نالی کی انٹھن یا تشیع جو نگلنے کی طاقت کو ہٹا دے یا مغلوب کرے۔

## درم لوزتین یا ٹانسلز کا درم

ایکونائٹ این۔ شری میں ہی اس دوائی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ پریشانی بے مینی اور دکھن نمایاں علامات ہیں۔

بیلادونا۔ جب ٹانسلز ہوا گلے سے سوز جائیں تو یہ دوائی دی جائے۔ وہ سرخ اور خون سے پر معلوم ہوتے ہیں۔ ٹیکن والی درد جو کانوں تک جائے۔

سلیشیا۔ شدید درم لوزتین جھنجھ والی دریں۔ جب پھوڑا پھٹ جائے اور اسے آرام نہ آئے۔

مرک آئیوڈ۔ جب بائیں طرف درد ہو تو درم لوزتین یا ٹانسلز کے لئے بہترین دوائی ہے۔

سٹریپٹوکوکین۔ تیز بخار کے ساتھ درم لوزتین ہو تو عمل انگریز کے طہ پر یہ دوائی دیں۔

فائیلو لاکا۔ جب درد کانوں میں گولی گئے جیسی آئے۔ بلغمی جھلی اور بخور میں دھبوں

کی طرح زخم ٹھنڈے مشروبات اچھے ثابت ہوں جبکہ گرم مشروبات اچھے ثابت ہوں جبکہ گرم مشروبات نگلنے مشکل ہوں۔ گلے کی سوزش گہری سرخ یا تقریباً نیلی آواز کا بیٹھ جانا اور خشک کھانسی۔

ایمپریسلفر۔ جب پیپ ناگزیر ہو۔ گلے میں ناسور۔ پھانس یا پھلکی کی ہڈی کا گلے میں احساس کانوں تک درد بڑھے۔ گرم مشروبات افاقہ دیں۔

ایپس میل۔ گلے کی سوزش۔ ڈنگہ لگنے جیسی اور جلن دار ٹھنڈے آفاقہ ہو۔  
 زبان اور کوا سوجا ہوا اور پھولا ہوا۔ کوا لٹکا ہوا اور گھٹن کا باعث ہو نتیجتاً موت کا خطرہ ہو۔  
 بریٹا کا رب۔ ٹانسز کے بڑھنے میں چوٹی کی دوائی ہے۔ بچے آہستہ آہستہ بڑھیں اور  
 ذہنی طور پر پس ماندہ ہوں۔ ناک کے پھیلے حصہ میں نزلہ ناک سے خون بہنے کے برابر۔ (کام میں  
 مبتلا ہونے پر ٹانسز میں پیپ۔ کھلی ہوا۔ خشک موسم اچھا رہے۔ ۲۰۰ طاقت مزمن حالت  
 میں اور ۶ طاقت میں حالت میں۔

لارو میروس۔ گلے کی تشنجی گھٹن اور گلے کی نالی کی تشنجی گھٹن۔ مشروبات گلے کی نالی  
 اور معدہ کی نالی میں آواز پیدا کرتی ہوئی جائیں۔  
 اوییم۔ جب مشروبات پینے پر بچے نہ جائیں بلکہ ناک سے باہر نکلیں۔ گلے کی نالی کا  
 فالج۔ مشروبات غلط راستے پر چلے جائیں۔  
 برومین۔ سانس کی نالی کا تشنج اور کھچاؤ۔

اگنیشیا۔ نکلنے پر گلے کی تکلیف اور درد کو آفاقہ ہوا یا نکلنے کے عمل کے دوران میں  
 تکلیف میں زیادتی ہو۔

پیشیا۔ صفت مشروبات ہی نکل کے تھوڑا سا ٹھوس بھی منہ بند کر دے۔  
 ٹیوبرکولینم۔ یہ دوائی بطور عمل انگیز کے ایک ماہ کے دوران ایک خوراک ۲۰۰ طاقت  
 میں دی جائیں۔

تھوجا۔ یہ دوائی بطور ۲۰۰ طاقت میں بریٹا کا رب سے بدل کر ہر ہفتہ میں ایک دفعہ  
 دی جائے۔ مزمن ٹانسز میں یہ ادویات اس ہفتہ میں ہرگز نہ دی جائیں جب ٹیوبرکولینم  
 دی جائے۔

ایٹوڈم۔ شدید بھوک کے ساتھ وزن میں کمی ہونا۔ فوری بھوک بہت زیادہ پیاس کے  
 ساتھ۔ تھوڑی سی محنت کے ساتھ پسینہ آجائے اور بہت کمزوری۔ ٹانسز اور تھالی رائیٹ ٹھنڈو  
 کا بڑھ جانا۔ گرم اور نمدا موسم میں۔ کھلی ہوا اور خوراک کھانے سے آفاقہ۔ کان اور حلق کی نالی میں

رکاؤٹ کی وجہ سے بہرہ یں -

مرک پر ڈوٹو آئیوڈ - ٹانسلز بہت زیادہ بڑھے ہوئے - ناک کے مزمن نزلہ زکام کیساتھ -

لائیکو پوٹیم - جب مرض دائیں سے بائیں طرف جائے اور گرم مشروبات سے آفاقہ ہو -

لیکس - جب مرض بائیں سے دائیں جائے اور گرم مشروبات سے نیا دقتی مرض ہو -

تھوک کی لمبی تاریں - خاص طور پر رنگ دار ناراض لوگوں کے لئے ہے -

گن پاؤڈر - جراثیم کی وجہ سے ٹانسلز بڑھ جائیں -

رسٹائکس - گلے کا گنٹھیا جو ٹانسلز بڑھ کر اثر انداز ہو - گلے کی - استسقاءئی سوچن

مشروبات ننگے وقت گھٹن کا احساس -

اگنیشیا - زیادہ تکلیف خاص طور پر جب خوراک کے علاوہ مشروبات نکلے -

مرکیورس - دائیں طرف کے ٹانسلز میں تکلیف شروع ہو لیکن ٹھنڈے مشروبات

سے آفاقہ - زبان گہری قرصے ڈھانچی ہوئی شدید جھنجھے والی گندی بدبو - قبض -

مرکیورس بن آئیوڈ - خناق - گلے کی زہر آلودگی کی وجہ سے غون میں زہر کا پھیل جانا -

نفاثر ہونا بائیں سے دائیں طرف کو ہو -

برٹیا میمور - جب ننگے وقت گلے میں درد اور گلے کے بند ہونے کا احساس ہو

کلکیہ یا فاس -

کلکیہ یا کارب - ایم اینڈیو برکولینم - ایم - ہر چند روز کے بعد اول بدل کر دینے

سے مزمن ٹانسلز کو ٹھیک کر دیتی ہے جو ایسے بچوں میں جن میں موٹے ہونے کا رجحان ہو اور بڑی

پلستر اور کاغذ وغیرہ کھانے کا رجحان ہو - ادویکی ادویات ۲۰۰ طاقت میں دو ماہ تک دی جائے

۱ - ایم طاقت میں استعمال کرنے سے پہلے - اگر یہ ناکام ہو جائے تو برٹیا ۲۰۰ اور تھو جا ۲۰۰

طاقت ہر سفتہ اور ڈیو برکولینم ۲۰۰ طاقت میں ہر ماہ ایک خوراک -

ایمون - جب ٹانسلز بڑھتے رہیں اور سخت ہوں - نزلہ کے رجحان کے برابر جو گلے میں ہے -



## ٹانسلز دُور کرنے کے بعد کی تکالیف

سرپیٹو کو کمین۔ ٹانسلز دُور کرنے کے بعد کی تمام تکالیف مثلاً جب مریض زرد۔ پیلا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھوک نہ رہے بے پرواہ ہو۔ ہر راہ ایک۔ اہم طاقت میں ایک خوراک دیجئے۔ گلکیر یا کرب۔ ٹانسلز کے دُور کرنے کے بعد ناک کے پچھلے حصہ کا نزلہ اور ناس کی نالیوں کی تکالیف کیلئے ۲۰ طاقت ہر رقتہ ایک خوراک دیجئے۔ سلفر۔ دل میں جلن۔ مٹھائیوں کی زبردست خواہش دن کے وقت بھوک نہ ہو۔ رات کے وقت کھانے کیلئے شدید رغبت و بھوک۔ موسم کی تبدیلی کے وقت علامات میں زیادہ طوفانوں سے پہلے۔ خارش۔

## حلق کا کوتا

ایس۔ حلق کے کونے کے بڑھے ہوئے کیلئے مخصوص اور چوٹی کی دوائی۔ مانسفیلا۔ حلق کے کونے بڑھے ہونے کے لئے جس میں گلابی طرح سو یا ہل ہو۔ مرکار۔ تھوڑا سا مرکار کی چھوٹی طاقت میں حلق کے کونے پر لگائیے یہ فوراً مستقل طور پر آرام کر دے گا۔ ہائیوسائیمس۔ حلق کے کونے کا بڑھ جانا، سرسراہٹ والی کھانسی کے ہمراہ جھلیٹ جانے پر زیادہ ہو۔

الیومن۔ جب حلق کا کوتا ڈھیلا ہو گیا ہو، حلق میں پھیلن کے ساتھ۔

تمسیر احصہ

## نرخرہ۔ تنجہ

(کروپ کھانسی۔ تنجہ یا ہوا کی نالی کے اوپر والے حصہ کی سوزش بھی دیکھئے۔)

## درم زرخره

اکوناٹ این - جب پڑھجان کھانسی ہو بخار - بے چینی - اور پریشانی کے ہمراہ -  
خشک گرم جلد اور آواز بیٹھی ہوئی -

سپونجیا - عام طور پر اکوناٹ کے چھ گھنٹہ بعد دی جائے یا جوئی سانس لینے کا عمل  
باریک اور تیز ہو اور بھونکنے والی کھانسی آواز کا بیٹھ جانا اور اس کا جلتے رہنا، ہوا کی نالی کے  
اوپر والے حصہ میں درد کے ہمراہ -

ایلیم سیپا - گلا بیٹھا ہوا - سخت - بجنے والی - تشنجی کھانسی جو بخیرہ میں مستقل ہرگز  
اور بھانٹنے والی درد - تکلیف کے ساتھ - شدید زرخره کی کھانسی -

لیکسس - گلا حساس - مشکل سے نکلے، گرم مشروبات تکلیف کو بڑھائیں جب  
مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائیں -

کالی بانی - جب گاڑھی چپکنے والی اور تار دار بلغم ہو تو یہ دی جائے -  
کاسٹیکم - جب آواز کے پٹھوں کی کمزوری ہو سخت کھانسی جس کے ہمراہ پیشاب خارج ہو جائے -  
فاسفورس - خشک - پڑھجان زرد اور قلت خون والا بخیرہ - آواز حملے کے کافی دیر  
بعد تک بیٹھی رہے -

مینگنم - خشک بیٹھی ہوئی آواز کے ہمراہ کھانسی -

کلورم - اگر ۱۲ یا ۳۰ طاقت میں دی جائے تب بھی مفید ہوتی ہے -

نیٹرم میووس { ٹی بی والے مریضوں میں درم بخیرہ -

سمبوسکس نائیگرا - لیس دار کھٹ کا بخیرہ میں اکٹھے ہو جانا - آواز کا بیٹھ جانا - دم گھٹنے والی

خالی گہری کھانسی - بے چینی اور پیاس کے ہمراہ - سون سون کی آواز کے ساتھ سانس -

کارلو وینج - ٹی بی یا اس کے علاوہ جب زکام شروع ہو اور آخر کار پھپھاتی اور بخیرہ میں بیٹھ جانا ہے -

سیبل سیرولیشا - ہنجرہ کی دق -


ریو میکس - پندہجان متواتر سرسراہٹ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے زیادتی -

## زخمرہ یا ہنجرہ کا تشخ

برومیم - سینے کی ڈیروں کے پیچھے - تشنجی گھٹن - سرسراہٹ اور ملن کے ہمراہ - سانس اندر کی ملن  
لے جانا جو کھانسی پیدا کرتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے نسبت سانس خارج کرنے کے - غدد دھڑھڑاتے  
خاص طور پر کان کے پاس کے غدد اور غدد درو قید -

کیو پرم میٹ - سانس کی نالی کے اوپر کے سرے کا تشنج سانس رکھنے کے ہمراہ - چہرہ نیلا  
انگوٹھا، تھیلی کی طرف بھیج جلتے اور انگلیاں اس کے اوپر چڑھ جائیں -

کلورم - سانس کی نالی کے اوپر کے سرے کا تشنج سانس رکھنے کے ہمراہ - زخمرے کی ہڈی  
کڑی کا تشنج - ہوا کی نالی کا تشنج - زخمرے خالصتاً بھان کیوجہ سے - آواز کے پھوٹوں کے تشنج کیوجہ  
سے تنگی و تنفس - وحشیانہ نظر - گھوڑے اور باہر کو ابھری ہوئی آنکھیں چہرے کے نیلے پن کے ہمراہ -  
برومیم کے برخلاف کلور فارم کا مریض آسانی سے سانس لے سکتا ہے لیکن بشکل سے خارج کرتا ہے -  
کلکیر یا کارب - ہنجرہ کے تشنج جب اعصابی تکلیف کی وجہ سے نہ ہو یہ ایک جہانی بناوٹ  
کے مطابق دوائی ہے -





مسوڑھے، داستوں  
مُتہ اور زبان کی  
بیماریاں

## پھوڑے اور سوزش

**مرکیورس** - مسوڑھے کے پھوڑے سے پیپ نکلے۔ مسوڑھے سوجے۔ انفعی کی طرح اور ان میں سے خون نکلے۔ سانس بدبودار۔ بستر کی گرمی اور رات کو زیادتی مرض۔  
**امپیرسلفر** - یہ اس وقت دی جائے جب حقیقتاً پیپ نکلتا شروع ہو جائے۔ یہ پھوڑے کو بٹھانے اور ختم کرنے کا دوا عمل کرے گی۔  $3 \times$  طاقت میں استعمال کیجئے۔  
**سیلیشیا** - جب امپیرسلفر ناکام ہو جائے تو یہ استعمال کی جائے۔  
**ہیکلا لاوا** - مسوڑھے کے پھوڑوں کے لئے بہترین دوائی خاص پرلوسیدہ لگے ہوئے دانتوں کے  $3 \times$  طاقت میں استعمال کیجئے۔

**بیلادونا** - جب مسوڑھوں میں تپکین والا درد ہو۔

**مرک آئیوڈ** - یہ دوائی بیلادونا سے اول بدل کر دی جائے، جب شدید دردی ہوں۔  
**کلکیریا فلور** - جب کیلیم کی کمی اور دانتوں کا انجیل زہر ہے تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔  
**آرنیکا مانٹ** - مصنوعی دانتوں کے ختم ہونے کے بعد مسوڑھوں میں درد اور سوزش۔

## مسوڑھوں سے خون نکلتا

**مرک سال** - مسوڑھوں کے ناسور اور ان سے خون بہے۔ خارش مبین اور مسوڑھوں کی مرنجی۔  
**فاسفورس** - مسوڑھوں کے ناسور اور ان میں سے خون بہنے کے لئے شاندار دوائی ہے اس دوائی سے علاج شروع کیا جائے خشک دوسری ادویات کی مان علائقاً ظاہر ہو جائیں۔  
**کلکیریا فلور** - مسوڑھوں سے خون بہے دانتوں کے گلنے کے ہمراہ۔

کارپو و تبح۔ جب دانت مسڑھوں سے علیحدہ ہو جائیں اور ڈھیلے ہو جائیں۔ دانت  
جلدی جلدی لگیں۔ جب دانتوں کی صفائی کی جائے تو خون بہے یا تھوڑا سا بھی دانتوں کو  
جوسنے پر خون ہے۔ دونوں سرد اور گرم یا نمکین خوراک سے تکلیف ہو۔

لیکسس۔ مسڑھوں سے خون بہے پانی کی شدید پائس کے بہراہ۔ گنٹھیا میں مبتلا  
ہونے کا رجحان۔ دانتوں کے ارد گرد سے خون ہے۔

انٹم کروڈ۔ مسڑھوں سے اور دانتوں سے جلد علیحدہ ہو جائیں اور آسانی سے خون ہے۔  
سٹیف سگیر یا۔ انفع کی طرح کے مسڑھوں کو جن کو خوراک یا انگلی کے چھونے سے  
آسانی سے خون بہنا شروع ہو جائے۔

ٹیر پیٹجھ۔ پیناب میں البیومن کے اخراج کے بہراہ مسڑھوں سے خون ہے۔

کاسٹیکم۔ دانتوں کے نامور میں آسانی سے مسڑھوں سے خون ہے۔

سیدرن۔ حیض کے دوران مسڑھوں سے خون ہے۔

کلکیر یا کارب۔ حیض کے دینے کی وجہ سے مسڑھوں سے خون ہے۔

سلفر۔ ٹائیفاؤئید بخار میں مسڑھوں سے خون ہے۔

الیومن۔ مسڑھوں سے خون ہے جو دانتوں سے پیچھے مٹیں۔ دانتوں کا گلنا۔

### منہ کی دکھن اور زخم

آرمیکم البم۔ منہ اور زبان پر شدید خشکی اور جلن۔

ہائیڈرو کوٹائٹل۔ پوٹاشیم کلورائیڈ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔

لیکسس۔ بلیغی بھٹی کے قریب گہری اور غوانی رنگ کا اظہار۔

مرک سال۔ جب تھوک اور دکھن ہو۔

ٹائٹرک الیڈ۔ تیز بھنے والی درد،

خاص طور پر پٹھائیوں کے رستیا ہونے کی صورت میں۔

کیسٹڈولا۔ پائویریا کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ کچھ دقت کیلئے ۲۰ قاتیں دیکھئے۔  
 کلکیریا رینالس۔ پائویریا کے لئے شاندار دوائی بنائی جاتی ہے۔  
 مرکوریس۔ سفید سفیج کی طرح کے مسوڑھے منہ سے بدبو آئے ۶ ملاقات میں استعمال کیجئے۔  
 سیلشیا۔ درد والی سوزش۔ مسوڑھوں میں پیپ کا بننا۔ مسوڑھوں کے چھوڑے۔  
 گن پاؤڈر۔ جب مسوڑھوں میں پیپ بنے اور پیپ خارج ہو۔  
 کالی کارب۔ پائویریا منہ سے بُری بدبو آئے اور دانت ملیں۔  
 پلانٹیکو میجر۔ دانت دکھیں اور چھوٹنے سے حساس ہوں۔ چاتو مارنے والی اور  
 سوراخ کرنے والی تکلیف۔  
 کریوزوٹم۔ بیمار دانت گندی بو کے ہمراہ۔ کھینچنے والی۔ ٹپکن والی درد۔ مسوڑھے  
 ناسور زدہ اور ان سے جلدی خون ہے۔

پیشیا۔ مسوڑھے گہرے سُرخ اور بدبودار۔ مسوڑھوں سے خون اُبلے۔ بدبودار  
 تھوک (ذہن کے تحت درد اعصابہ بھی دیکھیے)

### درد اعصابہ

سٹیفسیگیا۔ یہ بہترین دوائی ہے۔ سب سے پہلے دی جائے۔  
 کوکسیلا۔ دوسرے نمبر پر یہ دوائی دی جائے۔  
 گومٹر۔ رسولی۔

میگنیشیا کارب۔ دائرہ کی ہڈیوں کی رسولی۔

نائٹرک ایسڈ۔ مسوڑھوں کے گوڑ یا رسولی اخروٹ کے برابر۔

## بھوڑا یا ناسور

مرک کار۔ جب ناسور کے ہمراہ بہت زیادہ پانی کی طرح کا قھوک ہو۔  
کریوزوٹم۔ جب مسوڑھے ہلکے نیلے سرخ۔ نرم۔ اسخج کی طرح کے جن سے خون ہے،  
اور سورج ہوئے۔

نیٹرم میور { نائٹرک ایسڈ  
یہ ادویات مسوڑھوں کے  
ناسور کے لئے مفید ہیں۔

## جبرٹا کڑکڑانا دوسرا حصہ

رسٹاکس۔ جبرٹے کا کڑکڑانا۔ گنشیا کے ہمراہ یا اس کے بغیر۔  
نائٹرک ایسڈ۔ اگر رسٹاکس ناکام ہو جائے تو یہ استعمال کی جائے۔  
گریٹیم۔ جبرٹے کی پردرد کرکن۔  
آرم ٹر انٹلم۔ نکلے وقت جبرٹے کے جوڑ میں تکلیف جیسے کہ موج آئی ہوئی ہو۔

## گلنا سٹرنا

بڈی کا گلنا سٹرنا دیکھیے۔ اپولس بھی دیکھیے۔  
تھوجا۔ اگلے بڑے دانوں کے پیچھے دانتوں کے ناسور۔  
کلکیریا کارب۔ جب تھوجا ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے ۲۰۰ طاقت یا سی ایم  
طاقت کی خوراک ہی استعمال کرائی جائے۔  
برانی اونیا۔ نچلے جبرٹے کے بائیں طرف کے زاویے کی سوزش یا رسولی۔

پہلے ہم ایسی کم ایک کینیم۔ اگرچہ مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائیں۔  
 میگنیٹس پوس آرک۔ جڑے میں سوزش اور تکلیف خاص طور پر بائیں جڑے میں۔  
 ٹھنڈک کانیاں احساس۔

## دانت بند ہو جانا یا جبرٹوں کا نہ کھلنا

اکٹیا پاکٹیا۔ جب اوپر کے جڑے میں درد ہو۔  
 میگنیٹیا فاس۔ جبرٹوں کا نہ کھلنا۔ ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر جو کچھ تکلیف۔  
 انگچہ چورا۔ جبرٹوں کا نہ کھلنا۔ ہونٹ پیچھے کی طرف کھینچ جائیں۔ دانت نظر آئیں۔

## جبرٹوں کا گلنا سڑنا۔

انگچہ چور دیر۔ یہ ۲۰ کی طاقت میں دی جانی چاہیے۔  
 فاسفورس۔ بائیں طرف کے پچھلے جڑے کا گلنا سڑنا۔  
 سیلیٹیا۔ یہ مختلف طاقتوں میں دی جانی چاہیے، اگر مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں۔  
 اگر کیس ایم۔ اوپر کے جڑے کی ہڈی میں درد اور دانتوں میں درد۔

## تیسرا حصہ

## ہونٹ۔

### خون بہنا۔

آرم ٹرائفل۔ ٹائنائیڈ بخار وغیرہ میں ہونٹوں سے خون کا بہنا۔ مریض ہونٹوں کو چھوئے۔  
 حکم ان میں سے خون ہے۔

لیکس۔ بخاروں اور خناق میں ہونٹوں سے خون ہے۔

برومیم۔ کالی کھانسی میں ہونٹوں سے خون ہے۔ (دیکھئے ہونٹوں کا ناسور، بخار)

ہنچے۔ متفرقات کے نیچے کینسر دیکھے )

## چھالے پھٹے ہوئے

آرم سلفیو زینیم۔ ہونٹ پھٹے ہوئے۔  
 آرم ٹرائفلیم۔ ٹھنڈی ہوا سے پھٹے ہوئے ہونٹ۔  
 برائی اونیٹا۔ ٹائیٹائیڈ بخار میں اسہال میں۔  
 نیرم میور۔ ملیریا کے بخار کے بعد ہونٹ پھٹ جائیں۔  
 یسپیا۔ درد میں ہونٹ پھٹ جائیں

انٹیم کروڈ  
 کنڈورا انگو۔ { منہ کے کناروں پر تکلیف دہ چیرے۔  
 زینکم میٹ

## تیچھے کی طرف کھینچ جائیں۔

انگسچور۔ ہونٹ تیچھے کی طرف کھینچ جائیں۔ دانت نظر آئیں۔  
 سوزش۔

کیدیمیم سلف۔ ہونٹوں کی سوزش۔

## رسولی

بیادریات مریض کی حالت کے مطابق دیکھا جائیں۔ ایسے کیسوں میں کوئیم  
 سخت رسولی میں اور سب سے پہلے دی جانی چاہیے۔ اور نرم رسولی میں  
 سب سے پہلے سٹیف گیگیا دی جا سکتی ہے۔

فاسفورس - سخت قسم کے گھوڑوں یا رسولیوں میں دی جا سکتی ہیں۔ یا رب سے پہلے رخص  
 سلفر - کسی عام حالت کو دیکھ کر یا مندرجہ ذیل میں سے ایک یا دو ادویات دینے  
 سیلیشیا - کے بعد جب مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہیں۔

## ہونٹوں کا تشنج

اولیم انیمیل - ہونٹوں کا تشنج۔

منہ

چوتھا حصہ

## منہ کی خشکی

آر سینکلم الیم - تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ تھوڑے پانی کی پیاس  
 کے ساتھ منہ کی خشکی۔

برائی اونیا - کثیر مقدار میں لمبے وقفے کے ساتھ پانی کی پیاس زیادہ۔

نکس ماسکٹا - منہ کی بہت خشکی۔ زبان اتنی خشک کہ منہ کی پھٹ کے ساتھ چپک

جائے۔ تھوک پیاس کی طرح ہو۔ گلا خشک۔ سخت پیاس نہ ہو۔

لیکس۔ منہ اتنا خشک ہو کہ مریض زبان باہر نہ نکال سکے

ایومن۔ منہ گلا اور زبان خشک۔ برف جیسے ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ منہ میں جلن۔

زخم شہ گندا۔ اور اسفنج کی طرح کا۔

نکس وایمکا۔ سانس بدبودار۔ کھانا کھانے کے بعد منہ کی خشکی یا صبح کے وقت

منہ کی خشکی۔

پلیٹیللا۔ سانس بدبودار۔ شام کے وقت یا رات کے وقت منہ کی خشکی۔

آرم میٹ۔ سانس بدبودار۔ لڑکیوں میں بلوغت کے وقت۔

آرم ٹرائفلم۔ منہ سے گندی بدبو۔

کیسپیکم - گرم مچھنے والی گندی ہوا پھپھڑوں میں سے نکلے، کھانستے وقت گلے کا ذائقہ گندا ہو۔  
 ہائپوسائٹیس - منہ خشک - زبان چمکے کہ جلا ہوا چمڑا ہو چڑے کا ہی ذائقہ ہو۔ زبان منہ  
 میں خشکی کی وجہ سے سے کھر کھڑا رہتی ہے۔

برٹریا میوٹ - منہ خشک - زبان پھٹی ہوئی - موٹھوں سے خون بہے - لیسر ہتھوکی  
 منہ کو بھر دے - منہ سے گندی بدبو آئے - جلد میں جلن اور جھپٹن۔

مرکوریٹس پرنسپس - منہ اور گلا خشک منہ میں کھانڈ نہ پگھل سکے یا حل ہو سکے کھانا  
 کھانا کھانے سے خشکی میں زیادتی - سانس گرم اور ہونٹوں کو خشک کر دے۔

ایپیس - منہ کی خشکی میں یہ دوائی مفید ہے۔  
 ایسڈ فاس - زیادتیٹس کے مریضوں میں منہ کی خشکی کے لئے مفید ہے۔

یورینٹیم ٹائٹ { زیادتیٹس کے مریضوں میں منہ کی خشکی  
 فاسفورس { کے لئے یہ ادویات مفید ہیں۔  
 سلیسیلک ایسڈ - منہ خشک زبان پر جلنے والی چھوٹی چھوٹی جگہیں - منہ میں زخم اور  
 دکھن اور بدبو دار سانس۔

ویرٹرم ایلم - پسینہ کے دوران میں شدید پیاس۔  
 منہ کھولنا۔

لیکس { لیکس  
 کاسٹیکم { منہ کھولنا مشکل ہو۔

اوپیم - نیند کے دوران منہ کھلا ہو۔  
 بیونو - مرگی کے حملہ سے پہلے منہ کھلا ہو۔

لائیکوپوڈیم { لائیکوپوڈیم  
 سلفر { منہ بند نہ کر سکے۔

## زبان کے نیچے کا گوہر - تندوا -

تھو جا - نیلی یا دریدوں کی کانٹھیں زبان پر یا منہ میں -

امبر گریسا - بدبو دار سانس کے

ہائڈرو فوبیم - جب دقے کے بعد تندوا متوقع ہو یا تندوا دقے کے بعد قہی ہو جائے

کلکیر یا کارب - اگر مذکورہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جاسکتی ہیں -

مرک سال - سخت اور جسامت میں بڑا - یہ تھو جا سے ادل بدل کر دی جائے -

## تھوک

مرک سال - سادہ تھوک، منہ اور مسوڑھے دکھیں - حمل کے دوران بھی - نیند کے دوران میں تکیہ جھگودے -

نیرٹرم میسور - خدتی قسم کا تھوک - منہ زبان پر پھوڑے یا ناسور کے ہمراہ - ہونٹوں کے زاویے اور منہ کی اندرونی دیواریں - متواتر اور شفات تھوک سے پُر -

ایسٹیک ایسڈ - جلن دار پانی کی منہ بھر کر الٹی بہت ہی تھوک کے ہمراہ - دن اور رات - کھٹے پانی کی الٹی -

آئیوڈم { پارے کی دجہ سے تھوک - اگر پہلی دوائی نائیرٹرم ایسڈ ناکام ہو جائے تو دوسری دوائی دی جائے -

آئرس ور - اعصابی درد سے کے ہمراہ تاردار تھوک -

ایلیم ٹائیوا - کھانا کھانے کے بعد بہت ہی زیادہ مقدار میں تھوک - بول چال کے دوران منہ سے پھوارا گرے -

جبرائیلی - حمل کے دوران اعصابی وجوہات سے -

مرکورس - { بدبو دار اور گندا تھوک -

پیکر الیڈ - سفید بھاگ دار تھوک تاروں سے فرش تک لٹکے -  
کالی باٹی - تار دار تھوک -

سائیکلیمین - نمکین تھوک -  
اگنیشیا - چرسش یا کھٹا تھوک -

دریٹیم البم - بے ذائقہ تھوک - شدید کمزوری جسم ٹھنڈا - غش کھانے کا رجحان -  
منیجرس کون - سوتے وقت سرٹانے پر بہت زیادہ تھوک ہے -

ایپی نیگس - لیس دار تھوک - سر درد کے دوران تقریباً مستقل تھوک کی خواہش  
سلفر - تھوک جس خون کی ملاوٹ ہو اور بواسیر کے رجحان کے ساتھ -

پلسٹیل - جب زیادہ تھوک متلی اور خوراک سے نفرت کے ہمراہ - حمل کے دوران -  
آرسنکلم البم - شدید کمزوری - لاغر - کمزور اور زرد لوگوں میں غشی کے ہمراہ - دل کی  
جلن خوراک کی تہ - حمل کے دوران -

کیمو میل - مٹھاس والا تھوک -

کریوزوٹم - حمل کے دوران تھوک زیادہ -

کالچیکیم - منہ کا تھوک جس کو ننگلے پرچی متلائے -

بریٹامیور - منہ سے گندی بو کے ساتھ تھوک کی زیادتی -

بریٹاکارب - میند کے دوران تھوک منہ سے ہے -

### منہ کی دیکھن

بیلادونا - منہ سرخ خشک اور جلن اور بغیر پائیس کے -

کیپسیکم - منہ کی سادہ سوزش جلن کے ہمراہ -

نیٹریم میور - نقشہ دار زبان کے ساتھ، منہ کی سوزش اور سرخ نشان - منہ اور زبان

گرم خشک اور جلے ہوئے معلوم ہوں -

ہیپر پلٹر۔ منہ کے کناروں پر بھوسا دار داع۔ تھوڑی پرچھنیاں۔ نرم تالو کا ناسور جو حلق کے کوسے کو کھا لیتا ہے اور نرم تالو کو تباہ کر دیتا ہے اور بعد میں منہ کی چھت کی ہڈیوں والا حصہ تباہ کر دیتا ہے۔ منہ سے شدید ناگوار بو سڑے ہوئے پتیر جیسی آتی ہے اور پارے کا غلط استعمال۔

مڑک کار۔ منہ کی زخم دار سوزش۔

میوڑ ٹیک الیڈ۔ چھالوں والا منہ۔ زبان کی کھجلی یا خارش۔ بار بار ہونے والے ناسور۔ آدم ٹرٹفل۔ منہ میں بہت زیادہ دھکن۔ زبان کی سرخی۔ اٹھے ہوئے دانے۔ ہونٹ اور منہ کے کونے پھٹے ہوئے ناک دکھے۔

ریوم۔ سونے کے بعد منہ بدبو دار کف سے بھر جائے۔

بورکس۔ بلفی جھلی ٹنکن دار جیسے کر ملی ہوئی ہو۔ منہ خشک۔ منہ کی سوزش پیاس اور تھکے کے ہمراہ۔ چھوٹے پرچھالوں سے آسانی سے خون بہے۔

ہائیڈرو کوٹائیل۔ زبان نرم جس پر دانتوں کے نشان پڑ جائیں۔ احساس جیسے کہ یہ جل گئی ہو۔ خاص طور پر زبان کا اگلا حصہ یا سامنے والا حصہ۔ سوراٹینم۔ زبان کی نوک خشک اور جلی ہوئی محسوس ہو۔

سینٹونیزیا۔ منہ کی چھت اور گالے کی چھت محسوس کرے کہ یہ جلی ہوئی ہے یا گرم پانی سے دھوئی گئی ہے۔

ہائیڈراسٹس۔ خاص طور پر چھالوں والے پردہ منہ کے لئے مفید ہے۔ زبان شدت سے ڈھاپا ہوئی۔ فیسیجی ناسور منہ میں، منہ سے چپکانے والا کف۔

پٹیشیا۔ غددوں کے ناسور۔ گہرے سرخ یا بیگنی رنگ کے۔ گندہ اور بدبو دار بہت زیادہ تھوک۔ زبان پر درج پٹی ہوئی اور ناسور دار (رسل و دق)۔ پارے کے اصل یا نامزدالی (آرمینکم البم)۔ منہ میں اور زبان پر سرخی اور نیلگوں چھالے۔ گالوں اور سوراٹوں کی ناسوری سوزش بخار کے ہمراہ ناسور کے درمیان میں سیاہ نقطوں والا حصہ شدید پیچنی اور کڑی۔

ناٹرک ایڈ - پارے کا غلط استعمال یا آتشک کی وجہ سے ناسور - تھوک خراشدار اور بدبودار - منہ کے کناروں کو پھیلنے والا - دانت زرد نظر آئیں ڈھیلے ہوں اور گرہیں - یہ ناسور اور گنگرین قسم کی زخموں کو تندرست کرتی ہے - منہ سے گندی بدبو -

ایتھوزا - دودھ خارج کرتا ہے منہ اور گلے کی عمومی چھالوں والی حالت جن کی وجہ سے ننگلے میں دقت ہو - معدہ کی خرابی کی وجہ سے پیچہ دہی کی صورت میں - دودھ خارج کرتا ہے تیزی سے قے کرنا یا منہ بھر قے کرنا اور پھر اس کے بعد کمزوری -

فاسفورس - منہ کے زخموں کی وجہ سے منہ کی دکھن اور مسوڑھوں سے خون بہے - مفید یا زرد لکیر مسوڑھوں پر - عام بدنی کمزوری -

مرک سال - جہاں پارے کے استعمال کا کوئی نشان نہ ہو - منہ کے زخموں کی وجہ سے منہ کی دکھن کے لئے بہت مفید ہے - مسوڑھوں کے زخم بہت زیادہ تھوک کے ہمراہ بدبودار سانس اور رات کو تکالیف میں زیادتی -

سیسیا - زبان میں تکلیف یا درد دیکھ کر کھل گئی سو - البومن - منہ کا پکنا اور اس میں خشکی - ٹھنڈے - پانی کی پیاس - سفلینم - منہ کا پکنا - منہ کے زخم رات کے وقت سونے پر بہت زیادہ مقدار میں تھوک مرک سال کی طرح سرہانے کو خراب کرے -

نیٹرم سلف - جب منہ میں چھوٹے چھوٹے چھلے ہوں یا بہت ہی حساس قسم کے چھوڑے جن کو ٹھنڈا پانی منہ میں رکھنے پر فائدہ ہو -

ایسیلی بورکس نائیکر - منہ کے چھلے بہت زیادہ تھوک کے ہمراہ کے لئے مفید دوائی ہے - سرخی نابل زرد کناروں کے ساتھ زخم - زبان کا سٹن ہونا اور سوج - گلے میں کڑوا ذائقہ - سلفینوک ایڈ - منہ میں چھلے - زبان بہت ہی سوجی ہوئی بہت زیادہ مقدار میں تھوک سانس بدبودار - منہ سے خون بہے -

لیکسس - منہ کے اندر چھالے اور رنگی جگہیں جلیں اور دکھن کے ساتھ مسوڑھے

سوچے ہوئے۔ افغیج کی طرح کے انخون۔ یہ زبان سوچی ہوئی جلتی ہے۔ کانپتی ہے۔ سرخ  
خشک اور کناروں سے پٹی ہوئی ہوئی۔

## بولنے میں تکلیف ہو

سیدرن۔ حیض کے دوران بولنے میں تکلیف ہو۔  
جلیسیم۔ زبان کے بھاری پن کی وجہ سے بولنے میں تکلیف ہو۔  
امونیا کارب۔ درد کے ہمارے بولنے میں تکلیف۔  
کیوریم میٹ۔ جب گلے میں تشنج کی وجہ سے ہو۔  
مرکورس۔ منہ اور زبان کے کانپنے کی وجہ سے بولنے میں تکلیف آواز لڑکھڑائے۔  
اگرکیس ایم  
روٹا  
سٹرامونیم  
ڈلکامارا۔ جب زبان کی سوزش کی وجہ سے ہو۔  
لیکسس۔ جب ٹائیفائیڈ بخار میں  
آرڈنٹ میٹ۔ جب لیسڈر تھوک کی وجہ سے۔  
سٹائم۔ جب چھاتی یا گلے کی کمزوری کی وجہ سے  
کالی بروم۔ بچکچاہٹ سے بولے یا بولنے میں بچکچاہٹ محسوس کرے۔  
ہائپرکیم۔ آواز کانپے۔  
کیمومیل۔ بولنے میں تکلیف کے ساتھ الفاظ پھوڑ جائے۔  
نکسوامیکا۔ الفاظ اور رکن تہجی پھوڑ دے۔  
لائیکوپوڈیم۔ غلط الفاظ اور غلط رکن تہجی استعمال کرے۔  
گلونائن۔ گفتگو مشکل اور غیر واضح۔ مشکل سے بول سکے۔

ہیو فو۔ لڑکھڑانا اور ہکھلانا جب غیر مربوط گفتگو سمجھ میں نہ آئے۔ تو ناراض ہو جائے۔  
کو کولس۔ گفتگو غیر واضح۔

امونیا میور۔ مجمع طریقہ سے نہ بول سکے۔  
تھو جا۔ ایک قسم کے رکن تہی بولے۔  
اکونائیٹ این۔ گفتگو کا بنی ہوئی اور ہکھلاتی ہوئی۔

## بولنے کی طاقت جاتی رہے

لیکسس۔ بولنے کی طاقت مکمل طور پر جاتی رہے۔ زبان کو منہ سے نکلیں باہر نکالنے کی۔  
ہائیوسا نیمس۔ اگر ڈر کیوجہ ہو تو زبان کی حرکت ناکافی مٹ ہونے اور لڑکھڑانے کے ساتھ۔  
سٹرائٹیم کارب۔ ٹائیٹائیڈ بخار کی وجہ سے۔  
کاسٹیکم۔ جب عضو کے فالج کیوجہ سے۔  
نکسوامیکا۔ مرگی کے حملہ کے بعد۔  
اکٹیا ریس۔ ایک بھی رکن تہی نہ بول سکے اگرچہ کوشش کرے۔  
فیرم پیکریم۔ پبلک میں تقریریں کرنے والوں کی آواز کا بیٹھ جانا یا ناکام ہو جانا۔

## تھوکتا۔

کو کولس۔ تھوکنے کی لگاتار خواہش۔  
کروئیلس ایچ۔ سیاہ خون تھوکتا۔  
ایپی نیگس۔ اعصابی سردرد کے بہرہ لگاتار تھوکتا۔ لیسڈر تھوک کے ساتھ۔  
سٹرائٹیم۔ منہ پر جھاگ کے بہرہ لگاتار تھوکتا۔  
کاجو بیٹم۔ لگاتار تھوکنے کا رجحان۔

## ہکلانا۔

سٹر امونیم۔ ہکلانے کی چوٹی کی دوائی ہے۔ لفظ بولنے سے کافی دیر تک دی جائے۔  
چہرہ کو بگاڑنے اور بولنے کے لئے کافی کوشش نہ کیجئے۔

بودسٹا۔ بچوں میں ہکلانا۔

کالی بزم۔ ہکلانا۔ آہستہ اور بولنے میں مشکل محسوس کرے۔

گلکیر یا کارب۔ بڑی۔ بھاری اور سخت مالو کی وجہ سے ہکلاہٹ۔ سی ایم طاقت  
میں دی جائے

ہائیوسائیمس۔ جب ہائیوسائیمس نامیام ہو جائے تو درج ذیل دیکھئے۔

نیرم کارب۔ زبان کے بھاری پن کی وجہ سے ہکلانا۔

سکوٹا وائر و سٹا۔ جب اپنے الفاظ کو نگل جاتا ہے۔

کاسٹیکم۔ جب جوش یا انتہائی ناراضگی کی وجہ سے ہوا زیادتی ہو۔ زبان کی فابلی حالت  
کی وجہ سے ہکلانا۔

آجنٹیم نائیریم  
لائیکو پوڈیم  
وریریم ایلیم

جب نائیفائیڈ بخار کی وجہ سے۔

لیکس۔ خاص رجن تہجی مثلاً ایکس۔ ایس۔ وی۔ ٹی۔ اے پی پر ہکلانا۔

سیدرن۔ عورت میں مباشرت یا جنسی فعل کے ہکلانا۔

بیوفو۔ ہکلانا اور لڑکھڑانا۔ جب اس کی بے ربط گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو ناراض ہو جائے۔

دیکھیے نہ کا دکھنا۔ منہ کا سوج جانا۔

## منہ کا ذائقہ

چائنا۔ ہر چیز جسکے پانی کا ذائقہ بھی کڑوا معلوم ہو۔

اکونائٹ این۔ ہر چیز کا ذائقہ سوائے پانی کے کڑوا معلوم ہو۔

برائی ادویا {  
 نیشتر میوہ  
 پلسٹیل  
 سلفر

جب خوراک کا ذائقہ کڑا لگے دی گئی ترتیب میں دیتے تھے حتیٰ اگر کسی خاص  
 دوائی کی علامات ظاہر ہوں۔

کریوزوٹم - پانی پینے کے بعد خوراک کا ذائقہ کڑا معلوم دے۔  
 کاربووٹک {  
 یوریکس

کھانا کھانے سے پہلے ذائقہ کڑا۔  
 سائیکامین - نمکین ذائقہ۔ ذائقہ کم یا بگڑا ہوا۔  
 کیمفر - ہر قسم کی خوراک کا ذائقہ بڑھا ہوا۔  
 ورمیٹم ورائیڈ - پانی کا ذائقہ میٹھا معلوم دے، مٹھائیوں سے نفرت۔  
 مرک سال - روٹی کا ذائقہ میٹھا معلوم دے۔  
 کیویرم میٹ - دھاتی ذائقہ۔ چکنا اور میٹھا ذائقہ۔  
 رٹائکس - ذائقہ کھٹا یا ترش۔ دھاتی اور گریس کی طرح کا۔  
 نکس وایکا - ذائقہ بُرا۔ ترش ہر قسم کی تبدیلیوں کے ساتھ۔ دودھ کا ذائقہ پریشان  
 کُن۔ جیسے کرناوب ہو۔

بووسٹا - خون جیسا ذائقہ  
 لائیکوپوڈیم - ہر چیز کھٹی یا ترش معلوم دے۔  
 نیشتر میوہ - کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک ذائقہ رہے۔ نمکین ذائقہ  
 کیپسکیم - گندہ ذائقہ جیسے کڑھا ہوا پانی ہو۔ جب کھانے تو منہ میں جھنجھنے والا برا ذائقہ۔  
 ہائیڈراسٹس - بُرا ذائقہ جیسے کہ صابن کا ہو۔ زبان کی نوک پر ذائقہ ہو۔ میٹھا یا نمکین ہو  
 ایوڈیم - خوراک کا عجیب سا ذائقہ ہو کھانے کے عرصہ بعد تک ذائقہ ہو۔  
 کوکولس - میٹھا دھاتی ذائقہ تھوکنے کی لگتا خواہش کے ساتھ۔

میں درنہم۔ تانبے جیسا ذائقہ زبان پلست شدہ۔ خساروں اور زخموں کے اندر دفنی طرح ہے۔  
 مرکوس نیکیں ذائقہ۔ میٹھا۔ دھاتی۔ شیرہ جیسا یا گندہ اندوں جیسا۔  
 پلسٹیل۔ گلے سڑے گوشت جیسا ذائقہ، تے کے رجحان کے ساتھ۔ منہ میں جلی  
 ہوئی چیزوں کا ذائقہ، کڑوا، ہر چیز کا ذائقہ کم۔  
 سٹرمونیم۔ ذائقہ کڑوا۔ تمام چیزوں کا ذائقہ کڑوا معلوم ہو۔ ذائقہ جاتا رہے۔  
 وریٹرم البم۔ منہ میں ذائقہ کی کمی۔ بے ذائقہ تھوک۔ پسینہ کے دوران شدید پیاس  
 دیکھئے دیکھنا۔ ناسور۔

## پانچواں حصہ

## دانت

### دانت کا ناسور۔

کلکیر یا فلور۔ دانت کے ناسور اور گلنے سڑنے، دانتوں کی پالش اتر جانے کیلئے چوٹی کی  
 دوائی ہے۔ دانتوں کی پالش کا اتر جانا۔ دانتوں کا غیر قدرتی ڈھیلا پن تکلیف کے ساتھ یا تکلیف کے  
 بغیر۔ دانت اپنے خلاؤں میں ڈھیلے ہو جاتیں۔  
 سٹیفنگیہ یا۔ جب دانت سیاہ ہو جاتیں۔ ان میں گہری دھاریاں پڑ جاتیں۔ گھٹا سٹرن شروع  
 ہو گئے ہوں۔ تھوڑا سا چھوٹے پر بھی حساس ہوں۔ یعنی دکھیں۔ کھانے یا پینے پر دکھیں۔ دانت درد  
 دودھ کے دانت ابھی طرح نہ بڑھیں۔ ان پر سیاہ دھبے ہوں اور ٹوٹ چھوٹ جائیں۔  
 مرک سال۔ دانتوں کا گھٹا اور ڈھیلے ہو جانا۔ سڑھوں سے خون ہے۔  
 پلانڈینگو۔ تیزی سے گھٹا اور ڈھیلے ہو جانا۔ سڑھوں سے خون ہے۔  
 کریوزوٹم۔ جوں ہی دانت ظاہر ہوں، وہ سیاہ ہو جاتیں اور لگیں سڑیں۔  
 فلورک ایسڈ۔ دانتوں کا جلد ناسور یا آنسوؤں کا ناسور۔  
 تھوچا۔ دانت جڑوں میں گل جاتیں جب کہ سر یا باہر کے حصے تندرست ہوں۔  
 ایسڈ فاس۔ زرد دانت۔ سڑھوں سے خون ہے۔ سوچے ہوئے۔ دانتوں سے دھڑلے۔  
 سڑھوں پر درد والی کانٹھیں۔

سفلیتیم - دانت ٹوٹ پھوٹ جائیں اور زرد ہو جائیں۔ سوڑھوں کے سروں پر دانت گل جائیں اور ٹوٹ جائیں۔

میوہ کو لینے میں جب دانت بالکل نہ بچیں یا نہ ظاہر ہوں۔ یہ دوائی دانت پیدا کر دے گی۔ بچوں کے دانت گندے نظر آئیں اور تقریباً سبز رنگ کے ہوں۔ اس دوائی کی ایک خوراک دانتوں کو صاف کر دے گی۔

پتھر پھس - عقل ڈاڑھ کے نکلنے وقت کی تسکلیف کے لئے بہترین دوائی ہے۔ آرٹیکا مانٹ - معالج دندان کے پاس جانے سے پہلے ایک یا دو خوراک اس دوائی کی لینا چاہئیں۔ یہ اپریشن کے صدمہ سے محفوظ کر دے گی۔ اپریشن کے بعد دو یا تین خوراکیں ہر گھنٹہ کے بعد لی جائیں۔

ایپیکاک - دانت نکالنے کے خون میں اگر خون چمکدار سرخ اور زیادہ مقدار میں ہو۔ فاسفورس - اپریشن کے بعد دانتوں کے غلاؤں میں سے خون ہے۔ ہر نپہرہ پندرہ منٹ بعد اس کی دو یا تین خوراکیں دے دیجئے۔ خون بہنے کو روک دے گی۔ اور صدمہ سے نجات دے گی۔ دانت بے رنگ بھوسے۔ کھوکھلے۔ سوڑھوں سے خون ہیں۔ دانتوں کے غلاؤں سے مواد ہے۔ جڑ سے گلنا سڑنا۔

مینٹریم - تیزی سے گلیں سڑیں۔ اور دانت لمبے معلوم ہوں۔ سلیشیا - سوکھے مان میں مبتلا بچوں کے دانتوں کا گلنا سڑنا۔ کلکیر یا فاس - دانت نکلنے میں دیر کریں یا جلدی گل سڑ جائیں۔ چھوٹے سے یا دبائے جانے سے حساس ہوں۔

کلکیر یا کارب - موٹے بچوں میں دانتوں کا گلنا سڑنا۔ دانت ظاہر نہ ہوں، جہاں ظاہر ہوں وہ ٹوٹے پھوٹے ہوں۔ اوپر والے بدنما صہ یا ہوں۔ یہ خون کو روکنے والی دوائی ہے۔ دانت اکھاڑنے یا نکالنے کے بعد خون کو ختم کرنے میں بہت زود اثر دوائی ہے۔

کاربو وک - دانت تیزی سے گلیں۔ اسفنج کی طرح کے سوڑھے۔ آسانی سے خون بہے گرم یا

ٹھنڈی یا ٹمکین خوراک سے حیرنے پھاڑنے والی دردیں ہوں۔

نیرم مہلف۔ دانت ڈھیلے ہو جائیں اور سائیکوس حالت میں چلے جائیں اور گرمائیں۔ دانتوں سے مسوڑھے علیحدہ ہو جائیں۔ دانتوں میں گرم اشیاء سے درد، ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوائے اقلتہ۔ (ناسور بھی دیکھئے۔)

## دانتوں کی بدنمائی

تخلینیم۔ بچوں میں بد نما دانت۔ ٹوٹے پھوٹے۔ دھبے دار۔ جلدی لگیں۔ کپکپانے والے دانت۔ شدید درد۔ دانت کی جڑ میں کیڑے رنگنے کا احساس۔  
دانت گرنا۔

مرک دائیو۔ سادہ قسم کے کیسوں میں  
فاسفورس۔ مسوڑھوں میں پیپ پڑنے کی وجہ سے دانت گریں۔  
دانت کا ناسور

سلیشیا۔ دانت کا ناسور۔ مسوڑھوں کے پھوٹے۔ دانتوں کی جڑوں میں پھوٹے۔ مسوڑھے سرد ہوا سے متاثر ہوں۔

ایسڈ فلوریکم۔ دانت کا ناسور جس سے متواتر خونی اور ٹمکین مواد نکلے۔ دانت گرم محسوس ہوں۔ اوپر کے جبڑے کے دانت اور ہڈیوں پر اثر کرے۔  
علیحدگی۔

کالربو و تاج۔ مسوڑھوں کا دانتوں سے علیحدہ ہونا۔ دانت ڈھیلے ہو جائیں۔ اسفنج کی طرح کے مسوڑھے۔ دانت تیزی لگیں۔ مسوڑھوں سے خون بہے۔ ٹھنڈا اور گرمی سے درد۔ ایوومن۔ دانت ڈھیلے ہوں اور لگیں۔ مسوڑھے ہٹ جائیں مسوڑھوں سے خون بہے۔

## دانت درد

آرم ٹرائللم ۲۰۰ گلی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی دانتھ میں درد خاص طور پر بائیں طرف کی دانتھ۔  
چینو لوڈم۔ جب درد کو ٹھکانوں سے آفاقہ ہو۔

کافیا کروڈ۔ جب منہ میں برف کی طرح کا ٹھنڈا۔ پانی رکھنے سے درد میں آفاقہ ہو۔  
۲۰۰ طاقت میں خوراک دیتے۔

کلیریا کارب۔ دوران حمل میں دانت درد جو ٹھنڈک اور آرام سے زیادہ ہو۔ ادھر  
ادھر چلنے سے آفاقہ۔

پلسٹیللا۔ منہ میں ٹھنڈا پانی رکھتے یا کھلی ہوا میں چلنے پر درد میں آفاقہ۔ حاملہ عورتوں  
میں اعصابی دانت درد۔ مریض کو پائیں نہیں لگتی، پسینہ زیادہ آتا ہے۔ گرم چیزوں اور گرمی کی  
گرمی سے درد میں زیادتی۔

فاسفورس۔ جب پانی ہاتھ ڈوبنے سے درد زیادہ ہو۔ دھوون عورتوں میں دانت درد۔  
ہیکٹلا لاوا۔ دانت درد۔ مسوڑھوں کے پھوٹے۔ جبروں میں سوزش۔ دانتھ کی نکیلیں۔  
کیوروزم۔ گلے ہوئے دانتوں کا درد۔ سکولتی مسوڑھے۔ دودھ کے دانتوں کا دقت  
سے پہلے لگنا۔ دزرد۔ گرے ہوں اور بھر گل جائیں۔

ایلیم سیدیا۔ جب درد کو ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے پانی سے دھونے آفاقہ ہو۔ دانت  
کو خلال کرتے سے اور چرسے سے درد میں آفاقہ۔

بیلادونا۔ دانت میں تپکن وار درد۔ اور دانت کے بڑھے ہونے کا احساس۔

نیٹرم میور۔ دانت درد۔ دانت بہت حساس۔ اندر ہوا لیجانے، زبان کے دباؤ۔

اور خوراک کے دباؤ سے درد۔ دانت ڈھیلے ہو جائیں۔ دانتوں سے کانوں تک کھینچنے والی درد۔

میکینٹس پوس آرک۔ دانتوں میں درد۔ پچھلے بائیں جبرے کی سوزش کے ہمراہ۔

ایک زخار سرخ اور گرم۔ جسم ٹھنڈا۔

اگریکس ایم۔ دانتوں میں درد اور اوپر کے جبرے کی ہڈی میں۔

لہٰذا کو پوچھیں۔ مسوڑے سوچے ہوئے گرم اور نرم۔ پھلانگتی ہوئی دانت درد، گرم خوراک  
 سے افاتہ۔ دانت کو چھونے سے یا دباؤ ڈالنے سے زیادتی۔  
 سبب۔ حمل کے دوران میں دانت درد۔

انٹیم کروڈ۔ خلاء والے دانتوں میں درد۔ بعض اوقات درد سر میں جذب ہو۔ رات کو  
 اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ درد۔ دانت کو زبان سے چھونے سے شدید درد۔ اعصاب کو بھانسنے  
 والا درد۔ کھلی ہوا میں چلنے پر افاتہ، ہر کھانے کے بعد، گلے میں کٹے والی کلیف۔  
 نیرٹم کارب۔ ٹھنڈا پانی اور میٹھے پھل کھانے کے بعد دانتوں میں درد۔

بسمتھ۔ منہ میں ٹھنڈا پانی سے دانت درد کو افاتہ۔  
 چاننا اوٹ۔ بچے کو دودھ پلاتے وقت دانت درد۔  
 کلیمٹس۔ گلی مشری دار ٹھنڈے درد۔ روٹی کا ٹکڑا انہیں آنے پر شدید درد۔ ٹھنڈے  
 پانی پر افاتہ۔ تباکو نوشی پر زیادتی درد۔

مرک سال۔ جب گلے ہوئے دانت کی جڑ پر سوزش ہو۔ دانت سیاہ۔ گندے اور گلیں۔  
 تیکن دار دانت درد جو رات کو زیادہ ہو۔ یا منہ دار موسم میں زیادہ ہو۔ دانت لمبے معلوم ہوں۔  
 اور دیکھیں۔ ٹھنڈی یا گرم اشیاء گلنے سے زیادتی ہو۔

اگنس کاٹس۔ گرم خوراک یا گرم مشروبات سے دانت درد میں زیادتی۔  
 فاسفورس۔ جب پانی ہاتھ ہاتھ ڈوبنے سے درد زیادہ ہو، دھوین عورتوں میں دانت درد۔  
 کیموٹیل۔ جب گرم خوراک یا گرم مشروبات سے درد زیادہ ہو۔ ناقابل برداشت درد۔  
 ناقابل برداشت تکلیف تمام دانتوں کی قطار میں درد جو کانوں اور چہرہ تک اثر کرے۔ دانت  
 درد کہ دن کے وقت افاتہ رات کے وقت جو نئی مریض گرم بستر میں جاتا ہے درد ہو۔  
 سٹیف سکیہ یا۔ دانت درد جو آنکھوں تک جائے۔ سیاہ، کوٹھے دھوئے والے گلے ٹرنے  
 والے پرت دار چھونے اور ٹھنڈی اشیاء سے بہت متاثر ہوں۔ حیض کے دوران دانت درد۔ گلے  
 دانتوں کی جڑوں میں کٹنے والا درد۔ گلے ہوئے دانت کو چھونے سے درد۔

کلکیر یا فلور۔ دانت درد کے لئے جب کیلیم کی کمی اور دانت پالش نہ ہو سکے کے لئے بہترین دوائی ہے۔ جب کوئی خوراک دانت کو چھو جائے تو دانت درد۔  
پلائینٹیکو میجر۔ دانت درد جو کانوں تک جائے۔ اس کا مدرکچر اور پرنکچر لگایا جاسکتا ہے یہ فوراً درد کو بند دیتا ہے۔

کوئینسیلا۔ دانت، مسوڑھوں اور منہ کا اعصابی درد جس کی زیادتی رات کو ہو۔  
ایم ایملیس۔ دانت درد جس میں دانت کو دانت سے دبائے پر افاقہ۔  
میگنیشیا کارب۔ حیض کے دوران اور حیض سے پہلے اور حمل کے دوران دانت درد چہرے کے بائیں طرف۔ درد اگرچہ دانتوں کی جڑیں بالکل صحیح ہوں۔  
نیٹرم سلف۔ دانت درد کو گرمی سے زیادتی۔ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے افاقہ۔ مسوڑھے دانتوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ ڈھیلے ہوں اور گرہیں۔  
کاربووٹیج۔ گرم۔ ٹھنڈی یا نمکین خوراک سے کھینچنے والی اور پھاٹنے والی دردی مسوڑھوں سے خون بہے۔ انفج کی طرح مسوڑھے جب دانت صاف کرے، خون بہے۔  
مسوڑھوں کا دانتوں سے علیحدہ ہونا۔ دانتوں کی ساری قطار زیادہ لمبی اور بہت نرم معلوم ہو۔  
ریفینس۔ حمل کے ابتدائے میں دانت درد۔  
روڈوڈینڈرون۔ طوفان سے پہلے یا طوفانِ بادِ باران کے دوران دانت میں درد۔  
آرنیکا مانٹ۔ دانت اکھاڑنے کے بعد۔ دانت بھرنے کے بعد یا سوراخ کرنے کے بعد خون نکلنے کے لئے مفید ہے۔

سپانچیلیا۔ گلے ہوئے دانتوں میں پھاٹنے والی درد جو دائیںوں تک کی ہڈی کو متاثر کرے۔ تکلیف دہ جھٹکے، گلے ہوئے دانتوں میں ٹھنڈک سے یا ٹھنڈے پانی سے سر کو رٹنے پر رکھنے تکلیف میں زیادتی۔ سر کو اٹھانے پر افاقہ۔

الیومن۔ دانتوں سے خون بہے، مسوڑھے گلیں۔ اور دانتوں سے پرے ہٹ جائیں۔ دانت ڈھیلے ہو جائیں۔ دانت اکھاڑنے کے بعد خون نکلے۔

## متفرقات - کاٹتا ہے کاٹنا زبان کا کینسر - سرطان

الیومن - زبان خشک - سیاہ شام کے وقت - جلن دار درد - دکھن کا احساس  
زبان کی نوک پر چھین والا درد - سختی کا رجحان جب کبھی بھی سوزش زبان پر ہو -  
فاسفورس - زبان کا سرطان - جیسے کہ زبان کے درمیان میں سوراخ، زبان سوچی ہوئی  
کنارے اوپر کو ابھرے ہوئے اور سخت - شدید خون بہنے کے ساتھ زبان کا کینسر یا سرطان -  
ہر ہفتہ - ۲ طاقت کی ایک خوراک دیجئے -

ایپس ایم - گوڑ - سختی - سخت کینسر یا کھلا ہوا سرطان - ڈنگ لگنے جیسی جلن دار درد  
زبان خشک - سوچی ہوئی - نہ نکل سکے کے سوزش - بھٹی ہوئی، دکھتی ہوئی - سرطان زدہ یا دھو  
سے دھانپی ہوئی - زبان کا سرطان

آرسینک الیم - زبان نیلی یا سفید - نیلے رنگ کے ساتھ سرطان زدہ - جب آرسینک کی  
نمایاں علامات ہوں تو یہ پوٹینسی کی صورت میں دینے پر شفا ہو جائے گی - جب علاج بالمثل زیادہ  
سادہ حالت میں درکار ہو تو چھوٹی پوٹینسی بہتر کام کرتی ہے - جیسا کہ اس حالت میں آرسینک ملان  
زدہ نسجوں پر اور سرطان زدہ نظام پر بہت اچھا کام کرتا ہے -

آرسینک ہائیڈرائڈ - زبان کا سرطان - دانتوں کا نشان زبان پر ہو - کن روں کی طرف کنڈر ہٹاؤ -  
ہائیڈرائڈس - زبان برسی ہوئی مگر سستہ قاعدہ ناسور - گردہ دار سوچیں، مگر کم اور خشک -  
کنڈر انگو - زبان کا سرطان، منہ کے کونوں پر تکلیف دہ چیرے - زبان کی اوپر والی سطح پر  
تکلیف دہ - گوڑ یا چھنسیاں یا زبان کی نوک کے دائیں طرف -

کالی سائینٹم - زبان کی دائیں طرف سرطانی چھوڑے - ہونٹ اور بلغمی جھلی زرد - زبان گہری سفید پالش کے ساتھ -

آرم میٹ - منہ کا دھاتی ذائقہ - زبان ہلکی بھوری قرص کے ساتھ پالش شدہ - ذائقہ نہ ہو - نگین - منہ میں کڑوا ذائقہ - خشکی کا احساس - ذائقہ نہ رہے - زبان چمڑے کی طرح سخت اور ہل نہ سکے - سوزخ غروب سے لیکر سوزخ طلوع ہونے تک زیادتی - خودکشی کا رجحان - ٹھنڈی پھوٹی، آتش یا پارے کے اثر کی وجہ سے -

آرم میور - زبان میں رُرا ذائقہ - ذائقہ مطلقاً جاتا رہے - سرطان - زبان چمڑے کی طرح سخت بمشکل ہے - سُرخ خشکی - زبان پر پھبیاں -

بنیز واک الیڈ - ہلکے نیلے رنگ کی زبان - پیشاب بہت بُودالا - اور بہت رنگدار سطح زبان اسفنج کی طرح گہرے شکاف اور پھیلتے ہوئے زخم - منہ کے بائیں طرف سرطانی گومڑ - خبر دل کے اتصال یا جڑوں کے جڑنے والی نرم جگہ پر آخری داڑھ کے پیچھے -

کلکیر یا کارب - پھٹی ہوئی یا جری ہوئی زبان - پارے کے خلط استعمال کی وجہ سے زبان کی سوزش - سفید پالش والی زبان - ناگوار ذائقے کے ساتھ گندی زبان - زبان ہونٹ ہاتھ سفید اور ٹھنڈے ہوں - جب نگلیں تو بائیں طرف کی زبان کی ہڈی کے پیچھے زبان کے نیچے تکلیف - زبان کے نیچے خددوجے ہوئے - زبان اوپر کی طرف کو مٹی ہوئی گول نیم شفاف گول، اتار چھاؤ والا گومڑ - کبوتر کے انڈے کے سائز کا - تیندوا - سرطان یا زبان کے آنشکی گومڑ - چھوڑے - پھٹی ہوئی، جری ہوئی زبان - زبان کے نصف پہلو کی سوزش -

آرینیکم البم -  
بائیوسائیکس - { زبان بھوری

نیرٹم سلف - زبان پر علیحدہ علیحدہ سرخ ٹکڑیاں -

ٹاریکسکیم - نقشہ دار زبان جو دھبوں کو صاف کر دے - گہرے سرخ نشان چھوڑتے ہوئے نرم دھبے جو حساس ہوں -

کالی میسور۔ نقشہ دار زبان۔ زبان پر بھوری مائل سفید پالش یا تہ۔

## درزیں یا شگاف

بیلادونا۔ درزوں والی یا شگاف شدہ خشک۔ مھلسی ہوئی زبان۔  
 میکمل کار۔ درزوں والی خشک زبان۔ زبان کی نوک میں بھنبھناہٹ ہو کہ زبان سخت معلوم ہو۔  
 زنجیولس لیس۔ بھلکا اترتا ہوا اور درزوں والی زبان۔  
 آرم سٹراٹلم۔ بھٹی ہوئی زبان پر درز زبان، خون ہے۔ زبان کی سوزش جس کے ہمراہ ناک سے  
 جلن دار اخراج۔ زبان اور گلے کی فالجی کمزوری۔ ننگن شکل ہو۔ خوراک اور مشروبات ناک کے  
 راستے باہر نکل آئیں۔ زبان سرخ زبان پر سرخ دانے نکلے ہوئے۔ زبان تقریباً ننگی معلوم ہو۔  
 رگس وی۔ زبان درمیان سے بھٹی ہوئی ہو۔  
 کالی بانی۔ زبان بھٹی ہوئی ہو۔ گلاس کی تہ کی طرح چمکے۔  
 کنڈر انگو۔ تکلیف دہ شگاف۔  
 ہائیو سائیمس۔ زبان سخت۔ بھٹی ہوئی، خون ہے۔ مشکل سے بلوے یا بول سکے۔  
 زبان اطاعت نہ کرے یعنی مرضی کے مطابق الفاظ ادا نہ کرے۔

## زبان خشک۔

ہائیو سائیمس۔ زبان منہ میں کھرکھرائے اور جلد ہوئے چمڑے کی طرح خشک ہو۔  
 میوزمیک الیڈ۔ چمڑے کی طرح خشک، ٹائیفائیڈ بخاریں۔  
 کیمر۔ ٹائیفائیڈ بخاریں دبے ہوئے پیشاب کے ہمراہ زبان خشک۔  
 فاسفورس { اسہل میں زبان کی خشکی  
 مرک سال { دماغی ترتیب میں دتجھے۔  
 بکس ماس۔ رات کے وقت اتنی خشک زبان جیسے کر ریزہ ریزہ ہو جائیگی۔ زبان نہ کہت  
 سے چٹ جلتے۔

بیلا ڈونا۔ منہ میں ایک ٹکڑے کی طرح کھٹکھٹائے۔  
 برائی اونیا۔ پیاس کے ساتھ زبان کی خشکی۔  
 پلسٹیللا۔ بغیر پیاس کے زبان کی خشکی۔  
 سیکل کار۔ زبان خشک بھٹی ہوئی۔ خون کی طرح کی روشنائی زبان سے نکلے۔ گہری  
 پالش۔ زبان کی نوک کی بھینھنا ہٹ اور سختی۔

## سوزش

مرکب کورس۔ زبان کی شدید سوزش اور باہر نکلنا۔ منہ میں میٹھا ذائقہ۔ زبان ڈھیلی  
 ڈھال۔ دانتوں کے نشانات کے برابر۔ رات کے وقت سارے منہ میں زبان گردش کر کے پڑ  
 کرتی ہوئی۔

اکونائیٹ۔ اگر شدید بخار ہو تو مرکب کورس کے بعد دی جائے۔  
 کینتھرس۔ اگر سوزش جلنے یا جھلے جلنے کی وجہ سے ہو۔  
 ایپس ایم۔ حاد سوزش۔ خشک زبان ڈنگ لگنے جیسی جلن دار تکلیف لگے میں۔  
 ایسٹ اوگزنگ۔ اگر زبان سوچی ہوئی۔ پُر درد جلن دار اور یا جھاگ دار ہو۔  
 بنزواک ایسٹ۔ زبان کی سوزش اور زخم۔ جب جوڑوں کی در دیں۔ طوفانی موسم اور سردی  
 کی وجہ سے اچانک بند ہو جائیں۔

پلسٹیللا۔ جب خون کے بہاؤ کے رکنے اور گٹھی یا وی تکلیف کی وجہ سے سوزش زبان ہو  
 بیلا ڈونا۔ جب تکلیف تیزی سے مرکب کورس کی ساتھ ٹھیک ہو، جب تکلیف تیز تر کا خیر بادہ تم کی۔

آرینیکم الیم { جب کنگرین کی علامت کا خدشہ ہو،  
 ایکسس { تو ان ادویات کے متعلق سوچا جائے۔  
 کروٹیلوس ہو۔ زبان اپنی عمومی جامت سے دگنی سوج گئی ہو، ایک بھی لفظ نہ بول سکے  
 زبان اتنی زیادہ سوج جائے کہ منہ میں جگہ ہی نہ رہے۔

زبان پر لگانے کے لئے۔

آرنیکا۔ آرنیکا مدرنیکم کے بیس قطرے چھ چائے والے پانی کے چمچوں میں ملائیں اور دن میں تین دفعہ غرارے کرائیں۔

آرنیکا یورنیس۔ مندرجہ بالا طریقہ سے تیار کردہ لوشن کا آمیزت ہو تا ہے جب تھوڑی سی ظاہری تبدیلی کے ساتھ یا جب جلنے یا پھلنے جانے تکالیف ہوں۔

## زبان کا اعصابی درد

مینگنم۔ زبان کا اعصابی درد۔

اگر گیس ایم۔ { زبان میں جلن کے ساتھ اعصابی درد کے لئے  
آر سی سکیم ایم۔ { دی گئی ترتیب میں ادویات استعمال کریں۔

## زبان کا فالج۔

کاسٹیکم۔ فالج کے لئے چوٹی کی دوائی ہے، جب فالج کی وجہ سے تھکلا ہٹ ہو یہ سب سے پہلے استعمال کی جائے۔

ڈلکا مارا۔ زبان سوچی ہوئی اور سخت فالج زدہ محسوس ہو، باہر نہ نکال جا سکے۔

جیلیمیم۔ زبان بہت موٹی اور سوچی ہوئی اور شکل بول سکے۔

پلمیم۔ یہ ایک اور بہت اہم دوائی ہے اگر اور ادویات اثر نہ کریں تو اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

لیکسس۔ جب مریض زبان باہر نہ نکال سکے تو یہ دوائی استعمال کی جائے۔

زبان چڑے کی طرح معلوم ہو۔ بمشکل بول سکے۔

بریٹاکارب۔ بوڑھے لوگوں میں زبان کا فالج۔ بوڑھے لوگوں میں زبان کی سختی۔ عمر سے

پہلے بوڑھا ہو جانا اور بچوں کا جواب دے دینا۔ (منہ کے زیر عنوان تیندوا منہ کے زیر عنوان

## تیندوا۔ ناسور یا زخم۔

ایسڈ میور۔ بار بار منہ کے زخم۔ اسفنج کی طرح کا گوشت۔ سوچن، سختی اور زبان کا فالج۔  
 لائیکو لوڈیم۔ زبان کے بیچے زخم۔  
 ٹائٹریک ایسڈ۔ کالی کھانسی میں زبان کے بیچے زخم یا ناسور۔  
 مرکریس۔ گندے اور بغیر درد کے ناسور یا زخم۔ آتشکی سوزائیس  
 گریفائٹس۔ جب آتشک کی وجہ سے ناسور یا زخم ہوں۔  
 کاربوترج۔ جلن دار تکلیف کے ساتھ بہت ہی بدبودار اخراج۔ شام اور رات دوران  
 کالی بانی۔ زبان زخموں والی۔ موٹی خشک۔ ہموار، سُرخ اور جھٹی ہوئی،  
 شیشے کی طرح چمکے۔

پیشیا۔ زبان سوجی ہوئی۔ پردرد اور بدبودار۔ سیاہ خون سے ڈھانپی ہوئی۔  
 دُکھے۔ ننگی اور چمڑے کی طرح خشک یا جیسے کہ لکڑی کی بنی ہوئی ہو۔ چھالوں کی ٹکڑیاں  
 بن کے سرے سے زیادہ بڑے ناسور نہ ہوں۔ سیاہ اور بدبودار ہوں۔  
 امونیم میور۔ زبان کی نوک پر جلن دار دانے۔  
 یوپی روٹم۔ زبان اُبھری ہوئی ہو اور کانٹھوں سے پُر ہو۔  
 کنڈورا ٹمکو۔ زبان پر بند منہ والے زخم یا پھوڑے۔  
 سلفیورک ایسڈ۔ سوجی ہوئی زبان پر زخم۔ منہ میں چھلنے کا کافی زیادہ تھوک مانس بدبودار۔



ساتواں  
باب

پھاتی، پھیپھڑوں  
کی بیماریاں  
اور  
کھانسی

### ہوا کی نالیوں کی سوزش

اکونائٹ این - ابتداء میں جب بخار تیز ہو، ٹھنڈک لگنے سے پھیپھڑوں میں اجتماع خون، پسینے کو روکنے اور ٹھنڈی ہوا لگنے سے پانی جسے خونی لکیروں والی بلغم کا اخراج، لیکن کبھی بھی گاڑھا اور خونی لکیروں والا نہ ہو۔ غیر ضروری پریشانی اور بہت زیادہ پریشانی اور بے مینگی -

برائی اونیٹا - خشک کھانسی جو سر کو تکلیف دے جسم کے دروازوں کو بھی ہلا کر رکھے بخار میں پانی کی بہت زیادہ مقدار میں پیاس اور لمبے عرصے کے بعد زیادہ پانی پئے۔ مریض چپ چاپ لیٹ جانا چاہیے۔ اور اس کی مرضی ہو کہ کوئی اسے بلائے بھی نہیں۔

ایپیکاک - کھانسی اونچی خرخراہٹ کی آواز کے ساتھ۔ بلغم ساری چھاتی میں۔ کھانسی کے دروں کے ساتھ کھڑکے۔ تے اور کھٹن کا احساس۔

انٹیم ٹارٹ - ایپیکاک جیسی علامات ہوں سوائے شدید کمزوری اور ٹھنڈے پسینے کے۔ بلغم ساری چھاتی میں کھر کھڑائے۔ خرخراہٹ۔ ڈھیلی کھانسی لیکن بلغم نہ خارج ہو۔ مشکل سے سانس آئے۔

سیلاڈونا - سانس پھوٹے، تیز تیز۔ دباؤ دے، مشکل سے خشک کھانسی، تشنجی آواز بھاری۔ آواز بیٹھی ہوئی۔ بعض اوقات آواز بالکل نہ سکے۔ پیشاب گہرا بہت کم مقدار میں۔ جلد گرم اور خشک لیکن ڈھانپے ہوئے حصوں پر مقدار۔

ہائیموسائیمس - خشک کھانسی لگاتار جب لیٹے تو زیادہ ہو۔ میٹھے پادری کے کونے کے آواز۔ سنگٹا پلیم - ناک بند۔ ناک اور گلے میں رطوبت ہوا کی نالیوں کی سوزش کے ساتھ۔

کانوں میں اور آنکھوں کے ڈھیلیوں میں دھیمے دھیمے درد کے ہمراہ سر درد۔

ریور میکس - گلے میں گدگدی کی وجہ سے کھانسی جو ٹھنڈی ہوا سے ہو۔ ہوا میں درج حرارت

کی تبدیلی ہونے سے یا کھانے سے زیادہ ہو۔ جو نئی مریض بستر میں جا کر اپنے آپ کو کپڑوں میں پٹیتا ہے۔ دم ہوا بار بار استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کافی اچھا محسوس کرتا ہے اور کھانسی نہیں ہوتی۔ کھڑکی کھولنے سے، منہ اور ناک کو کھلا پھوڑنے پر ناک میں گدگدائی اور کھانسی شدید ہو جاتی ہے۔

ہیپر سلفر۔ جب کھانسی ڈھیلا کرنے پر کھڑکھڑاہٹ۔ کمزور کرنے والی۔ دم گھٹنے والی۔ گھٹن میں کھانسی ایک نمایاں علامت ہے۔

فاسفورس۔ نیم حاد اور دریتک ٹھیک نہ ہونے والے نرم کیوں، لمبے پتلے، زیادہ بڑھے ہوئے یا دق والے لوگوں میں۔ چھاتی میں دم گھٹنے والی اور حنفہ میں تکی۔ آواز بیٹھ جائے بلغم کھڑکھڑائے۔ غنی اور بلغم نکین اور میٹھا سا ذائقہ رکھتی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ کھانسی کر لوز روٹ۔ سانس کی نالیوں کی سوزش خطرناک بو والی سانس اور بلغم۔ مریض کے قریب کوئی آدمی جانا پسند نہ کرے۔

مرکبوس۔ سوچی ہوئی نالیوں (سانس کی) کار کام۔ نیچے چھاتی تک کھڑدراپن اور دھکن خشک دھکن والی تشنجی کھانسی جو بہت کمزور کرنے والی ہو۔ پانی کی طرح کا بلغمی اخراج تھوکر زرد اور پیپ دار بلغم۔

سلفر۔ عمل انجیز کے طور پر کام کرنے والی دوائی جب غیر جذب شدہ دھبے ہوں اور اچھی طرح سے منتخب شدہ ادویات کام نہ کریں۔

یوہر کو لینم۔ ایک اور بہت اچھی دوائی علاج کے شروع میں دی جانی چاہیے۔ جب مندرجہ بالا ادویات مرض کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہیں۔

## سانس کی نالیوں کی مزمن سوزش۔

نیفتھالین۔ سانس کی نالیوں کی سوزش دباؤ اور دبی ہوئی کھڑکھڑاہٹ والی بلغم۔ چلنے پر کتناہ دم یا سانس کا تیز ہونا۔ تنگی تنفس اور خراہٹ رات کے وقت۔ تکلیف دہ

تشخی کھانسی جس میں بلغم مشکل سے خارج ہو۔ یہ دسے میں مفید ہے۔ کالی کھانسی بخار کاہی۔ پھیپھڑوں کی دق اور تشخی کھانسی کے لئے مفید ہے۔  
 گرائڈیلیا۔ پھیپھڑوں اور معدہ کے اعصاب پر عمل کرتی ہے پہلے یہ خون کے دباؤ کو ادخا کرتی ہے نتیجہً نبض کمزور کرتی ہے اور خون کا دباؤ کم کرتی ہے اور نبض کو دھما کرتی ہے باقی علامات اس کی نیفتعلین سے ملتی جلتی ہیں۔

نوٹ :- مندرجہ بالا دونوں ادویات میں اتنی زیادہ کیا نیت ہے کہ ایک یا دو گھنٹے کے بعد اول بدل کر دی جاسکتی ہیں۔ مریض کی علامت کے مطابق ۴ طاقت میں استعمال کیا جانا چاہیے۔  
 یہ دونوں ادویات اکثر کیسوں کو قابو میں کر لیتی ہے اور سب سے پہلے دی جانی چاہئیں۔ دوسری علامات کے ظاہر ہونے پر دوسری ادویات دی جانی چاہئیں۔

کیپسکیم۔ مزین براکٹائٹس گندے سانس کے ہمراہ گہرے سانس باہر کی طرف بہانے اور بلغم کے اخراج میں۔

اوریسی۔ بچوں کے پھیپھڑوں اور سہاگنی نالیوں۔ ہوا کی نالیوں اور منویا اور چچک میں مبتلا ہونے پر۔ دیگر علامتی ادویات کے ہمراہ ہر سفقہ ایک خوراک دیجئے۔

بیسبی لینیم۔ مزین دم گھٹنے والا نزلہ، پیپ دار بلغم کے اخراج۔ ۲۰۰ طاقت میں ہر سفقہ ایک خوراک دوسری علامتی ادویات کے ہمراہ۔

ڈروکیرا۔ مزین براکٹائٹس میں مفید ہے۔ تشخی کھانسی جس میں آدمی رات کے بعد زاجرتی ہو۔ خشک کھانسی۔ اونچی گہری آواز پیدا کرنے والی جس میں مریض اپنی پھٹائی پکڑنے پر مجبور ہو۔ ٹھوس خوراک لینے میں تکلیف ہو۔ بلغم کا بوجھ میں اجتماع۔

انٹم آرسینکیم۔ جب سانس مشکل سے آئے۔ تیز سہا، سال سال کرے۔ کھڑکھڑائے نمایاں تگلی تنفس بے چینی۔ جلد دم دار اول بدل کر گرم اور ٹھنڈی۔

انٹم ایوڈ۔ کھانسی کے اکثر دورے۔ گارٹھی۔ بھاری زردی مائل پیدار بلغم خارج ہو۔ کالی بائیکرومیکم۔ دھیلی دھالی بیٹی دار کھانسی۔ بلغم کے بوجھ، حلق اور نالیوں میں جم

جانے کی وجہ سے کھڑکھڑاہٹ تاردار اور چپکنے والی بلغم۔ بلغم بہت شکل سے اُکھڑے۔  
 اور کھانسی اکثر تیز پر مینج ہو۔ اکثر بلغم کا اخراج بند ہو جائے تو گنتھیا شروع ہو جائے۔  
 کالی سلف۔ ہوا کی نالیوں کی بلغمی جھلیوں کی سوزش کے بعد چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ۔  
 بغیر اخراج بلغم کے کھڑکھڑاہٹ۔

کاسٹیکم۔ چھاتی میں خاص طور پر سینے کی ہڈیوں کے۔ تجھے تکلیف گیری خشک کھانسی  
 کی وجہ سے چھاتی میں دکھن کے ساتھ کھڑکھڑاہٹ۔ چھاتی کی تنگی گہرے گہرے سانس لے۔  
 کھانسنے وقت۔ اکثر بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے۔

کاربوورسج۔ شام کے وقت گلے کا بیٹھ جانا۔ سنجہ اور ہوا کی نالیوں میں دکھن اور  
 کھڑن یا خراش۔ چھاتی میں دباؤ، بوڑھے لوگوں میں ہوا کی نالیوں کی سوزش۔ کافی زیادہ  
 زرد بدبودار بلغم خارج ہو۔ ہوا کی نالیوں سے اخراج خون۔

انٹیمٹارٹ۔ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز۔ نبض تیز اور کمزور، پھپھڑے کمزور اور  
 جزوی طور پر فالج زدہ۔

آر سینکیم البم۔ سانس کی نالیوں کے علاوہ، آنکھوں، ناک اور حلق اور انتہائیوں سے  
 پتلے جلن دار پانی کا اخراج۔ شدید بے چینی اور کمزوری۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑے  
 ٹھنڈے پانی کی پیاس۔

سکوٹیللا۔ بہت زیادہ لیسار اور چپکنے والی بلغم۔ لیسار اور چپکنے والی بلغم کی  
 نوعیت کی وجہ سے مریض کو بلغم کھاڑنے کے لئے کافی دیر تک کھانا پڑے۔  
 پلسٹیللا۔ بہت زیادہ زرد بلغم یا بیپ دار اخراج، گلے سے، ناک سے، آنکھوں سے  
 مریض کھلی ہوا میں آفتاد محسوس کرتا ہے۔ چشمانی میں سرور بھی ہو سکتا ہے۔

امونیم کارب۔ بلغم کا خارج نہ ہونا اس دوائی کی نمایاں علامت ہے اگر بلغم خارج ہو  
 تو اس کے ساتھ غونی لگیں ہوں۔ دل کی دھڑکن۔ کمزوری اور نبض کی تیزی ہوتی ہے۔  
 لیڈم۔ جب نسجوں میں ہوا کی موجودگی ہو۔

نارسیس - مزمن کیسوں میں اسے ۲ طاقت میں دیتے ہیں!  
 کلورم - جب براؤنکائیٹس کے بعد سانس ٹرک جائے۔  
 سیبل سیر - مزمن براؤنکائیٹس ہوا کی نالیوں میں پھیلاوٹ کے بعد۔

## ہوا کی نالیوں کی بلغمی جھلیوں کی سوزش

ٹیوبوکلینٹم - ہوا کی نالیوں کی بلغمی جھلیوں کی سوزش کی چوٹی کی دوائی ہے اور مرض کے شروع میں ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک دی جائے۔ دوسری ظاہر ہونے والی دوائی جو بیس گھنٹے کے بعد دی جائے۔

اپریکاک - چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ تے اور متلی کا رجحان پھینکوں کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس اور گھٹن۔

برائی اوریا - جب خشک کھانسی اور سانس زیادہ پانی کے لمبے وقفے کے بعد مریض خاموش ہو کر لیٹا چاہے یا بے چین ہوتا ہے، چھاتی میں درد کیوجہ، سانس مشکل سے لے اور تکلیف دہ ہو۔

چیلنڈوم - دائیں پھیپھاڑے متاثر ہو۔ جلد اور پھوٹا سانس تنگی نفس بھوٹی تھکا دینے والی کھانسی۔ کھڑکھڑانی والے شکل سے بلغم خارج ہو۔ دائیں کندھے کے جوڑے نیچے سونال لگنے جیسا درد۔ ناک کے نھنوں کا پھر پھر انا۔

آئیوڈین - دائیں طرف کا نمونہ زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ۔ بلغم خون کی لکیر کے ہمراہ۔ چھاتی مشکل سے پھیلے۔ مشکل ساں ساں کرتی ہوئی۔ عمل نفس یا سانس پھیپھاڑوں کے پردوں سے اخراج۔ کھانسی جس کی زیادتی۔ کمرے میں گرمی سے اور نمدار موسم سے۔ فاسفورس - خشک کھانسی بہت کم بلغم کا اخراج اور چھاتی پر دباؤ۔ ڈھیلی کھانسی خون آمیز اور پیپ دار بلغم کا اخراج۔ ۲۰ طاقت سے کم ہرگز نہ دینا چاہیے۔

آرسینک آئیوڈ - یہ آرسینک البم کی علامت رکھتی۔ لیکن یہ کسی بیشی میں مختلف ہے۔ آرسینک

ایہم کا مریض گری سے آفتاب محسوس کرتا ہے جبکہ آریسٹیکم ایہم کی علامات کا مریض گرم بیہوش یا گرم چہرہ  
یا گرم کمرے میں جانے پر زیادتی محسوس کرے

گلیسیرین - انفلوئنزا والا نمونیا - بہت زیادہ اخراج اور تنگی تنفس - دونوں پھیپھڑوں کا  
جم جانایا جام ہو جاتا۔

لو سیلیا الفلیٹا - بچپن کی پھیپھڑوں کا سانس کی نالیوں کی سوزش اچھاتی کی تکالیف کا  
نامکمل آرام، خاص طور پر پی پی کے خارش۔

انٹم ٹارٹ - کھلے ہوئے دھوئیں والے ہر سانس کے ساتھ پھیپھڑوں کے لئے نفع  
پھیپھڑے بلغم دار، بلغم سے بھرے ہوئے۔ اٹھانا مشکل ہو۔ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ۔  
شدید کمزوری اور عمل کی کمی۔

لائیکو لوڈیم - انٹم ٹارٹ کی طرح کی علامات کے لئے، لیکن جب وہ کام کرنے میں  
ناکام ہو تو ہر سانس کے ساتھ نفعوں کا پھیپھڑوں کا پھیپھڑا اور تکلیف دہیں طرف سے شروع ہو  
اس دوائی کی نمایاں علامات ہیں، اچھا رہے کے ساتھ۔

سلفر - یہ ایک عمل انجن کے طور پر کام کرنے والی دوائی ہے۔ پھیپھڑوں کے دھبوں  
کے سلسلے میں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایسے دھبوں کی وجہ سے بخار ہو تو اس کو  
دور کرتی ہے۔ برے حال اور جگر بڑے ہوئے کیسوں کے لئے مفید ہے اور سرورک طبیعت۔ ٹی بی  
کے رجحان کے ہمراہ کمزوری اور بیہوشی۔

## خنازیر - بھیریں۔

برومیم - پھیپھڑے کے دائیں حصہ پر رات کے وقت ۲ طاقت کی ہر روز ایک دوڑ دی جائے۔  
سانس کی نالیوں کا سردی کا زکام  
برٹیا کارب - بوڑھے لوگوں میں دم گھٹنے والی کانسی۔ پھیپھڑوں میں دھوئیں کا احساس

جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو۔

گلیسرین - الفلوئیز اور نمونیا بہت زیادہ نزلہ و زکام اور تنگی تنفس، دونوں بھیڑوں کا جام ہو جانا۔ یا جم جانا۔ ۲۰۰ طاقت میں دے دیجئے۔

آرم ٹرائفلم - جب سبزہ کی کھانسی کے ہمراہ۔

## پھیپھڑے کے پردے کی سوزش - ذات الجنب

برائی اونیا - جب تکالیف پھیپھڑے کے پردہ کی سوزش کی نوعیت کی ہوں جن میں سوئی بٹنے اور بھالا لگنے جیسی نوعیت کی ہوں۔ اور حرکت کرنے پر زیادہ ہوں۔ جب مریض آرام کر رہا ہو یا تکلیف والی طرف لیٹ جائے تو ان میں آفاقہ ہوتا ہے۔

رنکولس بلب - پھیپھڑوں کی بھلی کی سوزش، استسقاء یا جلدور اور چکنے کے ہمراہ چھاتی کے پٹھوں میں درد اور دکھن۔ پھیپھڑوں کی بھلی کی سوزش کے لئے چوٹی کی دوائی ہے مریض درد والی جگہ پر دباؤ یا چھوئے جانے کو پسند نہ کرے۔

آر سینکم البم - جب بہت زیادہ بے چینی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہو اور نمایاں کمزوری ہو۔ دریں۔ جلن دار نوعیت کی ہوں، جن کو گرمی اور گرانش سے آفاقہ ہو۔ دمہ والا سانس اور تنگی تنفس۔

آر انیا ڈایا { ان ادویات کی ڈاکٹر کلارک نے جسمانی ساخت کے مطابق سفارش کی ہے جب جسم میں پانی بھر گیا ہو  
ایپیکاک { اور پھیپھڑوں کی بھلی کی سوزش دفعہ دار بخار کے ہمراہ۔  
نکسوا میکا {

کینتھرس - یہ دوائی پھیپھڑوں کی بھلی دوسری ٹیج جس میں چھاتی میں شدید گرمی اور جلن کا احساس ہو۔ بہت زیادہ مقدار میں اخراج ہو۔ امعاء مستقیم اور معتدیل جلن ہو بیلاڈونا۔ پتوں میں پھیپھڑوں کی بھلی دوسری ٹیج جس میں چھاتی میں تشنج کے ہمراہ۔  
اجتماع خون کی سم کا ہو۔

ایس میل - جب رطوبت کا اخراج زیادہ ہو لیکن کینتھرس کے مقابلہ میں سوزش کم ہو  
رطوبت کی زیادہ مقدار کی وجہ سے تنگی تنفس اور سانس میں گھٹن -

اسکلی پیاز - { جب برائی اونیانا کام ہو جائے تو ان کا خیال  
سنیگا - { کچھے یا ان کے متعلق ضرور سوچئے !

کالی کارب - پھیپھڑوں کی مزمن سوزش تیز ہوئی - جسے جیسے پھلانگنے والی جلن دار  
دردیں، چھاتی میں ٹھنڈک کے ہمراہ - کھانسی اور دمردالا سانس - صبح تین بجے زیادتی -  
حرکت کرنے پر دردوں میں زیادتی یا تکلیف والی طرف لٹنے زیادتی - ٹھنڈی چیزیں لگانے  
سے عارضی افادہ -

سٹانم - چاقو گھونسنے جیسے درد - آگے کی طرف کھینکے خاص طور پر بائیں طرف زیادتی  
آرینکلم آیوڈ - پھیپھڑوں کی پیپ سکلتے والی سوزش، سانس خارج کرتے وقت شدید کمزوری  
تیز دبی ہوئی کھانسی -

ایسپیر سلفر - جب پیپ اکٹھی ہو جائے - تہق اور کمزوری نمایاں ہو ٹھنڈک کے بار بار حملے  
کے ہمراہ - بخار اور پسینے - زیادہ دیر تک پیپ رہے -

سلفر - { پھیپھڑوں کی جھلیوں کی مزمن سوزش اور اخراج، سانس پھوٹا چھاتی  
سورائٹیم } میں دباؤ اور کمزوری - سورائٹیم خاص طور پر اس وقت ضروری ہوتی ہے جب  
بدبودار سانس اور بہت ہی بدبودار پیپ -

سیلیشیا - بلا تکلیف پیپ کا اخراج کافی عرصہ سے پہلی بدبودار پیپ آہستہ آہستہ  
کمزوری لاحق ہو -

پھیپھڑوں کے پردوں کی سوزش کی ادویات دیکھیے -

پسلیموں کی تکلیف - نمونیم -

ایکونائٹ - ابتدائی درجہ میں جب تیز بخار سے پہلے سردی لگے - پھیپھڑوں میں اجتماع خون

سخت خشک تکلیف دہ کھانسی، پتلی خون کی لکیر والی بلغم کا اخراج لیکن کبھی بھی گاڑھی خون والی نہ ہو۔ غیر ضروری پریشانی -

دریٹرم وائٹڈ - پھیپھڑوں میں شدید اجتماع خون۔ دل کی شدید دھڑکن جو تیز نبض سے ظاہر ہو، متلی۔ اٹھنے پر غشی۔ زبان درمیان سے ذرا نیچے سرخ -

برائی اونیٹا - جب پھیپھڑے ٹھوس ہو جانا شروع ہو جائیں۔ کھانسی سخت اور تکلیف دہ۔ سانس لینے پر دباؤ۔ آرام سے لیٹ جانا چاہیے۔ پہلے ۹ طاقت میں دتبعہ مہجب آفاذہ شروع ہو جائے تو ۲۰ طاقت میں دتبعہ -

انٹم مارٹ - برائی اونیٹا - انٹم مارٹ کلام ہو جائیں تو یہ دی جائیں یہ ۲۰ طاقت میں دی جائے -

فاسفورس - برائی اونیٹا کے ساتھ آدل بدل کر دی جاسکتی ہے۔ جب کھڑکھڑاہٹ والی آواز - چھاتی میں پائی جگے اور پھیپھڑے کے فالج کا خطرہ ہو -

سلفر - جب پھیپھڑوں سے رطوبت رسے تو یہ دوائی نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ نہ مل ہونے والے پھیپھڑوں میں دھبوں کو بننے سے روکتی ہے اور شفا دیتی ہے

چیلیڈونیم - منویا صفرادی علالت کے ہمراہ -

ٹیوبرکولنیم - بطور عمل انگیز دوائی کے استعمال کی جانی چاہیے۔ ساختی خرابیوں اور زہر کو دور کرنے والی دوائی ہے۔

نکس و امیکا - [اسی اور مندار موسم میں بہت جلد متاثر ہونے والے اشخاص میں اپیکاک (اس مراد سے ایسے مریض جو مندار رہائش سے بہت جلد متاثر ہو ارنیا ڈائیا دیما) جاتے ہوں۔ یہ مریض اپنے جسم میں بہت زیادہ رکھتے ہیں ایسے مندار موسم یا مندار رہائش سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ دائیں پھیپھڑے کا منویہ کی وجہ سے ٹھوس ہو جانا۔ بائیں پھیپھڑے بائیں ٹھیک۔ آدل بدل کر اچھے ہوں یا متاثر ہوں۔ ٹھنڈی کریں۔ دی گئی ترتیب میں یہ ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں۔

سنیگا۔ جو نمونہ پھیپھڑوں کی سوزش کے ہمراہ ہو چھاتی۔ چھاتی میں درد و حرکت کرنے پر اچھا محسوس ہو۔ کھانسی اور دماغ آرام کرنے پر اچھے ہوں۔

ایڈوڈیم۔ جب پھیپھڑوں کا انجماد شروع ہو چکا ہو۔ اور تنگی تنفس نمایاں ہو۔ بخار اور متاثرہ طرف ٹی بی والی سرخی ہو۔

سٹرکنیا فاس۔ جب اسٹم ٹارٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوائی اسٹم ٹارٹ کی تمام علامات رکھتی ہے جیسا کہ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ۔ کمزور تیز نبض۔ تنگی تنفس، ٹھنڈے پسینے وغیرہ کمزور دل کے ہمراہ۔ یہ تین طاقت میں دی جانی چاہیے۔ مریض کی حالت کے مطابق ہر گھنٹہ کے بعد دی جانی چاہیے۔

سٹام ایڈوڈ ایڈ۔ نمونیا کی آخری سیٹیج میں جمے ہوئے حصے کا حل ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہو، باقی حصوں کو بغیر جمے ہوئے پھوڑ کر بغیر تحلیل شدہ نمونیا میں جب سرفز ۱۰ ملا ناکام ہو چکا ہو۔ گرائڈیلیا۔ دل میں چربی کے اجتماع کے ہمراہ اسٹم ٹارٹ والی علامات میں ضروری ہے۔ سونے سے ڈرے ایسا نہ ہو کہ سوتے میں دل فیل ہو جائے۔ لازمی بالگاتر ہے۔ دیکھنے کے لئے کہ دل دھڑکتا ہے۔

سٹرو فنٹھس۔ نمونیا کے دوران میں دل کے فیل ہونے کو روکنے کے بہترین دوائی ہے۔ نبض تیز، کمزور اور بے قاعدہ۔ چوٹی کے قریب سوئی لگنے جیسی اور اینٹھن وار در دیں۔

## تپ دق۔ ٹی۔ بی

فاسفورس۔ ٹی بی کے علاج کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ پھیپھڑوں اور لمبی لمبوں کے لئے خاص لگاؤ رکھتی ہے۔ مریض غالی چھاتی والا یا مرغی کے چوزے جیسی چھاتی والا اور خون تھوک سکتا ہے یا خون تھوکے۔ گلا بیٹھا ہوا۔ شدید سرسراہٹ والی کھانسی جو ہنسنے یا بولنے پر زیادہ ہو چھاتی میں دباؤ کے ہمراہ۔ ۲۰ طاقت سے کم یہ دوائی ہرگز استعمال نہ کیجئے۔

ٹیوبیکولینیم۔ یہ ایک عمل انگیز دوائی ہے۔ ۲۰ یا اس سے اوپر کی طاقت ہر سہتہ بعد یا پندرہ روز بعد دوائی کی طاقت کے مطابق ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت استعمال کیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی گولیوں کی صورت میں ۴ یا ۵ گولیاں ایک خوراک میں استعمال کریں۔ یہ بہتر ہے کہ ایک ڈرام کی شیشی میں گولیاں ڈال کر اس کے دو یا تین قطرے ڈال دیں اور ان کو جھٹکے دے کر ہلا کر رکھ چھڑیں۔ کیونکہ قطرہ کی صورت میں دوائی کا استعمال مرض کو بڑھا سکتی ہے جس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔

آر سینکیم آئیوڈ۔ جب نلویا انفلوئنزا بڑی وجہ مرض ہو۔ کمزوری اور لاغری نمایاں علامات ہیں۔ شدید پیاس لگتی ہے۔ لیکن ٹھنڈا پانی معدہ میں بے چینی پیدا کرتا ہے اسلئے مریض گرم مشروبات استعمال کرتا ہے۔

آئیوڈم۔ جب غدود متاثر ہوں تو یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے مریض عموماً گرم رنگ کا ہوتا ہے۔ خشک غیر صحت مند جلد اور کافی زیادہ بخار ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ لاغر ہوتا رہتا ہے۔ لگاتار اور رنگ کرنے والی کھانسی ہوتی ہے۔

کلکیریا آئیوڈائیڈ۔ جب ماسایقی غدود مطبوت ہوں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ شدید کمزوری صحت بدلیوں اور کھال کا ڈھانچا پیٹ، بہت زیادہ تنا ہوا۔ غدود بڑھے ہوئے اور دانے دار۔ پاخانہ کی کئی دفعہ حاجت ہو۔ پاخانوں کا رنگ سبز یا مختلف رنگوں کا بہت زیادہ گیس کے ہمراہ۔ جلد بہت خشک سوائے رات کے پسینوں کے ۶۰ یا ۳۰ طاقت عام طور پر استعمال کی جاتی ہے ٹیوبیکولینیم بوجہ۔ اگر ۱۰۰ یا اسی ایم طاقت میں دی جائے تو یہ حفظ تالقدم کے طور پر اور شفا دینے والی ہوتی ہے، زندگی میں صحت ایک یا دو خوراکیں دی جائیں ۳ یا ۴ ملہ کے وقفے سے۔

کاربو انیمیلس۔ پھیپھڑوں کی دق کی آخری سٹیج کے لئے ہے۔ دم گھٹنے والی آواز میٹھی ہوتی۔ کھانسی جو تمام دماغ کو ہلا کر رکھ دے، سبز بدبودار بلغم اور پیپ خارج ہو۔ بدبودار تھوک میٹھا۔ بدبودار اور تنگی تنفس۔ سیبل سر۔ حنجرہ کی ٹی بی کیلئے مخصوص ہے۔

گیلیکیم ایسڈ - جب پھیپھڑوں سے خون بہنے کے ہمراہ - بہت زیادہ بلغم کا اخراج اور رات کے پسینے -

چینیئم سلفٹ - جسم کے گھل جانے کے ساتھ یعنی ٹی بی کے مریض کی آخری سٹیج میں جب شدید بخیف و زرار ہو جائے -

(۱) - وزن میں کمی (۲) - سالوں تک لگاتار کھانسی رہے (۳) جب کھانسی بند ہو جائے تو داہنی طرف چہرے میں درد یا مندار موسم میں زیادتی - (۵) ہر سوچتھے دن مرض کی زیادتی - دوسرے معنوں میں یہ دوائی ٹی بی کے مریض جس میں بانی زیادہ ہو گیا ہو کے لئے بہتر ہے -

فاسفورس } پینے اور معمولی کھانسی (تین ہفتوں کے بعد متواتر ہر دو گھنٹے کے بعد  
کالی نائٹرکیم } اول بدل کر استعمال کرنے کے بعد بخار جاتا رہا، لیکن ایک سال کے

بعد یا زیادہ عرصہ بعد بیماری کی واپسی کا خدشہ ہوتا ہے - نکسولمیکا اور آرمیکس ایم اول بدل کر دینے سے یہ رجحان ختم ہو گیا -

سٹانم آئیوڈس ۳۳ x - صاف رنگت والے اور لمبی پلکوں والے لوگوں میں ٹی بی کے لئے مفید ہے - گلے میں سرسرابٹ کے ساتھ کھانسی ہو -

ویکسینم ۲۰۰ x - ٹی بی کے دوران کھانسی کے لئے عمل ایگز کے طور پر کام کرنے والی دوائی ہے -

اوسیمیم ۲۰۰ x - جب پیشاب سے نفشہ جیسی بو آئے، مولی جیسے ڈکار اور پس جیسا پسینہ ہو - سانس کی نالی میں جھین ہو -

لائیکوسپس وزج - دق کی ابتدائی سٹیج میں (باٹیں چوٹی تاثر ہو) پاخانے کے ڈھیلا ہونے کے ہمراہ -

کوکولس انڈ - حنفہ کی دق جس کے بعد ہوا کی نالیوں کا نزلہ - نکام ہیکس ٹوسٹا - جب پھیپھڑوں سے خوں آنے کے ہمراہ - لگاتار آواز کا بیٹھ رہنا -

خشک سرسراہٹ والی کھانسی رات کے وقت زیادتی جو سونے نہ دے۔ تنگی تنفس ٹیڑھیاں چڑھے پر زیادتی  
 سلفر۔ ایسے لوگ جو ٹوٹ پھوٹے گئے ہوں زرد اور کمزور چمکے والی۔ خشک کھانسی نندار اور ہلکی۔  
 پاؤں اور ہاتھوں کی جلن۔ ۲۰۰ کی طاقت میں دی جانی چاہیے اور دہرائی نہ جائے کیونکہ یہ ٹی بی  
 کی حالت کو دوبارہ لا سکتی ہے۔

اسٹونیامی۔ ہلکا بخار، پچپش کے ہمراہ طاقت استعمال کیجئے۔  
 کلکلیہ یا فاس۔ جب مریض بہت کمزور ہو جائے تو ایک ایم طاقت میں استعمال کیجئے۔  
 لیکنٹھس۔ رات کے پسینوں۔ خشک کھانسی۔ درد اور گردن میں سختی،  
 پھرے پر سرخی کے دائرے ٹائیفائیڈ بخار یا ٹائیفوئوئوئیا میں بھی بہتر ہے۔  
 پکس لیکوئیڈا۔ پھیپھڑوں کی دق کی تیزی سیٹج میں ہیپ دار اخراج۔ بدبودار بو اور  
 ذائقہ تیسری کمری ہڈی کی پسلی میں درد کے ہمراہ۔

گوائیکم۔ ٹی بی کی بڑھی ہوئی سیٹج بائیں پھیپھڑے کی چوٹی پر پھیپھڑوں کی جھلی میں  
 میں درد۔ بدبودار مواد کے تھوک کے ہمراہ ۴ گرام بیٹن کو ۹۹ گرین بلک شوگر ملا کر چاقو کی  
 نوک پر آنے والا آمیزہ دن میں چار دفعہ کھلایئے۔ ٹی بی کے لئے بہتر ہے۔ بڑی تعریف مانی ہے۔  
 یہ راساٹا۔ ہوا کی نالیوں کی ٹی بی۔ رات کے پسینوں اور جسم کے وزن میں کمی کے ہمراہ  
 اکثر ہوا کی نالیوں کے نزلہ زکام کی وجہ سے۔

سیکرم لیکٹس۔ جسم کے گھٹنے کی آخری سیٹجوں میں پچپش یا اسہال۔  
 سٹائم۔ کافی زیادہ سبز رنگ کے مواد کے اخراج کی وجہ سے کمزوری۔ ٹی بی میں حرکت  
 کا میٹھا ذائقہ۔ چھاتی میں کمزوری محسوس کرے۔ بمشکل بول سکے۔

تھوچا۔ یہ دوائی بطور عمل انگیز کے دی جانی چاہیے، ایسے مریضوں کو جو آتشک  
 میں مبتلا رہ چکے ہوں۔ ۱۔ ایم طاقت میں دینا چاہیے۔

سفلیئم۔ یہ دوائی بطور عمل انگیز کے دی جانی چاہیے۔ ایسے مریضوں کو جو آتشک میں  
 مبتلا رہ چکے ہوں۔ ایک ایم کی طاقت میں دی چاہیے۔

کو نو بارک۔ ٹی بی کے مزمین اسہال۔ بہت زیادہ اور کمزوری کرنے والے۔

کافی مقدار میں مڈرینج میں دیتے ہیں۔

دوسرا۔ حنجرہ کی ٹی بی کے لیے مخصوص۔ گھٹنے کے جوڑوں یا جسم کے دوسرے حصوں کی ٹی بی۔

سیلیشیا۔ صدر پیدا کرنے والی کھانسی۔ بہت ہی ناگوار اور بول والی بلغم جو پانی کی تہہ میں بیٹھ جائے۔ بلغم ڈھیلوں کی شکل میں۔ زرد یا سبز۔ ٹھنڈے یا نمدار موسم میں زیادتی۔ اور ٹھنڈے نمدار موسم میں زیادتی۔ اور ٹھنڈے خشک موسم میں افاتہ۔ دق کی نرلا دق قسم۔ لائیکولوپٹیم۔ بچوں کی دق جو چھپک اور کالی کھانسی کے ہمراہ گردن اور بھاتی کی غیر موزوں بڑھوتری میں ملتی تھنفس۔ پیٹ کا تن جانا۔ بزمواد کا اخراج اور بھاتی میں کھڑا۔ سینشو۔ حیض کی رکاوٹ کی وجہ سے دق۔

## کھانسی

### حصہ دوسرا

دومہ۔

دومہ ایک خطرناک بیماری ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج آسانی سے نہیں کیا جاسکتا۔ حادثہ میں تکلیف کو عارضی طور پر روکنے والی ادویات دینے کے بعد ایک ڈاکٹر کو جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے ادویات کی طرف توجہ دینا چاہیے تاکہ مریض کو مستقل شفا نصیب ہو جائے۔ جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے نمایاں یا بڑی بڑی ادویات دوسری موزوں ادویات کے ہمراہ دی جائیں یہ ہیں۔

(۱)۔ ٹیوبرکولیم (۲)۔ تھو جہ (۳)۔ نیٹرم سلف (۴)۔ میسڈرینم (۵)۔ سفلیئم۔ مندرجہ بالا ادویات بطور عمل انگیز دی جاتی ہیں۔ ۱۔ ایم یا سی ایم طاقتوں میں زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ ان ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے مریض کو دو یا تین دن قبل یا بعد دوسری کوئی دوائی ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اگر مندرجہ بالا ادویات میں سے کوئی اپنا اثر دکھانا

شروع کر دے تو مزید دوائی دینا بند کر دیں۔

خوراک کے معاملے میں ایک ہدایت بھی ضروری ہے۔ سفید آٹا یعنی میدہ اور سفید کھانڈ یا ان سے بنی ہوئی اشیاء، گوشت، مچھلی، دودھ اور علوہ وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ سالم گندم کا آٹا، شہد، سلاہ، تازہ سبزیوں، پنیر اور انڈوں کے ہمراہ کھائیں۔

اکنونائٹ<sup>x9</sup> [حملے کے دوران اڈل بدل کردہ نونوں دی جائیں۔ یہ بطور حاضی علاج اپریکاک<sup>x9</sup> کے کام کرے گی۔ کھانسی اور سانس کے عمل روک سکے۔ بل میں کام کرنے

والوں کے دمہ کے لئے بھی اکنونائٹ فائدہ مند ہے۔ اپریکاک، تشنجی قسم کے دمہ جس میں چھاتی پر بہت وزن یا پریشر کی کمی کے ساتھ۔ سال کی آواز۔ کوتاہ دمی یا چھوٹے چھوٹے سانس دم گھٹنے کا احساس۔ حرکت پر زیادتی۔ لگاتار کھانسی جس سے تھ واقع ہو۔ چھاتی بلم سے پُر یا بھری ہوئی۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ٹھنڈے پستے۔ دمہ جلدی امراض کے ہمراہ۔ ۲۰۰ طاقت میں استعمال کیجئے زنجبیر۔ گیس کی تسکین کی وجہ سے دمہ۔ آواز بیٹھ جائے۔ خنجر سے نیچے شدید مشکل سے سانس لے۔ چھاتی میں سوئیاں چھین۔ صبح کے وقت دمہ کی زیادتی۔

کالی کارب۔ یہ دوائی عموماً دی جاتی ہے۔ جب دمہ کا دور خصوصی طور پر آچھی رات کے بعد یہ مریض کو مجبور کر دیتا ہے۔ وہ خاص طریقے سے بیٹھ جائے جس میں اس کو آفاقی ہو۔ موسم کی تبدیلیوں اور ٹھنڈی ہوا کے بھوکوں سے متاثر ہو۔ پُرمیجان زدہ جس۔ مختلف قسم کے خوف اور تصورات سے۔ میلا ڈونا۔ جب دمہ کی شدید دور سے ہوں، گلے اور چھاتی کی گھٹن کے احساس کیاتھ جیسے کہ مریض دم گھٹ کر مر جائے گا۔ تشنج کے خلاف دوائی ہے۔

اپیڈوہیرما۔ ایسا دمہ جس میں مشکل سے سانس آنے کے لئے مؤثر دوائی ہے ۲ طاقت یا ۳ طاقت میں دیتے۔

گمرانڈیلیا۔ جب غیر معمولی بلم کا اجتماع ہو، سوتے وقت سانس اور تنفس رک جائے پھیلے ہوئے دل کے ساتھ نسیموں میں ہوا ہو۔ بوڑھے لوگوں میں دمہ ہوا کی نالیوں کی سوزش کی وجہ بوش معدوی عصب میں نایج کا باعث ہو۔ بھوک واپس لانے کے لئے شاندروداکی ہے

دل کی دھڑکن اور تنگی تنفس کے افاقہ کے لئے۔

کاربوئیئم سلف - تکلیف والے سانس اور تیز تنفس والے دمر کے لئے ابھی دوائی ثابت ہوئی ہے۔ شراب کے استعمال سے خواب محنت والے لوگوں کے لئے۔

پلموولیس - بہت زیادہ سیٹی دار سانس - کھڑکھڑاہٹ اور پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا۔  
 پلانا اوری - دمر - سانس کی نالیوں کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر کے لئے شاندار

دوائی ہے۔ تنگی تنفس گارمی پیپ دار بلغم کے ہمارے حملہ کے دوران ۲ یا ۳ x ملاقت میں دی جا سکتی ہے۔

کلوریم - سانس کی آواز کے ہمارے دمر جب لیٹا ہوا ہو تو ناک اندر لے اور ہونٹوں سے سانس باہر لے جائے۔

امبروسیا آرٹ - بخار کا ہی کے ساتھ ریگ وید کے زرد دانوں کو دیکھ کر۔

ارالیا ریموسا - دمر نزلہ زکام سے ادل بدل کر جائے، بہت زیادہ سال سال کی اور سیٹی دار تنفس لینے پر بارات کے وقت تھوڑی نیند کے بعد تھوڑے گرم اور کمین ہو جائے گئے میں سرسراہٹ اور چھاتی میں گھٹن کے ساتھ کھانسی۔ دم گھٹنے سے بچنے کے لئے بیٹھنا پڑے۔

کالی بانی - جب دورہ یا دمر کا حملہ مباشرت کی وجہ سے ہو یا مباشرت کے بعد ہو۔  
 صبح سویرے زیادتی - ناردار اخراج اس کی نمایاں علامت ہے جو کافی مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ سانس کی نالیوں کی سوزش کی وجہ سے دمر۔

کالی فاس - اعصابی دمر میں۔ ایک ایم طاقت بطور عمل انگریز دوائی کے دیجئے۔  
 کالی نائٹریم - شدید تنگی تنفس - بیہوشی - تلی - جھمی چھن دار درد - چھاتی میں جلن دار درد - کافی اخراج بلغم۔

کالی سلف - زرد بلغم کا اخراج - چھاتی میں بہت کھڑکھڑاہٹ - وقت سے سانس آئے۔ بولنے کے تقریباً نااہل۔

الیو متا سلیکیٹ سانس لینے کا عمل کھانسی سے پکڑا جائے۔ دمر والا سانس چھاتی میں کھر کھر اہٹ کے ساتھ کھانسی سے سانس مشکل سے آئے۔

سلفر۔ جب دمر پھنسیوں کے دینے یا ان اول بدل کر۔ دمر ظاہر ہو جو بھینیاں غائب ہو جائیں یا اس کے الٹ یعنی ہو۔

لائیو لوڈیم۔ جب دمر غصہ یا جذبات کی وجہ سے ناک کے نچنے پکھنے کی طرح ہلے۔ اضمحالی دمر۔ ٹھنڈا محسوس کرنے والے مریضوں میں دمر جو ہمیشہ زکام میں مبتلا رہوں۔ جلدی تھک جانے والے اور کمزوری کرنے والے جب زکام لگے بلغم دائیں پھیپڑے میں جم جائے۔ دمر کے ہمراہ معدہ میں سبب لگنے کی طرف اور کپڑوں کے ساتھ معدہ میں اینٹھن۔ ۴ بجے سے ۸ بجے شام دمر کی زیادہ ہو۔

ناجا۔ سانس مشکل سے لے لیٹ نہ سکے۔ بہت زیادہ پھیکیں جو سانس لینے میں مدد دیں۔ پھیپڑوں کی خشکی سانس مشکل سے لے نبض آہستہ۔

نیرم سلف۔ نمدار موسم یا بارشوں کے موسم میں حملے۔ جب مریض ہر موسم کی تبدیلی کے ساتھ حملوں کا نشانہ بنے۔ صبح سویرے دمر کے حملے۔ ڈھیلی کھانسی نمدار زیادہ نمدار لیسدار سبزی مائل زرد بلغم۔ سوا کھر کھر اٹے۔ کھر کھر اہٹ۔ آوازوں۔ زیادہ مقدار میں سفید گاڑھی اور تار دار چھاتی میں دھن دھن ہو اور دبی ہوئی محسوس ہو۔ کھانستے وقت چھاتی کو ہاتھوں سے پکڑے جس سے تھوڑا سا آفاق ہو۔ سانس کی نالیوں سوزش کے ساتھ اور چھاتی میں لگاڑے کے ساتھ گنٹھیا کے ہمراہ دمر یا اس سے اول بدل کر دمر۔ اگر یہ دوائی آرام دینے میں ناکام ہو جائے تو مید ورنیم بطور عمل انگریز دوائی کے دی جا سکتی ہے۔

سمبکوس ٹائیگر۔ سانس تیز اور دقت سے آئے۔ اونچا خراہٹ والا۔ چھاتی میں دباؤ جیسے وزن ہے ہو۔ ذہنی کو فٹ اور دم گھٹنے کا ڈر ہو۔ بعض اوقات جہرے اور منہ پر سوزش سرخی رنگ کے ہمراہ۔ عام گرمی۔ خمر پھر سے زیادہ اونچا نہ بول سکے۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔ لیٹے ہوئے کی صورت میں زیادہ ہو۔ بچوں میں، نانا بانیوں میں اور نانا بیوں۔ مل میں کام کرنے والوں میں دمر۔ بچہ سانس

نلے مکے کی دھیرے جاگ پڑے، جسم پر پسینہ۔

آرم ٹر انفلیم۔ خاص طور پر بخار کا ہی کے لئے موزوں ہے چھینکیں۔ شام کے وقت گلے میں درد اور سکرٹن بہت زیادہ نزلہ و زکام کے ہمارے۔

ماسکس۔ مہربانی طبیعت والی عورتوں میں یا جن بچوں کو سردی لگ گئی ہو میں دم سانس کی نالی کے اوپر والے حصہ میں دور سے وار سکرٹن دم گھٹنے کے دوروں کے ہمارے اصل احساس کے ساتھ جیسے کہ گندھک کے بخارات میں سانس لیا جا رہا ہو۔

کیو پریم میٹ۔ ماسکس جیسی علامات میں دی جائے لیکن اس کے ناکام ہونے پر انھیں داریا تشنجی دم دوروں کا خطرہ گلے کی سکرٹن۔

لو ویلیا انفلیٹا۔ چھاتی کا تناؤ۔ سانس کی نالی میں سرسراہٹ کا احساس۔ جدوجہد سے سانس آئے۔ سانس لینے کے لئے منہ کھلا رکھا پڑے۔ چھاتی کے دباؤ کی وجہ سے دباؤ کو ٹھانے کے لئے ہلکا سانس لینا پڑے۔ اگر سانس لینے پر چھاتی کی ہڈی کے نیچے ہلکی سرسراہٹ۔ کھانسی اور بلغم کا اخراج نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا اور تباکو کے دھوئیں سے زیادتی جس کی برباشت نہ ہو سکے۔

فاسفورس۔ ترسم کے دم کے لئے بہتر ہے۔ ٹھنڈے پانی کی شدید پائیں۔ جوہنی معدہ میں گرمی ہوتی ہے تے شروع ہو جاتی ہے۔ شدید دباؤ۔ پیشاب کی کمی البیون کے اخراج کی کھچھ۔ ایسڈ فاس۔ جب فاسفورس ناکام ہو جائے تو یہ استعمال کی جائے۔ پہلے ۲۳ میں اور پھر ۲۰۰ میں دی جائے۔

نیرم آرمینیکم۔ الرجی یا جلدی خارش کے ساتھ دم۔ کوئلے کے باریک ذرات بھیچڑوں کے اندر چلے جانے کی وجہ سے دم۔

انگلیکس ایم۔ پتلے۔ بید کی طرح کے پتلے اعصابی اور بے چین حضرات جو تشنج میں مبتلا ہو جائیں۔ ٹھوٹوں کا کانپنا۔ اعصاب کی بھنجھاہٹ۔ بے ڈول اور بھدے حضرات۔ ادھر ادھر گریں چیزیں ہاتھ سے گرا دیں اور ٹوڑ دیں۔ شدید ٹھنڈا محسوس کریں۔ کھل جانے کا رجحان۔ چھاتی کا زکام رات کے سبب سببوں کے ہمارے۔ شدید کھانسی کے دورے جو چھینکے پر منتج ہوں سانس نہ آنا۔

دل کی دھڑکن۔ بازوں کے جھکے جن کے بعد شدید کمزوری اور تھکاوٹ صبح کے وقت لیکن شام کے وقت خشک کھانسی وہ خوش و خرم اور کام کے ناقابل ہوتے ہیں۔

تھو جا۔ جب نیکہ لگانے کے بعد دم ہو۔ چہرہ زرد۔ بیماریوں کی طرح کا۔ موی اور جھکدار۔ کبھی کبھار متے ظاہر ہوں۔ شام کے وقت خشک کھانسی ہو، بچوں کا دم، خشک کھانسی یا ڈھیلی کھانسی، پرانا نزلہ، گارٹی زردی، نائل بنز اخراج کے ساتھ۔ جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ بطور عمل انگیز کے دیا جائے۔

ہیپرسلفر۔ ٹھنڈی ہوا لگنے دم۔ مشرقی خشک ہوا کے چلنے سے دم میں زیادتی۔ نمدار دم میں بہت زیادہ کمی ہو۔

کیلڈیم۔ دم۔ خارش دار قانون سے اول بدل کر۔

سٹکٹافاس۔ خشک کھانسی شام کے وقت زیادتی ہو۔ لیٹ کر سونے کے۔ جتنا زیادہ کھانے کھانسی بڑھتی ہی جائے۔ سوئیں جن میں دودھ کم آئے۔

برومین۔ ملاخوں کا دم جب وہ ساحل پر جائیں، جنہی وہ سمندر پر چلے جائیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ گرد اور ہوا کے جھونکھوں سے زیادہ ہو جائے۔

سیلیشیا۔ یہ سائیکوٹک مریضوں اور سردی محسوس کرنے والے مریضوں کے لئے موزوں ہے۔ چھاتی کے پلنے زکام پرانے مریضوں۔ دم کی وجہ سے ساں ساں یا خراہٹ۔ تھوہڑٹ کے ساتھ دم گھٹے۔ حرکت نہ کر سکے۔ زیادہ گرمی لگنے اور زیادہ کام کرنے کے ساتھ مزین مانس کی نالیوں کی سوزش اور پھیلاؤ۔ نمدار دم۔ بلغم کی بھدی سی کھڑکھڑاہٹ۔ تمام چھاتی بلغم سے بھری ہوئی محسوس ہو جسے کہ وہ دم گھٹ کر جائے گا۔ سوزاک کب جانے سے واقع ہو۔ نسیجوں میں ہوا بھراؤ جہاں پک کم ہو گئی ہو اور ریشے آخری درجہ تک ڈھیلے ہو چکے ہوں نئے یا پورے چاند کے دوران زیادتی ہو۔

انگیشیا۔ دم جذبات۔ احتیاطوں اور غموں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہو۔ میڈورینم۔ دم کے لئے ایک عمل انگیز کے طور پر دوائی ہے۔ جب دوسری اچھی طرح سے

منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں یا مکمل صحت نہ دے سکیں۔ دم گھٹنے والی کھانسی بخون  
 بند کر اس میں ہوانہ گزر رکے۔ صوف چھوڑ کے بل لیٹنے سے آفاقہ ہو۔ گہری خالی لیٹنے سے زیادتی  
 معدہ کے بل لیٹنے سے آفاقہ۔ سانس مشکل سے آئے۔ بچھا جھکنا چاہے۔ ٹھنڈک محسوس کرے۔  
 لیکن اوپر لے گئے مگسٹروں کو دُور بھیجے۔ گرمی سے بھی زیادہ ہو۔ ہوائے خمدار جھونکوں، بجلی  
 کے طوفانوں سوزح کی روشنی سے غروب آفتاب تک زیادتی۔ ہمیشہ ہی شام کے وقت زیادہ بخمدار  
 یا ساحل سمندر پر آفاقہ اور اندرون ملک زیادہ (برومیم کے الٹ) دم گھٹنے کے ساتھ یا  
 اس کے متبادل ہو۔

اکٹیار لیس۔ دم کے شدید دورے جن کی زیادتی حیض کے دوران ہو یا بولتے وقت اور  
 رات کے وقت۔ بلفم کا اخراج سٹاڈونا۔

ریو میکس۔ کھانسی کے شدید دورے جن کی درجہ حرارت کی تبدیلی پر گرمی کوہ سے باہر  
 کی ٹھنڈی ہوا پر جانے میں اور اس کے الٹ اور بولنے سے اور سننے سے، ہنسی کی ہڈی کے نیچے درد  
 کا احساس کھانسی چھاتی اور سر کو ہلکے رکھ دے، بلفم کم اور مشکل سے نکلے۔

سنیگیٹا۔ بلفم کی جلدی کھر کھر اہٹ کے ساتھ دم، سخت اور تار دار جن کو آسانی سے  
 نکال دیا جائے، خشک گلے کے ساتھ۔ سانس اندر لے اور کھانے۔ ہوائی نالیوں کی مزین سوزش۔  
 سانس لینے کے اعضا کی نظام کی حالت کو آفاقہ دیتی ہے۔

ایسٹر سلیفینوک۔ دم پھوٹی خشک کھانسی کے ہمراہ، اکثر نہ تک معدہ سے مواد آئے یا  
 تھے ہو۔ چھاتی کمزور اور ملین دار اور سوئیاں چھیننے والی تکلیف سے پُر۔ نذرانے والا دباؤ اور  
 چھاتی کی گھٹن جن کو ٹانگیں نیچے لٹکانے سے آفاقہ ہو۔

کاربوو سیج۔ دم جو معدہ میں گیس کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ہو۔  
 پوتھوس۔ گرد و غبار سانس کے ذریعہ اندر جانے سے دم جن کو پانڈناریت کہتے  
 پر آفاقہ ہو۔

کلوٹھس۔ بدھنی اور گیس کی وجہ سے دم۔ سمندر کے کنارے زیادتی۔ گرگھ کے موسم

میں ٹھنڈی محسوس کرے۔

سورائینیم۔ بازوؤں کے کھلے رکھ کر لینے سے افاقہ ہو۔ بستر پر بازوؤں کو پھینکنے سے  
سانس میں آسانی کے لئے۔ جب بازو جسم کے قریب لائے جائیں تو زیادتی ہو۔ سردی اور  
ٹھنڈے موسم میں زیادتی۔ اخراج چپکے والا اور بدبودار۔ بوڑھے لوگوں کا دمہ۔  
ٹائیسیریکم۔ دھندلے موسم میں زیادتی۔ کافی مقدار میں اخراج بلغم اور پسینہ کی زیادتی  
سے افاقہ ہو۔

ڈولکامارا۔ مقدار موسم میں دمہ یا نندار جگہوں پر رہنے کی وجہ سے دمہ۔  
کرومیکو کالی سیلفیوریکم۔ جڑوں لوگ کہتے ہیں کہ دمہ کے لئے مخصوص ہے جس میں شدید  
دباؤ کا طبعی بلغم جو شکل سے اکھاڑی جائے۔

سبازولا۔ کاہی دمہ کے لئے بہت بہتر دوائی جو دباؤ پھینکوں اور پانی جیسے اخراج کے لئے  
ہائڈروکسیٹک الیڈ۔ اعصابی دمہ کا شدید حملہ میں شدید گھٹن کے ہمراہ۔  
سینگونیر یا سی۔ خاص طور پر خوشبو یا ت سے دمہ زیادہ یا ان کی وجہ سے کھانسی سخت  
خشک گلابیٹھا ہوا۔

سفلیئم۔ ہرگز کے موسم میں دمہ عود کر آئے یا دمہ کی بیماری ہو گری کے موسم میں لاحق ہو جائے  
ایک ایم طاقت میں دیجئے۔

پلسٹیللا۔ بڑل یا ڈرپوک جلد ناراض ہو جانے والے طبیعت جلد تبدیل ہو جانے والا  
ہنسیں اور آسانی سے جھینیں۔ اندھیرے کا ڈر۔ موت کا ڈر۔ شکی۔ چربی سے سخت نفرت۔ بیلو کے  
خواب۔ ا۔ ایم طاقت میں صرف ایک خوراک دیجئے کچھ عرصہ کے لئے اور انتظار کیجئے۔

## دل کی خرابی کی وجہ دمہ

اکونائٹ این۔ ابلی بلڈ خشک کھانسی۔ موت کے ڈر کے ہمراہ دمہ۔  
ناجا۔ مشکل سے سانس آئے۔ لیٹ نہ سکے۔ شدید پھینکیں جن سے سانس لینے میں افاقہ ہو۔

نبض آہستہ یا دھیمی۔

سیبل سر۔ خرخراہٹ کے ساتھ، دل کی خرابی والا دمہ خرخراہٹ کے ہمراہ شدید کھانسی۔  
سر اور منہ اور موسم میں زیادتی۔ کلا خشک۔ ۲ یا ۳ طاقت میں استعمال کرائیے۔

برٹیا کارب۔ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ دمہ۔ غددوں کی سوزش کا رجحان۔ آنکھوں  
کے آگے سیاہ دھبے۔ ڈھیٹلوں میں بھراؤ کا احساس، کانوں میں بھنبھناہٹ کی آواز اور کم شافی  
دے۔ احساس جیسے کہ دھواں اندھیروں میں لے جایا گیا ہو۔ چھاتی میں درد۔

برٹیا میور۔ بوڑھے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں دمہ۔ ذہنی کمزوری اور حافظہ جاتا  
رہے۔ دم گھٹنے والی کھانسی بلغم خارج کرنے کی طاقت نہ ہو۔ ہنہنہ کی موسمی تبدیلی سے زیادتی۔  
وکم البم۔ گردوں کی تکلیف یا ہائی بلڈ پریشر اور غالباً پیشاب میں ایسٹرومن کی وجہ سے دمہ۔  
یٹنے پر دم گھٹنے کا احساس نبض کمزور اور تندر۔ دل میں بھاری پن اور دباؤ کا احساس۔

کریٹیکس۔ دل کے فیل ہونے اور ہائی بلڈ پریشر والے، دمہ والے لوگ شدید  
تنگی تنفس اور دل کھلا ہوا۔

آرم میور۔ اونچی آواز کی کھانسی زرد رنگ کم بلغم کے ہمراہ۔ دل کے اوپر تکلیف یا درد۔  
سٹرکولیا۔ یہ کمزور دل والے خاص طور پر بڑھاپوں میں دمہ کی دوائی ہے۔

امونیا کارب۔ کمزور دل۔ لاغر۔ دل کی دھڑکن اور چلنے پر مشکل سے سانس لے

ایپوسائٹم کین۔ دمہ جس میں پیشاب میں کھار آئے۔ گردوں میں تکلیف اور دل

کمزوری کے سوجن کے ساتھ۔ دل کے خانوں کی نااہلیت۔ سانس چھوٹا۔ خون کی نالیوں  
کا کم دباؤ۔

کینٹکس گ۔ دم گھٹنے کے وقفہ دار دورے۔ غشی کے ہمراہ چہرہ پر ٹھنڈے

پیسے اور نبض کا نہ ہونا۔ احساس چھاتی کا پچھلا حصہ مضبوطی سے اسی سے باندھا ہوا ہے۔  
دباؤ اور دل کی دھڑکن۔ یٹنے میں مائع ہوا یا لٹینا نہ جا سکتا۔ چھاتی میں خون کا اجتماع، احساس  
جیسے کہ دل اور چھاتی ایک بانگ میں کچلے جا رہے ہیں۔ دورہ انہی صبح ہوں کھی ہو امین اناتہ۔

# کھانسی

اکونائٹ این - خشک کرپ دم گھٹنے والی - اونچی اور کھڑی کھانسی، دم گھٹنے والی سخت - بچنے والی اور سیٹی دار خشک ہواؤں اور ہوا کے جھونکوں سے -

سیلاڈونا - جب گلے میں اجتماع خون کی وجہ سے خشک - بھونکنے والی کھانسی ہو - کھانستے وقت چہرہ سُرخ ہو جائے -

برائی ادنیا - خشک کھانسی جب حادثہ کام کا حملہ ہو - منہ، خشک - چھاتی کے سپلوٹوں میں سویاں چھبے - جیسے درد -

کالی بائی - جب چھٹنے والی کھانسی جو رسی کی طرح کھینچی جاسکتی ہے - ڈھیلی کھانسی - ہائیموسائیمس - خشک کھانسی جب لیٹے تو زیادہ ہو - بیٹھنے پر افادہ - کھانے پینے - اور بولنے سے زیادہ ہو -

سائیکلیمین - رات کے وقت سوتے میں کھانسی بغیر جاگے خاص طور پر بچوں میں - کالی کارب - خشک کھانسی جب دورے دار - لیسڈار بلغم خارج ہو یا پیپ جو نگل لی جائے ۲ سے ۴ بجے کے دوران زیادتی -

کاربو قوج - درجہ معده میں گیس کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ہو - پلسٹیللا - ڈھیلی کھانسی جب کہ گرم کمرے میں زیادہ ہو اور کھلی ہوا میں افادہ - فاسفورس - گرم کمرے سے ٹھنڈے کمرے میں جانے پر کھانسی، ہنسنے پر کھانے اور پینے اور بائیں طرف لیٹنے پر کھانسی زیادہ -

سپونجیا - خشک کھانسی سال ساں کی آواز کے ساتھ جیسا کہ لکڑی میں سے آ رہے کھینچا جا رہا ہو - مٹھائیوں سے ٹھنڈے مشروبات سے - تمباکو نوشی سے - نیچا سر کر کے لیٹنے سے زیادتی - پڑھنے پر بھی - گانے پر بولنے پر اور نکلنے پر بھی زیادتی - کھانے پر بہتر یا گرم مشروبات کرپنی خیر امٹ کی آواز جب سانس لے -

ہیمپسلفر۔ جب خشک ٹھنڈی ہوا لگنے سے کھانسی ہو۔ چلنے پر زیادتی۔ جسم کو تنگ کرنے پر کھانسی۔ چھاتی کی کمزوری پریشان۔ بھرائی ہوئی خرخراہٹ دار سانس۔

پیٹرولیم۔ رات کے وقت کھانسی زیادہ جب دن کے وقت اسہال شروع ہو جائیں تو کھانسی میں افاتہ۔

سینگونیریا کین۔ خشک اور بخار کھانسی جس کے بعد سوزش ہو۔ سانس کی نالیوں کی کھانسی بخو اور چھاتی کے اوپر کے حصہ میں خرخراہٹ۔ رات کے وقت جگادے اس وقت تک نہ بند ہو جب تک میٹھے نہ اور ہوا نہ خارج ہو۔

کیپسکیم۔ دودر دراز حصوں میں درد کے ساتھ کھانسی۔ بدبودار سانس لوگوں کا کمرہ میں بیٹھنا مشکل کر دے۔ پھیپھڑوں سے گندی ہوا زور سے نکلے۔  $200 \times$  طاقت میں ۱۲ سے ۱۵ گھنٹے کے وقفے سے دبا جائے۔

میفاٹیس۔ ہر صبح کھرکھڑانے والی کھانسی۔ بولنے پر یا اونچی پڑھنے پڑکھانسی کھانسی کے ہر دور سے پریشاب یا پاخانہ خارج ہو جائے۔

اینا کارڈیم۔ کھانا کھانے کے بعد کھانسی۔ بولنے پر، سونگھنے اور ذائقہ کا جاتے رہنا۔ کھانسی کے ہر دورہ کے بعد مواد کا مٹکھڑچھنا اور تے کا آنا۔

نیٹرم میور۔ ماتھے میں درد کے ساتھ کھانسی اور بلا ارادہ پیشاب کا خارج ہو جانا۔ جگر کے تمام پر سوئیاں گڑنے جیسا درد کھانسی کے ہمراہ آنسوؤں کا بہنا۔

ایلیم سیپا۔ کھانسی جھجھجھ میں سرسراہٹ کی وجہ سے ہو سرسراہٹ سے نجات پانے کے لئے متواتر کھنا گھارنے کا رجحان۔

امونیا کارب۔ انفلوئنزہ کے بعد کھانسی جب برائی ادینا اور دوسری ادویات ناکام ہو جائیں۔ گلے کے تھرا جانے کی وجہ سے کھانسی خون تھوکرنا۔ گلے میں سرسراہٹ جیسے کہ گردوغبار سے ہو۔ کھانسی صبح ۲ بجے ہو۔

ڈرومیلر۔ کھانے کھانے کے دوران یا بعد میں کھانسی کے دورے۔

کاسٹیکم - زیادہ گہری کھانسی نہ کھانس سکے کہ بلغم کو اکھاڑ دے یا تھوڑی سی اکھڑی ہوئی۔  
بلغم حلق میں پھسل جائے نہ کھانسی کے دوران چشیاں خارج ہو جائے۔ کھانسی بول چال اور ٹھنڈے  
پانی سے زیادہ ہو لیکن ٹھنڈے پانی کے گھونٹ لینے سے افاتہ۔

کوکولس - اونچا بولنے یا دانتوں میں برش کرنے پر کھانسی ادرتے۔

کیوپریم میٹ - ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے کھانسی لیکن ٹھنڈا پانی پینے پر کھانسی  
رک جائے۔ کھانسی لگے میں طفل کی آواز کے ساتھ جیسے کہ بوتل میں سے پانی باہر اُڑا دیا جائے۔  
سلیشیا - بیہوش کرنے والی کھانسی خطرناک مواد تھوکن جو گولی وار زرد یا سبز اور پانی کی  
تہہ میں بیٹھ جائے اور بہت گندی بو آئے۔

چیلیڈونیم - ہوائی مایوں میں گرد و غبار کے احساس کی وجہ سے کھانسی۔

اکٹیا ریموسا - خشک پھاڑنے والی کھانسی رات کے وقت اور ہر بار بولنے کی خواہش بڑھاتی۔  
اکالیفا انڈیکا - شدید خشک کھانسی جس کے بعد غونی بلغم خارج ہو۔ کھانسی شدید  
رات کے وقت۔

کوریٹیم رب - بچے اپنا سانس گنوا دیں یا بچوں کو سانس نہ آئے ان کے چہرے زرد  
اور سیاہ ہو جائیں۔ سانس کھلنے نہ کھولیں جس کے بعد تپ ہو جائے۔ ہوا کے راستوں  
میں برف جیسی ٹھنڈک۔ اعصابی اور باریک دہین کھانسی۔

شائم آیوڈائیڈ  $3 \times 3$  { تمباکو نوشی کی کھانسی  
سٹیفسکیا  $30 \times$

سنیکا - جب کھانسی کا خاتمہ چھینکوں پر ہو۔

ٹیرنٹولا ایچ - کھانسی جس کو تمباکو نوشی سے افاتہ ہو۔ رات کے وقت لینے پر خشک  
کھانسی اور صبح کے وقت اٹھنے پر چھاتی میں پھاڑنے والے درد کے ساتھ کھانسی۔  
ٹرائیفلیم پی - کھانسی جس کے بعد ہچک لگے۔

نیفتھلینم - دم گھٹنے والی کھانسی۔ سانس لینے کے ناقابل بعض اوقات اتنی شدید کہ پسینہ پڑے۔

انٹیم ٹارٹ - جب بچہ ناراض ہو جائے، اول بدل کر کھانسنے اور جمائیاں لے۔  
 کروٹن ٹنگ - جب ایگزیمیا کے دہنے کی وجہ سے کھانسی ہو۔ یہ دوائی کھانسی اور بھڑکے  
 بھنسی کے اول بدل کر آنے کے لئے یعنی جب کھانسی ختم ہو جائے تو بھنسیاں ہوں اور حبیبیاں  
 غائب ہو جائیں تو کھانسی ہو۔ دے والی کھانسی جو آدھی رات کو مریض کو گہری نیند سے جگا دے۔  
 یوفریزیا - بعض اوقات خشک کھانسی لیکن عموماً ڈھیلی ڈھالی، دن کے وقت زیادہ رات  
 کو تکلیف نہ دے خون کے بہاؤ کے رک جانے پر کھانسی۔

لیکٹوکا - دورے دار کھانسی، دم گھٹنے کے احساس کے ہمراہ۔  
 میو بروکولینٹیم بو - نوجوان لڑکیوں میں کھانسی حوض دہ جانے کی وجہ سے۔  
 سکولٹا خشک سخت کھانسی - پھینکوں کے ہمراہ۔ کھانتے وقت پشیاں خارج ہو جاتے  
 کھانسی کے ساتھ تنگی تنفس کافی زیادہ ممکن، لیسڈار بلغم کا اخراج۔  
 ریو میکس - کھانتے وقت پشیاں خارج ہو جائے خشک متواتر تنگ کرنے والی کھانسی  
 ہوا کی تبدیلی سے زیادتی یا کمزوری کی تبدیلی سے زیادہ رگے کے گرمی کو چھونے یا دبانے سے زیادتی۔  
 میڈنگٹم - لیٹے سے کھانسی کو اناقد اور بڑیوں کا احساس ہونا۔  
 انٹیم کروڈ - آگ کو دیکھنے سے کھانسی میں زیادتی۔

کوکس کیٹانی - کھانسی کا مریض لیسڈار بلغم کے ہمراہ۔ یہ گرمی کے آخری مہینوں میں  
 شروع ہوتی ہے۔ اور سردی سردیوں میں رتی ہے۔ یہ ٹھنڈے موسم میں آتی ہے لیکن حقیقتاً  
 یہ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے کم ہوتی ہے۔ یہ گرم مکرے اور گرم مشروبات سے زیادہ  
 ہوتی ہے۔ گلے میں سرسراہٹ۔ دورے دار کھانسی۔ کالی کھانسی، اشرا بیوں کی کھانسی۔  
 برومیم - گرمی میں کھانسی، یہ گرد و غبار والی چیزوں کے استعمال سے زیادہ ہوجاتی ہے۔  
 بریٹاکارب - حنجرو میں اور ہوا کی نالی میں ہیجان کی وجہ سے کھانسی جس کو پیٹ کے  
 بل لیٹے سے آفاقہ ہو۔

انٹیم ٹارٹ - چھوٹی جیپک کے پیچھے کے طور پر کھانسی۔

آرم ٹرائلنگم۔ کھانسی چھلتی میں دکھن کے احساس کے ساتھ پھیپھڑے دکھیں سانس کی نالی اور سانس کی بڑی نالیوں میں جلن۔

امبرگوریا۔ جب زیادہ لوگ ہوں تو کھانسی زیادہ ہو اور اعصابی مریضوں میں بھی۔ کانے سے زیادہ، کھانسی جس میں بعد میں معدہ سے ڈکار آئیں۔ دوسری ادویات ایڈسلفٹ۔ آرنیکا، سیگلنیا۔ اور وریسٹم البم۔

ایریلیا ریموسا۔ تھوڑی سی نیند لینے کے بعد رات کے وقت کی کھانسی، کھانسی کے دورے کے دوران لیٹے سے زیادہ لیٹے کے فوراً بعد بھی یا عام طوراً دھمی رات سے پہلے۔

بسمتھ۔ کھانسی جب معدہ خالی ہو۔  
امونیا آرمینکم۔ خون آئینہ بلغم کے ساتھ کھانسی بلغم بدبودار۔ پیپ دار۔ میٹھے ذائقہ والی سخت، زرد، دھندلی کھانسی رات کے وقت۔ چھوٹی بے قاعدہ کھانسی۔ دم گھٹنے والی۔

## دل کی خرابی کی وجہ کھانسی

ہائڈروسانٹک الیڈ۔ یہ چوٹی کی دوائی ہے، سب سے پہلے یہ آزمائی جائیے۔

ڈیجیٹلیس۔ کھانسی جس میں سانس مشکل سے آئے۔ نبض بے قاعدہ اور وقفہ دار۔ چہرہ مڑوں جیسا زرد۔

پیونجیا۔ خشک جھوکنے والی کھانسی۔ گلے میں ڈاٹ لگنے کا احساس۔ حنجہ میں سرسبز۔ ناجا۔ گلے سے سانس لینا دم گھٹنے کے ہمراہ۔ دل کی تکلیف کی وجہ سے پُر ہجان کھانسی۔ لیس دار یا چپکنے والا بلغمی مواد اور تھوک۔

آرم میور۔ دل کی وجہ سے کھانسی۔

اگزالک الیڈ۔ تھوڑی سی مشقت سے دل کی خرابی والی کھانسی۔ حنجہ میں رکاوٹ کا احساس۔

## کالی کھانسی

پروٹینین۔ یہ ایک نو سود ہے کالی کھانسی کی ابتداء میں دی جانی چاہیے۔ اکثر کیڑوں میں اس کی

ایک خوراک کالی کھانسی کو درست کر سکتی ہے یا اس کے دقت کو کم کر سکتی ہے۔

**ڈرومیرا**۔ یہ کالی کھانسی کے لئے تقریباً مخصوص دوائی ہے۔ اس کی ۳ x طاقت دی جانی چاہیے۔ چار روز کے بعد دہرائی جائے۔ کچھ طبیب خیال کرتے ہیں کہ اس کی ۲ طاقت میں دو دو قطرے تین گھنٹے کے وقفے سے دینے چاہئیں۔ کھانسی کے دورے بار بار آئیں اور مریض کو سانس لینے کا موقع بھی نہ دیں۔ اس کے بعد ہی متلائے اور تھے ہو۔ کھانسی بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ سانس لینے کی واضح مختلف سوراخوں مثلاً ناک۔ گلا اور خنجر سے خون جاری ہو۔

**بیلادونا**۔ کالی کھانسی کے ابتدا میں خشک کھانسی نصف گھنٹہ یا اسی وقفے سے تین یا چار لہروں میں ایک دقت میں چہرہ سرخ ہو جائے۔ بعد میں ناک سے خون بہے۔

**کالی کارب**۔ جب ڈرومیرا ناکام ہو جائے تو یہ ایک مخصوص دوائی ہے۔ اس دوائی کا مخصوص نشان اوپر کے پوٹے اور ابرو کے درمیان پھیلنے کی مانند سوزش۔

**فاسفورس**۔ بعد کی حالتوں میں جب خطر ناک نتائج کی توقع ہو۔ گارمی۔ زنگ کے رنگ کی یا سرخ چمکدار بھاگ دار۔ بلغم۔ گلا بیٹھا ہوا۔ آواز جاتی رہے اور سر سر اٹھ۔

**آپتیکاگ**۔ جب تھے کے ہمراہ شدید کھانسی ہو۔ یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ کچھ کا چہرہ نیلا ہو جاتا ہے۔ چمکدار بلغم کا بہت زیادہ اخراج۔

**میفاٹیس**۔ سخت کالی کھانسی تشنجی دوروں کے ہمراہ جس کی زیادتی رات کے دقت اور لیٹے ہونے کی صورت میں ہو۔ دم گھٹنے کا احساس۔ بچہ سانس بھر نہ نکال سکے۔ بعض اوقات بعد میں اینٹھن ہو۔ چھاتی کے اوپر کے حصہ میں بلغم کھر کھڑے (بعض اوقات یہ دوائی دینے سے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں بیماری کا دور گھٹ جاتا ہے) شدید کھانسی جیسے کہ ہر دورہ مریض کی زندگی ختم کر دے گا۔ نظام کی علامات نہ ہوں۔ بلغم کا اخراج بہت ہی معمولی یا بالکل ہی نہ ہو۔

**کویرٹم رٹ**۔ شدید کھانسی۔ بچے اپنا سانس نہ لے سکے۔ من کے چہرے زرد اور سیاہ پڑ جائیں۔ سانس کے لئے تریں رتے بھی ہو سکتی ہے۔ سواکی نالیوں کی برف کی طرح کی ٹھنڈک۔

اعصابی اور پھوٹی بندوق کی طرح کی کھانسی۔ سانس لینے پر سواٹھنڈی معلوم ہو۔ کھانسی سے پہلے دم گھٹنا اس کی نمایاں نشانی ہے۔

کیو پریم میٹ۔ سانس کے رگ جانے یا ادب جانے سے کھانسی چہرے کا نیلا پن اور تپتے ہو۔ انگلیوں کے ناخن بے رنگ نکھیں اور کواٹ جائیں بجہ کھانا ہے حتیٰ اگر اس کا سانس اکھر جاتا ہے اور بیہوشی کی حالت میں لیٹ ہے۔ کھانسی جو ٹھنڈی ہوا سے پیدا ہو اور ٹھنڈے پانی سے آتا ہو۔ کھانسی کا شدید درجہ جس کو ٹھنڈا پانی پینے سے آفاتر ہو۔ مریض کو اینٹھن ہو سکتی ہے۔ انگوٹھے اور مٹھیوں کو بھینچ لے۔

ایلیم سپیا۔ بخوں میں تپتے۔ بد ہضمی۔ گیس اور بدبودار گیس کے اخراج کے ہمراہ کالی کھانسی۔ کوکس کی کھانسی۔ کالی کھانسی صبح کے وقت زیادتی جس کا خاتمہ رسیوں جیسی صاف بلغم کے اخراج جو منہ میں تاروں سے ٹپکتی ہوئی محسوس ہو۔ کال بائی بھی تاردار بلغم رکھتی ہے لیکن اس میں مواد زرد ہوتا ہے اور کوکس کی کھانسی کی طرح شفاف نہیں ہوتا۔

سینیگا۔ شام کے قریب کھانسی میں اندھے کی سفیدی کی طرح کی سخت شفاف بلغم کا اخراج۔ مریض کچل دینے والا ذرن چھاتی پر محسوس کرے۔ نیٹرم میور۔ جب کالی کھانسی میں آنسو بھی ہمراہ ہوں۔

نیفٹھالین۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔ سانس لینے کے ناقابل۔ بعض اوقات اتنی شدید کہ پسینہ آجائے۔ کھانسی کے حملہ اچانک ہوں اور کافی دیر تک رہیں، گلے میں تنگی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ (عورتوں میں کسی سبب کی وجہ سے کھانسی)

ٹیزٹولا کیونیز۔ کالی کھانسی کے لئے بہترین دوائی ہے جو مریض کو حصوں میں یا پھوٹے پھوٹے ٹکڑوں میں بلٹ دے۔

عورتوں میں بغیر اختیار کے کھانسی۔

سینشوارٹیس۔ حیض کے دب جانے کی وجہ سے کھانسی۔


یہ کیا۔ جب کھانسی پڑو میں سے اٹھتی ہوئی معلوم ہو۔ ممکن ذائقہ کی بلغم کا اخراج۔  
 ملی فوہیم۔ حیض کے دب جانے یا خون کے اخراج کے دب جانے سے کھانسی۔  
 اکیٹا ریموسا۔ خشک تھکا دینے والی کھانسی جو رات کے وقت زیادہ ہو پراپٹھ تھکت ہی  
 حساس ہوں۔

امبرگریسا۔ رحم کی کمزوری کی وجہ سے جب تھوڑے سے بھی جذبات کھانسی اور حیض کو بڑھادی۔  
 ایپس میل۔ بالغ ہونے پر بھونکنے والی کھانسی۔ دائیں طرف کی پچھڑانی کی حساسیت  
 کی وجہ سے

واٹر رحم پولس۔ حمل کے دوران میں کھانسی جو استقاط حمل کا باعث بن سکتی ہو۔ یہ  
 دوائی استقاط حمل کو روک دیتی ہے۔

کالی بانیکر و میکم۔ حمل کے دوران میں کھانسی۔

میڈورنیم۔ سوزاک کے ہمراہ یا سوزاک کی وجہ سے یا پرانے سوزاک کی وجہ سے۔



سُطَّوَالِ

باب

دل اور خون کی تالیوں

کی

بیمکاریاں

## خون کی نالیوں کی پھیلاؤ

بریٹاکارب - کافی دیر تک رہنے والی شدید دل کی دھڑکن جو بائیں طرف  
لیٹنے سے ہوا اور چھوٹے چھوٹے سانسوں کے ہمراہ - چھاتی میں بھراؤ خاص طور پر اوپر چڑھتے  
وقت - چھاتی میں سانس لیتے وقت سوئیاں چھٹنے کا احساس و تکلیف کہہ میں تکین و شدید  
کمزوری جیسے کہ دوران خون رگ گیا ہو - یہ مندرجہ ذیل ادویات پایہ تکمیل تک پہنچانے والی  
ہے تاکہ مکمل شفا ہو جائے۔

کاربو انیمیلس - سینے کی خون کی پھیلاؤ آواز جاتی رہے - تیز سوئیاں چھٹنے والی  
بہسی جلن دار درد چھاتی میں جو چلنے پر زیادہ ہو - ایک اہم طاقت میں دبیٹھ۔  
لائیکوپوڈیم - خون کی نالیوں کی پھیلاؤ، گوشت کی کمی کے ہمراہ، ہونٹ و گھس یا  
درد کریں - گیس اور قبض کا رجحان -

## درد دل

امانیل نائٹریٹ - حلا حملوں میں جب دل کا فعل تیز اور ہنگامہ خیز ہو - سر کے گرد پٹی  
بندھی ہونے کا احساس دل کے گرد سکڑن - دہی ہوئی سانس - چہرہ پر خون - بازوؤں کی کمزوری  
اور کا پٹنا - پریشان اور تشویش -

## دل کا پھڑپھڑانا - دل کی دھڑکن اور کمزوری

گلوٹائین - جب مارے جسم پر تکین محسوس ہو - تکلیف دل ہر طرف نکلتی ہوئی معلوم ہو -  
سانس مشکل سے لے دل کے پھڑکنے کے ساتھ -  
کریگس - اچانک اور شدید درد چھاتی کے بائیں طرف دل سے نکلتی ہوئی اور بائیں بازو

ماریوس اور موت سے ڈرے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی کے ہمراہ مدرنکچر کے پانچ قطرے  
فی خوراک۔ دل کی تمام تکالیف کے چوٹی کی دوائی ہے۔

لیکسیس۔ غش کے ہمراہ اینٹھمن دار در دیں۔ دل کی دھڑکن اور معمولی سے پریشانی  
سے بھی گھٹن، معمولی کرے کہ دل ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے اور ہر دھڑکن اسے پھاڑے  
دل کے حصّہ میں سوئیاں چھبھنے جیسی در دیں۔

ناجا۔ دل کے حصّہ سے گدی تک پھیلتی ہوئی درد۔ بائیں کندھے اور بازو میں پریشانی  
اور موت کے ڈر کے ساتھ۔ دل کا پھڑپھڑانا۔ اور دل کی دھڑکن۔ نبض مست اور بے قاعدہ۔  
اکونائٹ۔ ایک گارندہ دل کی دوائی جب ذہنی پریشانی۔ موت کا خوف۔ دباؤ اور دل کی  
دھڑکن۔ بائیں بازو کا سُن ہونا۔ انگلیوں میں پھنجانا ہٹ۔

آرمینکلم البم۔ دل کی تکلیف کے لئے اچھی دوائی ہے۔ شدید اور ناقابل برداشت  
دل کی تکلیف۔ خاص طور پر جب پیٹھ کے بل لیٹا ہو۔ ۱۲ بجے صبح کے بعد۔ دل کی چڑبیلی تنزی۔  
دل کے پردوں میں پانی آجانا۔ بے چینی۔ استسقاء۔

سپائیکیلیا۔ دل کی دھڑکن اور دل میں تیز سوئیاں چھبھیں۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ بھرپور  
اچھلتی ہوئی حرکت سے زیادتی۔

میگنیشیا فاس۔ یہ دل کی درد کے حملوں کو کم کرتا ہے اور درد سے نجات دلاتا ہے۔  
۶× طاقت میں گرم پانی کے ہمراہ دیتے تھے!

سمی سی فیوگا۔ جب دل کا فعل اچانک رک جائے تو شدید دردی مریض پر ہوش ہو جاتا  
ہے، نبض کمزور اور باریک۔

## شریانوں کی دیواروں کی سختی

بریمایوسور۔ جب خون کی بڑی نالیاں اور اورطہ ملوث ہو تو چوٹی کی دوائی ہے رات  
کو لیٹے پر شدید درد۔

آرنیکا مانٹ - دماغ کی شریانوں کی دیواروں کی سختی - بوڑھے لوگوں کے جگر - خون کے اخراج کا رجحان -

پلیجم - بلڈ پریشر اور شریانوں کی دیواروں کی سختی - تار کی طرح باریک نبض - مزمن درم گروہ - آرم میوٹر - دل کا حد سے زیادہ بڑھ جانا - پھیلائی اور سر میں اجتماع خون - دل کی شدید دھڑکن - سر کی شریانوں کے لئے خاص لگاؤ رکھتی ہے -

آرم میٹ - دل کی درد مزمن گٹھیاں کی وجہ سے جو ایک بوڑھے دوسرے بوڑھے آدمی کے ساتھ - حرکت پر دل ہلتا ہوا معلوم ہو اور دل کی دھڑکن حوالے سے ٹھہرنے پر مجبور رہے - اگر کوئی - شروع شروع میں جب شریانوں کی دیواریں سخت ہو جائیں - جب دل کا رجحان اور دل کی سخت آواز ظاہر ہو - شریانوں کی دیواروں کی سختی اور تباہی اور نالیوں کی تنگی سکڑن سختی کے ساتھ -

سٹرڈنٹس - بڑھاپے میں شریانوں کی دیواریں سخت ہو جائیں چربی کا شریانوں میں چربی کا جم - مرمت نہ کر سکا - قسطوں کے اکٹھے ہونے کا رجحان -

ایڈرینالین - شریانوں کا ہائیڈر پریشر - ہائیڈر پریشر کی وجہ سے کانوں میں گرج - آرنیکا مانٹ - ہر قسم کی دل کی بیماریوں کے لئے خاص دوائی ہے - نبض دھیمی دل کی دھڑکن کے ساتھ - سانس پھولی ہوئی - میٹر بھی نہ چڑھے - منزل والوز کی خرابی منزل کی سکڑن درد دل کے ساتھ -  $2 \times 3$  طاقت میں دن میں دو دفعہ کھانا کھانے کے نصف بعد دوسری ادویات کے ہمراہ یہ دوائی ہمیشہ دل کی تمام بیماریوں میں دوسری علامتی ادویات کے ہمراہ دی جانی چاہیے -

سپائیکلیا - ایک اور بہت مشہور یا ضروری دوائی دل کی سوزش کے لئے جس میں دل کی اندرونی اور بیرونی جھیلیاں متاثر ہو چکی ہوں - منزل والوز کی کمی شراب نوشی کے سے اس دوائی کی نمایاں علامت ہے - آنکھوں کے آگے شرارے ہوتے ہیں - دل میں تکلیف یا درد - سر جکڑنا - سر میں آوازیں آئیں - شدید اعصابیت - گلے میں رکاوٹ کا احساس - سونہ سکا -

## مائی بلڈ پریشر شریانوں کی جلد کی سختی بھی دیکھیے۔

لیکسس - مائی بلڈ پریشر کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ مریض صبح جاگنے پر زیادہ بری حالت محسوس کرتا ہے۔ نیند کے دوران زیادتی۔ بے چینی۔ فٹ پڑے نہیں پہن سکتا۔ ان کو ڈھیلے کرنا پاتا ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں میں یہ دوا مانی چلی گئی۔ ایک ایم طاقت میں دیتے تھے۔

آرم میٹ - جب غصے کے دہنے یا ناراضگی کی وجہ بہت زیادہ حساس۔ سر میں گرج، چکرتہ شدید سر درد۔ موت کا خوف۔ دل کی دھڑکن۔ ناامیدی اور مایوسی۔

اکونائٹ - دل کی دھڑکن۔ بہت پریشانی۔ جسم کی گرمی۔ دل کے حصہ میں بھالا لگنے جیسے درد۔ جھنجھٹا ہٹ کے ساتھ بیہوشی۔ نبض بھر پور، مضبوط اور سخت۔

ایلیم ٹائیوا - ایلیم جیم یا موٹے تازے مریضوں کے لئے موزوں ہے جو بہت زیادہ خوراک کھائیں، خاص طور پر سبزی خوردہ ہو۔ خون کی نالیوں کو پھیلانے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ بلڈ پریشر عام طور پر ۳۰ سے ۴۵ منٹ کے بعد ۲۰ سے ۴۰ قطرے ڈرنیکچر کے استعمال کرنے لگتے ہیں۔

سٹرو فنیٹس - بوڑھے لوگوں میں دل کی تسکایف جن کو گروے کی بیماریاں ہوں پوچھنا دل سخت شریانوں کے ساتھ پیشاب کافی مقدار میں۔ دل سکڑنے کو بڑھا دیتا ہے اور دل کی تیزی کو کم کرتا ہے۔

پلمیم میٹ - جب قبض اور بڑا دل ہمراہ ہو۔

نیٹرم میور - مریض جو تنک کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پشیمان ہوتے ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر کم کر دیتی ہے۔ ۲۰۰ طاقت یا بڑی طاقت دیتے تھے۔

کاربوا نیملیس - ضدی قسم کی سرک کھوٹری کا سر درد۔

جلیسیم - جب بڑی بخر کیوجہ سے اچانک صدمہ ہو جائے۔ ایک ایم طاقت میں دیتے تھے۔

اگیشیا۔ جب جذبات۔ ناکام محبت اور غم کے اثرات کی وجہ سے ۲۰ ملا میں دیکھے۔  
 گلونا لین۔ سستی۔ کام کرنے کو بالکل جی نہ چاہیے۔ ٹوکے جانے پر جوش و سببان اور  
 سر درد۔ سر اور دل کی طرف خون کا زیادہ ہوجانا۔ تپکن دار در دیں۔ بھر بھڑاتا ہوا دل۔  
 قبض اور خارش والی بواسیر۔

بریٹا میورٹیکیم۔ بوڑھے لوگوں میں شریانوں کی دیواروں کی سختی اور دماغ کی بیماریاں  
 چکر اور کانوں میں آوازیں۔ نبض کا تناؤ، فالج کے ساتھ جسم بہت ہی ٹھنڈا۔ شریانوں کا موٹا ہوا  
 جانا۔ بوڑھے لوگوں میں ہوا کی نالیوں کی تکالیف اور دل کا بڑھ جانا۔  
 وریٹیم وریٹڈ۔ پرخون کثرت دم والے لڑاکے آدمی۔ کمزوری نبض سخت پرخون  
 علامات کے ساتھ۔

میلاڈونا۔ دل کی شدید دھڑکن۔ سر میں گونج دار آوازیں تکلیف دہ سانس کے  
 ہمراہ۔ تھوڑی سی بھی سختی سے دل کی دھڑکن۔ تمام جسم میں تپکن۔ جلد پرخون اور گرم  
 پریشانی یا ڈر۔ پیاس نہ ہو۔ بائیں جانب یا پیچھے کی طرف گرنے کا ساتھ چکر بھونے سے  
 شور سے، بے ہنگم آواز اور نیچے لیٹنے سے زیادتی۔

آکسیکالم الیم۔ بے چینی کے ہمراہ، آنکھوں اور پاؤں کا سوج جانا۔ سانس لینے میں مشکل  
 رات کے وقت لیٹے پر دم گھٹے۔ ٹیرھوں پر چڑھنے سے زیادتی۔  
 تھوچا۔ ابلی بلڈ پریشر خاص طور پر کمزور شریانی دیواروں کے ہمراہ۔ ذاتی اور خاندانی  
 تاریخ دریدوں میں خون کے قطرے ظاہر کرے۔

ایڈرینالین۔ شریانوں کا بہت اونچا بلڈ پریشر۔ کانوں میں گرج ابلی بلڈ پریشر کی وجہ سے  
 لائیو پوڈیم۔ زرد رنج لوگوں میں جویوٹک ایسڈ کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا رجحان  
 رکھتے ہوں جو جلد چکر کے رنگ کے دھبے رکھتے ہوں۔ مٹائیوں کی زبردست خواہش۔ گھومتی  
 ہوئی گیس ہیٹ میں جو ۴ اور ۸ بجے کے دوران زیادتی ہو یا صبح سویرے حرکت سے افادہ۔

فیثرم میوہ۔ نمک کی زبردست خواہش۔ گرم موسم میں بے ہوش ہو جائے۔  
 چائنا آفیشلیس۔ چکر بھوشی۔ دل کا اچھلنا کودنا۔ جو بھی چیز کھائے گیس میں تبدیل  
 ہو جائے اور اد پر نیچے نہ ہو۔ کانوں میں آوازیں۔ طبیعت زندگی کا بہت زیادہ اخراج اور کمی۔  
 صیسیا۔ آنکھوں کے نیچے زردی نائل گہرے حلقے۔ تمام جسم میں دھڑکن۔ کبھی چیزوں کی  
 خواہش۔ شدید مشقت سے کمی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شکم کا اوپر کا حصہ بالکل خالی  
 معلوم ہو۔ جگر کے دھبے۔ زندگی اور اپنے محبوبوں سے لاپرواہ۔

کاربو و تاج۔ ناطقاتی۔ پیٹ کے اوپر والے حصہ میں گیس بھری ہو۔  
 ٹیوبرکولنیم۔ یہ ان لوگوں میں بطور عمل انگیز دوائی کام کرتی ہے جو اپنی صحت کو کھو رہے ہوں  
 کلکیہ یا فاس۔ یہ تھکے ہوئے نوجوانوں میں منظر ہوتا ہے تیزی سے بڑھنے والے نوجوانوں میں۔  
 وکیم ایلیم۔ نبض سُست اور کمزور۔ جوڑوں کا درد اور درد گتھیا۔ اعصابی درد اور لنگرادی  
 کا درد۔ ڈاٹ گلنے کا احساس۔ مستقل چکر۔ دل پر وزن اور دباؤ جیسے کہ بھیجا جا رہا ہو۔  
 لینے کے نااہل۔ سردیوں اور ٹھنڈے طوفانی موسم زیادتی تکلیف۔  
 جلیسیم۔ دل کی بے قاعدہ دھڑکن۔ دل کی دھڑکن۔ نبض بے قاعدہ۔ نرم کمزور دم  
 گھٹے۔ پھیپھڑوں کا فاج۔

## شریانوں میں خون کے لوٹھڑوں کا جم جانا

مرکوریس۔ دل کی کمزوری۔ جیسے کہ مر رہا ہو۔ کانپتے ہوئے دل کے ساتھ جالگے اور  
 ہلچل جیسے کہ ڈرا ہوا ہو۔ دل کی چوٹی پر درد جو اوپر کی طرف بڑھے۔ دل کا دباؤ۔ ڈر کے ساتھ  
 دل کی دھڑکن۔ رات کے وقت یا تھوڑی سی محنت کے ساتھ زیادتی کھائی کے ہمراہ اور  
 غنی بلغم کا اخراج کے ہمراہ

میڈورنیم۔ سانس لینے میں دقت چھاتی میں دباؤ کی وجہ سے دل کا پھر سمجھنا اور  
 تیکن دار درد درد دل۔ حاد۔ تیز۔ دھیمی دل کی چوٹی پر تیز درد۔ حرکت پر زیادتی۔ دل میں جلن

جو بیٹھ اور بائیں بازو تک جائے۔

لایکوٹو ڈیم۔ دل کی دھڑکن خفکہ بستر میں بھی رات کے وقت بستر میں پریشان پہلو بدلنے پر۔ کھانا کھانے کے بعد زیادتی ہضم ہونے کے اور دوران زیادتی۔ دل کا عمل دبا ہوا اور غیرواضح۔ پیشاب میں البیوض کا اخراج۔ چھاتی میں انیٹھن اور گھٹن۔ مانس نہ لے سکے۔ چھوٹی پسلیوں کو مانس کی دھڑ سے سوئی لگنے جیسی تکلیف ہو۔

لیٹیم گریٹم۔ احساس جیسے کہ دل مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو یا بانک (لوہاروں کا ایک اور اہل) جس میں چیزوں کو مضبوطی سے کسایا پکڑا جاتا ہے۔ میں جھینچا جا رہا ہو۔ جیسے کہ تمام خول دل کی طرف جلا گیا ہے۔ دہرا ہونیکا احساس پیدا ہو۔ سیدھا چلنے کے نااہل ہو، دل جیسے کہ زبردست پکڑ میں اور تب اچانک چھوڑ دیا جائے اول بدل کر گھٹن میں دل میں تکلیف تقریباً متواتر کھانا کھانے سے زیادتی خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ کھایا جائے۔ اکثر اوقات دل کی دھڑکن اور تشویش۔

آرنیکا۔ رات کے وقت ڈرے۔ اچانک موت کا ڈر۔ صدمہ۔ جسم کے اوپر دھکن دار گرہیں جسم پر۔ ناراضگی آرنیکا کی نمایاں علامت ہے۔ جسم سرد اور سرگرم۔ آرنیکا دل کی تڑپوں کی امراض کے لئے بہت مفید ہے۔ مریض علیحدہ چھوڑ دیا جانا پسند کرے۔ غلگین، جڑ پٹا۔ اداس۔ ڈرنے والا۔ آسانی سے ڈر جانے والا۔ ہر قسم کی چیزوں کا تصور کرے۔ رات کے وقت دہشت زدہ۔ اچانک موت کا ڈر اکثر رات آئے بے چین۔ سخت گھٹن زیادہ کام کرنے یا تھک جانے پر۔ آرنیکا متاثرہ حصوں کو آرام دے دیگا اور علاج کر دے گا۔ سیدکل کار۔ سیکل میں بازوؤں اور ٹانگوں کا سس ہونا اور ٹھنڈے ہونا پایا جاتا ہے۔ دل میں درد اور چھاتی میں سوراخ کرنے والا درد۔ سینے میں دھکن۔

## دل کی جھلی کی سوزش

اکونائٹ این۔ چھاتی میں سوئی گزرنے جیسی تکلیف۔ پریشانی۔ پیمنی اور بخار۔

سپائیکلیا۔ دل کے حصّے سے تیز باہر کی طرف جانے والی تکلیف دل کی دھڑکن اور بے چینی کے ہمراہ۔  
 لیکسس۔ دل کے حصّے میں پھوڑے کی حرکت کی دریں۔  
 کالمیا لیٹی فولیا۔ جب جوڑوں کی دردوں کے ہمراہ جگہ بدلنے والی تکلیف۔  
 گن پوڈر۔ خون گندہ ہونے کی صورت میں یا خون زیرِ پلا ہونے کی صورت میں ۳۔ ایکسٹ میں دیکھئے۔  
 ناجا۔ والوز کے متاثر ہونے کی صورت میں حاد حالت کے بعد

## دل کی عام بیماریاں۔

ڈیجیٹالس۔ نبض بھر پور۔ بے قاعدہ۔ آغاز میں بہت سُست اور کمزور۔ ہر تیسری یا پانچویں یا ساتویں سڑوک وقفہ دار یہ احساس کہ دل حرکت کرنا بند کر دے گا، اگر وہ چلی۔ استقساء یا جلودر۔ دل کی بیماریوں کی وجہ سے۔ بھاری سانس جو لیٹنے پر زیادہ ہوں۔ دل خون کی کمی کے ہمراہ ڈھیلا ڈھالا۔ سُست تھکا ماندہ۔ بے ہوش۔ سخت تھکاواٹ اور شدید کمزوری۔ دہشت ناک خواب اور معدہ بیٹھنا۔ سونے سے ڈرنے کہ اس سے دم گھٹ جائے گا۔

سٹرونیٹیس۔ کھلے دل کے لئے دل کی دھڑکن اور کمی خون کے لئے شراب۔ نمبا کو اور چائے نوشی کی وجہ سے دل کا اپنے افعال میں ناکام ہونا۔ تنگی تنفس پھیپھڑوں کی سوزش کے ہمراہ۔ یہ قے کھانسی، پھیپھڑوں سے خون آنا اور استقساء یا جلودر اگر دل کی تکلیف کی وجہ سے یا دل کی تکلیف ہمراہ ہو۔ دل کی اپنے افعال سرانجام دینے کی نااہلیت بغیر گھٹن کے۔  
 لاروسیروکیس۔ ڈیجیٹالس کے غلط استعمال کی وجہ سے دل کا فیل ہو جانا۔

کالسنونیا۔ دل کی بیماریاں۔ بیہوشی کے حملے۔ دباؤ۔ مشکل سے سانس لے، خونی بواہر کے ہمراہ۔ جب خون بہنا رک جائے تو دل کی تکلیف ظاہر ہوں۔

ایپوسائٹیم۔ دل کی بیماریوں کی وجہ سے استقساء یا جلودر۔  
 لائیکوپس درج۔ دل کی دھڑکن۔ نبض سُست، اونچائی پر چڑھنا مشکل۔ جیسے کہ یہ سڑوکوں پر چڑھنا وغیرہ۔

کیکٹس گرنیدی۔ درد دل۔ گھٹن اور دل کی عالمگیزی اور لاغری کے ساتھ، احساس جیسے کہ دل لوہے کے کڑے یا پھٹے میں تنگ سے تنگ ترک جا رہا ہے۔ دل کا سکڑاؤ اور گھٹن سر میں خون کا شدید دورہ۔ بازو، ٹانگوں میں ٹھنڈا کاشتہ احساس۔ بھاتی دل اور جسم میں خون کی غیر متوازن حرکت۔ دل کے کام کرنے کی نااہلیت گھٹن کے ہمراہ۔

لوہو سٹا۔ دل بہت بڑا عکس ہو۔ بھاتی میں دباؤ کے ہمراہ کھانا کھانے کے بعد دل کی دھڑکن یا حیض کے دوران میں دل کی دھڑکن۔ بن تکلیف کے ہمراہ دماغ میں گہرا درد سر کے بڑا ہونے اور سوجھ ہوئے ہونے کا احساس۔

جیلسمیم۔ دل کے پھول کی کمزوری اس احساس کے ہمراہ کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ نیند سے مریض اچانک اٹھ بیٹھتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ حرکت میں رہے درد دل رک جائے گا۔ نبض شاذ و نادر، نرم، کمزور اور تقریباً نامعلوم۔ گراؤ لیا۔ دل اور پھیپھڑوں کی کمزوری۔ جب مریض سو جائے تو اس احساس کے ساتھ اٹھ کر سانس رک چکا ہے۔

میگنولیا۔ بھاتی کا دباؤ پھیپھڑوں کا پھیل نہ سکا۔ کھانا کھانے کے بعد بے چینی کا احساس۔ گھٹن کا احساس جب تیز چلے یا بائیں کروٹ لیٹے، تنگی تنفس۔ دل میں ایٹھن دار درد۔ درد دل۔ دل کے غلاف کی سوزش۔ بیہوشی کی رغبت۔ احساس جیسے کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ دل میں درد غارش کے ہمراہ۔ گھٹیا وی درد دل۔

سکونٹا وائروسا۔ کانپنا۔ دل کی دھڑکن۔ احساس جیسے کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ بعض اوقات بیہوشی کے احساس کے ساتھ۔

لیکسس۔ چلنے پر دل کی گھٹن۔ بیگنی رنگ کا بہرہ استقاء اور بڑھے ہوئے جگر کے ہمراہ۔ نیند اور نیند کے بعد زیادتی۔ سونے سے زیادتی مرض کی دہرے ڈرے۔ فاسفورس۔ دل کی چربی تنزلی۔ دل پھیلا ہوا۔ بائیں جانب لیٹنے سے دل کے دھڑکن میں زیادتی۔

گرٹیکس۔ دل کے فیل ہونے ہی واسطے عمل کے لئے بہترین دوائی ہے۔ بیہوشی اور صحت  
نزع یا قریب المرگ۔ دل کا غیر قدرتی طور پر بڑھ جانا۔ اور دل کی خون کی روکنے والی جھلیوں  
کی بیماریاں۔ دل کی دھڑکن اور دل کا جلدی جلدی عمل کرنا۔ دردِ دل۔

آرم میٹ۔ گنٹھیاوی دل کے لئے بہترین دوائی ہے۔ جب درد ایک عضو سے دوسرے  
عضو تک منتقل ہو اور آخر کار دل میں ٹھہراؤ ہو جائے۔ یہ دل کی اندرونی جھلیوں پر اثر کرتی ہے،  
سن ہونے کے ہمراہ اور بائیں بازو میں جھنجھناہٹ والی درد۔ مزمن دم شاہرگ۔  
آرسنیک آئیوڈ۔ زہر کی وجہ سے دل کے غلاف کی سوزش اور دل کی استقامتی حالت  
عام سوزش اور آنکھوں اور پاؤں کی سوزش۔ دل بے قاعدہ دھڑکے اور نبض وقفہ دار۔  
سکولیریا۔ تباہ کن روشنی سے دل کمزور۔

فیزولس نانا۔ کمزور اور بغیر آواز کے دل۔ نبض کمزور اور وقفہ دار اور کمزور۔ جب اور کوئی  
تحریک پیدا کرنے والی دوائی کام نہ کرے تو دل کو فیل ہونے سے بچاتی ہے۔

یسرس لون۔ فتنی کوفت والی اور اینٹھن دار، دل کی دردیں۔  
لائیکوپوڈیم۔ کم بلڈ پریشر اور کمزوری کے لئے کھانا کھانے لار یا منہ سے پانی بہے۔  
گیس اور پیٹ پھول جائے یا تن جائے کمزور دل، کمزور دورانِ خون۔ بستر میں بھی دل  
کی دھڑکن۔ کھانا کھانے کے بعد زیادتی۔

ناجا۔ منزل والو کی تنگی دل کی دھڑکن۔ دل کے درد کے ہمراہ۔ دل پر درد محسوس ہو۔  
دل کی درد گدھی تک۔ بائیں کندھے بازو تک جائے اور موت کا ڈر۔ کم دباؤ۔  
کروکس۔ قابو نہ پائی جانے والی ہنسی اس احساس کے ساتھ کہ کوئی چیز اچھیلی  
یا اچھلتی ہوئی تکلیف، سوئی لگنے جیسی تکلیف اور صدمہ جیسے کچھاتی میں کچھ اچھل کود ہو۔  
مرک وائیو۔ دل کی جھلیوں کی سوزش جو جوڑوں اور دل کے غلاف۔ سفید زبان۔

شدید پسینے کے ہمراہ جس میں رات کے وقت علامات کی زیادتی ہو۔  
اگنیشیا۔ پریشانی کی وجہ سے دل کی شدید دھڑکن۔ ایک ایم طاقت میں دیجئے۔

تھائیرائیڈینم - تھائیرائیڈ غدد کے بڑھنے کے ساتھ دل کی تکلیف اور دھڑکن جیت  
 زلیٹ سکے - اعصابی ہسٹریا اور مری کے دوروں کے ساتھ گنٹھیاوی دل بھینچنے والی درد  
 کے ساتھ نیچے زلیٹ سکے - شدید قسم کا درد دل -

کاربووئک - بدھمی کی وجہ سے دل کی تکلیف یا پیٹ کے اوپر والے حصہ میں ہوا کی  
 وجہ سے دل کی تکلیف -

تھوجا - ٹیکوں کی وجہ سے یا زیادہ ٹیکوں کی وجہ سے دل کی بیماریاں -  
 ابرکس - تھوڑی سی حرکت پر دل کی دھڑکن یا کوتاہ دمی یا سانس کا نہ آنا - نرم اور دھڑلار  
 نبض - بائیں بازو میں تکلیف اور بے حتی - چکر - ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے - گلے میں گھٹن کا  
 احساس - اعصابی، رات کے وقت یا صبح کے وقت یا صبح کے قریب، علامات کی زیادتی -  
 اگر الکالائیڈ - دل کی دھڑکن - آواز کے نہ ہونے سے اول بدل کر آئے - کاپنے - انیٹشن  
 احساس نہ رہے - جسم اور بازوؤں، انگلیوں اور ہونٹوں کا سن ہو جانا - دل، حرام مغز اور  
 دماغ کی بیماری کی وجہ بازوؤں کا فالج - تمام جسم میں دھکن - تھکاوٹ - پھٹارنے والی - تیرکی  
 طرح نکلنے والی - کاٹنے والی شدید در دیں - سانس مشکل سے لے -

ایڈونس ورنیکس - فمزل اور اوٹلی میں خون کی واپسی - شاہرگ کی مزمز سوزش - دل  
 کی دھڑکن - تنگی تنفس - چربی کی وجہ سے دل کی جھلیوں کی سوزش -  
 ایڈرینالین x ۲۰۰ - دل فیل ہونے کی صورت میں -

کالیا - ایل با - جب گنٹھیاوی دل کی طرف جاتے تو یہ مفید ہوتی ہے - یا جب دل کی تکلیف  
 گنٹھیا کے ہمراہ ہوں -

کاچیکیم - جب کالیا ایل ناکام ہو جائے تو یہ آزمائی جانے -  
 کنوولیریا - دل کی دھڑکن، رحم کے حصہ میں دھکن کے ہمراہ - آخری علامت کے ہمراہ ڈاکٹرنش  
 نے دل کے استقاء کا کامیاب علاج کیا - اس دوائی کی ۲۰ طاقت کے ساتھ -

ریکٹس { دل کے والوز کی بیماریوں میں سن ہونیکے ہمراہ اور بائیں بازو میں بھنجنا ہٹ کے ساتھ -  
 ارم }

مرکیورس سائیکس - دل کی پھٹی کے سر۔ دل کی خطرناک بیماریوں میں دل کے جلدی  
فیل ہونے کی مفید دوائی ہے۔

لیٹیم نگرینم - احساس جیسے کہ دل بڑا گیا ہو۔ ہانک میں کس کر کھلا جا رہا ہو خون دل کی  
طرف جائے دھرا ہونے کے ساتھ۔ دل میں تکلیف۔

آرنیکا مانٹ - دل کی شریانوں کی بیماریاں جسم ٹھنڈا اور سرگرم علیحدہ رہنا پسند کرے گا۔  
بد مزاج۔ چڑچڑاہٹ۔ غمگین۔ ڈرپوک۔ آسانی سے ڈر جائے۔ اچانک رات کے وقت موت کا ڈر۔  
سیکل کار۔ دل کا درد۔ خون کا بہت زیادہ دباؤ سن ہونے کے ہمراہ۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے  
میدورینم - پھاتی پر دباؤ کی وجہ سے مشکل سے سانس ہونے کے ہمراہ۔ دل ادھر ادھر  
پھٹ پھٹاے تھوڑی سے دزیش سے بھی دل کی دھڑکن۔ دل میں تیز۔ جلد جلد اور جیس  
دریں۔ دل میں جلن۔

## دل کا بڑھ جانا

کریڈیٹس - دل کے والوز کی نااہلیت کی وجہ سے دل کا بہت بڑھ جانا۔ تنگی تنفس اور  
استعداد کے ہمراہ۔

کالیسیائیٹس - دل کے والوز کی بیماریاں دل کے بڑھنے کے ہمراہ جس کے بعد گھٹیا  
کے حملہ کا ڈر ہو یا اس کے ساتھ گھٹیا ہو۔ دل کی دھڑکن اور دل میں تکلیف جو نیچے پیٹ  
کے جائے۔

آرنیکا ایم - جب دل کا بڑھنا والوز کے صدمہ یا چوٹ کے ہمراہ ہو اور یہ زیادہ دیر تک  
رہتا کس طاقت سے زیادہ کام کرنا جیسے کہ دوڑ لگانا یا کاروباری طور پر تھکے ہوئے  
لوگوں میں شدید دباؤ کی وجہ سے بڑھ گیا ہو۔ تنگی تنفس۔ بیڑھیاں نہ چڑھ سکے۔ دھواں  
برداشت نہ کر سکے، کئی خون۔

لارڈوسیس - منزل والوز کی نااہلیت کی وجہ سے دل کا بڑھ جانا سانس لینے  
کے لئے ہانپنے۔ ناہانتی۔ چلنے پر یا چڑھنے پر بے دم ہو جائے۔

ابرس - دل کا بڑھ جانا اور کھلا ہو جانا۔ دل کا شدید اور تیز عمل، نرم نبض کے ہمراہ  
 تھوڑی سی بھی حرکت یا کام کی زیادتی پر دل کی دھڑکن، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے لگنے کے  
 بند ہونے کا احساس۔ دل کے عمل کے لئے محاسن۔ مڈمکھڑ کا ایک قطرہ فی خدا رک دیجئے !  
 کیلکس - شدید دل کی دھڑکن۔ کمر کے بل لیٹنے پر زیادتی۔ جوش دلانے پر حرکت کرنے پر  
 اچانک اٹھنے پر یا چلنے پر زیادہ۔ چہرہ سرخ چنڈیا پر سردرد۔ شریانوں کی تنگن۔ نوجوانوں۔  
 میں دل کا بڑھ جانا اس کی خاص نشانی ہے۔

اکونائٹ این - دل کا سادہ بڑھ جانا بغیر والوز کی بیماری کے۔ انگلیوں کا سُں ہو جانا اور  
 بھنجنا ہٹ (والوز کی تکلیف میں یہ بہت نقصان کر سکتی ہے)۔

آرم میٹ - والوز کی تکلیف میں سُں ہونے اور بائیں بازو میں بھنجنا ہٹ کے ہمراہ۔ آرم  
 میٹ چربی والا دل بغیر پھیلاؤ کے ہوتا ہے۔

نیرم میسور - بائی بلڈ پریشر دل کے پھیل جانے کے ہمراہ چڑھتا ہے اور ہمدردی سے نفرت  
 کرنے والے لوگوں میں جوش شدید ضبط کرنے والے۔ اپنی پریشانیوں اور غموں کے متعلق کبھی  
 بات نہ کریں۔ اس سلسلہ میں معمولی ہمدردی، انہیں ناراض کر دگی۔ خاموش غم۔ جلد زرد پٹی چمکیلی۔

## درم شریان - شریانوں کی سوزش

کلکیر یا کرب - شریانوں کی سوزش  
درم وریڈ

ہیما میلس - سادہ اور حاد درم وید حساسیت۔ وریڈیں سخت گرہ دار اور تکلیف دہ  
 پلسٹیل - جب پتھر کی پیدائش کے بعد۔ نید حصے۔ دکھن اور زنگ لگنے جیسی تکلیف  
 سپوزیم - جب پیپ بن چکی ہو۔

## دھڑکن

اکونائٹ نیپ - دل کی دھڑکن جو طاقت در ہو۔ بائیں کندھے اور چھاتی میں درد۔ پریشانی  
ڈر اور انگلیوں میں جھنجھناہٹ۔

نکس و امیکا - جب بڑھتی کی وجہ سے - کھانا کھانے کے بعد گیس۔

واٹپرا - وریڈوں کا درم - متاثرہ بازو کو نیچے ٹکانے سے زیادتی - بھڑاؤ - درد اور  
وریڈوں میں پھٹنے کا احساس - قبض - کھانا کھانے کے بعد زیادتی۔

الیومن - دائیں طرف لیٹے سے دھڑکن جو اس دوائی کے لئے خاص اور نمایاں ہے۔  
پلسٹیل - عورتوں میں بڑھتی سے یا سنہرے بالوں والے لوگوں میں - تیز امیت - پانخانہ  
ڈھیلا - ڈھالا۔

کاربووٹیج - کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بہت زیادہ گیس - ڈکاروں سے افاقہ۔  
ماسکس - اعصابی دھڑکن - بیہوشی کے ہمراہ۔

مختاثر ایڈینم - دل کی دھڑکن اور بیہوشی دل کے نہایت تیز عمل کی وجہ سے۔  
کریٹیکس - دل کی دھڑکن، دل فیل ہونے کے خطرہ کے ساتھ - دل کے حصہ میں درد  
اور بائیں کندھے کے عورتوں میں درد - سانس بہت چھوٹا - تیزی کے ساتھ - نرم اور بے قاعدہ  
نبض - انگلیوں اور پنجوں کا نیلا پن۔

ڈیجیٹلس - دل کی دھڑکن بے قاعدہ اور وقفہ دار نبض کے ہمراہ۔

آرینکم ایلم - دل کی دھڑکن یا دل جب تمام جسم ہل رہا ہو اور چھاتی جگہ سے اپنی دیواروں  
کو پھٹ جائے - بیٹھنے پر آگے بھٹکے یا پیچھے بھٹکے پر افاقہ۔

کوکا - سانس چھوٹا - دباؤ تنگی تنفس - شدید سنی جانے والی دھڑکن جو بائیں پر پڑھنے کی  
وجہ سے ہو۔

کالیا لیٹ - دھڑکن یا دل میں درد نیچے کی طرف پیٹ میں آتی ہوئی - دل کا بڑھ جانا یا دالوز

کی تکالیف جس کے بعد گھٹنے کا دورہ یا ادل بدل کر گھٹنے کا دورہ یا حملہ۔  
 لاروسیر وکیس۔ دل کا بڑھ جانا، منزل والوز کی نا اہلیت کی وجہ سے۔ سانس کے لئے ہانپنا۔  
 ناطاقتی چڑھنے پر یا پھلنے پر۔ سانس نہ آئے۔

لائیکوپس ورج۔ دھڑکن سست نبض۔ اونچائی پر چڑھنا نہ جاسکے، جیسے کہ لیٹھیوں پر۔  
 کینا بس انڈیکا۔ دل کی دھڑکن۔ نیند سے بیدار کر دے۔  
 ابکرس۔ دل کا بڑھ جانا اور پھیل جانا۔ دل کا شدید اور تیز عمل نرم نبض کے ہمراہ۔ تھوڑی  
 سے حرکت یا کام سے دھڑکن۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ گلے میں رکاوٹ کا احساس۔ دل کے  
 عمل کیلئے محاسن۔ مدد کچھ کا ایک قطرہ فی خوراک دیجئے۔

اولینڈر۔ تیز نبض کے ساتھ دل کی دھڑکن۔ جی تلاء اور قے۔ تمام جسم میں درد۔  
 کیلکٹس۔ دل کی شدید دھڑکن جو بائیں جانب لیٹنے پر یا حیض کے شروع پر زیادہ ہو۔ دل  
 کے گرد وہ بے کڑے کا احساس۔ دم گھٹنے کے ساتھ اور ٹھنڈے سینے۔ دل کی چوٹی پر درد  
 جو بائیں بازو تک جائے۔ سرگرائی۔ سانس جھوٹا اور گیس کے ہمراہ۔ دھڑکن نبض کمزور تیز اور  
 بے قاعدہ۔

ناجا۔ دل کے گرد وزن کا احساس، سوئی لگنے جیسی درد کے ساتھ جو گردن کی گڈی، بائیں  
 کندھے اور بازو تک پریشان اور موت کے ڈر کے ساتھ۔ متعدی امراض کے بعد دل کی تھابی۔  
 برویمیم۔ دل کی دھڑکن جی تلاء کے ہمراہ اور سرد اور اعصابی براہ کھینگی کے ساتھ۔  
 کام سے، پڑھنے سے نفرت۔ گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لے۔ لاپرواہ۔ تھکا کا ماندہ۔  
 غمگین اور بے حوصلہ۔

آرنیکا مانٹ۔ دوڑ لگانے والوں میں زیادہ طاقت کے استعمال کی وجہ سے دھڑکن۔ زیادہ  
 رستا کس۔ وزن اٹھانے والوں میں۔ بائیں بازو اور کندھے کا ٹھن ہو جانا۔ دی گئی  
 ترتیب سے ان ادویات کو آزمائیے۔  
 سٹانم۔ تھوڑی سی مشقت سے بھی دھڑکن اور پریشانی جیسے کہ گھریلو بات دینے پر ہی۔

کلکیر یا آرسینکیم - تھوڑے سے جذبات دل کی دھڑکن کا باعث نہیں۔

سٹرونیٹکس - دل کے پھیل جانے اور خون کی کمی کی وجہ سے دھڑکن۔

آرنجم نائیریکیم - دائیں جانب لیٹنے سے دھڑکن۔

آرنجم میٹ - پھلتی میں یا سارے جسم میں پیٹھ کے بل لیٹنے پر، ہلنے پر، پھر پھٹانے اور کاپنے کے احساس کے ساتھ۔ دھڑکن۔

اگنیشیا - بہت زیادہ متاثر ہونے والے آدمیوں اعصابی دھڑکن۔ رات کے وقت بستر میں زیادتی دھڑکن مریض کو جاگاتا رکھتے۔

لیکس - تھوڑی سی پھیل پر دھڑکن خاص طور پر زندگی کی تبدیلی پر۔

امبرگریا - { گانا سننے پر دل کی دھڑکن

سٹیفسگریا - {

انٹیم مارٹ - پاخانہ کے دوران دل کی دھڑکن۔

سلفر {

کونیم {

ڈیجیٹلس { غم اور ڈر کے بعد دل کی دھڑکن۔

اوپیم {

ڈیجیٹلس { جماعت کے بعد دل کی دھڑکن۔

سیدیا {

امونیم کارب - تنگی تنفس کے ساتھ دھڑکن۔ لیکن بغیر کسی دل کی بیماری کے نہانے پر زیادتی۔

نیٹریم میور - جب بستر میں لیٹے یا کھانا کھانے کے بعد۔ کونین کے غلط استعمال کے بعد اور جب

دھڑکن سارے جسم کو ہلا کر رکھ دے۔ بائیں جانب لیٹنے پر زیادتی

اکٹیا لیس - پیٹ کے گڑھے میں ڈوبنے کا احساس کے ساتھ دھڑکن شدید بے چینی اور نیند۔

سپاٹھیلیا - دل کے حصے میں شدید تیر لگنے جیسا کاٹنے والا درد منہ سے گدی بو کے ہوا،

نبض کمزور اور بے قاعدہ - اعصابی درد جو بازوؤں تک جائے - گرم پانی کی زبردست خواہش -  
جو کہ آفاقی دے -

بیلادونہ - تھوڑی سی مشقت سے دھڑکن پورے ٹپکن دار سر درد کے ہمراہ، سرخ چہرہ،  
روشنی اور سرور سے بہت حساس -

تھیا - دل کے پھر پھر اٹنے اور وقتی طور پر رک جانے کے ساتھ دھڑکن -  
میگنیشیا میور - ہیٹریا والی عورتوں میں دل کی دھڑکن جس کو جلنے پھرنے سے آفاقی ہو -  
فاسفورس - تباہ کنوشی کی وجہ سے دل کی دھڑکن - جنسی کمزوری -

ورسیرم ورائیڈ - جب نبض ۴۰ یا اس سے نیچے گر جائے - بعض اوقات کلائی میں محسوس  
ہی نہ دے - مریض سرخ دھاری رکھتا ہوزبان کے درمیان میں - کمزور دل لوگوں کے لئے  
یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے -

## نبض

اولینڈر - نبض تیز تیز اور جی متلانے کے ساتھ یہ نبض کی رفتار کو نیچے لے آتی ہے -

اکونائٹ این - نبض تیز - جلد اور اچھلتی ہوئی یا پھلانگتی ہوئی -

بیلادونہ - نبض اچھلتی ہوئی - چہرہ سرخ - پُر خون مریض - ٹپکن دار نبض -

کاربوویج - بے قاعدہ نبض، ناک سے خون بہنے کے ساتھ -

یسورٹیک ایسڈ - جب نبض ہر تیسرے ٹھوک پر وقفہ دے -

ورسیرم ایلیئم - نبض ۳۰ - ۴۰ پر آجائے، لیکن دوبارہ فوراً اور پر آجائے اور پھر گر جائے -

نبض ٹھنڈے پینے کے ہمراہ غائب -

ڈیجیٹلیس - نبض بے قاعدہ اور بہت سست اور کمزور ہر تری، پانچویں اور نویں ضرب پر وقفہ ہو -

کیکس - نبض گھٹن کے ہمراہ غائب ہو گنٹھیاوی دل میں وقفے دار نبض -

ایمرس - جھکے دار نبض - تھاپ ایک دوسرے میں ملتی ہوئی معلوم دے، دہری نبض -

آرینیک سلف فلیوم - نبض تیز - بے قاعدہ - وقفہ دار - پھوٹی اور کمزور -  
پھولی ہوئی رگ - نوطوں کی پھولی ہوئی رگیں -

پلسٹیلڈا - بطور حفظ ماقدم یا جب متاثرہ حصے نیلے ہوں - دکھن کے ساتھ اور ڈنگ لگنے  
 جیسی درد ہو - پھولی ہوئی رگوں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے -

فارمیکا - جب کمزوری ساتھ ہو -

فلورک ایسڈ - بہت ہی پرانے کیس - خندی - خاص طور پر روتوں میں جنھوں نے بہت بچے پیدا کئے  
 ہوں - رگوں میں کانٹھیں اور پھولی ہوئی رگوں کے لئے چوٹی رگوں میں پھوڑے خاص طور پر ٹانگوں پر  
 پائرو جینیم - پھولی رگوں کے پھوڑے - پھوڑوں والی ٹانگوں جن میں مواد بہت زیادہ رہے  
 اور انتہائی شدید درد -

آرینیکم ایلیئم - آگ کی طرح جلیں، خاص طور پر رات کے وقت -

نکسوامیکا - حمل کے دوران امیرانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے -

ہیما میلس - ڈنگ لگنے جیسے اور سوراخ کرنے والی درد (پھولی ہوئی رگوں پر ہیما میلس  
 کا سلیوشن ہر حالت میں لگایا جانا چاہیے)

وائیپرا - متاثرہ حصہ کو پھلنے دینا جیسے کہ یہ بھراؤ کی وجہ سے پھٹ جائے گا - اس دوائی کی  
 نمایاں علامت پھٹ جانے کا احساس -

بیسلاڈونا { پُر خون لوگوں میں پھولی ہوئی رگیں جہاں خون سر کی طرف اُٹھے -

گلونائین { دریدوں میں تپکن دار درد -

میگنیک لپس آسٹ - ٹانگوں میں تپکن دار درد جب بچے لٹک رہی ہوں تو گرم پانی  
 کے گرنے کا احساس - متاثرہ حصوں پر چلنے پر بیہوشی -

لیکسس - حمل کے دوران دریدوں کا درد -

ملی فولیم - پھولی ہوئی دریدوں میں بہت ہی مفید دوائی ہے خاص طور پر جب شعری نالیاں

اسفنج کی طرح اور برقی ہوئی ہوں۔ دریدیں آسانی سے ٹوٹ جائیں جب ان میں اجتماع خون ہو۔ زخموں سے آسانی سے اور زیادہ خون ہے۔ دریدوں کی سوزش پر درد حمل کے دوران۔  
 بھولت ہوئی ٹانگوں کی دریدیں بھوڑے پھنسی والیاں اور حاملہ عورتوں میں ان سے خون ہے۔  
**سلفر**۔ دریدیں پھوڑوں والی۔ پٹ جائیں اور خون ہے۔ ٹانگوں اور ماتحتوں کی دریدوں  
 کی سوزش۔ یہ دوائی بطور عمل انگیز کے استعمال کرنی چاہیے جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں  
 یا نامکمل آرام دیں۔

## خوراک

دل کی تمام بیماریوں میں گوشت، مچھلی، پرندے اور ان سے بنی ہوئی چیزیں کھانڈ  
 لیک، پیٹری، جام، مارلیڈ اور مٹھائیوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ نمک کی بھی  
 کم سے کم مقدار استعمال کرنا چاہیے۔



نواں  
باب ۹

نظامِ انتظام  
کی بیماریاں !  
پیٹ

## پیٹ - زندہ

کر دو کس - جیسے کہ کوئی زندہ چیز پیٹ میں یا بھاتی میں حرکت کر رہی ہے۔  
 ایسا کارڈیم - یقین کرے کہ جب کوئی چیز پٹے تو یہ معدہ میں نہ جائے، جیسے کہ اس کے اندر  
 کوئی ہے، جو چیز وہ کھاتا یا پیتا ہے وہ نگل لیتا ہے۔ یہ تمام علامات بعض اوقات پارے کی نرم  
 سے لگزمیا کے اندر دب جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔  
 تھو جا - کوئی زندہ چیز کے پیٹ میں ہونے کا احساس - بچے کے ہاتھ کی حرکت کو محسوس کرے  
 یا اس کی آنکھوں میں کوئی جانور ہے۔

## ورم زائدہ

برائی ادینا - سوئی لگنے جیسی اور جلن دار درد جو تھوڑی سی حرکت سے زیادہ ہوں۔ دباؤ  
 اور درد والی طرف ٹیٹے سے افاقہ۔ پیٹ کے نچلے دائیں طرف دکھن، مرضی خاموشی کے ساتھ  
 لیٹے ٹانگیں اوپر کھینچی ہوئی ہوں۔ پیٹ کے بچوں کو آرام دینے کے لئے بھونپنا پسند نہ کرے۔  
 اور ہر سانس سے درد میں زیادتی ہو۔ ٹھنڈے پانی کی زیادہ مقدار میں شدید پیاس - ۹ طاقت  
 میں ہر چار گھنٹے کے بعد دیکھتے تھی کہ درد ترک جائے۔

سلفر - بطور عمل ایجنز استعمال کی جانی چاہئے تاکہ مکمل شفاء ہو جائے  
 آئرس ٹینکس - ورم زائدہ کا علاج شروع کرنے کے لئے پہلی دوائی ہے۔ وہ جہاں  
 کہ اندھی آنت اور چھوٹی آنت آگرتی ہیں شدید درد - دباؤ سے بہت زیادہ درد - موت جیسا  
 احساس معدہ کے گڑھے پر۔

بیلادونا - یہ آئرس ٹینکس جیسی علامات رکھتی ہے لیکن یہ اس وقت دی جائے جب پہلی دوا  
 ناکام ہو جائے۔ یہ اندھی آنت اور چھوٹی آنت کے ملنے والی جگہ پر شدید درد ہوا، ہلنے یا بچکا

سے زیادتی۔ معمولی سا پھوٹا جانا بھی برداشت نہ ہو سکے۔ برسرِ کار کا چھوٹا بھی تکلیف دہ ہو۔  
 قے بھی ہو۔ پُرغیند لیکن سونہ سکے۔ روشنی کے لئے بہت زیادہ حساس اور دوسری بیرونی احساسات  
 کے لئے۔ پیٹھ کے بل لیٹنے پر گھٹنوں کو کھینچ کر لیٹنے پر افاقہ۔ اعصابیت۔ ٹیکن دار سرد درد۔  
 ٹیک لگانے پر زیادتی۔ ڈھیلے کپڑے پہننے چاہیے۔

ڈائسکوریہ۔ جب تکلیف و درد متواتر ہو اور مریض درد سے نجات نہ پا رہا ہو تو یہ دوائی  
 بہترین دوائی ہے۔ انسٹرپاں گیس سے بھری ہوئی پیٹ میں درد ہو۔ دہرا کرنے والا درد جس کو  
 تپجے کی طرف ہونے سے افاقہ ہو۔ یہ گرم پانی میں دی جانی چاہیے۔

مرکیورکس۔ جہاں بیرونی علامات حاد ہوں۔ انسٹریوں کی یا پیمپش کی حالت موجود ہو۔ سخت سرخ  
 چھوٹی آنت اور اندھ آنت کے ملنے کی جگہ پر درد۔ انسٹریوں میں دھکن۔ پسینہ سے کوئی افاقہ  
 نہ ہو۔ اینڈکس کے حصہ میں نرم گوارہ علم ہو۔

کالوسٹھ۔ خاص طور پر جب شدید درد ہو رہا ہو جو کٹنے والا ہو۔ دہرا کرنے والا یا ایٹھن ہو  
 منہ کا ذائقہ کڑوا۔ جلی کی طرح کا پاخانہ یا لیسڈار پاخانہ۔ برہم ہونے یا غصہ آنے پر زیادہ۔  
 دباؤ یا گرمی سے زیادہ۔

لیکسس۔ ایک قیمتی دوائی سارے پیٹ میں دھکن اور سوئی پھٹنے جیسی تکلیف۔ سوزش  
 والی جگہ پر۔ کولہوں سے پھللی طرف اور پھلی طرف۔ مریض پیٹھ کے بل لیٹتا ہے۔ گھٹنے کھینچنے  
 ہوؤں کے ساتھ۔ گرمی محسوس کرتا ہے۔ سرد موسم میں بھی کپڑے برداشت نہیں کر سکتا۔

لائیکولوڈیم۔ جب حاد حملہ ختم ہو چکا ہو تو اونچی طاقت مثلاً... طاقت میں اچھی دوائی ہے۔  
 ہر نذرہ روز بعد ایک ماہ بعد دہرائی جائے تاکہ دوبارہ حملہ نہ ہو۔

آرسینک الیم۔ جب عفونی حالت ہو یا جراثیمی حالت ہو تو یہ دوائی دیتے۔ سردی کی نہیں۔  
 دق کی علامت۔ پیمپش۔ بے چینی اور طاقت کا اچانک جواب دینا کی علامات ہوں۔

رسٹاکس۔ چھوٹی آنت اور اندھ آنت کے ملنے والی جگہ پر شدید سوزش اور شدید درد جس  
 کی وجہ سے نہ رکنے والی دے چینی ہو۔ یہ جراثیمی یا زہریلی حالتوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔

اگنیشیا۔ اینڈکس میں شدید درد اپریشن کا ڈر خاص طور پر ذہنی علامت ہے۔ گھٹنے  
 ٹھوڑی گھٹنوں سے لگی ہوئی۔ جسم گرم اور سخت۔ مریض حساس۔ چست اور اعصابی ہوتا  
 ہے۔ وہ بیک وقت ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ انٹریوں میں درد  
 سونی بچھنے جیسی تکلیف۔ اعصابی مریضوں میں اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے۔

فیرم فاس  
 کالی میور  
 میگنیشیا فاس { چھوٹی آنت اور اندہما آنت کے علاقہ کی سوزش  
 کے لئے کارآمد ادویات ہیں۔

### پیٹ کا استسقاء۔ جلودر

ایپس میل۔ جلودر پیاس کے بغیر۔ یہ بخاروں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، خاص طور  
 پر دانے دار بخار۔ جلد زرد۔ موم جیسی اور شفاف پیشاب بہت کم۔ جلد خشک گری سے  
 زیادتی اور ٹھنڈک سے انفا ۶ یا ۹ طاقت میں دیکھئے!۔  
 ایپوسائٹیم کین۔ ٹائیفائیڈ کے بعد جلودر یا سرخ بخار یا جگر کی رکاوٹ کی وجہ سے۔  
 جب عضوی مرض ہو تو یہ جلودر کے لئے مفید ہے۔ سردی سے زیادتی اور سرد مشروبات  
 سے حساس۔ ٹھنڈے مشروبات سے پیٹ میں درد۔ ایپس کی طرح پیشاب کم اور جلد خشک  
 شدید پیاس کے ساتھ لیکن پیشاب کم۔

آر سینکم البم۔ ہر قسم کے جلودر میں مفید خاص طور پر جب دل اور پھیپھڑوں میں خرابی ہو۔  
 اور گردوں کے علاقہ کا جلودر ہو۔ چہرہ پر سوزش اور بلکوں کے گرد سوزش ہو موم جیسی  
 شفاف جلد۔ پیاسا اور قے ہو وغیرہ جلودر میں خون آب کا باہر ناسا بھی ایک علامت ہے۔  
 ایک ٹی فلورٹیم۔ جلودر دل کی عضوی بیماری کی وجہ سے جگر کی مزمن تکالیف۔ پیشاب  
 میں بہت زیادہ مقدار میں البیومن جس کے بعد وقفہ دار بخار ہو۔

ڈیجیٹالس۔ دل کے جلودر میں مفید ہے۔ کمزور بے قاعدہ جیسے کہ خاموشی سے کھڑا ہو۔

گہرا سانس لینے کی خواہش کے ساتھ۔ پیشاب کم۔ گہرا اور البیومن والا۔ بعض سست خضبیوں کی قبلی اور آلت تناسل صوجا ہوا۔ ٹھنڈے پینے۔

میوسٹیک الیڈ۔ جگر کے کینسر کی وجہ سے جلور

ہیلی بورس۔ جیلی کی طرح کے بچش کے ساتھ جلور۔ پیشاب گہرے رنگ کا اور مقدار کم

تھلاپی برسا۔ جلور میں مفید ہے۔ مدر نکچر کے قطرے فی خوراک دیجئے۔

یوریا۔ گردوں کے جلور میں مفید ہے۔ پیشاب میں البیومن۔ پیشاب میں کھارنے اور شوگر۔ کم وزن مخصوص کا پیشاب۔

لیٹرس ہسٹائیگیٹا۔ جگر اور تلی کے بڑھنے کی جلور۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے۔

کریم پراگین پیشاب ایک دن میں خارج کر دیتا ہے۔ آدھا دنس بڑے پراگین جو شانہ بنائے جو ایک دن میں استعمال کرائے یا مدر نکچر کے قطرے فی خوراک دیجئے۔

ڈلکا مارا۔ پسینہ دب جانے کے بعد جلور یا پھنسیوں کے دب جانے سے یا ٹھنڈ لگنے سے جلور۔

ایسٹیک الیڈ۔ پیٹ کے جلور گیس کے ہمراہ۔ ڈمار کے ہمراہ یا منہ میں پانی آنا یا رلیں بہنا اور بچش۔

لیکسس۔ جلور۔ پیشاب گہرا اور البیومن ملا۔ جلد گہری یا نیلگوں سفید۔

ٹیرینتھنا۔ گردوں میں زیادہ خون کی وجہ سے جلور۔ گردوں کے علاقہ میں دھیمی دھیمی درد

گہرا اور دھوئیں کے رنگ کا پیشاب۔

کالچیکم۔ گہرے پیشاب کے ہمراہ جلور۔ خاص طور پر گنٹھیا دی بچیدگیاں اس دوا کی مظهر ہوتی ہیں۔ خوراک یا کھانے پکنے کی بو کو برداشت نہ کر سنا اس کی نمایاں علامات ہیں۔

لایکوٹوڈیم۔ جگر کی بیماریوں کی وجہ سے جلور، نچلا نصف پیٹ تنا ہوا۔ ٹانگوں پر چھوڑ

بڑھی ہوئی تلی کے ساتھ جلور۔ شام کے وقت بخار بغیر پیاس کے یہ پر سانس مشکل سے آئے۔ پیشاب کم مقدار میں اور گہرے رنگ کا قبض دار پاخانہ دل کا فعل کمزور

لکھ: ۱۷۱۰ عدد۔

پلسٹیللا۔ بلوغت پر یاس یاس یا حیض کے ختم ہونے پر جلودر۔ خاص طور پر نرم طبیعت شریف اور آسانی سے مان جانے والی طبیعت والی عورتوں میں۔ کھلی ہوا پسند کریں خواہ بہت ٹھنڈی ہی کیوں نہ ہو۔

## بچے کی طرف کھینچاؤ

لٹم میگنٹم۔ تمام اعضاء پیٹ کا بچے کی طرف کھینچاؤ۔ معدے سے بچے کی طرف کھینچاؤ۔ میگنٹم۔ انترلوں کا بچے کی طرف کھینچاؤ۔ ڈھیلا چھوڑنے پر تمام پیٹ ذریعہ ملزم ہو تھکی مادی۔ کمی خون والی عورتیں رحم اور امعاء مستقیم کا خورج ہو۔

## درد قونج

نکسوا میکا۔ بد ہضمی کی وجہ سے درد قونج کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ ابتداء میں کم طاقات میں گرم پانی کے ہمراہ دی جانی چاہیے۔ درد پیٹ کے کسی بھی حصہ میں ہو۔ دریں مسلسل یا انٹھن دار اور کھانا کھانے پر زیادتی اور اس کے ہمراہ گیس ہو قبض ہو۔ اور جی ملٹائے، جمل کے دوران میں پیٹ میں انٹھن۔

کالو منتھنس۔ پیٹ درد۔ نکسوج کی طرح پکڑا ہوا۔ انٹھن دار۔ کھودنے والا خنجر لگنے والا۔ درد جیسے کہ انگلیوں سے پکڑا ہوا ہو۔ آگے کی طرف جھکا کر دہرا ہونے پر افاقہ یا پیٹ کی دیوار پر سخت دباؤ سے افاقہ۔ گرمیوں کی تکالیف اور بچش بھی۔ درد قونج گیس کی وجہ سے غیر مضغ شدہ خوراک یا کچے پھلوں۔ ٹھنڈک سے یا شدید جذبات جیسے کہ غصہ کا دورہ یہ سوزش والے قونج میں کوئی خاص نائدہ مند نہیں ہوتا۔

ورٹیرم ایلیم۔ پیٹ کی دریں جن کو دہر ہونے سے افاقہ ہو۔ یا ٹپلنے سے آرام ملے درد قونج جیسے کہ انترلوں میں گانٹھ پڑ جائے۔ پیٹ میں انٹھن۔ چہرے پر ٹھنڈے پسینے۔ یہ خاص طور پر مفید ہے جب انتریاں ایک دوسرے سے گزرجائیں۔ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس۔

بودھ سٹیا - دہرا ہونے اور کھانے کے بعد افاقہ محسوس کرے۔ - پیشاب سرخ۔  
 کروٹن ٹنگ - انتریلوں میں درد پانی کی طرح کی پچیش جو پانی کے نل کی طرح خارج ہو۔  
 تیمارداری اور کھانا کھانے سے زیادتی۔

ڈائسکوریہ - ناف والے حصہ میں درد جو گتارا در مستقل ہو۔ پیچھے کی طرف بھٹکنے پر افاقہ  
 اور رحم کو کھینچنے پر افاقہ۔ رطوبت کی وجہ سے گنٹھیا اور اعصابی درد تو لچ۔ خوراک منہ کو آئے۔  
 کھٹے یا کڑے ڈکار۔

یکوپرم میڈٹ - سوزش والی درد تو لچ کے لئے مفید کے لئے دوائی ہے۔ پیٹ سخت  
 درد تو لچ کے شدید دور سے جیسے کر پیٹ میں جاتو گھونپا جا رہا ہو۔ ٹھنڈے مشروبات  
 سے زیادتی۔

یکمو میلا - یہ ایسی درد تو لچ کے لئے مفید ہے جو اچانک آئے فائٹ ہو جائے بغیر  
 کی وجہ سے درد تو لچ، گرمی سے زیادتی۔ سیٹفگیر یا ایک اور دوائی ہے جو غصہ کے بعد  
 درد کے لئے موزوں ہوتی ہے یا پیٹ کے اپرین کے بعد۔ گیس کو ڈکاروں سے فائدہ ہے۔  
 اکونائٹ - جب پیٹ اور رحم میں اجتماع خون ہو۔ بھر پور اور تعداد میں زیادہ بغض ہو۔  
 کوکولس انڈیکا - اعصابی درد تو لچ۔ رات کو زیادتی۔ گیسوں کے ہمراہ جس کے اخراج پر کوئی  
 افاقہ نہ ہو۔ ٹھنڈے مشروبات کی زبردست خواہش خاص طور پر ٹھنڈی، سیرکی، کڑوا یا دھاتی  
 ذائقہ پیٹ میں اینٹھن۔

الیون - سیسے میں کام کرنے والوں میں درد تو لچ کا رجحان جیسے کہ پیٹرز۔  
 پلمبسم - پیٹ میں در دیں جو ہر طرف کونکلیں۔ پیٹ کی دیواریں گھنپی ہوئی۔ جیسے کہ پیٹ  
 اور پیٹھ کے ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں۔ ٹانگوں میں اینٹھن۔ صندی قسم کی  
 قبض لیکن گیس نہ ہو۔ پیٹ کی پتھر جیسی سختی۔ خصوصاً سیسے کے درد تو لچ کے لئے  
 ناف کی درد کانٹے ٹنگ جائے۔ مریض پیچھے کی طرف بھٹکے۔

پلاسٹیل - ٹھنڈک سے درد تو لچ جو میٹری اور مرغی غذاؤں کی وجہ سے ہو۔ پیٹ اوپن اپنی

گرگزراہٹ اور آواز گیس والا درد قویخ ہسٹریا والی اور حاملہ عورتوں میں پیشاب کی کثرت  
 سوئی لگنے جیسی یا اینٹھن دار دریں جی تھلانے کے ہمراہ۔

کیٹیم سلف - معدہ میں جلد اور کاٹنے والی دریں شدید جی تھلانے کے ہمراہ ادرتے۔

سیاہ تے۔ تھوڑی سی شے بھی ہونٹوں کو لگنے پر تکی کی تحریک ہو۔

کیوریم آرسینکیم - پیٹ میں اعصابی دریں جلد دار۔ اینٹھن دار اور درد قویخ۔

زنکولس بلب - سوئی لگنے جیسے درد پسلی کے نیچے پیٹ کے دائیں کوکھ کے نیچے کا درد۔

فیٹرم کارب - معدہ میں درد جس کو کھانا کھانے سے افادہ ہو مریض کو ہ بجے صبح بستر میں  
 سے اٹھارے کو کچھ کھائے۔

سینا - درد قویخ خصوصاً بچوں میں جب بچہ کا پیٹ ہوائے بھرا ہوا ہو۔ یہ کمزوری اور  
 انٹریوں کی دور کرتی ہے۔

میگنیشیا فاس - شدید درے دار درد جو گرم اشیاء لگانے سے کم ہو۔ دائیں طرف درد  
 کی زیادتی جس کو دہرانے سے افادہ ہو۔ ڈکار اور ہوا کا اخراج کوئی فائدہ نہ دے۔ متواتر بھکی  
 ابکائی کے ہمراہ دن رات ٹانگوں میں اینٹھن۔ پتہ میں سوزش پتہ کی وجہ سے درد۔

چیلیڈونیم - شکم کے بالائی حصہ میں پریشانی اور دباؤ کے ہمراہ تیز درد۔ پیٹ میں کھینچاؤ عمومی  
 کرے جیسے کرسیوں سے بندھا ہوا ہو۔ درد دائیں کندھے کے چوڑی طرف پھیلے نان کے  
 حصے میں درد۔ دائیں طرف حرکت کرنے پر موسم کی تبدیلی پر اور صبح کے وقت زیادہ۔ رکاوٹی تھان  
 سوزش پتہ۔ پتہ کی پتھری۔ بالائی شکم میں درد انٹریوں میں تبخیر کی وجہ سے۔

چائناٹ - شکم کے بالائی حصہ میں درد، وزن اوپر ہونے کا احساس معمولی سی غذا کھانے  
 پر بھی۔ رطوبات کے اخراج کی وجہ سے شدید کمزوری۔ منہ کا ذائقہ کڑوا۔ خوراک کا ذائقہ ممکن  
 معلوم ہو۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس اور بھوک کا احساس۔ پیٹ ہوائے پُر۔ ڈیوڈنیم میں درد۔ بھکی۔  
 میلادونا۔ پیٹ بہت ہی تنا ہوا۔ معمولی سامشردب بھی خارج ہو جائے۔ معمولی سا بھڑا  
 جانا بھی برداشت نہ ہو اور شدید درد کا باعث نہ بنے۔ انٹریوں میں رکاوٹ۔ پیچھے کی طرف  
 بھکنے سے افادہ۔

ڈاکا مارا۔ ناف کے حصے میں درد یا پھنسیاں خاص طور پر سوراخ۔

پلائینیم۔ پینٹرز کا درد قولنج۔ ناف کا درد پیٹھ تک جائے۔ وہ چھٹا چلا تا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ درد سے نجات مل سکے۔

کیسٹوریم۔ اعصابی قسم کا درد قولنج جو خاص طور پر پھوٹی آنت میں ہوتا ہو۔ دروں کو دبانے سے انافق ہو۔ اچانک طاعت کا ڈوبنا جسے کہ زندگی کا بنیادی اصول ہی مرنا ہو۔

سٹیفٹیکیر یا۔ غصے کی وجہ سے درد قولنج کے لئے مفید ہے۔

سٹافم۔ درد قولنج شدید دباؤ سے آرام پذیر ہو۔ درد میں آہستہ آہستہ شروع ہوں بتدریج بھوٹی تک بڑھیں اور تب بتدریج کم ہو جائیں۔

گرتشی اول۔ پیٹ میں شدید کاٹنے والی دردیں گیس کی کلنگڑا ہٹ پیٹ میں ٹھنڈک احساس کیساتھ ایلیم سپیا۔ شدید کاٹنے والی درد پچھلے بائیں حصہ پیٹ میں۔ پشیاپ میں جلن اور پشیاپ کی بہت زیادہ خواہش۔ بچوں میں درد قولنج دہرا ہونے کے ساتھ اور دب و دار ہوا کے ساتھ۔

جربائٹری۔ پیڑ میں شدید درد جس پر ٹھنڈا پانی گرانے کی زبردست خواہش ہو جسے فاقہ ہو۔ کاربو قح۔ معدہ کے اوپر والے حصہ میں گیس کے جہاز درد جو ڈکارنے پر کم نہ ہو۔

ایونقا۔ پینٹرز کا درد قولنج۔

لائیکو لوڈیم۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ کے بالائی حصہ میں درد یا دباؤ۔ کھٹے ذائقہ کے ساتھ بہت زیادہ تناؤ خاص طور پر پیٹ کے پچھلے حصہ میں۔ زبان بغیر پائیس کے خشک۔ شدید بھوک۔ گوشت یا روٹی کھانے پر زیادتی۔ ۴ سے ۸ بجے شام کے دوران اور چلنے پر فاقہ ڈکار آنے اور گیس کو خارج کرنے پر فاقہ۔

کانیا۔ حمل کے دوران بے خوابی کے ساتھ اینٹھن دار درد۔

### مزمن پیچش۔

سلفر۔ مزمن پیچش کی چوٹی کی دوائی ہے۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ کیسوں کو درست کرتی ہے۔ بغیر کسی اور دوائی کی مدد کے ۲۰۰ طاقت استعمال کیجئے۔

میگنیشیا کارب - پیٹ - بہت زیادہ تناہو سہر پانی کی طرح کا پاخانہ انٹریوں سے پانی کے نل کی طرح خارج ہوتا ہے۔

چائنا آف - جب ہمیشہ پھل کھانے یا شدید ٹھنڈا پانی پینے سے ہو۔ زرد پانی کی طرح کا پاخانہ گیس کے ہمراہ بغیر تکلیف کے اور کھانے کے بعد زیادتی۔

لیکس - ہمیشہ بدبودار ہمیشہ قبض سے آدھ بدل کر۔ موسم بہار میں زیادتی۔

سیلینیم - انٹریوں کی بھلی کی ٹی بی - سبب کھانے سے، مگر سے یا میوں کھانے سے ہمیشہ۔  
تھوجا - ہمیشہ یا امیائی ہمیشہ کے لئے شاندار دوائی ۱۔ ایم طاقت میں دیکھئے۔

### پیٹ کا بڑھ جانا

لیکس - نوجوان لڑکیوں میں پیٹ کا بڑھ جانا۔

گیس - معدہ کے تحت گیس بھی دیکھئے۔

چائنا آف - جب تمام پیٹ میں گیس ہو۔ گیس کی وجہ سے پیٹ کا تناؤ تقریباً پھٹنے کے قریب پھلی۔ پھل اور شراب سے زیادتی۔

کاربو رتج - جب پیٹ کے اوپر والے حصہ میں گیس۔ سانس لینے میں دباؤ ڈالے یا پھٹائی کے گرد تیز دریں۔ پاخانہ بے قاعدہ یا ڈھیلا ڈھالا۔ خوراک کے گلے ٹھرنے کی وجہ سے پیٹ ڈھول کی طرح پھول جائے۔

لائیکو پوڈیم - جب پیٹ کے نچلے حصہ میں گیس ہو۔ شام ۴ سے ۸ بجے تک زیادتی۔ جو چیز بھی کھائے گیس میں تیل ہو جائے پھوٹی چھوٹی چیزوں سے ناراض ہو جائے اور تنگ ہو جائے۔ ایک لقمے ہی سے گیس بھر جائے اور پیٹ تن جائے۔ رحم سے گیس کا اخراج۔

ریفینس - جب ہوانان کے گرد ہو، جو خارج نہ ہو سکے اور پُر درد۔

کاربالک ایسڈ - پیٹ میں گیس کی وجہ سے تناؤ جس کی وجہ سے اکثر آہیں اور ڈکار آہیں۔

نکس ماسکاٹا - گیس کی وجہ سے تناؤ جس کی وجہ سے جہاں ہر چیز گیس میں تبدیل ہو جائے۔

کیومیلہ۔ گیس جس کو ڈکاروں سے افاتہ ہو۔

ایلو۔ گیس بدبودار۔ جلن دار۔ بہت زیادہ نازح ہو۔ کم پاخانہ بہت زیادہ ہوا خارج ہو۔ پیٹ میں اتنی گرگڑا ہٹ ہوتی ہے کہ کمرے میں موجود کوئی بھی سن سکتا ہے۔ انیٹھن پاخانے سے پہلے اور بعد میں۔ سخت پاخانہ بغیر پتہ پہلے باہر خارج ہو جائے۔ پیٹ میں اتنی ہوا کہ معلوم ہو کہ پیٹ پھٹ جائے گا۔

لیک کینم۔ رحم سے ہوا خارج ہو۔

ساریریلہ۔ جب پیشاب کے ساتھ ہوا خارج ہو۔ پیشاب آواز کے ساتھ خارج ہو۔

اولینڈر۔ ہوا کے ساتھ پاخانہ خارج ہو جائے۔

کلکیر یا آئیوڈ۔ خالی ڈکار۔ بدبودار۔ کڑے۔ بے ہوئے۔ چھاتی اور بالائی شکم میں درد۔ دھکن کے بعد معدہ میں چپکنے والی درد۔ سکرٹنے والی درد بالائی شکم میں جو سانس کو روک دے۔ بالائی شکم میں گیس کا اجتماع جو پھونے پر حاس ہو یعنی درد کرے۔

فیل توری۔ پیٹ میں گرگڑا ہٹ اور بے ہنگم آوازیں بے ٹوہیے دانقہ ڈکار۔ کھانا کھانے کے بعد سونے کا رجحان۔

فیوکس ولس۔ اس دوائی سے گیس کم ہو جاتی ہے اور بالآخر غائب ہو جاتی ہے بدبو کم کر کے تین قطرے فی خوراک دیں۔

کیسٹوریم۔ پیٹ ہوا کی وجہ سے پھولا ہوا۔ چڑوں میں کچا ڈ۔ ناف کے گرد کاٹنے والا درد جس کو دبانے سے افاتہ ہو۔ سبزیسدار پاخانہ جو جلن دار ہو۔ اعصابی قورنج، بچوں کے لئے گرمیوں میں سبز پاخانہ میں متبدل ہو جانا۔

ایلم سپیا۔ بدہضمی۔ تہ اور گیس بچوں میں۔ بدبودار گیس۔ درد کی وجہ سے دہرے ہو جائیں۔ کالی کھانسی۔

ہومرکس۔ رات کے وقت ہوا خارج کرنے کے لئے جاگ جائے۔ آرجنٹ ٹائٹریک۔ ہوا اتنی کہ پیٹ پھٹنے کے قریب۔ ہوا کے خارج ہونے یا ڈکاروں خاص افاتہ ہو۔

کاکولس۔ جب ہوا کی بندش ڈھول کی طرح پیٹ پھولا دے۔

لائیکوپرسیکم۔ پیٹ میں بہت زیادہ گیس خاص طور پر اسے ۱۱ بجے صبح پانی کی زیادہ مقدار والی پیاس کے ساتھ۔

لیکس۔ پیٹ گرم۔ حساس۔ پرورد پھولا ہوا۔ گیس۔ دباؤ نہ برداشت کر سکے کافی ہوا خارج ہوا۔ ڈکاروں سے افاتہ۔

پلسٹیللا۔ پیٹ سخت پھولا ہوا۔ درد تو بچ اکثر تے اور عجیب کے پہلو۔ دباؤ جیسے کہ پتھر ہو جو شانہ تک بڑھے چونکی غذا۔ پیٹری اور پھلوں کے بُرے اثرات۔

نکس و امیکا۔ شراب۔ کافی اور بیٹھے رہنے والی زندگی کے بُرے اثرات۔ گیس کا دباؤ اور کی طرف جو سانس کو روک دے۔ چھاتی میں دباؤ جیسے کہ معدہ میں پتھر ہوں۔ قبض، پانخانہ کی لامحالہ خواص۔ یعنی پانخانہ کی خواہش کے باوجود کھل کر نہ آئے۔

## ہرنیا۔

کلیریا کارب۔ ہرنیا کے لئے چوٹی کی دوائی ہے جس کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہئے یہ اکثر مکیوں کو درست کر دے گی۔ ہرنیا جہاں پیٹ کی دیواریں تھلی ہوں اور ہرنیا کی پٹی نہ ہوتی جاسکے۔

لائیکوپوڈیم۔ دائیں جانب کا ہرنیا۔ آنتوں کے الجھنے کی وجہ سے ہرنیا۔ ہرنیا روز کے بعد ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔ پیٹ کا گیس کی وجہ سے گڑبگڑا ہٹ اور تناؤ۔ نکسوامیکا۔ بائیں جانب کا ہرنیا۔ ہرنیا روز بعد ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔

جب لائیکوپوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دائیں جانب کے ہرنیا کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔

کاکولس۔ جب لائیکوپوڈیم اور نکسوامیکا ناکام ہو جائیں تو ۲۰ طاقت میں دی جائے۔

آرم میٹ۔ بچوں میں چڑے کا ہرنیا جب درج بالا ادویات ناکام ہو جائیں۔

لیکس۔ آنتوں کے الجھاؤ کی وجہ سے ہرنیا اور آنتوں کا گلنا سٹرنا۔

پلمیم۔ آنتوں کے امعاء کی وجہ سے ہرنیا خواہ ران کا۔ چڈے کا یا ناف کا ہرنیا ہو۔  
سلیفگیہ۔ شانے کا ہرنیا۔

سلیشیا۔ چڈے کے خندوں کا پھول جانا اور سوزش۔ پھوٹنے پر دکھیں۔ پر درد چڈے کا ہرنیا۔  
ایسکیلوس ہیپ۔ چڈے کا ہرنیا۔ داہنے چڈے کے حصہ میں کاٹنے والا درد۔

## انٹریوں میں رکاوٹ

بیلادونا۔ انٹریوں کی رکاوٹ کے لئے اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے۔  
اوپیم۔ پانخانہ کی پھوٹی آنتوں میں درد سے دار رکاوٹ۔ پیٹ سخت پھولا ہوا۔ ڈھول  
کی طرح، درد قویٰ کے دوران پانخانے کی حاجت اور سخت پانخانے کا اخراج۔  
پلمیم۔ انٹریاں سخت پانخانے سے پُر اینٹھن نمایاں طور پر محسوس کی جاسکتی ہے اور دیکھی جاسکتی ہے۔  
کاسٹیکم۔ گیس کا رگ جانا سخت پانخانے کے ساتھ۔  
لیکس۔ پیٹ پھولا۔ حس۔ پر درد کم کے گرد کوئی چیز برداشت نہ کر سکے۔

## انسپشن آف باولز

اکونائٹ این۔ پیچھے کے ساتھ اچانک درد۔ شدید بے چینی۔ پیٹ تنا ہوا۔ امعاء مستقیم  
سے خون اور رطوبت رے۔ امعاء مستقیم۔ غبار سے کی طرح پھولا ہوا ہو جیلی کی طرح سرنج  
رطوبت امعاء مستقیم سے رے۔ ۳۰ طاقت میں دیکھئے ہر پندرہ منٹ کے بعد ایک خوراک اپنی  
طاقت میں بھی یعنی ایک ہزار طاقت میں کام کرتی ہے۔  
پلمیم۔ درد قویٰ پانخانے کی تے کے ہلہ۔ ناف پر رسی کی طرح کا کھنچاؤ جیسے کہ پیٹ اندر کی  
طرف کھینچا ہوا ہو۔ بعض اوقات یہ احساس کہ پیٹ اور کم بہت ہی قریب ہو گئے ہیں۔  
اوپیم۔ شدید درد قویٰ اور اینٹھن۔  
ورٹیرمالیم۔ درد ادھر ہوا آگے کی طرف بھگے اور دبانے سے افادہ سخت اذیت یا سخت تکلیف۔

## ناف

لائیکو لوڈیم - گیس کی وجہ سے ناف کا باہر نکلنا۔  
 نکس یا سٹکٹا - ناف کے گرد پھوڑے پھنسیاں نوزائیدہ بچوں میں۔  
 ابرو ٹیم - نوزائیدہ بچوں میں ناف سے خون کی طرح کی رطوبت رسنا۔  
 کلکیر یا فاس - نوزائیدہ بچوں میں ناف سے خون کی طرح کی رطوبت رسنا۔  
 ہائیوسائیمس - نوزائیدہ بچوں میں ناف سے پیشاب کا اخراج کیا رسنا۔  
 ڈائسکوریہ - ناف سے درد شروع ہوا اور ہر طرف پھیلے۔  
 ایومنا - ناف کا سکڑ جانا یا کھینچ جانا۔

## رکاوٹ

نکس و امیکا - تولوں کا وہ حصہ جہاں سے اعلیٰ مستقیم شروع ہوتی ہے مین تکلیف کے ساتھ رکاوٹ تکلیف والی طرف لیٹنے سے لیکن دباؤ سے افادہ۔ پاخانہ یا ہوا خارج کرنے کے نااہل یعنی دونوں خارج نہ کر سکے۔  
 رشاکس - ٹھنڈی اشیاء کے علاوہ ہر شے سے کدے۔ زبان پر زرخ سرخ تین کونوں والا سرا۔  
 بے چینی - اکثر اپنی حالت کو بدلنا چاہے جس طرف لیٹے سُن ہو جائے اور درد ہو۔  
 ادیم - انٹروین کی رکاوٹ۔

## بلبلہ

آئرس در - بلبلہ کے حصہ میں بلندار بے چینی - میٹھے پانی کی تے کے ہمراہ - گریس کی طرح کا تھوک - پانی کی طرح کے پیش جن میں غیر مضغ شدہ چربی ہو۔  
 آئیوڈین - یہ تھوک کے غدودوں پر اثر کرتی ہے۔ پانی کی طرح کا زیادہ مقدار میں تھوک

پانی کی طرح کی کثرت سے شدید تھکے یا کھٹے مواد کی ہمیشہ بھرت نرم پانی جیسے جھاگدار پانے  
 جن میں چربی ہو۔ کھاتے پیتے ہونے کے باوجود کمزور ہوں  
 فاسفورس - مختلف اعضاء خاص طور پر دل، جگر اور گردوں کی چربی تنزلی - غیر منقسم شدہ  
 پاخانہ جس میں خوراک ماکودانہ کی طرح کے ذرات ہوں - تیل کی طرح نظر آنے والا پاخانہ - لبلبہ  
 کی چربی سیلی تنزلی -

بیلہ ڈونا - لبلبہ کا زکام خون ملی لبلبہ کی سوزش

## سوزش غشاء مصلیٰ

معدہ کی جھلی پر پیونیم کی سوزش -

اکوٹائٹ این - جب ٹھنڈ لگنے سے - بخار پیٹ میں پر پیونیم میں درد -

فیرم فاس - ٹھنڈ کی وجہ سے پر پیونیم میں درد کے لئے ایک اور دوائی ہے -

برائی اونیا - بخار تمام جسم پر جلن دار گرمی کے ساتھ شدید پیاس بہت زیادہ پانی پینے  
 کی - پیٹ میں درد جو حرکت اور دباؤ سے زیادہ ہو -

بیلہ ڈونا - پیٹ پھولا ہوا جو ڈرم کی طرح سخت اور پھونے پر حساس - تھوڑی سی حرکت  
 شور اور روشنی درد کو بڑھادے - ابکائیاں ادرتے -

مرک مال - جب پیپ آنا شروع ہو جائے - پیٹ اس کے نکلنے سے پھولا ہوا ہو - مریض  
 کو ٹھنڈے پینے آتے ہوں - ہمیشہ ٹھنڈ اور بخار کے ساتھ -

لیکس - پیٹ کی جھلی پر پیونیم کا درد جب معمولی سا پھولا جانا بھی بڑھت نہ ہو سکے -

رسٹاکس - پیٹ کی جھلی پر پیونیم کی سوزش ٹائیفائیڈ کے رجحان کے ساتھ - تیز

بخار - خشک زبان - زبان کا سر اسرخ - پیٹ میں سوزش - کڑوا ذائقہ - دودھ کی خواہش -

درٹیرم ایلم - جب مریض حالت نزع جیسی تصویر پیش کرے - شدید ٹھنڈک -

کمزوری تھے - اسہال - اور ہاتھ پاؤں میں انیٹھن -

## ٹی بی - تپدق

فاسفورس - میزنٹرک غدود یا ماساریقی غدودوں کی ٹی بی۔

ناسور۔

اور نٹیھو گلیم۔ معدہ کے زیریں حصہ اور اندھی آنت کا ناسور معدہ کے شدید تناؤ کے ساتھ ڈکاروں، بدبودار گیس سخت تکلیف، کپڑے ڈھیلے کرنے پڑیں۔ معدہ اور بارہ انگشتی آنت کے ناسور۔

ایسٹیک الیڈ۔ معدہ کے ناسور۔ گرم کھٹے ڈکار۔ خون اور تمام کھائی ہوئی خوراک کی تہ۔ کاٹنے والی درد۔ معدہ کا تناؤ۔ معدہ اور پیٹ میں جلن۔ معدہ پر لیٹنے سے افاقہ نہیں ملتا اور جلور پچھش خالص خون کے۔ کمی خون کمزور اور لاغر۔ بھوک کی کمی۔

آر جیم ٹائپ ٹیکم۔ انٹرلوں کا ناسور یا معدہ کا ناسور۔ خونی تہ کے ہمراہ۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد تکلیف۔

کالی بائیکرو میکم۔ انٹرلوں کا ناسور مزمن پچھش کے ہمراہ۔

مرک کلر۔ بڑی آنت کا ناسور۔ خون پاخانے کے ہمراہ۔

ٹیر مینتھنا۔ انٹرلوں کا ناسور اخراج خون کے ہمراہ۔

ٹائپرک الیڈ۔ ٹائیفائیڈ بنجار میں انٹرلوں کا ناسور۔

فاسفورس { معدہ کا ناسور جلندار درد کے ہمراہ دی گئی ترتیب بھی دیکھیے۔  
آر سینک الیڈم

لیو فورزیم۔ معدہ کے ناسور جلن دار درد کے ہمراہ دی گئی ترتیب اگر ناکام ہو جائے تو درد معدہ کے ناسور جو کولوں کی آگ کی طرح چلیں۔ جلندار درد جب فاسفورس اور آر سینک الیڈم ناکام ہو جائے

لائیکو پوڈیم۔ چند ہی لقوں سے پیٹ ابھر جائے۔ ۴۴ سے ۸ بجے شام زیادتی۔ ۱۔ ایم طاقت میں نیچے

لیکس۔ معدہ کا ناسور جب مریض جاگنے پر بہت زیادہ تکلیف محسوس کرے کئی قسم کی بندھن برداشت

نہ کر سکے۔ ڈھیلے کپڑے پہننا چاہیے۔ سوزش کی گری برداشت نہ کر سکے۔

پلسٹیللا۔ ایسے مریض جو چربی ہضم نہ کر سکیں۔ کھلی ہوا میں افاقہ۔

تھوہا۔ زیادہ ٹیکے لگوانے والے حضرات میں معدہ کا ناسور۔

گریفائیٹس۔ یہ معدہ اور بارہ انگشتی آنت کے ناسور کے لئے بہت مفید ہے گرم

خراک اور گرم مشروبات اور لٹنے سے افاقہ۔

نیٹر م فاس۔ معدہ کا ناسور۔ ایک مخصوص جگہ پر درد کھانا کھانے کے بعد زیادہ تیزابیت اور تیزابی مواد منہ میں آئے۔

میڈورنیم۔ بارہ انگشتی آنت کا ناسور کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد درد۔ بہت زیادہ گیس

اور مندر کے کنارے پر ہمیشہ افاقہ۔ ایک۔ اہم طاقت میں دیکھئے۔

ایسکیلوس۔ اجتماع خون اور معدہ کا ناسور، تھے کے رجحان کے ہمراہ جو کھٹی ہوتی ہے بجٹے

ڈکار۔ متواتر بے چینی اور معدہ میں جلن۔

یورینیم ٹریٹم۔ پائیلورک اور معدہ کے ناسوروں کے لئے مفید۔ پس پی ہوئی کافی کی

طرح کے مواد کے ساتھ خون آمیز تھے۔ پاخانہ تارکول کی طرح کا سیاہ اور گہرا۔

معدہ ————— دوسرا حصہ

تیزابیت۔ (گیس اور ڈکار دیکھئے) شدید بھوک۔ بڑھی ہوئی بھوک۔

رنا۔ بڑھی ہوئی بھوک جب بھوک بڑھنے کی وجہ پیٹ میں کرم ہوں۔ بچہ کھانے پر اسودگی ہو کر۔  
لیک کینیم۔ بہت بھوکا۔ انا نہیں کھا سکتا کہ بھوک مٹ سکے۔

فلورک ایسڈ۔ بڑھی ہوئی بھوک اور متواتر بھوکا۔ ٹھنڈے پانی کی زبردست خواہش۔ پیٹ میں

کچھ بھی نہ ہونے کا احساس۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ کیونکہ زیادہ

نہ برداشت کر سکے اور جلد ہی بھوکا ہو جائے۔

ایپس کیمین۔ کاٹنے والی بھوک۔ زیادہ کھانے کا رجحان۔

گریشی اولہ - کھانا کھانے کے بعد بھوک - خالی پن کا احساس -

لیکس - برسی ہوئی بھوک معدہ میں درد کے ہمراہ -

لائیکو پوڈیم - شدید بھوک لیکن کھانا شروع کرنے پر چند ایک لمحوں سے یہ رو جایا بھوک رہے -

پٹرو لیم - پیش کے ہمراہ برسی ہوئی بھوک -

آئیوڈین - شدید بھوک کے لئے بہترین ہے یہوشی محسوس کرے اگر تین یا چار گھنٹے

کے بعد نہ کھائے - وہ دونوں کھانوں کے دوران کھاتا ہے لیکن پھر بھی بھوکا رہتا ہے -

x۳ طاقت میں دوانی دیتے -

ایومنا سیلیکیٹ { بھوک برسی ہوئی خوراک کی خواہش کے بغیر - کھانا کھانے کے بعد بھی

ایومنا فاس { بھوک - شدید بھوک -

ایروڈینم - درد میں ابلی ہوئی روٹی کی زبردست خواہش اپنی لٹنے والی بھوک مٹانے کے

لئے - درد سے نفرت -

رسٹاکس - کتوں جیسی بھوک کھانا کھانے کی خواہش کے بغیر -

آر جنٹ میٹ - مکمل کھانا کھانے

انتھرم - غیر صحت مندیا بے قابو بھوک - بھوک کی وجہ سے رات کو جاگ جائے - ٹیپ ورم -

ہائیڈراسٹس - بھوک مگر خوراک سے مطمئن نہ ہو - اس دوانی کی یہ علامت نمایاں ہے -

صبح طور پر جذب نہ ہونا -

سلفر - معمول کے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے خوراک کے لئے بے کل ہو جانا، خاص طور

پر گیارہ بجے صبح - اگر خوراک نہ ملے تو وہ کمزور ہو جائے اور جی تلتائے - تھیلیوں، تلیوں

اور سر کی جلن وغیرہ -

نکس و امیکا - شیر شراب سچے استعمال کے بعد - مزمن پیش میں -

ایسٹ فاس - کتوں جیسی بھوک کی وجہ سے رات کو جاگ جائے

گلگیر یا کارب { شدید بھوک جو کمی سے  
 فیرم میٹ { ادل بدل کر ہو۔ سوکھا  
 آیسوڈم { مسان میں اچھا کھانا کھانے کے باوجود سوکھا جائے۔  
 مرک کار۔ { معدہ کے سرطان میں۔

کافیا۔ جلدی جلدی کھانا کھانے کے ساتھ۔  
 آر سینک ایلیم۔ کھانا کھانے اگرچہ وہ مجھے کسوی لگے گی۔  
 ہائیو سائیکس۔ مرگی کے دورہ سے پہلے کتوں جیسی بھوک۔  
 یو پیٹوریم پرف۔ کونین کے بعد دفعہ دار بخار میں بھوک۔  
 زینکم میٹ۔ بازوؤں میں کمزوری کے احساس کے ساتھ۔  
 نیٹرم کارب۔ معدہ کے گڑھے میں صبح کے وقت کچھ نہ ہونے کا احساس  
 ایلیم ٹائیوا۔ بہت زیادہ کھانے کی عادت۔ پیٹو۔  
 وریٹرم ایلیم۔ حمل کے دوران۔ بہت زیادہ۔  
 اولیم جکیف۔ سوکھا مسان بچوں میں۔  
 اگینشیا۔ عادی تباکو نوشی سے۔  
 کینابس انڈیکا۔ بھوک جو خوراک سے دور نہ ہو۔  
 مگنیشیا کارب۔ بچے جو دودھ پینے سے انکار کر دیں۔ درد میں مبتلا دہول اگر دودھ نہیں

بھوک نہ رہے۔

نکس و امیکا۔ کڑوا ذائقہ۔ زبان پھیل کر زرد فرسے ڈھکی چھپی ہوئی۔ بڑی دجہ بد بھنی ہوئی ہے۔  
 چائنا۔ بھوک کی کمی جو کھاتے وقت ہی لگ جائے۔  
 اگینشیا۔ خوراک مشروبات اور تباکو نوشی کی باکل خواہش نہ ہو۔ ان سے نفرت یا ان  
 کے بُرے ذائقے کے بغیر۔

فیرم فاس۔ بھوک کم یا باسکل نہ رہے۔ خوراک کی خواہش باسکل نہ رکھے۔ خوراک دودھ  
گوشت وغیرہ سے نفرت۔ پیٹ پھولا ہوا۔ جگر اور تلی بڑھی ہوئی۔ بہت زیادہ گیس۔ جی  
تلائے اور تے۔

ہومرکس۔ بھوک کی کمی ہلنے کی نااہلیت کے احساس کے ساتھ۔ جب وہ صبح کے وقت  
جلگے۔ گلے میں دھکن۔

لیک ویک ڈیفیل۔ بھوک کی کمی پانی کے بہت زیادہ مقدار میں پینے کی پیاس کے ہمراہ۔  
ایس نائیگرہ۔ صبح کیوقت بھوک باسکل نہ ہو لیکن دوپہر اور رات کے وقت خوراک  
کی شدید خواہش۔

جشیا لٹ۔ سادہ بھوک کی کمی یا حادثہ بیماری کے بعد۔ مرنچور اور ۲۲ طاقت کھانا  
کھانے سے نصف گھنٹہ پہلے دیں۔

پروٹس ایس۔ چند لقمے کھانے سے احساس جیسے کہ بہت کھا لیا ہے۔ اس علامت  
پر لائیو پوڈیم بھی دی جاسکتی ہے۔

کلیر یا آرسینک۔ خوراک کی خواہش کی کمی لیکن ٹھنڈے پانی کی پیاس۔  
مرکیورکس۔ بچے دودھ پینے سے انکار کر دیں۔

## کینسر

اور ٹھوگم۔ معدہ کے زیریں حصہ اور اندھی آنت کے کینسر۔ یہ دوائی مرنچور میں ایک  
قطرہ فی صبح پانی میں دیا جانا چاہیے۔ اس سے مریض سیاہ لیمبر قیض کرنا شروع کر دیگا۔  
بہت افادہ ہوگا۔ اگر پہلی خوراک کام نہ کرے تو دوسری خوراک ۳۸ گھنٹے کے بعد دی جائے۔  
کارپو وکج۔ پیٹ کے اوپر والے حصہ میں جلن اور گیس۔

کنڈور انگو۔ معدہ کا کینسر۔ سخت گانٹھ دار۔ سوزش زیریں معدہ میں۔

آرسینک البم۔ جلن اور بے چینی کے ہمراہ۔ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس کے ہمراہ۔  
اور گرم پیووں سے افادہ۔

چھلیڈونیم۔ معدہ کا کینسر۔ ایک ایم یا سی ایم طاقت میں دیجئے۔  
 فاسفورس۔ پس ہوئی کافی کی طرح کے مواد کی تے کے ہمراہ خاص طور پر جب کینسر کھالت میں  
 بننے والی ہو۔ بہت اونچی طاقت ایک ایم یا سی ایم طاقت میں دیجئے۔

**ڈکار۔** (پیٹ میں در دیا معدہ اور گیس۔)

آر جنٹم نائٹریم۔ اونچے۔ کثرت سے اور بغیر تکلیف کے ڈکار۔  
 کاربووٹرک۔ پیٹ بنا ہوا۔ ڈکار۔ کھائی ہوئی خوراک کے ذائقہ کے ڈکار بغیر۔ جلن دل کے ڈکار۔  
 کاربو انمیلنس۔ کاربووٹرک کے بولگیس۔ اینٹیگس تک آئے۔ دباؤ اور گھٹن کا باعث ہو۔  
 کاربالک الیسڈ۔ ڈکار۔ اعصابی بد مضمی کے ہمراہ۔  
 ایپس نائیکرا۔ بالائی شکم میں پردرد گرنے کا احساس جیسا کہ اوپر سخت اُبلتا ہوا انداز ہو۔  
 نکس ماسکٹا۔ گیس اعصابی مریضوں میں۔  
 سلفر۔ خوراک کے ذرات کے ہمراہ ڈکار جو بہت کھٹے ہوں۔

اویمیم۔ مولی کے ڈکار۔

سلیفورک الیسڈ۔ دل کی جلن کے ہمراہ ڈکار جو دانتوں کو کنارے پر سیٹ کر دیں۔  
 انڈم کرڈ۔ جو چیز کھائی ہو اسی کی ڈکاریں۔ جی متلائے اور تے کی خواہش۔ کرواڈائقہ۔  
 بسمتھم۔ ہر کھانے کے بعد جی متلائے۔ جو نہی پانی معدہ میں پہنچتا ہے تے کر دیا جاتا ہے  
 گندی بدبو کا اٹھنا۔ پیٹ میں گرڈ گڑا ہٹ۔ پیٹ میں جلن۔ تے اور بچش۔ معدہ کا کینسر  
 اپیکاک۔ جی متلائے خالی ابکائیاں۔ سورکا گوشت کھانے کے بد اثرات۔ پیٹے ہوئے پانی  
 اور غیر ہضم شدہ خوراک کی تے بچش کے ساتھ قیس۔ خون کی قیس۔

مائڈر اسٹس۔ کھٹے مواد کی ڈکاریں۔ معدہ کا کینسر۔ سولے دودھ کے ہر چیز کی قیس۔  
 روئی یا سبزی تیزابیت کا باعث نہیں۔ مزین گیس کا زکام۔

فرم ایوڈیم۔ خوراک اور پرک طرف دھکیلتی ہوئی معلوم دے۔

کیویم میٹ۔ جب پانی پیے متواس کی آواز سنائی دے۔

برائی ادویا۔ کڑے ذائقے کے ساتھ ڈکار  
 ہائیڈرو سائک لیسڈ۔ پانی لیے پھلے جیسے کہ خالی دہم میں پھلے۔  
 آرسینک ایلم۔ خراشدار اور کڑی ڈکاریں۔  
 سورائینم۔ گلے میں اندھوں جیسے ڈکار۔  
 ایتھوزا۔ خوراک کھانے کے ایک گھنٹہ بعد تے کی صورت میں الٹ دینا۔ تے بے جینی کو دہر کر دے  
 بہت پریشانی اور درد۔

کیموسیل۔ اگر علامتی ادویات ناکام ہو جائیں تو گرم پانی کے ہمراہ بطور مل انجینز کیموسیلادی جائے۔  
 لاروسیرکس۔ کڑے بادام کے ذائقے جیسے ڈکار۔ معدہ میں مواد لڑھکتا ہوا عکس ہوا

## خوراک کا زہر

نکس دامیکا۔ خوراک کے زہر کے لئے جوتی کی دوائی ہے تے معدہ میں درمچش  
 آرسینک ایلم۔ آئس کریم یا زہر پکے ہوئے پھل کھانے کے بعد۔  
 پٹیشیا۔ پھوت کی زہر کی وجہ سے خوراک کا زہر  
 کیوریم۔ علامات کے مطابق دوائی کا انتخاب کیجئے!  
 کاربوونج۔ خراب شدہ اور لگا ہوا گوشت کھانے سے۔  
 ہائیڈروکس۔ خوراک کے زہر کے دوران بیٹھن۔  
 نیٹرم میور۔ شہد کھانے کے بڑے اثرات۔  
 پلسٹیل۔ جزیلی غذا کھانے کے بعد یا چاکلیٹ کھانے کے بعد  
 آرڈنم نامٹرکیم۔ حواس کا مکمل طور کو دینا۔ یہوشی اور اینٹھن۔ سیاہ قیش

## درمعدہ (ڈکار بھی دیکھئے)

نکس دامیکا۔ معدہ کے نظام کے درم برہم ہونے پر بہترین دوائی ہے۔ جھوک کی کمی۔ کھانا

کھانے کے بعد درد بطنی۔ اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ بالائی شکم سے مختلف اطراف کو جاتی ہوئی دریں۔ دورے وار قشوں کے ہمراہ۔ اعصابی درد معدہ تکلیف کھانے کے نصف گھنٹہ بعد ہو۔ جب شراب کی وجہ سے تکلیف ہو۔

کاربوونج۔ سست اور نامکمل ہاضمہ۔ معدہ اور انٹسٹینوں میں وزن۔ دھیمیا اور معدہ میں کچھ نہ ہونے کا احساس۔ کھانے سے جس کو آفتاد نہ ہو۔ لیکن چند لمبے کھانے کے بعد جیسے ہونے کا احساس۔ معدہ میں کچھ نہ ہونے کا احساس۔ معدہ میں بہت جلن۔ چھاتی اور پیٹ میں میٹھن دار دریں جو مریض کو دہرا ہونے پر مجبور کر دیں۔ معدہ میں وزن۔ تیزابی ٹوکاریں۔ کھٹی اور گندی بو والی۔ معدہ میں گیس یا پیٹ کے اوپر والے حصہ میں گیس۔

آئرکس ور۔ زیادہ تیزابیت کے لئے بہترین دوائی ہے۔ کھٹے اور کرڑے ڈکار جو دانتوں کو کھٹا کر دے۔

رومینیا۔ جب زیادہ تیزابیت کے لئے آئرکس در ناکام ہو جائے تو یہ آزائی جائے۔ پٹیلیائی۔ سرد در کے ہمراہ صفرا کی زیادتی۔ مزین درد معدہ متواتر معدہ میں۔ متواتر کھائے جائے۔ گرمی اور جلن کا احساس۔ قبض اور شام کا بخار۔ جگر سوجا ہوا دبانے پر ڈکھے دھیمی اور مسلسل درد۔ جگر میں اجتماع خون۔ مزین درم جگر۔

چائٹا۔ جب تمام پیٹ میں گیس ہو اور تازہ درد ہو۔ ڈکاروں سے وقتی آفتاد ہو۔ کھٹے یا کرڑے ڈکار یا بدبودار گیس۔ فعل ہاضمہ کا سست ہونا۔ رات کے کھانے کے بعد زیادتی۔ زرد بیچش اور رات کے وقت زیادتی اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ بغیر بدبو یا سٹرانڈ کے بلندار ڈکاریں۔ اس کو کاربوونج سے تفریق کرتی ہے۔ اس دوائی کی ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ خوراک معدہ میں کافی عرصہ تک بغیر ہونے کے پڑی رہتی ہے اور آخر کار غریب قسم شدہ خوراک تے کر دی جاتی ہے۔

انٹم کرڈ۔ بیچش چپکنے والے کھٹے اور بدبودار۔ پچھ ہر دفعہ خوراک کھلانے پر تے کر دیں۔ زبان سفید گاڑھی فرسے ڈھانچی ہوئی۔ بچوں کے معدہ کی مزین خرابیاں۔ متواتر ہی متلائے۔

معدہ میں گلا۔ ہیٹ تنا ہوا۔ پتھر ٹھکا ہوا۔

لائیکو پوڈیم۔ جب ہیٹ کے پچھلے حصہ میں گیس ہو تو یہ دوائی منہ پر ہوتی ہے۔ شدید بھوک لیکن چند لمحوں کے بعد کھانے پر غصوں ہو کر ہیٹ بھرا ہوا ہے اور کھانا ایک طرف کر دیتا ہے۔ پلسٹیلہ اور انکارڈیم کے بر خلاف تکلیف کھانے کے فوراً بعد ظاہر ہوتی ہے۔ جبکہ مذکورہ بالا دونوں ادویات میں آدھ گھنٹہ بعد۔ نیکس اسکاٹا میں فوراً تکلیف ہوتی ہے اور کر کے ارد گرد دباؤ برداشت نہیں ہو سکتا ہمدقت جیسے کرلیکسس میں ہوتا ہے۔ اس دوائی کی ایک اور علامت ٹھٹھائیوں کی زبردست خواہش ہوتی ہے۔ یہ مزدوں ترین ہے۔ ناموافق یا کمزوری کی حالت میں تیزابی قسم کی بعضی میں کیونکہ یہ کھٹا ذائقہ رکھتا ہے۔ کھٹے ڈکارا درتے جب کبھی بھی یہ ہوتا ہے یہ کھٹا ہوتا ہے۔ معدہ کے گڑھے پر پردہ سوزش۔ گیسوں کے ڈکارا افاتہ ذکر کریں۔ پیشاب میں سرخ ریت۔ فوڑا سیو۔ بچوں میں قویج کا درد۔

پلسٹیلہ۔ منہ خشک۔ صبح جاگنے پر منہ کا ذائقہ گندہ اور یہ احساس کر خوراک سینے بڑیوں کے نیچے پڑی ہوئی ہے اس کی نمایاں علامات ہیں۔ زبان کھردری کا بھی ذرا سی فرسے دھانی ہوئی۔ تیزابیت اور دل کی جلن۔ خوراک کا ذائقہ کڑوا۔ کھٹا یا بدبودار۔ منہ میں رال اور کھلی ہوئی خوراک کے کھٹے ڈکار۔ پیاس نہ ہومرت منہ کو تر کرنے کی خواہش۔ بُرا ذائقہ پلسٹیلہ کی مخصوص علامت ہے۔ چربی غذاؤں سور کا گوشت پیٹری یا ملی جلی خوراک سے معدہ کے بگاڑ کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔ مریض ٹھنڈے محسوس کرتا ہے لیکن گرمی سے زیادتی محسوس کیا۔ کے بر خلاف شام کے وقت زیادتی جبکہ پلسٹیلہ میں صبح کے وقت زیادتی ہوتی ہیں۔

دوری فوراً۔ معدہ اور دوسرے حصوں میں جلن۔

اینکارڈیم۔ کھانا کھانے سے بہت افاتہ اس کی نمایاں علامت ہے۔ معدہ میں بیٹھنے کی کیفیت کھانا کھانے کے دو گھنٹہ بعد اور معدہ میں دھیمہ درد جو ریڑھ کی ہڈی تک جائے۔ بے ذائقہ ڈکار بعض اوقات کھٹے ڈکار۔ کھانا کھانے کے بعد زیادتی۔ فاسفورس۔ خوراک کا الٹ کر منہ میں آنا۔ ٹھنڈی چیزوں کی شدید خواہش جو یہ چیزیں معدہ

میں گرم ہوں تو تھک کر دی جانیں۔ بغیر جی متلاسنے کے خون تھوکنے اس دوائی میں ماک ہے۔  
 معدہ میں کمزوری کا احساس جو سلف اور سیسپا کے برخلاف انٹروین تک بڑھتا ہے بعض اوقات  
 کندھوں میں بھی جلن پائی جاتی ہے۔ مزمن بد ہضمی میں تھکے۔ یہ دوائی توڑ پھوڑ اور علیحدہ کرنے  
 کے عمل کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے اس لئے یہ کینسر کے لئے مخصوص دوائی ہے سخت  
 جگہوں اور کینسر کی رطوبت سے نئے پیدا شدہ زخموں وغیرہ کے لئے جلن دار۔ کاٹنے والی محدود  
 جگہ کے اندر درد محسوس ہوتی ہے جسم کا جلدی کم ہو جانا۔ اوکھی خون۔  
 سٹائٹس۔ درد معدہ مریض کو مجبور کرتا ہے کردہ ادھر ادھر ملے لیکن کمزوری اسے آرام  
 کرنے پر مجبور کرے۔ زیادہ دبانے پر افاتہ ہوتا ہے۔

جنشیا سی کیو۔ معدہ میں دباؤ جیسے کروٹاں پاخانہ ہونے کا رجحان۔  
 اکنائٹ این۔ معدہ اور معدہ کے گڑھے میں دباؤ جیسے سخت تھکے ہو۔  
 ایسکولس ہیپ۔ معدہ میں شدید جلن دار۔ بے چینی۔ معدہ کے گڑھے میں جیسے تھکے کا ذن  
 ہو۔ ہوا کی خالی ڈکار۔

گریفٹائٹس۔ درد معدہ جس کو کھانے سے افاتہ ہو۔ کھانا جلدی جلدی کھائے تاکہ پیٹ  
 کے بالائی حصہ میں سے درد کو افاتہ ہو۔ خاص طور پر دوپہر کے کھانے کے وقت اور رات کے کھانے پر  
 آرمینٹیک الیم۔ معدہ کی خرابیوں کے لئے شاندار دوائی ہے۔ پریشان کن معدہ کا بگاڑ اور حاد سوزش  
 پیٹ میں درد اور پھیش درد جلن دار قسم کی ہوتی ہے جن کے ہمراہ تلی اور تھکے، معدہ حساس ہو اور  
 دیکھے۔ مریض کمزور معدہ میں ٹھنڈک پھیل یا آئیس کریم کے ذریعے۔

آر جینٹم ٹائٹریم۔ بہت زیادہ گیس جس کو ڈکاروں سے افاتہ ہو۔ کاٹنے والی اور ناسوری درد  
 پیٹ کے گڑھے میں جہاں سے درد ہر طرف کو جائے۔ درد معدہ خاص طور پر اعصابی اور نرم نازک  
 خواتین میں۔ یہ جذبات کی براہینگی۔ نیند کی ٹوکی یا بعض خرابیوں سے لاحق ہو سکتا ہے۔ معدہ  
 میں گولے کا احساس۔ مواد کی تھک جوتا روں میں کھینچا جاسکتا ہے۔ مٹھائیوں کی زبردست خواہش  
 جبکہ مٹھائیوں سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ اور پھیش ہو جائے۔ معدہ کا کینسر کھانا کھانے کے بعد

اور درد دبانے سے تکلیف زیادہ، خونی تہ اور لیسہ دار تہ کے ہمراہ، مزمن درد معدہ۔ نوزائیدہ بچوں میں درد تو بلخ۔

پیٹروسیلیئم۔ معدہ اور انٹسٹینوں کی تکلیف کے لئے۔

کالچیکم۔ معدہ میں برت کی طرح کی ٹھنڈک۔

ہیپو مینز۔ معدہ میں برت کی طرح کی ٹھنڈک ۲ یا ۳ ملاقات میں دیجئے۔

گریشی اولہ۔ معدہ میں تیزابیت گنتھیا کے ہمراہ۔

نیرٹم سلف۔ عام صفراوی حالت جو نمی کی وجہ سے یا نمی سے زیادتی ہو۔

نیرٹم کارب۔ درد دھ سے عجیب۔ دل کی دھکن۔ معدہ کی درد کھانے پر کم ہو۔ صبح سویرے

بستر سے اٹھائے۔ کچھ کھانے کے لئے۔

نیرٹم فاس۔ گیس دہی جیسی تہ کے ہمراہ۔ شدید تیزابیت۔ کھٹے پسینے۔ معدہ کی تیزابی حالت

متلی کے ہمراہ اور جلن دار مواد کی تہ۔ کھٹے ڈکار۔ ہر کے جیسے کھٹے ڈکار۔ معدہ کا ناسور کھٹی

رطوبت منہ کو آئے۔

لیک ویک ڈیفلو۔ معدہ کا درد اور انٹسٹینوں کی سوزش، مزمن سوزش عجیب اور تہ۔

فاسفورس۔ بڑھتی ہوئی خوراک اندر

فرم میٹ۔ نگلی جائے۔ یہ کھٹی ہو جائے وہ

آر سیکنگ الیم۔ ڈکار لیتا ہے، حتیٰ کہ مواد خارج کر دیا جاتا ہے

ایسکولس ہپ۔ دل کی جلن اور متواتر معدہ میں جلن۔ معدہ کا ناسور۔

انٹم کروڈ۔ معدہ کی تکالیف ذہنی علامات کے ساتھ۔ موت کی خواہش۔ معدہ سے غذا کا اڑ

اٹھنا کھانے کے بعد تہ اور متلی کے ہمراہ ۲۰۰ ملاقات یا ایک ایم ملاقات میں دیجئے۔

بکٹنٹھس۔ معدہ میں جلن۔ متلی اور تہ کے ہمراہ۔

کیڈمیم سلف۔ انٹسٹینوں کی سوزش۔ معدہ میں جلن۔ پیٹ سو جا ہوا اور پھولا۔ بھالا گئے جیسے

درد خنجر گئے جیسے درد۔ پائیلورس میں درد۔ خون والے عجیب خونی پیشاب کے ہمراہ۔

برائی اونیا۔ معدہ کی خرابیاں معدہ کے بخار۔ ٹھنڈ اور سردی کے ہمراہ۔ ٹھنڈک اور سردی کے ہمراہ پریشانی۔

کروٹیلکس ہور۔ حیران کن نایاب مفراوی دوائی ہے۔ سیاہ مواد کی تہ بڑی مقدار میں درم کے ہوا۔ پیرولیم۔ حمل کے دوران درد معدہ جب بھی پیٹ خالی ہو متواتر کھانا کھانے سے انافقہ۔

ایسٹریلک۔ معدہ کی تیزابیت۔

ولیریانہ آف۔ اعصابی معدہ کا بگاڑ۔

سلفیورک الیڈ۔ جب معدہ میں نمک کے تیزاب کی زیادہ ہو۔

الیومن۔ درد معدہ ضدی قسم کے درد معدہ کے ہمراہ۔ متلی تہ اور مواد کا نہ کوٹنا۔  
۱۔ ایم یا سی ایم طاقت میں دیکھئے۔

دیکھئے معدہ کے ناسور۔ پیٹ کے سلسلہ۔

## کلیجے کی جلن۔

اپیکاک۔ کلیجے کی جلن۔ متلی یا تہ کے ہمراہ بہت زیادہ گیس۔ یہ حمل کے دوران بھی مفید ہے۔  
نکس و امیکا۔ کلیجے کی جلن گیس اور بہت زیادہ تیزابیت کے ہمراہ لیکن بغیر متلی یا تہ کے۔ زبان پر ملائی جیسی نر۔ عام طور پر معدہ خراب۔ جب اپیکاک ناکام ہو جائے تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ اپیکاک سے ادل بدل کر دی جاسکتی ہے۔

کلکیریا کرب۔ معدہ میں جلن کا احساس۔ خراشدار ڈکار۔ بعض اوقات کھٹے دھڑکتے کھاری ذائقہ میں معدہ پر دباؤ کا احساس خوراک اور مواد کی تہ کے ہمراہ۔

سٹیفسیگیا۔ تباہ کنوشی کی وجہ سے معدہ کی جلن۔

ایم ایلم۔ گندہ کڑا یا کھٹا ذائقہ۔ حلق اور گلے میں گرم جلن کا احساس۔ خراشدار مواد متلی ابکائی اور خون ملے ہوئے مواد و لیسدار مواد کی تہ۔ ماتھ پاؤں کا کاپنا اور سردی کا احساس

معدہ میں درد کے ہمراہ اور دبائے والی پریشانی۔ بے قاعدہ اور بے شکم نبض۔

## ہچکی

ہکسو امیکا۔ بدھنمی کے ساتھ ہچکی۔ تھوڑی ہچکی۔

اگشتیا۔ جب ہچکی کی زیادتی کھانا کھانے۔ تبا کو نوشی اور بالائی پیٹ میں خالی پن کے احساس کے ساتھ تبا کو جانے سے تکلیف دہ ہچکی۔ خاموش غم سے بھی ہو سکتی ہے۔ صدر یا ناکامی کھانا کھانے یا پینے کے بعد ہچکی۔

رٹنہیا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد شدید ہچکی خاص طور پر جب وہ کافی دیر تک بغیر کھانے کے ہو۔ حملوں سے پہلے یا پیٹ کے تناؤ کی شکایت ہو۔

سنا۔ شدید ہچکی۔ جب رٹنہیا ناکام ہو جائے تو یہ دہری جائے۔

کو کولس انڈ۔ ڈایا فرام کے تشنچ کے ساتھ ہچکی۔

ہائیو سائمس۔ پیٹ کے آپریشن کے بعد ہچکی۔

ٹیو کریم۔ دودھ پلانے یا خوراک کھانے کے بعد ملاہنے والی ہچکی۔

چائنا آف۔ کونین کے غلط استعمال سے ہچکی۔ ہچکی کی وجہ سے سردرد۔

زنکولس بلب۔ شراب والے مشروبات کے بعد ہچکی۔ شرابیوں کی ہچکی بھی ہچکی شدید اینٹھن دار اور ڈکاروں کے ہمراہ۔

نیٹرم میور۔ شدید ہچکی کے لئے خواہ عادی ہوں یا مریض خاص طور پر کونین کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔

سائیکلیمین۔ حمل کے دوران ہچکی صبح کے جی ملنے کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانا کھانے کے بعد۔

سٹرامونیم۔ گرم مشروبات کے بعد شدید ہچکی، پانی جیسے تھوک کی موجودگی میں۔

ورٹیرم ایلیم۔ گرم مشروبات کے ہچکی۔

آرسنیک الیم۔ سرد مشروبات کے بعد ہجکی۔

پلسٹیللا۔ ٹھنڈے مشروبات یا تبا کو نوشی کے بعد۔

کاجو بیٹم۔ تھوڑے سے جذبات کی برا نگینگی پر ہجکی آئے۔

ایسٹریلف۔ زبان پر سوجن محسوس ہو حلق اور حلق کا سکڑنا۔

وریٹرم ورائیڈ۔ مستقل ہجکی۔ تکلیف دہ خوراک کی نالی کے اوپر والے حصہ میں دڑے۔

بھھوک۔ (بڑھی ہوئی بھھوک یا کم بھھوک دیکھئے۔ درد معدہ۔ تیزابیت۔

زیادہ) نمک کے تیزاب کی معدہ میں کمی۔

شکرینیم نائٹرکیم۔ کم تیزابیت کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ معدہ کے مواد کو بڑھاتی ہے اور تیزابیت کو بڑھاتی ہے۔

کاربووٹک۔ کم تیزابیت یا تیزابیت نہ ہونے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔  
ہائیڈروسلٹک ایسڈ۔ مشروبات گئے اور معدہ میں گر گر کر امیٹ پیدا کریں۔ نمک کے تیزاب کی کمی جب معدہ خالی ہو تو درد معدہ۔

قے۔ متلی۔ ناسور۔ قے۔ ناسور پیٹ کے باب

اپریکاک۔ یہ متلی اور قے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ مزہ زیادہ تھک

خوراک صغرا خون اور مواد کی قے۔ ہجکی۔ صاف زبان۔ بیہوشی اور حالت نزع۔ معدہ میں خنجر لگنے جیسے درد متلی جس کو قے سے آفا نہ ہو۔ حیض سے پہلے کلیجہ کی ملن اور قے۔  
انٹم گروڈ۔ قے سفید زبان پر نمایاں علامات ہے، جو نہی مریض کچھ کھانا پیتا ہے تے کر دیا ہے۔ شدید قے جو کسی طرح بھی نہ رکے۔

ایٹھوزا۔ بچوں کی قے کے لئے بہترین دوائی ہے۔ بچہ کھانے پینے کے جلد بعد قے کرتا ہے۔ اس کے بعد شدید کمزوری جو اس کی نمایاں علامت ہے۔ بچہ کمزوری کی وجہ سے پیچھے کو

گرتا ہے۔ دہی کی پھیٹوں کی طرح کی بنتے۔ تھے کے فوراً بعد بھوک محسوس کرے۔  
 نکسوا میکا۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں وزن محسوس کرنا۔ سانس میں دقت کے ہمراہ متلی  
 ابکائیوں کے ہمراہ۔ قولنج دریں۔ پانخانہ کی حاجت کے ہمراہ جو بہت کم خارج ہو۔ ٹھنڈک  
 لاپٹنا۔ اور پریشانی۔

فاسفورس۔ صغیر معدہ والے خزن تے کرنے والے مریضوں کے لئے بہت ہی مفید دوائی  
 ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بہت ہی پیاس جوتے سے افادہ کرتی ہے لیکن جو نہی یہ پانی معدہ  
 میں گرم ہوتا ہے تے کر دیا جاتا ہے۔ یہ خونی تے اور معدہ کے السر اور کینسر کے لئے مفید ہے۔  
 آئرس در۔ بہت ہی کٹھے مواد کی قہیں جو دانتوں کی کھٹاس کا باعث ہوں۔ یہ قہیں گلے  
 کو پھیل کر رکھیں۔ تاروں والا ٹھوک۔

کروٹیلس پورینڈس۔ تے پچش۔ بے چینی کرنے والی متلی اور میثاب تنگ کرنے والی درد  
 کے ہمراہ۔ سیاہ صفراوی تے بڑی مقدار میں۔

کالچیکم۔ پکائی ہوئی خوراک سے متلی اور تے خاص طور پر چربی والا گوشت۔ اندے  
 اور مچھلی، کھڈی سی حرکت سے بھی متلی پیدا کرے۔ دوسرے کمرے میں خوراک کی بوجھی  
 یا باد رچی خانہ سے خوراک کی بوجھی مریض میں متلی پیدا کرے۔

لارڈ میسر ایس۔ گرم ٹنڈو کے قریب آنے پر متلی۔

یو جینیا جیموس۔ متلی جس کو تبا کو نوشی سے افادہ ہو

سینگو نیریا۔ معدہ میں جلن کے ہمراہ متلی تیز روشنی کی وجہ سے اینٹھن دار درین۔

طامونیم۔ معدہ اور طوق میں جلن اور تے۔ پچش۔ دل مکرور اور دل کی دوسری امراض کے ہمراہ  
 سوخن، استفادہ خاص طور پر پاؤں کی سوخن۔

نکشیٹھس۔ متلی اور تے معدہ میں جلن کے ہمراہ۔

گلگیر یا میور۔ ضدی قسم کی تے

ایسڈ کاربولک۔ شربتوں کی تے۔ عام قسم کی تے پیٹ پیٹ کے بالائی حصہ میں وزن کم ہوا  
 معدہ کی جلن۔

ٹوبکیم - تبا کو کے غلط استعمال کی وجہ سے  
 لکریٹیا پیو - تے اور متلی شدید قسم کی کھانا کھانے کے بعد حمل کے دوران  
 سائیکلیم - صبح کے وقت اکثر تے کیس - معدہ میں درد  
 مینیریم - تے اور متلی کھانا کھانے کے بعد غائب ہو جائے یا رک جا۔ میٹر شراب  
 کی تے (پانی کی بنیں) کڑوا - ذائقہ ہو۔  
 سیپیا - کھانا کھانے کے بعد متلی غائب ہو جائے - صبح کے وقت زیادہ حیض کے بعد کلچر  
 کی جلن اور تے۔

کو کولس - دماغی قسم کی تے - بجائے معدہ کی تے کے - آدھے مہ کے درد سے تے یا دماغی  
 پھوڑوں کی تے، خوراک کا خیال یا درد کمر سے خوراک کی بو یا باورچی خانے کی بو ہی  
 مریض میں متلی پیدا کرے۔ اور بچا بولنے سے تے اور کھانسی لاحق ہو جائے متلی جو سرد مزاج  
 محسوس کی جائے۔

روٹا - اسائے مستقیم میں متلی کا احساس۔

آر جنٹم نائیٹ - معدہ کے پرانے ناسور کی وجہ سے خون کی تے۔  
 ڈائسکوریا - کانوں میں متلی محسوس ہو۔

آرینکیم البم - حیض کے دوران میں تے اور کلچر کی جلن۔

کریوزوٹم - تے اور ابکیاں معدہ کی کمزوری کی وجہ سے جو غیر مضبوط خوراک کو متروک کر دے۔

یانکال دے کھانا کھانے کے کئی گھنٹے بعد یا جب تے پاخانہ کی بو یا کسی دوسری گندی بو کی  
 وجہ سے ہو۔ گھنٹہ یا دو گھنٹہ خوراک کھانے کے گھنٹہ بعد تے متواتر متلی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ملنا  
 درد اگر نجی طاقت ناکام ہو جائے تو ۲۰ طاقت دیجئے۔

ویسا - تے یا بیہوشی گرم مٹو کے نزدیک یا گرم کمرے میں غصہ یا جذباتی برا بھلائی بھی دور لاسکتی  
 لوسیلیا انفلیٹا - تے شدید پسینہ اور تھوک کے بہاؤ۔  
 تھیرڈون - شور کی وجہ سے جی متلائے۔

ویلیر بیانہ - بچہ قے کر دے جو بھی یہ والدہ کے غصہ کے بعد دودھ پئے یعنی اگر والدہ کو غصہ آیا ہوا ہو۔  
بچہ دودھ پنے تو فوراً قے کر دے۔

کیموسیللا - قے اور تکلیف دہ تسلی اور آبکیاں جو انہوں اور ماہرین کے بعد لاتی ہوں۔  
انگیشیا - ناقابل ہضم چیزوں سے قے میں افادہ جبکہ قابل ہضم چیزوں مثلاً دودھ ٹوٹے سے قے ہو۔  
بچی گو بھی اکثر ہوا پیاز اور آلو قے بند کریں۔

کروٹن ٹنگ - قے اور شدید تسلی، چکر جانے کے بہراہ۔ شراب نوشی کے بعد زیادتی۔  
کیڈمیم سلف - معدہ جواب دے دے، باخضر باسکل نہ ہو۔ ہر کھائی ہوئی چیز قے کر دی جائے۔  
مرض خاموشی سے لیٹنا چاہے اور آرام سے سوچنا چاہتا ہے۔ وہ تنگ کیا جائے یا بلایا جانا پسند نہیں کرتا۔  
سیاہ قے۔ جلندار اور کاٹنے والی درد۔ معدہ میں شدید تسلی اور قے۔ معمولی چیز جو ہنٹوں کی لکائی  
جائے تو معدہ میں شدید تسلی اور قے۔

بوریکس - متواتر قے۔ کھٹے مواد کی قے گیس پیٹ کا تناؤ پر کھانے بعد۔  
ایسڈ سلفیورک - کھٹی تیزابی قے۔ اچھی طرح صفائی کے باوجود بچہ قے کھٹی ہوئے۔  
نیٹرم میٹ - خوراک کھانے یا پینے کے بعد کی قے کے لئے بہترین دوائی ہے۔  
پلمبیم - پانخانہ کی قے۔ (پانخانہ کے مواد کی قے)  
کروٹیکلیس - سیاہ قے  
آزینیکا مانٹ - سیاہ روشنائی کی طرح قے۔ مزہ کڑوا اور عام دکن۔ سیاہ تو تھڑے دار خون

## منہ کا پانی

مرک سال - منہ کا پانی اکثر ننگے تسلی کے بہراہ۔  
لیکسس - خراشدار پانی جو منہ کو دکھائے۔  
لایکوپوڈیم - حل کے دوران میں منہ میں پانی آئے۔ اینٹھن کے بغیر یا اینٹھن کے بہراہ جی  
مثلاً قے کے بہراہ یا اس کے بغیر بڑھتی ہیں۔

نکسوا میرکا۔ کلیجے کی جلن کے ہمارے منہ میں پانی۔ قوی خچ کے ساتھ بدہضمی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد۔  
 میگنیشیا میور۔ سرد درد کے ہمارے منہ میں پانی۔ درد ہضم نہ کرنا جو درد پیدا کرے۔ گندے کار۔ معدہ خراب۔  
 پلیسٹیل۔ حیض کے دوران یا پہلے رات کے وقت منہ میں پانی۔  
 پٹرولیم۔ صبح کے وقت جی تھلانے کے ہمارے منہ میں پانی  
 کاربو انیمیس۔ منہ میں نکین۔ منہ سے باہر گرے۔  
 کیورارے۔ رحم کے ناسور میں۔ منہ میں پانی کی زیادتی۔  
 سلیشیا ٹھنڈے لگنے کے ساتھ منہ میں پانی کی زیادتی۔  
 سیپیا۔ شراب پینے کے بعد منہ میں پانی کی زیادتی۔  
 برائی اونیا۔ منہ میں تیزابی پانی۔ بغیر ذائقہ کے ابکیوں کے ہمارے۔  
 چیلیٹونیم۔ منہ میں کڑے ذائقہ والا پانی۔

## جگر اور تلی کی تکالیف

یتسرا حصہ

### جگر کی تکالیف

یہ جیلیٹونیم۔ جب جگر کا دایاں پہلو یا تو متاثر ہو چکا ہو۔ جب بعض دائیں کو میں تکلیف محسوس کرے اور  
 چھوٹے پردہ محسوس کرے۔ یہ دوائی یرقان کے لئے ۶۶ طاقت دی جانے مفید ہے۔ جگر کے حصہ میں درد  
 جو دائیں کندھے اور چھاتی اور معدہ تک پڑھے۔ یہ جگر کے مضمون کے لئے مفید ہوتی ہے۔ یہ جگر کے پتلا  
 اور زیادہ صفر خارج کر دیتی ہے۔ یہ جگر میں پتھری کو خارج کرتی ہے اور اس کے بننے کو روکتی ہے۔ درد تیز  
 اور بھالا مارنے جیسی۔ گرم مشروبات سے قے کرنے کا رجحان۔

کارڈس میریالس۔ یہ جگر کیلئے بہترین دوائی ہے۔ جب بایاں کو سوزش زدہ ہو یا متاثر ہو چکا ہو  
 یہ مدد کنچر میں ۵ سے ۱۰ قطرے دی جانی چاہیے۔ یہ جگر کے کیسز میں، یرقان، دیمے سرد درد قے اور

اور تلی میں درد کو درد کرتی ہے۔ ہنسیاب نہری بڑی نابل زرد۔ جگر کے دھتے اس دوائی کی خاص علامت ہے۔  
 مائیرسکیا میر لپیرا۔ یہ ایک بہت اہم دوائی ہے اگر کم استعمال کیجاتی ہے۔ سردی کے یرقان میں کارآمد ہے  
 دیماسر درد۔ صبح کے وقت زیادتی۔ آنکھیں میلی۔ گندی اور زرد رنگ اور زبان پر زرد فرہ بعض کمزور  
 اور بچوں میں کھن کی شکایت کرتا ہے۔ بازوؤں میں درد دھیمی نفخ اور گہرا ہنسیاب۔ دانہ پلسیوں  
 کے نیچے درد۔ جھوک نہ ہو سکے۔ کھٹاس کی خواہش۔ ناسودہ نیند یعنی نیند ٹھکاوٹ درد نہ کر سکے۔  
 نکسوامیکا۔ جگر کی خرابیوں جو کہ شراب والے مشروبات یا بہت ہی بھونی ہوئی خوراک۔ کوئین یا  
 جلاہوں کے استعمال کی وجہ سے۔ جگر کی خرابی۔ درد تو لہج بھی ہو سکتا ہے۔ ایملز فڈل کے بعد تیران  
 باضمہ آسانی سے خراب ہو جائے۔ پیاس نہ ہو غصے کے درد سے کے بعد یرقان۔ وہ عموماً صبح کے  
 وقت زرد جس اور ناراض ہوتا ہے۔ نا اُمیدی اور جگر میں نامکمل صفرا بنانے کی وجہ سے یرقان۔  
 کالی آئیوڈ۔ آتشک کے تیسرے درجہ میں جگر کا بڑھ جانا۔  
 ریفینیس۔ جگر میں سوئی لگنے جیسی درد۔ انجائیاں اور قشیں جھوک کا نہ رہنا۔ تناہوا پیٹ۔  
 دھول کی طرح کس ہوا۔ سخت۔ نان کے گرد اکٹھا ہوا ہوا پیٹ۔  
 واپیرا۔ بڑھے ہوئے جگر میں شدید درد۔ یرقان اور بخار کے ہمراہ۔ درد جگر سے کندھے تک  
 اور نیچے کو پہلے تک خونی پاخانے۔  
 تھیرڈ رن۔ جگر کا پھوڑا۔ جگر کے حصے میں شدید جلن دار درد۔ ابکیاں اور مفروئی تے۔  
 لیکس۔ جلن دار اور حاد درد جگر میں جو معدہ تک جائے۔ جگر کی سوزش اور نرم ہو جانا۔  
 جگر کا پھوڑا۔ پتے کی پتھری۔ پیٹ سخت اور تناہوا۔ دباؤ برداشت نہ کر سکے۔  
 لائیکو لوڈیم۔ جگر پھوڑے پر حساس ہوا اور اسمیں تناؤ کا احساس۔ درد دھیمے اور مسلسل  
 تیز اور بھالا لگنے جیسے دردوں کی بجائے جیسے کہ چیلیدونیم میں۔ تھوڑا سا کھانے پر پردہ  
 کا پڑ جانا۔  
 سلفر۔ یہ ایک مل ایگز دوائی ہے اور اسے شفا کو مکمل کرنے کیلئے دینا چاہیے۔ یہ صفرا کے بہاؤ  
 کو بڑھاتی ہے۔ جگر میں شدید تکلیف اور دھن ہوتی ہے۔

فاسفورس - جگر کی چربی تنزیل دیکھن اور یرقان کے ہمراہ - پانخانے مجبورے قابل مفید ہوں۔  
یہ جگر کی غنیمت بیماریوں میں مفید ہے۔

پٹیلیا - جگر کے حصہ درد اور وزن - بائیں جانب لیٹنے سے بہت زیادہ جو کھینچنے کا احساس پیدا کرے۔  
آرم آرسینکم - جگر کے حصہ میں لاغری یا کمزوری - ہیٹ کے تناؤ کے ہمراہ یا اس کے بغیر - جگر کا سخت  
ہو جانا - ہیٹ کی جلد کی خارش۔

زیٹرم سلف - جگر بہت بڑھا ہوا - گنٹھیاوی طبیعت - جگر کے علاقہ میں دیکھن - منہ میں بڑا ذائقہ۔  
باتھ اور پاؤں ٹھنڈے - ریڑھ کے آخری ہمرہ میں (کوکی) میں درد۔  
مرک سلف - جگر کا بڑھ جانا پتہ پر گوڑے بخار - جگر میں درد - پانخانے سیاہ قبض - بڑا ذائقہ۔  
جسم میں جلن کا احساس۔

ٹامیکسکیم - جگر کے علاقہ میں درد اور دیکھن اور صفراوی بچش - نقشہ دار زبان اور کڑا ذائقہ  
منہ کا - کھانا کھانے کے بعد سردی - بڑا سخت جگر تلی اور جگر کے علاقوں میں درد - انگلیوں کے سر  
پر ٹھنڈک کے ساتھ۔

سیلشیا - چھوٹے بچوں کے جگر کے لئے بچہ کو پانخانہ نہ آئے اور اکثر چلائے - سر پر پینہ ۲۰۰ قات  
یا ایک ہزار طاقت میں دیجئے۔

چوننتھس - جگر کا بہت بڑھ جانا اور اس میں رکاوٹ قبض - مٹی کے رنگ کے پانخانے مزمن یرقان۔  
آرسینکم البم - جگر کا بڑھ جانا اور اس میں درد کو منہ کی وجہ بخار کے دب جانے کی وجہ سے کھانے کے  
بعد ۲ دن میں ایک خوراک دیجئے۔

آرسینکم سلف رمبرم - پتہ کی بھری تولخ بخار کے ہمراہ۔  
مرک آئیوڈ - جگر بڑھ جانا پتہ پر گوڑے بن جانے کے ساتھ - رائے کی تیل کی طرح کا پیشاب - بہت درد  
ایک دن میں ایک خوراک دیجئے۔

فیرم آئیوڈ - جگر اور تلی کا بخار کے بغیر بڑھ جانا۔  
فیرم آرسینکم - جگر اور تلی کا بخار کے ساتھ بڑھ جانا۔

کلکیر یا آریسینکم۔ بچوں میں جگر کی خرابیاں۔ ۲۰ یا اس سے زیادہ طاقت میں استعمال کیجئے۔  
اوپیم۔ جگر سست قبض کے ساتھ!

چائنا آف۔ جگر کے علاقہ میں درد جیسے کہ کھال کے نیچے ناسور سے ہو۔ پھوٹنے پر زیادتی جلد زار  
آنکھ کے پردے میں پیلاہٹ۔ پتے کی پتھری کی دہرے درد۔ سو جا ہوا سخت جگر۔  
پلوڈو فاسیلم۔ کمزور جگر یا نرسن جگر میں اجتماع خون جب پیمیش کے ہمراہ ہو۔ جگر سو جا ہوا اور حساس  
برلی او نیا۔ جگر سو جا ہوا۔ جگر میں اجتماع خون اور سو جا ہوا۔ جگر کے علاقہ میں تکلیف یا درد  
حرکت پر زیادتی۔ درد دلی طرف لینے سے افادہ۔

پتے کی سوزش یا پتھری والے کیلئے پتے کی پتھری دیکھئے

بغیر پتھری کے۔

چیلیڈونیم۔ دائیں کندھے میں درد متواتر دسمج کے وقت صفروای قے کے ساتھ جی ملٹائے۔  
بالائی ہیٹ کے حصہ میں درد جس کو کھانا کھانے سے عارضی افادہ ہو۔ پیٹ تبا ہوا قبض سخت مٹی  
کے مٹی رنگ کے رنگ پاخانوں کے ساتھ اور پیمیش اول بدل کر معقد کی مارکش۔ پیشاب  
گہرا زرد اور بھگا دار۔ کھانا کھانے۔ دباؤ اور گرمی اور صبح کے وقت زیادتی کھلی ہوا اول میں  
طرف لینے سے افادہ ہو۔

کارڈس میور۔ جگر اور صفروای نالی پر مخصوص عمل۔ بائیں طرف درد پسلیوں کے نیچے۔ الچی قسم  
کادمر۔ چکر پیچھے کی طرف گرے۔ قبض سخت گانٹھ دار یا خانہ بڑی مشکل سے خارج ہوا یا پیمیش  
شراب کی طرح کا چمکدار یا خانہ۔

پلوڈو فاسیلم۔ ہیٹ کے بالائی حصہ میں درد۔ تبا ہوا پیٹ اور اس میں غلغلہ کا احساس۔  
کٹی خوراک یا تیزابی خوراک کی خواہش۔ پانی کی زیادہ مقدار میں زبردست خواہش کے ہمراہ پیمیش والے  
درد، سبز پانی جیسے، بہت زیادہ گندے پانی کی جیٹ کی طرح خارج ہوں قبض سے بدلیں جیسے  
کہ چیلیڈونیم میں۔

یچو منتھس۔ جگر کی خرابیاں۔ پکریاز کی بیماریوں کے ساتھ سخت پیاس کے ہمراہ۔ بہت زیادہ گہرا پیشاب۔ صفروی دھبوں اور لکڑوں کے ہمراہ۔ جگر کے حلاقہ میں ذرن اور ریتان اور قرض کے ہمراہ لیٹنڈرا۔ میلبا کے بعد جگر کی تکالیف۔ جگر کا بڑھ جانا۔ دل کی دھڑکن درد کے ساتھ۔ نیچوالی کے ہمراہ جگر۔ آگے کی طن تھوڑا لگے جیسی درد۔ بہت زیادہ عجیب جس میں گہرا خون ہو۔ خون کی بواہر۔ مقعد باہر نکلے یا خروج مقعد۔

مائیکہ کا سر اٹھا۔ برفان جس میں وزن میں بہت کمی ہو۔ دماور واضح کمزوری۔ کنٹیوں اور ماتھے میں درد سر۔ کڑوا ذائقہ شدید جی متلانے کے سہرا۔ مہاگنی کے رنگ جیسا گہرا شباب۔ صفراوی نمکیات کے شکنے کی وجہ سے جلدی عاشر۔ ترش خوراک کی خواہش۔ کھانا کھانے کے متلی زیادہ ہو۔ چلنے سے افسا ہو۔

کولیسیٹر مین۔ مزمن سوزش پتہ۔ جگر میں اجتماعِ خون کے ساتھ کینسر سے پہلی حالت یا کینسر کی حالت میں جگر کے علاقہ میں جلن دار درد جو دائیں کندھے تک پھیلے۔ شدید کمزوری و ملاقت کی کمی۔ کئی خون کے ساتھ۔

پتے کی پتھری

چیلیڈ ونیم۔ پتے کی پتھریوں کے لئے چوٹی کی ددائی ہے۔ اگر کافی عرصہ تک لی جائے  
یہ ان پتھریوں کو خارج کرتی ہے اور ان کی پیدائش کو روک دیتی ہے۔

کو لیسٹرن۔ یہ پتے کی پتھری کے درد کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اجتماعِ خون اور اور پتے کے قفل کے درم برہم ہونے کی وجہ بخار کو ٹھیک کرتی ہے (نوٹ)۔ روغنِ زیتون پتے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ نصف پیسٹ، روزانہ لیا جانا چاہئے۔ روغنِ زیتون پیچھے لوراس کے فوائد لیمو کا رس۔ تین چار منٹ بعد اور روغنِ زیتون پیچھے۔ اسی طرح لکھنے حتیٰ اگر نصف پیسٹ روغنِ زیتون اور رملیموں آخر میں ختم ہو جائے۔ رملیموں روغنِ زیتون کو مضہم کرنے میں مدد دیتا ہے اور جی نہیں تھلائے گا۔ یہ طریقہ استعمال کرنے سے ایک روز میں پتھری کو نکال دیگا۔

بعض اوقات یہ علاج دو تین دن بھی مہاری رکھنا پڑتا ہے۔

برسرک و لکڑیسیں۔ پتے کی پتھری کیوجہ سے درد۔

چینو نٹھس ورجیکا۔ مفردی درد تو لٹے۔ پتے کی پتھری کا درد یہ صفر الومائیں میں تبدیل کر دیتا ہے۔

پتھری کوٹنے سے روکتا ہے، پہلے سے بنی ہوئی پتھری کو خارج کر دیتا ہے۔ طبرہا کی بگلوں میں جگر کی رکاوٹ دور کرتا ہے قبض، پاخانہ مٹی کے رنگ جیسا۔ زرد جلد۔ پیشاب تقریباً سیاہ۔

کارڈس میرالیس۔ جگر اور تلی کا ٹھہر جانا، پتے کی سوزش۔ پتے کی پتھری کا درد مفردی بخار۔ پاخانہ سخت۔ مشکل سے خارج ہو۔ گانٹھ دار۔ پچھش سے آدل بدل کر آئے۔

کلکیر یا کارب۔ پتے کی پتھری کا درد۔ پیٹ میں چربی کا اجتماع۔ تھوڑے سے دباؤ کیلئے بھی حساس۔

جب ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو جگر میں درد۔ چمڑے اور میز نرک خرد و سوجے ہوئے اور پُر درد۔

ہائیڈراسٹس۔ پتے کی پتھری کا درد۔ بچھوں کی طاقت کمزور، نظام انہضام بگڑا ہوا، خضی قبض۔ بگڑا ہوا۔

چائنا۔ جگر کے علاقہ میں درد جیسے کہ جلدی پھوڑے میں ہو، پھوٹنے پر زیادہ ہو۔ آنکھ کی پتلی۔ اور

جلد زرد پتے کی پتھری کا درد۔ سو جا ہوا سخت جگر پتے میں پتھریوں کو حل کر دیتا ہے۔ پتے کی پتھری کا درد۔ یرقان۔ یہ جگر میں اجتماع خون۔

مینگنم۔ یہ تندرست صفرا میں پتھریوں کو حل کر دیتا ہے پتے کی پتھری کا درد۔ یرقان۔ یہ جگر میں اجتماع

خون اور گوشت کے بننے کو روکتا ہے۔

نیزم سلف۔ پتے کی پتھری کا درد بد ہضمی کے بعد لاحق ہو۔ پتے کے علاقے میں درد۔ پیشاب کرنے

کے بعد قطرہ قطرہ پیشاب۔ دائیں طرف کی درد جو چھاتی تک جائے۔

## بچھوں کا یرقان

جیلیڈونیم۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کیجئے اور موزوں وقت میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا یہ بچے

کی حالت پر منحصر ہوتا ہے (نیچے دی گئی ادویات دیکھئے۔

نکس و امیکا۔ پاخانہ سست اور آہستہ۔ بچہ زرد رنگ اور چلائے۔

کالنسونیا۔ نمایاں زردی۔ پاخانہ گروہ دار اور دہی کی طرح۔

مرک سال۔ اگر یقان کے ہمراہ، ماتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ تمام اخراجات اور پیشاب بہت ہی رنگدار  
چیونٹھخص۔ جب پیشاب صفرا سے پُرسندیدہ زرد پُپ اور چمکدار۔

## یرقان

سلفر۔ یرقان کا علاج ہمیشہ سلفر سے شروع کیجئے۔ یہ دوائی مکمل شفاء کے لئے بھی دی جانی چاہیئے۔  
اور اس دوا کی ۲۰۰ طاقت استعمال کیجئے!۔

چیلیڈونیم۔ ایک دن کے بعد سلفر کے بعد یہ دوائی دی جانی چاہیئے۔ یہ یرقان کے لئے مخصوص دوا  
ہے۔ ۶ طاقت میں دیجئے۔ آنکھ کا پردہ زرد رنگ کا۔ ذائقہ کڑوا۔ زبان کا رنگ گہرا سُرخ۔ دہانے پر  
جگہ دکھے۔ بھورا سُرخ پیشاب۔ ہلکے مٹی کے رنگ کے پاخانے۔

مائیریکاسیریفرا۔ بننے والے یرقان کے لئے اہم دوائی ہے۔ صبح کے وقت دھیما سر درد۔ آنکھوں  
کا رنگ گندہ خلیط۔ زبان پر زردی۔ مریض کمزور اور پٹھوں کی کمزوری کی شکایت کرتا ہے۔ بازوؤں  
میں درد نبض سُست اور گہرا پیشاب۔ دائیں طرف پسلیوں کے پیچھے درد۔ مٹھوک نہ ہو۔ ترش چیزوں کی  
خواہش۔ نیند سے تازگی نہ آئے یا نیند سے تھکاوٹ دور نہ ہو۔

ہائیڈراسٹس۔ سردی زکام کا یرقان۔ تیز سوئی چھبنے جیسی دردیں بہت زیادہ لیسڈ مواد ہے  
متلی اور تھ۔ جگر کا گھٹ جانا۔ زبان سوچی ہوئی دانتوں کے نشان سفید یا زرد فر کے ساتھ۔  
چیونٹھخص۔ بننے والا یرقان اگر گڑھاٹ کے ساتھ۔ ہر گرمی میں پلٹ کر آنے والا یرقان۔ مٹی کے رنگ  
کے پاخانے کے ہمراہ قبض۔

مرک سال۔ یرقان کے لئے ایک نمایاں دوائی ہے۔ نبض تیز۔ آنکھ کے پردے کا زردی مائل رنگ  
کی ہلکی تہہ زبان پر قبض۔ زرد اور خشک پاخانے۔ پاخانہ پتلا۔ گہرے زرد رنگ کا۔ پسینہ بہت زیادہ  
جس سے افادہ ہو۔ افزائت بڑھے ہوئے خاص طور پر تھوک۔ زبان دھیلی ڈھالی۔ دھاتی ذائقہ  
جگر کے علاقہ میں حساسیت جو کم سوچی ہوئی ہو۔ اور سخت ڈنگ لگنے جیسی اور سوئی چھبنے جیسی درد۔  
پوڈوفاسیلیم۔ بھراؤپ کا احساس۔ تیز اور کاٹنے والے درد جگر کے علاقہ میں گارھے صفرا اور خون کی

بعض اوقات یہ علاج دو تین دن بھی ہماری رکھنا پڑتا ہے۔

بربرس و لگڑیوں۔ پتے کی پتھری کی وجہ سے درد۔

چینو ننٹھس و رجیدیکا۔ صفرائی درد تو لچ پتے کی پتھری کا درد صفرائی کو بائیں میں تبدیل کر دیتا ہے۔

پتھری کو نٹھ سے روکتا ہے، پہلے سے بنی ہوئی پتھری کو خارج کر دیتا ہے۔ میسرما کی جگہوں میں جگر کی

رکاوٹ دور کرتا ہے۔ قبض، پانخانہ مٹی کے رنگ جیسا۔ زرد جلد۔ پیشاب تقریباً سیاہ۔

کارڈس میرائیس۔ جگر اور تلی کا ٹھہر جانا، پتے کی سوزش۔ پتے کی پتھری کا درد۔ صفرائی بخار۔

پانخانہ سخت۔ مشکل سے خارج ہو۔ گانٹھ دار۔ پچھش سے آول بدل کر آئے۔

کلکیریا کارب۔ پتے کی پتھری کا درد۔ پیٹ میں چربی کا اجتماع۔ تھوڑے سے دباؤ کیلئے بھی حس۔

جب ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو جگر میں درد۔ چلنے اور نیزنگ عند وجہ ہوئے اور پردرد

ہائڈراسٹس۔ پتے کی پتھری کا درد۔ ٹیوں کی طاقت کمزور، نظام انہضام بگڑا ہوا، صفرائی قبض۔ جگر گھٹا ہوا۔

چائنا۔ جگر کے علاقہ میں درد نیسے کہ جلدی پھوڑے میں ہو، پھوڑے پر زیادہ ہو۔ آنکھ کی پتلی۔ اور

جلد زرد پتے کی پتھری کا درد۔ سوجا ہوا سخت جگر۔ پتے میں پتھریوں کو حل کر دیتا ہے۔ پتے کی پتھری کا

درد۔ یرقان۔ یہ جگر میں اجتماع خون۔

مینگنم۔ یہ تندرت صفرائی پتھریوں کو حل کر دیتا ہے پتے کی پتھری کا درد۔ یرقان۔ یہ جگر میں اجتماع

خون اور گوشت کے بننے کو روکتا ہے۔

نیرم سلف۔ پتے کی پتھری کا درد بدضمی کے بعد لاحق ہو۔ پتے کے علاقے میں درد۔ پیشاب کرنے

کے بعد قطعہ قطعہ پیشاب۔ دائیں طرف کی درد جو چھاتی تک جائے۔

## نیچوں کا یرقان

چیلیڈونیم۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کیجئے اور موزوں وقت میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا یہ نیچے

کی حالت پر منحصر ہوتا ہے (نیچے دی گئی ادویات دیکھئے۔

نیکس و امیکا۔ پانخانہ مسست اور آہستہ۔ بچہ زرد رونا اور چلائے۔

کالنسونیا۔ نمایاں زردی۔ پاخانہ گروہ دار اور دہی کی طرح۔  
مرکب سال۔ اگر یقان کے ہمراہ، مائع اور پاؤں ٹھنڈے۔ تمام اخراجات اور پیشاب بہت ہی رنگدار  
چیونٹھخص۔ جب پیشاب صفرا سے پُر شدہ زرد پُپ اور چمکدار۔

## یرقان

سفر۔ یرقان کا علاج ہمیشہ سفر سے شروع کیجئے۔ یہ دوائی مکمل شفاء کے لئے بھی دی جانی چاہیئے۔  
اور اس دوا کی ۲۰۰ طاقت استعمال کیجئے۔

چیلیڈونیم۔ ایک دن کے بعد سفر کے بعد یہ دوائی دی جانی چاہیئے۔ یہ یرقان کے لئے مخصوص دوا  
ہے۔ ۶ طاقت میں دیجئے۔ آنکھ کا پردہ زرد رنگ کا۔ ذائقہ کڑوا۔ زبان کا رنگ گہرا سرخ۔ دبلنے پر  
جلد دکھے۔ بھورا سرخ پیشاب۔ ہلکے مٹی کے رنگ کے پاخانے۔

مائیریکاسیرفرا۔ بننے والے یرقان کے لئے اہم دوائی ہے۔ صبح کے وقت دھیماسر درد۔ آنکھوں  
کا رنگ گندہ غلیظ۔ زبان پر زردی۔ مریض کمزور اور بھڑوں کی کمزوری کی شکایت کرتا ہے۔ بازوؤں  
میں درد نبض سُست اور گہرا پیشاب۔ دائیں طرف پسلیوں کے نیچے درد۔ مھو کو نہ ہو۔ ترش چیزوں کی  
خواہش۔ نیند سے تازگی نہ آئے یا نیند سے تھکاوٹ دور نہ ہو۔

ہائیڈراسٹس۔ سردی کا مکی یرقان۔ تیز سوئی چھبئے جیسی دردیں بہت زیادہ لیسدا مراد ہے  
متلی اور تپ۔ جگر کا گھٹ جانا۔ زبان سوچی ہوئی دانتوں کے نشان سفید یا زرد فر کے ساتھ۔  
چیونٹھخص۔ بننے والا یرقان گڑا گڑا ہٹ کے ساتھ۔ ہر گرمی میں پلٹ کر آنے والا یرقان۔ مٹی کے رنگ  
کے پاخانے کے ہمراہ قبض۔

مرکب سال۔ یرقان کے لئے ایک نمایاں دوائی ہے۔ نبض تیز۔ آنکھ کے پردے کا زردی مائل رنگ  
کی ہلکی تہہ زبان پر قبض۔ زرد اور خشک پاخانے۔ پاخانہ پتلا۔ گہرے زرد رنگ کا۔ پسینہ بہت زیادہ  
جس سے افادہ ہو۔ افزائت بڑھے ہوئے خاص طور پر تھوک۔ زبان دھیلی ڈھالی۔ دھاتی ذائقہ  
جگر کے علاقہ میں حساسیت جو کمزوری ہوئی ہو۔ اور سخت ڈنگ لگنے جیسی اور سوئی چھبئے جیسی درد۔  
پلوڈو فائسلم۔ بھراؤں کا احساس۔ تیز اور کاٹنے والے درد جگر کے علاقہ میں گارٹھے صفرا اور خون کی

تھے۔ گلے سڑے انڈوں جیسے ڈکار۔ قبض اور اسہال اول بدل کر۔  
 ڈیجیٹلس۔ دل کے پٹھوں کی کمزوری۔ جگر کے بڑھنے اور سختی کی وجہ سے یرقان سست وقفہ دار  
 نبض۔ بہت ہی رنگدار کم مقدار میں پیشاب دل کی تکالیف کے ہمراہ یرقان کے لئے مفید دوائی ہے۔  
 نکس وایکا۔ بلاسیر اور قبض کے ربحان کے ساتھ یرقان۔ گندہ پھموندی جیسا یا کراوا ذائقہ خوراک  
 سے نفرت جگر کے علاقہ میں پکٹن دار درد۔ غشی کے دورے۔

ٹیلیڈائی۔ جگر میں اجتماع خون، معدہ میں بکڑن اور بکڑن نہیں جھنکی  
 کیومیولا۔ غصے کے دورے کی وجہ سے یرقان یا کسی بھی غیر ضروری براہ کھانگی کی وجہ سے یا جذبات  
 کے درجہ برہم ہونے سے جگر میں اجتماع، بھوک کا نہ ہونا۔ متلی گندہ اور چکن ہٹ والا ذائقہ پیٹ  
 میں چٹکیاں بھر پور مرڈر والی جیسی درویں۔

## مہلک یرقان

فاسفورس۔ مہلک مرض ابتداء میں۔ جگر کے بڑھا جانے اور اس کی سختی میں جگر کی مادہ کمزوری۔ جگر کے  
 علاقہ کی بیماری۔ مہلک یرقان۔

لیکسس۔ کئی خون والے۔ اعصابی درد اور حساس لوگوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ سونے کے بعد۔  
 گرم مشروبات پینے کے بعد اور گرم کمرہ میں زیادتی ہوں۔ پیشاب بھگا دار۔ گہرا تقریباً سیاہ۔ تمام جسم میں  
 جلن اور خارش۔ تمام وریدوں کے راستوں پر نیلا پن۔

آرینک الیم۔ مہلک یرقان کی آخری پیچ میں۔ بے چینی کے ساتھ بخار اور بیاس تھوڑے تھوڑے  
 وقفے پر تھوڑے تھوڑے پانی کی۔

## تلی کی تکالیف

سینو تھیس۔ تلی کے بڑھ جانے کے لئے بھوٹی کی دوائی ہے۔ یہ عام طور پر مدد نگر کے تھوڑوں کی  
 صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ تلی کے علاقہ میں گہرائی پر درد۔ گہری سوئی چھنے والی انداز  
 موسم میں زیادتی۔ سردی کے دورے اور بخار۔ تلی ہوئی اور اپنی جگر سے ٹپی ہوئی تلی۔

چائنا - تلی کے بڑھ جانے میں دوسری بڑی دوائی جب تلی میں اجتماع خون ہو۔ سوزش اور سوئی  
 جھجھے در تلی میں کھینچنے والے شدید بخار کی وجہ سے۔

ارنا یا ڈائیدرما - تلی کا بڑھ جانا۔ مزمن ملیریا کی وجہ سے کاہلی کستی اور متواتر سردی لگنا مفید دوائیں۔  
 کیپسکیم - حساس۔ سوئی ہوئی اور بڑھی ہوئی تلی کے لئے بہتر ہے۔

سیکینم ایسڈ - تلی کی حالت اور فعل کو درست کرنے کے لئے اچھی دوائی ہے۔

برائی اوٹیا - تلی کی سوزش اور اجتماع خون۔ سوئی جھجھے جیسی اور پھارنے والی در دیں جن کو حرکت پر  
 زیادتی ہو۔ آرام سے افاتہ ہو۔

لیکسس - تلی کی سوزش خون بہنے کا رجان کے ساتھ۔ کسے ہوئے کپڑے اور کسی سوئی پٹیاں  
 برداشت نہ کر سکے۔ تلی کے علاوہ میں شدید در دیں۔

## امعائے مستقیم اور پاخانہ

پہو تھا بھٹہ

### ناسور

ایومونا - امعائے مستقیم میں ناگوری آگاؤ یعنی ناسور، پاخانہ کے بعد در دعام طور پر مرض  
 قبض میں مبتلا ہوتے ہیں۔

رُوثا - امعائے مستقیم کا ناسور۔ پاخانہ کے گھنٹوں بعد تک در جاری رہے۔

ایسڈ ٹائٹرک - جب ایومونا ناکام ہو جائے تو یہ دوائی استعمال کی جائے بہت مفید ہے۔

سکرینیم - یہ دوائی بطور عمل انیگر استعمال کی جائے جب مذکورہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں۔

### ہیضہ

کیمفور - مدر ٹیکر کا ایک قطرہ ایک خوراک میں بطور حفظ ماقدم اور ابتدائی درجہ میں علاج کیلئے

یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ جب کرتے اور اسہال شروع ہو چکے ہوں۔ ابتدائی حالت میں دل کا ڈوبنا۔

ٹھنڈک اور اچانک پسینہ جو کمزوری لاحق کر دے۔ مرض بہت ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اخراجات کم۔

چہرہ کی خشکی اور نیلاہٹ ہوتی ہے۔ قے کرنے یا اسہال خارج کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ گرمی سبب آناٹہ  
معدہ اور خوراک والی نالی میں جلن۔ پسینہ نہ ہو لیکن نہ ٹھنڈے والی پیاس۔

دریٹرم ایلیم۔ ہیضہ کی دوسری سیٹج جب اسہال اور قے شروع ہو چکے ہوں۔ پاخانہ پہلے  
پیٹ میں درد۔ پاخانہ کے بعد شدید درد کمزوری۔ ٹھنڈا پسینہ اور جسم کی سطح ٹھنڈی۔ اندرونی  
جلن کا احساس۔ دریٹرم کی نشاندہی کے لئے پیٹ میں ضرور درد ہونی چاہیے۔ نمایاں یا زیادہ  
اخراجات۔

کیو پرم ہیٹ۔ انگلیوں اور پنجوں میں شدید شدید انیٹھن کے دورے۔ جسم کی سطح پر ٹھنڈک  
جلد کی نیلاہٹ۔ منہ کی خشکی اور پیاس پیٹ کے بالائی حصہ میں شدید درد۔ قے کی لاعااصل کوشش  
یعنی قے کرنے کی کوشش کرے لیکن قے نہ کر سکے۔ رتے اور اسہال دریٹرم قے ہی رکھتا ہے لیکن  
ٹھنڈا پسینہ نہیں ہوتا۔

ایٹھوزا سی۔ پنجوں کا ہیضہ جواچانک آتا ہے۔ بچہ بھونچا درد دھڑپا ہے قے کر دیتا ہے  
اور تب اس کو شدید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ درد کا کچھ حصہ دہی کی صورت میں اور کچھ حصہ  
مائع کے ہمراہ تھلا۔ زردی مائل لیسڈار پاخانہ کے ساتھ۔

آر سینکلم الیم۔ پنجوں میں جب ایٹھوزا ناکام ہو جائے تو ہیضہ کے لئے بہترین دوائی ہے۔ غیر مفید  
پاخانہ اور تیزی سے کمزوری ہو۔ ٹھنڈی ہیضہ کے لئے دریٹرم کی مانند ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں  
بے چینی زیادہ اور پسینہ کم ہوتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے پانی کے لئے پیاس وقفوں کے بعد۔ شدید قے اور  
اسہال بہت زیادہ بدبودار زرد یا بھجھے اسہال۔

کارلوقوچ۔ یہ مرض کے آخری سٹیج کی دوائی ہے۔ جب مریض آرام سے لیٹ جائے بہت کمزوری۔  
ٹھنڈا سانس، نبض کمزور تیز ہو اور دھماکے کی طرح باریک۔ قے اور اسہال نہ ہوں اور نہ ہی درد  
یا دورے ہوں۔ مرض جسم کو چھوڑ چکی ہوتی ہے لیکن کمزوری شدید تر ہوتی ہے۔ بہاؤ کی وجہ مریض غیر  
مزاہمتی سٹیج تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔

بائیڈرو سائیکل سیڈ۔ یہ دوائی حالت نزع میں جب تمام اخراجات ترک جائیں کارلوقوچ کے برخلاف  
غشی کے دورے اور تشنجی دورے رکھتی ہے۔

ایسٹریم۔ بچوں کا بیضہ۔ زیتون کے تیل کی طرح سبز پانی جیسے پاخانے جو ذرے نکلیں۔  
 لیکس۔ جلن کے ساتھ جو تھوڑی سی بھی سختی کے ساتھ پھرے جاری ہو جائیں۔  
 سیکلکار۔ آخری شیج کی دوائی ہے جب مریض ٹھنڈا رہنا پسند کرتا ہے۔ مریض تقریباً بغیر بیض کے  
 اور ٹھنڈا لیکن دھاپنے جلنے سے نفرت کرتا ہے۔  
 جٹروفا۔ بیضہ تاردار تھے۔ البیومن ملا مواد۔ شدید کمزوری، تھکے اور اسہال اور چاٹوں کی پیچ  
 جیسے پاخانے۔ انٹھن اور ٹھنڈک۔ یہ بیضہ کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔

## قبض

نکس و امیکا۔ دُبیلے تلے مریض انتہائی زرد رنگ جو آواز اور ہوا کے جھونکوں سے متاثر ہوں بہت  
 زیادہ پاخانہ زیادہ جلاب لینے پر۔ پاخانے درروالے بہت دباؤ کے ساتھ۔ تباکو۔ کافی۔ شراب  
 زیادہ استعمال کی وجہ سے قبض۔ قبض غیر تسلی بخش حاجت کے ہمراہ۔ یہ سست عادات والے لوگوں  
 میں ہوتی ہے۔ ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں دتے تھے۔  
 برائی اونیا۔ پاخانہ خشک جیسے کر جلا ہوا پیاس کے ساتھ۔ قبض جس سے اپنڈکس کا درد ہو۔  
 گرم موسم میں قبض ہو پاخانہ بہت سخت اور آٹول کے بغیر۔  
 ایومنا۔ انٹریوں کی خشکی اور ان کی حرکت دررا لگنے نہ ہونے وجہ سے جب بہت سا پاخانہ اکٹھا  
 نہ ہو جائے پاخانہ کی خواہش اور حاجت نہ ہو۔ بہت دباؤ کو ڈکی سید پر جم کر بیٹھنا پر کے پاخانہ  
 پاخانہ سخت۔ گرہ دار نرم۔ معتد سے چپک جائے۔ پاخانے کی تھوڑی یا بالکل خواہش نہ ہو۔  
 امعائے مستقیم کا مکمل جمود کزنم پاخانہ بھی بہت شکل سے خارج ہو۔ پاخانہ سخت اور گرہ دار  
 بھیڑ کی مینگنیوں کی طرح۔ منہ خشک اور زبان زرد حس اس دوائی کی رہنمائی کرتی ہے۔ شدید ذہنی  
 ایوسی، بھوک کی کمی حمل کے دوران قبض۔

سیدیا۔ عریض جن میں پٹو پر پیچھے کی طرف شدید دباؤ جو امعائے مستقیم تک بڑھے۔ پاخانہ کی ناکام  
 کوشش۔ زور لگائے مگر پاخانہ نہ آئے۔

اینا کارڈیم۔ جب اعلیٰ مستقیم باریکٹم میں پاخانہ کی لا حاصل خواہش ہو۔ پاخانے کے اعلیٰ مستقیم باریکٹم پر دباؤ، نمکس و امیکا میں دباؤ، پیٹ پر محسوس کیا جاتا ہے۔

اوپیم۔ انٹریوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے قبض۔ پاخانہ کی خواہش نہ ہو۔ جب پاخانہ اُسے تویر سخت خشک یاہ گولیوں کی طرح۔ انٹریوں کی خشکی اور ان کا کام نہ کرنا ہمیں پایا جاتا ہے، منہ اور معدہ کی خشکی مریض کئی روز تک پاخانہ نہ کرنے پر بھی۔ تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ پاخانہ کی حاجت ہی نہ ہو۔ پیلیم۔ مزین قبض کیلئے سوٹی کی دوائی ہے۔ یہ اوپیم کی قبض کی طرح ہے لیکن اس میں انٹریوں میں کچھ عمل ہوتا ہے۔ پاخانہ کی خواہش ہوتی ہے لیکن بہت دقت سے پاخانہ آتا ہے۔ پھول کا عمل مست اور انٹریوں کے خدو کے افزائت کم ہو جاتے ہیں۔ پاخانہ سخت اور ڈھیلا کی طرح سوچے ڈال دے۔ لائیکوپوڈیم۔ سخت قسم کی قبض۔ پاخانہ کی لا حاصل خواہش۔ معدہ میں تیز اہمیت اور جلن کو دکھاؤں سے آفاقہ ہو۔

سلفر۔ قبض۔ پاخانہ سخت۔ گرہ دار خشک جسے کہ جلا ہوا ہو۔ بڑا تکلیف دہ پتھر تکلیف کی وجہ سے پاخانہ جلنے سے ڈرے۔

گریشی ادلا۔ ناسور کی قبض۔ اعلیٰ مستقیم باریکٹم گھٹا ہوا۔

کارلوانیمیل۔ قبض۔ مریض محسوس کرے کہ پاخانہ خارج ہوگا۔ لیکن منہ ہوا خارج ہو۔

سیلینیم۔ قبض۔ پیٹ مشکل سے منہ یکانی انداز سے خالی کیا جاسکے۔ بہت ہی مشکل سے پاخانہ آئے اپنے بڑے مائز کی وجہ سے مقعد کو مچھاڑیں۔ پاخانے میں بالوں کی طرح دھلگے۔

مفلینیم۔ سالوں کی ضدی قبض اعلیٰ مستقیم رسیوں سے بندھی ہو جب انیا کیا جائے تو پاخانہ نکلنے کے ساتھ دروازہ جیسا درد ہو۔

نیٹرم میور۔ جب پاخانہ سخت اور ٹھٹھا ہوا۔ اعلیٰ مستقیم خشک پاخانہ مشکل سے خارج ہو۔ خون جاری ہو جائے رکیم میں تناؤ اور دکھن پاخانے کے بعد۔

گریفائیٹس۔ پاخانہ کی خواہش نہ ہو قبض کے ساتھ۔ کئی دنوں تک پاخانہ کی حاجت یا خواہش نہ ہو جب چہرہ پر شرمی بڑی پھنیاں ظاہر ہوں۔ بواہر کے ساتھ اور چہرے جو جلیں دکھیں اور ان پر

ناقابل برداشت غارِ شہادت خاں ہو۔ پانخانے کے مقصد میں دردِ گرفتاری کی عمومی ادائی اور نہ تو  
 آسانی سے اس دوامی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پسندارِ باد سے کھڑے ہوئے پانخانے۔ یہ ان صورتوں کے  
 لئے موزوں ہے جو پانخانہ جانے کے لئے کستی کرتی ہیں۔ مریض بہت ہی حاس۔ اعلیٰ اپنی وجہ  
 کو مکرر ذکر کرے۔ صبح کے وقت اٹھنے میں دقت محسوس کرے۔  
 پلاٹینا۔ اس قسم کی قبض مافرول اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے لوگوں میں زندگی کے  
 معمولی میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پانخانے کی اکثر خواہش لیکن کم پانخانہ اور شکستہ  
 کی نہر کے بعد جب مکس وائیکا ناکام ہو جائے۔  
 در شرم ایلیئم۔ انٹرویل کی مکمل ناماقتی یا شدید ناماقتی یا کلوری۔ امعاء مستقیم میں بہت سا  
 پانخانہ جمع ہو جائے۔ مریض کوشش در کوشش کرے اور اکثر پسینہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر  
 کوشش جھوٹ دیتا ہے اور مصنوعی طریقہ سے پانخانہ خارج کیا جاتا ہے۔  
 سٹانم میٹ۔ آرام کے دنوں کے بعد قبض۔  
 پلوڈوفائلم۔ مزین قبض امعاء مستقیم یا مقعد کے خروج کے برابر۔  
 لیک ٹیک ڈیفلو۔ قبض جہاں امعاء مستقیم فالج زدہ معلوم ہو۔ پانخانہ کافی زور لگانے کے باوجود  
 اندر نہ جاتا ہے۔  
 میگنیشیا کارب۔ مریض ہونے اور بیمار بچے جو خوراک اور درد دھینے سے انکار کریں کیونکہ  
 یہ چیزیں لینے سے ان کے معدوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اسہال میں مبتلا ہوتے ہیں  
 پانخانے، سوکا مان یا سوکڑے کے مریض ہوتے ہیں۔  
 کاسٹیکم۔ کھڑے ہو کر بہتر پانخانہ خارج کرے۔  
 میڈورنم۔ پانخانہ خارج کرنے کے لئے پیچھے کی جانب جھکتا ہے۔  
 میگنیشیا سور۔ پانخانہ سے پہلے کلیف وہ خواہش۔ پانخانہ کے بعد مقعد میں ملن۔ انٹرویل کی کلوری  
 درد شہادت کی کلوری۔ چناب صوف شے کی طرف جھکنے اور پیٹ کے ٹھنڈے کو دبانے سے فارغ ہو سکتا ہے  
 بچوں کے دانت لگانے کے زمانہ میں قبض۔ بڑے بڑے جلاب۔ بے سخت گوہر پانخانہ لیکن کوئی  
 تکلیف دہ۔

ایسٹریا آر۔ خدی قبض۔ ۱۲ سے ۱۵ دن کے پانخانہ ہوں۔  
 ایونن۔ کئی دن تک پانخانہ کی خواہش ہی نہ ہو۔ خدی قبض جس کے ہمراہ منگی تھے انکائیاں۔  
 میڈراسٹس۔ قبض کے لئے ۹ طاقت میں ۲ قطرے فی خوراک دن میں ۲ بار۔  
 امبرگر لسیا۔ بڑے لوگوں میں پانی قبض۔ خاص طور پر جب ان کے قریب کوئی اور ہو تو پانخانہ نہ آئے  
 سینکولا۔ قبض۔ پانخانہ بڑا اور سخت جو خارج کرنا مشکل ہو کافی دباؤ ڈالنے کے بعد جو مختل  
 باہر نکلتا ہے واپس چلا جاتا ہے جو میکانی طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ کئی ایچ لیا پانخانہ جس کو  
 خارج کرنے کی زیادہ کوشش کی ضرورت نہ ہو۔  
 سیلشیا۔ سخت بدبودار پانخانے۔ اکثر سخت اور شکل خارج ہوں۔ بہت بدبودار باج  
 خارج ہو۔ پیٹ سخت اور سوجا ہوا۔

ٹیرٹولا، سپانولا۔ براتی قبض، بے چینی کے ہمراہ مریض ایک کوٹ سے دوسری کوٹ بدلتا ہے  
 یا لڑھکتا ہے، جو بے چینی کو افاقہ دینا ہے۔

## اسہال

نکسوا میکا۔ یہ دو اہل حادثہ قسم کے کیسوں میں جب بے ہنگم یا بلا تیز زیادہ خوراک کھانے سے  
 اسہال ہوں ۹x طاقت میں دی جانی چاہیے۔

ایلو۔ جب مریض کو پانخانے پر کنٹرول نہ ہو اسے الیزین کی طرح دور کرنا چاہیے۔ پانخانے پانی کے  
 تل میں سے پانی کرنے کی طرح خارج ہوں۔ ناف کے گرد کٹنے والے درد انیٹھن وار درد پیٹ میں  
 کھلنے اور پیٹھ سے زیادہ ہوں۔ پیشاب کے ساتھ پانخانہ کی حاجت ہو۔

ارگو مین۔ جب اعصاب متعظیم یا ریگیم میں احساس ختم ہو جائے۔ اور مریض کو تیرہ ہی نہ بل کئے کہ  
 کبھی صاف اور پاک نہ رہ سکے۔ ۲x طاقت میں دیجئے۔

ایٹوسائیمس۔ پیشاب کرتے وقت بلا ارادہ پانخانہ خارج ہو جائے۔ اخراج بلا درد۔  
 آسٹیکم الیم۔ جہاں شدید بے چینی۔ سخت اذیت اور ناقابل برداشت درد۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں

پر تھوڑی تھوڑی پانی کی شہد پیاں۔ پانخانہ کی مقدار تھوڑی لاغری اور کمزوری اس کی مناسبت سے بہت زیادہ۔ معویہ میں ٹھنڈک کی وجہ سے اسہال طیر یا کی نوعیت کی ٹھنڈک یعنی رطوبت کا طیر یا کہ کھنپنا۔ ورسیم البکم۔ بہت زیادہ پانخانے۔ بے حبیبی۔ زیادہ مقدار میں پانی کی بہت زیادہ پیاں۔ پانخانہ کے بعد بہت زیادہ کمزوری۔ ٹھنڈے پسینے۔ ٹھنڈک اور عام جسم کی نیلا ہٹ۔

ایسٹیک الیڈ۔ دق میں اسہال۔ اسہال پتلے خون آمیز یا خون۔ بواسیر سے بہت زیادہ خون، زخم اسہال۔ الیومنا۔ ایک دن چھوڑ کر اسہال۔

فلورک الیڈ۔ ایک دن چھوڑ کر شام کے وقت اسہال۔

برائی اونیا۔  
 اگنیشا۔  
 کالوشخص۔  
 شیفسگرا۔  
 کرونیکلیم۔ اس کی تین اہم نشانیاں۔

(۱) پانخانے زبرد اور پانی کی طرح پتلے۔ (۲) اچانک گولی کی طرح خازج ہوں۔ (۳) کھانے یا پینے سے زیادہ۔ نرم پتلے پانخانے زور سے باز نکلیں۔ اس کے ساتھ تسلی اور قے۔ گرم پانی سے آفاقہ ہو۔ ہر حرکت سے پانخانے آئیں۔

فاسٹولا کا۔ دانت نکلنے کے زمانہ میں اسہال۔ مسوڑھوں اور دانتوں کو چبانے والی قابو میں نہ آنے والی خواہش۔

ٹیز ٹولا ایچ۔ جو بے سرد ہو یا جائے پانخانہ آجائے۔  
 بیٹر ولیم۔ دن کے وقت اسہال رات کے وقت افتاد جب کھانسی جاری ہو ہمیشہ فقرہ دقت پر اسہال آوے ختم ناٹریم۔ کھنڈ اور مافی کھانے سے اسہال۔ جذبات کی وجہ سے اسہال۔  
 مرک ڈلس۔ بچوں میں سبز اسہال۔ آر جیم ٹیز ٹیم اور اپیکاک بھی دیکھے۔  
 نکس مارکاما۔ حمل کے دوران اسہال۔

اولینڈر۔ بلا ارادہ اسہال۔ معدی کی تکلیف۔ نظام انہضام درہم برہم اور خوراک مکمل طور پر غیر مفید  
شدہ خارج ہو جاتی ہے۔ ہوا کے ساتھ پانخانہ خارج ہوتا ہے۔

تھوہا۔ صبح کے وقت اسہال، پیٹ میں گڑگڑاہٹ کے ساتھ جیسے کہ برباد ترین جیسے پانی گڑا ہوا ہے۔  
ٹرامبیدیم۔ اسہال کیلئے بہترین دوائی ہے۔ جب کھانے پینے سے اسہال میں زیادتی ہو۔ پانخانہ  
سے پہلے۔ دوران میں اور بعد میں اینٹھن وارد ہو۔ یہ پیش بھی رکھتی ہے۔

ڈیجیٹلس۔ یہ تھان کے دوران اسہال مفید پاک ک طرح، راکھ ک طرح، پچکے دالے پانخانے۔  
سینی کولا۔ جتنی دفعہ خوراک کھائے، اتنی بار پانخانہ آئے۔ کھانا کھانے کی میز سے فوراً پانخانہ کیلئے جانا  
پڑے۔ پانخانہ کو روکنے کے لئے مانگیں ایک دوسرے پر چڑھائے۔ مقعد کو بند کرنے والے ٹھوس پتھریلوں  
ہو۔ اکثر کھڑے دھڑتے ہوئے یا رات کے وقت پانخانہ خارج کو ہے۔

السونیا کون۔ غیر مفید شدہ خوراک کے اسہال خوراک کھانے کے فوراً بعد کھانا مکمل کھانے سے پہلے  
ہی میز پر آٹھ ٹپا پڑے۔ ہلکا سا بخا بھی آجانا۔

مرک کار۔ طاقت سے نکلنے والے اسہال۔

گوانیم۔ اسہال غیر مفید شدہ خوراک خارج ہو جائے۔ صبح کے وقت اسہال کی خون دلا۔

گرم مریض گنشیادی بھی۔

اسٹیمپیٹ۔ ذہنی کام کی زیادتی کی وجہ سے اسہال۔

چیارو اماگرس۔ اسہال اور پیش۔ حاد یا مزمن جب دوسری دوائیاں ناکام ہو جائیں۔

گرفیٹس۔ بہت زیادہ بدبودار پانخانے جو سانس گھریں بدبودار پانخانے پھیل جائیں، مابین کے ٹکڑے جیسے۔

بنزداک الیڈر۔ بھورے مواد پانخانے غیر مفید شدہ چیزوں کے ساتھ ناقابل برداشت بدبو کے ہوا۔

کونیم۔ ٹھنڈے پانخانے کے ہوا اسہال۔

ڈاک مارا۔ پہاڑوں میں اسہال کے لئے مخصوص جب ٹھنڈے کی وجہ سے اسہال ہوں۔

سفلینیم۔ اسہال جن کو پہاڑوں پر جانے سے اتفاق ہو۔

سورائینیم۔ گلے اندوں جیسی بودالے اسہال۔ بہت ہی بدبودار۔ گندے اندے جیسے دکار۔

سورائیم - گلے انڈوں جیسی بوداے اسہال، بہت ہی بدبودار۔  
 سیلیشیا - دودھ پینے سے اسہال، ٹھنڈے ٹھنڈے لگنے اور پانی جیسے اسہال لیسڈار سبز یا زرد۔  
 آئرس ور - جب اسہال پانی جیسے ہوں اور مقعد کو جلائیں جیسے کراگ لگی ہو۔ منہ اور نرگ کی  
 نالی میں جلن جتنی کے ہزارہ۔

سپٹسمین - کیمپ کی زندگی میں یہ دوائی عیاد کی طرح اثر کرتی ہے۔  
 ریموڈ ڈیفنڈروان - ٹھنڈے مقدار موسم میں اسہال اور طوفان برق و باران میں دوبارہ ہو جائیں۔  
 آرنیکا - رات کے وقت بلا ارادہ پانخانے۔  
 کیمفور - مرض کے شروع میں حالت نرسا۔

گریشی اولہ - موسم گرما کے اسہال - زرد - زرد سے نکلنے والے اور پانی جیسے معلوم ہو جیسے کٹانی  
 کے نلی سے پانی خارج ہو۔ پانی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس، بیز نرگ خردو  
 کی سوچن۔

لیاٹرس پائیکاٹا - مزمن اسہال، کیمپ کی زندگی۔  
 ملگیشیا کارب - زرد اور زرد یا سبز جو دودھ یا خوراک کھانے کے بعد اسہال میں مبتلا ہو جائیں۔  
 وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیں کیونکہ اس سے ان کے معدے میں درد ہو جاتا ہے اور سبز یا پتلے آتے ہیں  
 سوکھاپن یا سوکڑا - پانخانہ سبز جھاگدار جیسے کہ جوڑ کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔  
 سلفر - صبح کے وقت اسہال عام طور پر جب ریلض اٹھنے کے متعلق سوچا ہے۔ آدمی رات اور صبح  
 کے درمیان پانخانے بدبودار اور پانخانوں کی بدبو جریض کا بچھا کرتی ہے۔ جیسے کہ وہ پانخانے سے متحضر ہو جائے۔  
 بطور عمل ایگز دوائی کے استعمال کرنی چاہیے۔

یوڈو فائیلیم - کیمپ کے اسہال، نامات پانی پینے سے۔ پانخانہ بہت ہی بدبودار۔ صبح سویرے  
 پانخانہ پانی کی طرح - لیسڈار یا چکپنے والا - زرد یا ناہضم ہونے والا۔ طاقت سے خازن ہو۔ قدرتی  
 پانخانہ دن میں خارج ہو۔ پانخانہ ملا درد - خاص طور پر بچوں میں خدی اسہال کے کیوں کیلئے۔  
 ایسڈ فاس - اسہال پانی کی طرح پتلے اور بغیر تکلیف خارج ہوں۔ بعد میں ریلض افادہ محسوس کیے۔

مقعد کا پھلنا شروع ہو جائے اور پانچانے بلا درازہ نکل جائے۔ کافی زیادہ کافی دیر تک اسہال کمزوری نہ کریں۔

بیمہ کرب۔ درجہ پینے سے اسہال۔ اس کے ہمراہ دل کی دھڑکن بھی ہوتی ہے۔

بیمہ کرب۔ کوکاپینے یا چاکلیٹ کھانے سے اسہال۔

سٹس کینا۔ مزمن اسہال غدد کی اور بیٹ کی سوجن کے ہمراہ بول کی یا بیفرٹی کی کے دہوں۔

اویم۔ ڈرکی وجہ سے جب متواتر ڈر پیدا کرنے اور ذہن کے ساتھ ہی ہر ہو۔ خوشی میں اسہال

درمیشم البم۔ ڈرکی وجہ سے جب سرد پسینہ ہمارا

اسٹیمٹاٹیم۔ جب جذبات کی برائیتنگی سے اسہال ہوں جب تصورات سے کھیل گیا ہو بچوں میں

بیزی اہل اسہال۔ جب والدہ نے بہت بڑی مقدار میں کھانے کھائی ہو۔

پلسٹیل۔ جب اسہال بزرگ، ایسا درجہ حرارت کے وقت زیادہ ہوں۔ انفیو میں اسہال۔

جروفا۔ اسہال اور تھ۔ دل کی دھڑکن شدید ٹھنڈے جسم اور نیڈلیوں میں انٹھن کے

ہمراہ ایک ہی وقت میں تھ اور اسہال جیسے کرائیائی ہضمیت میں ہوتے ہیں۔

نوفوریہ کورولیا۔ تمام جسم پر ٹھنڈا پسینہ کے ساتھ اسہال اور تھ۔ خاص ذہنی حالت میں

مرجانا چاہتا ہے۔

چائنا۔ تیلے پانی جیسے بلا درازہ پانچانے پیٹ میں گڑا ہٹ کے ساتھ کافی پیاس اور تمام

جسم پر پسینہ کھانا کھانے پر زیادتی خاص طور پر پھل کھانے رات اور صبح سویرے زیادتی ہوتی ہے۔

ریوم۔ کھٹے پانچانے اور تمام جسم سے کھٹاس کی بوا اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ یہ بزرگ ہمارا

اور جوڑ کی جھاگ کی طرح بزرگ پانچانے ہوئے ہیں۔ مندرجہ بالا علامات کے ساتھ یہ دوائی بچوں

کے لئے خاص طور پر ہوزوں ہے۔

کلکیر یا فاس۔ کھٹے اور غیر ہضم شدہ پانچانے بچوں میں خاص طور پر جب بچہ دانت نکلانے

کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آواز پیدا کرتے ہوئے اسہال پانچانے ناشتہ کے بعد اسہال اسہال

جو طاقت کے ساتھ خارج ہوا اور آواز پیدا کرے۔ یہ پانی کی طرح بزرگ اور غیر ہضم شدہ اسہال ہوتے ہیں۔

بورکس۔ پیشاب کرنے سے پہلے پانچانے ناشتہ کے بعد اسہال۔

سٹر الشیا۔ رات کے وقت بڑی شدت سے اسہال۔ مریض شاید ہی لیٹیں جھکے کہ کچھ سوجھتا ہو جائے۔  
 فاسفورس۔ مزمن اسہال کے لئے، سبز مواد والے پاخانے جو صبح کے وقت زیادہ ہوں۔ اکثر غیر ہضم شدہ  
 اور پلادر پاخانے چاولوں جیسے سفید باتوں جیسے ذرات رکھتے ہوں۔ پاخانے کے بعد معدہ کھلی رہی۔  
 کیسٹوریم۔ پیچہ جو گرمیوں میں سبز پاخانوں میں مبتلا ہوں۔ اعصابی قوت۔  
 کالو منٹھ۔ شدید درد قوت کے ساتھ اسہال۔ دباؤ سے افاقہ اور جذباتی برائیگی سے زیادتی  
 صفراوی انفرزات دور سے دار دروں کے ہمراہ۔

فیرم میٹ۔ مریض کھانا ختم ہونے کا بھلے انتظار کر کے پاخانے کی ماحوت ہو جائے۔ یہ تقریباً  
 کھانے پینے کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ پاخانے غیر ہضم شدہ خوراک اور اکثر رات کو۔ مزمن کیوں میں پلادر ہوتے۔  
 گیجوبیجا۔ بوڑھے لوگوں کے اسہال۔ شدید خواہش اور پاخانے ایک ہی وقت میں بڑی طاقت  
 کے ساتھ خارج خارج ہوتے ہیں اور اس کے بعد کون آجاتا ہے۔

نیرم سلف۔ سبزیوں، پھلوں، پٹیلوں، ٹھنڈے مشروبات اور غذا سے اسہال۔ یہ صبح کے اسہال  
 جب مریض بستر سے اٹھنے کے بعد تھوڑا سا چل پھرے۔ یہ سلف سے مختلف ہے جہاں پاخانے کس  
 خواہش صبح اٹھنے سے پہلے اٹھنے پر مجبور کر دے۔ پاخانہ کرتے وقت لڑکھاہٹ اور بڑبڑکی آواز  
 تب اچانک زیادہ آواز سے خارج ہو۔

الیٹریم۔ زیتون جیسے سبز پاخانے۔ بہت زیادہ اور زور سے خارج ہوں۔  
 ایرومینیم۔ اسہال اچانک بند ہو جائیں جن کے بعد بواسیر اور حادثہ گنٹھیا۔ اسہال اور قبض اول  
 بدل کر خاص طور پر بچوں کے اسہال کے لئے۔

کیمومیل۔ جب بچہ پاخانہ خارج کرتے وقت جاگ جائے تکلیف کی وجہ سے ہر وقت اٹھایا جاتا  
 پسند کرے۔ سبز پاخانے۔ پانی کی طرح کے۔ پھیلین دار، اکثر سے ہوئے اندڑوں کی طرح کے۔ کھٹی بو  
 والے۔ دانت نکلانے کے دوران درد سے چلائے۔ کھانا کھانے پینے اور کھلونوں سے انکار کر دے۔  
 میگنیشیا کارب۔ ہر تیسرے ہفتہ اسہال۔ پاخانے سبز۔ جھگاگدار۔ جوڑی کی سبز جھگاگدار۔ دودھ  
 بغیر ہضم ہوئے خارج ہو جائے۔ اسہال سے پہلے کاٹنے والا درد تمام بچے سے کھٹی بو آئے۔

ریوم۔ مشکل سے دانت نکالیں بچے چین۔ زرد رنخ۔ پڑ چڑا۔ زرد چہرہ اور تمام جسم سے کھٹی بو کے بہرہ دھونے اور نہانے کے بعد بھی بچے کھٹی بو آئے۔ کھوٹری پر تواتر بہت زیادہ پینے آئے۔ فاسٹولا کا۔ دانت نکالنے کے دوران اسہال جن میں مسوڑھوں اور دانتوں کو کاٹنے کی تہنابو میں آنے والی خواہش ہو۔

ایٹھیک میڈ۔ شدید کمزوری کے ساتھ بخوں کے ضمن اسہال۔

ایلیم سیپیا۔ بد ہضمی۔ قے اور گیس۔ بدبودار گیس خارج ہو۔

میڈورنیم۔ بخوں میں اسہال بڑی مائل زرد یا خانوں کے۔ شدید بدبودار۔ ملازادہ اسہال۔

پانی کی طرح کے لیسدار ہی کی طرح کے۔ گلے ٹپے اندوں جیسی بو۔ خون اور سیکا بہت زیادہ اخراج۔

گمٹی گمٹی۔ نان کے گرد کاٹنے والی دردیں۔ بچہ چلائے اور کر اسے جس کے بعد پانچنے خارج ہوں اور افاتہ ہو جائے لیکن کچھ دیر بعد پھر عود کر آئے یعنی مندرجہ تکلیف شروع ہو جائے۔

اکونائٹ نیپ۔ جب بچہ پانی پیے اسہال میں چلائے اور بہت تکلیف کرے مٹھیوں

کو کاٹے اور بے خوابی ہو۔

ایپس ایم۔ بخوں اور بہت چھوٹے بخوں میں خاص طور پر مفید ہے جیسے خاص قسم کا پانخانہ

خون ملا۔ مواد اور خوراک ملا جسے کہ ٹماٹری چٹنی۔

## پیشکش

سلفر۔ یہ دوائی بطور عمل انگیز کے  $\times 20$  طاقت میں استعمال کی جائے۔ حاد یا مزمن کیوں

میں اس کی ایک ہی خوراک مطلوبہ نتائج حاصل کرے گی۔ یہ تین یا چار روز بعد دہرائی جاسکتی

ہے اگر معمولی خوراک نے کچھ اثر کیا ہو

مرک کار۔ پچیس لکھے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ پانخانے میں خونی علامات کے ساتھ بار بار پانخانے

کی تکلیف دہ حاجت رکھتی ہے۔ یہ شدید اور انتہائی تکلیف دہ بار بار پانخانے کی حاجت جو

شدید تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پانخانے کم لیسدار مواد کے ٹپے۔ خون زیادہ یا کم مقدار میں ہو سکتا ہے۔

یہ دوائی خونی پچیش میں بھی مفید ہوتی ہے۔ معقد میں جلن۔ پاخانے سے پہلے اور بعد میں تکلیف دہ کیفیت۔

مرکب سال۔ جب خون نہ ہو اور پچیش میں لیسدار مواد ہو۔ یہ مرکب کار کے نقل بلے میں بھی پچیش کے لئے موزوں ہوتی ہے۔

تھوہا۔ امیبائی پچیش کے لئے شاندار دوائی ہے جبکہ سلفر اور دوسری علامتی تمام ادویات ناکام ہو جائیں۔

کارا بلک لیڈ۔ لیسدار مواد دوائی پچیش نمایاں کمزوری اور ٹھنڈے پسینے کے ہمراہ۔

چپارڈ امرگاس۔ مزمن یا حاد پچیش جب اسہال اور پچیش میں عام ادویات ناکام ہو جائیں۔

کالو منٹھس۔ پچیش میں پاخانے سے پہلے تکلیف دہ حاجت۔ دہراہونے اور

دباؤ سے تکلیف میں افادہ۔

ٹرا بیڈیم۔ جب پچیش کھانے اور پینے سے زیادہ ہو۔ پاخانے سے پہلے اور دکان میں

انیٹھن دار در دیں۔

کالچیکم۔ موسم خزاں کی پچیش کیلئے انتہائی مفید دوا ہے۔ سفید مواد کے اخراج کے

ہمراہ شدید تکلیف۔ خونی پچیش، لیسدار مواد کے ساتھ ملے ہوا۔

سٹائیرس۔ پچیش جو ہرات کے وقت زیادہ ہو۔ خونی مواد والا پاخانہ کافی طاقت لگانی

پڑے۔ اسہال بنر پاخانے کے ہمراہ جورات کو زیادہ ہوں۔ پاخانے کے دوران مقعد پر نہر پھلے۔

سٹریکٹو کین۔<sup>۴۲</sup>۔ خونی پچیش جو انتہائی قسم کی بہت زیادہ خون اور بخار کے ہمراہ خون میں نہر

کی ملاوٹ کے ساتھ۔

ٹیفلو کوکین۔<sup>۴۲</sup>۔ مزمن قسم کی پچیش۔ خون اور پیپ کے اخراج کے ہمراہ۔

سیسین۔ کیمپ کی زندگی میں جادو اثر برائے پچیش یہ کیمپ اسہال کو رفع کرتی ہے۔

ٹیرنیتھنا۔ آسٹریوں اور قلوں کی سوزش۔ حسیں میں آسٹریوں سے خون ہے

اور ان کا ناسور۔

کروٹیلنس۔ ذہنی قسم کی پیمائش میں بہت زیادہ گہرا مواد۔ خون اور ملا اثر دہ پانے  
 ہمیں۔ شدید کمزوری اور غشی۔ پیشانی کم مقدار۔ گہرا سرخ۔ خون کے ہمراہ  
 کیسکریٹریا۔ پانے گہرا دار مواد سے لہڑے ہوئے۔ درد من کے ہمراہ۔ وریڈوں کی بیماریوں۔  
 کی وجہ سے اکثر درد رنگ کا خون اترتوں سے ہے۔ یہ پلازیم کا خون نہیں ہوتا یا اترتوں سے۔  
 لیٹنڈرا۔ پانے سیاہ گہرے۔ گول تار جیسے بدبو دار۔ غوطی لیڈر مواد۔ اسماعے مستقیم سے کسی  
 چیز کے گزرنے کا احساس۔

نکسوامیکا۔ پانے کی اکثر خواہش جو بھی اترتوں حرکت کریں۔ لا حاصل پانے کی خواہش۔  
 ایلوایس۔ جب پیٹ کے پچھلے حصہ میں پکڑنے والی تکلیف ہو پانے سے پہلے جس کے ساتھ  
 خون اور لیڈر مواد آئے عام طور پر چیلی کی طرح لیڈر مواد بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔  
 رہوڈنڈران۔ طوفان برق و باران سے پہلے یا دوران میں پیمائش یا ٹھنڈے مندر موسم میں۔

## بد مضمی

نکسوامیکا۔ نہ ہضم ہونے والی خوراک سے اینٹھن اور دورے دار درد۔ گیس۔ تے۔ اور  
 قبض۔ شرابیوں کی بد مضمی۔ خوراک ہضم ہو جانے پر افادہ۔ سلفر سے ادل بدل کر اسہال اور تے  
 کے لئے دیں۔

کاربووکیج۔ بہت زیادہ گیس۔ ہوا کے دھار۔ پھاتی میں کاٹنے والے درد تیز ایت اور ڈھیلا  
 پانے۔

ایس کین۔ گوشت۔ اجار اور دوسری خراب خوراکوں کی شدید خواہش کرنا۔ بھوک اور پیٹ  
 کے بلائی حصہ میں خشی کا احساس۔

سٹانم۔ اعصابی بد مضمی میں جب متلی اور تے ہو خوراک کی بڑے۔

کاربائک لیڈ۔ شرابیوں میں شدید درد کے ساتھ اعصابی بد مضمی۔

روڈیسا۔ تیز ایت کے ساتھ بد مضمی۔ معدہ میں درد کھٹی تیں۔

سلیسک الیڈر گندے ڈکاروں کے ساتھ بدھمی بہت زیادہ گیس کا اجتماع۔ معدہ کی تیز آہستہ، تلی نہانا اور تھوک۔

ایسٹڈ لیس ریسیکا۔ اسہال ادرتے

ایلیم سیٹیاوا۔ بڑھے، کچھ دھیم لوگوں میں بدھمی، تھوڑی سی خوراک کی بڑھتی سے نظام کا شیکم۔ اعصابی بدھمی، یعنی پیکر کرناوالی گیس۔ دل کا پھٹنا۔ زندگی سے باہر۔

کالی کارب۔ بدھمی ایک عجیب علامت جیسے کر پیٹ کے اوپر والے حصے میں کوڑا بندھوں کا احساس مرض سے جسم کا چھو جانا بھی برداشت نہیں ہوتا۔

کرٹیلکس۔ زہریلی قسم کی بچش جس میں بہت زیادہ گہرا مواد۔ خون اور بلا ارادہ پانخانے۔

میگنیشیا میکو۔ بدھمی، گیس، قبض، بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں۔

پلنڈرا۔ صفراء تھے۔ یہ پانخانے۔ ماتھے میں دھیمی درد جیسے کہ اس کے گرد پیٹ بندھی ہوئی ہو۔

مرک سال۔ زرد، ڈھیلی ڈھالی زبان۔ بدھمی دار سانس بکے پانخانے کم حوصلگی۔

کلیریا کارب سبب ہنگم جھوک یعنی لامحدود جھوک۔ سفید تہ چڑھی زبان۔ کلیجہ کی جلن۔ مزہ میٹائی۔

دورہ موافق نہ آئے۔ بالائی پیٹ کی سوزش۔ کپڑے تنگ برداشت نہ ہوں۔ پیٹ تھکا ہوا اور سخت بدھمی دار سفید پانخانے۔

سینگو نیریا۔ زبان پر زرد یا سفید تہہ۔ نام قابل ہضم اشیاء کی خواہش۔ مصالحہ دار خوراک کی

خواہش۔ بدھمی دار ڈکار۔ تلی جس کو تھے سے انقدر نہ ہو۔ تھوک زیادہ۔ کڑی قہقہے سرد درد کے ہمراہ

جلندار دباؤ یا معدہ میں خالی پن کا احساس۔ پیٹ کے بالائی حصے میں کھن۔

پلسٹیل۔ جبیلی غذا کھانے سے معدہ کے مواد کا درجہ ہر جانا۔ زبان بھرپور اور تھک تلی بہت

کھتے کے ہمراہ۔ کلیجہ کی جلن۔ درد نہ ہو۔ تھاکا احساس کپڑے ڈھیلے کرنا پڑیں۔ پانخانے ڈھیلے یا تھاکے

انٹم کوڈ۔ زبان دورہ کی طرح سفید۔ ہوا کے ڈکار اور کھائی ہوئی خوراک کا گندہ ذائقہ۔

لائیکو پوٹیم۔ منہ میں پانی۔ زبان پر سفید تہ۔ گیس۔ انتڑیاں تنی ہوئی کپڑے کا دباؤ برداشت کر کے

قبض۔ پھر دار پیشاب۔ کھانا کھانے کے بعد شدید نیند۔

اینا کارڈیم۔ کھانا کھانے کے بعد علامات غائب ہو جائیں اور دوبارہ ۲ گھنٹوں اور پھر تکالیف واپس آجائیں۔ (نکس و ایک کے الٹ جس میں بعض خوراک ہضم ہونے پر اچھا ہو جاتا ہے)  
ایس نائیکلر۔ بد ہضمی ایسے احساس کے ساتھ جیسے کمرے میں نے کوئی ناقابل ہضم شے نگلی ہو۔  
جو معدہ کے اوپر والے سوراخ میں پھنس کی ہو۔ کم حوصلگی۔ مرقی حالت قبض اور بد ہضمی۔ پیچھے پٹوں  
سے خون آنے کے ساتھ تبا کو یا جائے نوشی کی وجہ سے بد ہضمی۔  
نکس ماسکٹا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد خراشدار مواد منہ کو چڑھے۔ کاٹنے والے درد۔

## بدبودار پاخانے

یہ لوزوفائیلیم۔ گلے مڑے گوشت کی طرح کے پاخانے۔ بدبودار بخجوں میں دبائی بیضہ کے اسہال گرم  
موسم میں زیادہ۔ کٹھے ہوا کے ساتھ بخجوں میں گھگھینا ہٹ اور بہت پیاس۔  
لیکس۔ مڑہ جیسا نیند۔ نیند کے دوران زیادتی۔  
ایومونا۔ جیسے قبض کے براہ اور بہت دباؤ کے براہ بھگی بھلی موٹی اور سوچی ہوئی۔  
پلائینا۔ مقعد میں جیر جن میں ہر شام کیڑے ریگیں اور خارش ہو۔  
تھو جا۔ بوا سیر۔ پاخانے کے دوران شدید درد چلتے وقت شدید جلن چھونے پر حساس ہو۔  
بروئرس و لیکس۔ اندرونی اندھا پھوڑا جس میں سے گاڑھی زرد پیپ نکلتے مقعد جلن کا احساس۔  
لیکس۔ جب چیزوں پر تھوڑے لگنے جیسی درد ہو۔

## ناسور

نائیرک ایسٹر۔ اس مرض کی چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ ہر ہفتہ ۲۰ طاقت میں دی جانی چاہیے بجلی  
انٹروں میں دھن اور جلن۔ تپلا سبز مادہ کافی مقدار میں ناسور میں سے بہے۔  
سلیشیا۔ جب بدبودار پانی کی طرح کا ناسور میں سے اخراج ہو۔  
بروئرس و لیکس۔ ناسور میں درد جو مقعد میں ہو، صفراوی علامت کے ساتھ اور تمام حصوں میں خارش بھی ہو۔

لیکسس۔ ناسور میں درد جیسے کہ تھوڑے سے پیٹے گئے ہوں۔  
ایسڈ فلور۔ آنسوؤں اور دانتوں سے اخراج کے ہمراہ۔  
بسیلیم۔ آتشکی اور پارے کی تاریخ اگر بھی طرح منتخب شدہ ادویات فائدہ نہیں  
تو بطور عمل انجینر دوائی کے استعمال کر لی جاسکتی ہے۔

کلکیر یا سلف۔ تکلیف دہ بھڑا مقعد کے قریب۔ پیپ دار جیسی لیسڈر چیز کا اخراج۔  
کاشیکم۔ ناسور اور لوبا سیر، امعاء مستقیم دکھانے والا سمیں ملن ہو۔  
مائیڈر اسٹس۔ مقعد میں ناسور اور لوبا سیر۔ خدی قبض۔ امعاء مستقیم میں ملن اور کھن  
لوبا سیر اور غشی کے دورے۔

سلفر۔ مقعد کے اوپر کی طرف بھالائے جیسے درد خاص طور پر پاخانے کے بعد اندھانا سور بغیر  
درد کے بھری نائل زرد اخراج۔ بھوک نلکے گلے میں سرسراہٹ کے ساتھ۔ ناک کا زکام پیشاب میں  
بورٹ۔ فاسفیٹ اور اگر الیٹ کا اخراج۔

کلکیر یا فاس۔ خنزاری اشخاص میں چھاتی کی علامات سے اول بدل کر اور ایسے لوگ جن  
میں موسم کی تبدیلی پر جوڑوں میں درد ہو۔  
کیلنڈر ولاوشن۔ ایک اونس پانی میں ایک ڈرام کاوشن بنا کر مقعد پر لگایا جائے۔  
جریان خون۔

ایما میلس۔ جب گہرے رنگ کا خون پاخانے کے ساتھ خارج ہو بغیر کسی تکلیف کے۔  
فاسفورس۔ جب گیس کے اخراج کے ہمراہ خون خارج ہو۔  
لیکسس۔ جب حیض کے دوران خون خارج ہو۔  
امونیا کارب۔ پاخانے کے بعد خون خارج ہو۔

سینگونیریا۔ انٹروں سے خون کا اخراج جو جوکھوں کے لگانے بعد خارج ہو۔  
ناٹرک الیڈ۔ جب مقعد سے بغیر کسی خاص وجہ کے خون بہان کیلئے پولکی ادویات ہیں۔  
میوٹرک الیڈ۔

کر دے گا۔ جب خون سیاہ لیسڈار لوتھر سے دار نکلتے والے سوراخ سے سیاہ تاروں کی تھوڑی لکڑی  
 ٹیڑھ بن جاتا۔ مقعد سے خون اور بوائیسی خون بہے۔ پیشاب میں البیومن اور خون ہو۔ پیشاب شدید  
 بدبو دار آنتوں کا ناسور۔

## آنتوں کا ناسور

ایسٹیک الیڈر۔ خونی پانچنے یا خالص تیلے خون کا بہنا۔ بوائیسی وجہ سے بہت زیادہ خون ہے۔

## بوائیسی

سلفر۔ جب بیلن دار درد اور قبض پانچانہ کی لا حاصل حاجت ہو۔ خونی یا بغیر  
 نکس و امیکا { خون کی بوائیسی کے لئے چوٹی کی ادویات ہیں۔ گندھک ۱۰۰۰ طاقت بہراہ ایک غولہ ۵۲  
 کے لئے دو دن پہلے اور دو دن بعد کوئی دوائی نہیں دی جانی چاہیے۔ باقی دنوں میں نکس و امیکا ۲۲۰  
 دن میں تین مرتبہ دی جائے۔

ہیما میلس۔ بلا تکلیف خون بہے جس سے بہت زیادہ کمزوری ہو خون کے بہاؤ کے مقابلہ میں  
 خون گہرے رنگ کا۔ کئی خون سانس کا آنا کمزوری اگرچہ معمولی اچھی لگے۔  
 میو کونا۔ خونی بوائیسی کے لئے ایک غولہ ایک قطرہ مخصوص ہے۔ دن میں دو یا تین غولہ کیں دو تین دن  
 میں بیماری کو قابو کر لے گی۔

فائیکس ریل۔ اگر میو کونا ناکام ہو جائے تو یہ ایک اور دوائی آرام کر دے گی۔  
 ایسٹیک الیڈر۔ آنتوں سے شدید خون بہے خون کے رگ جانے سے یا کسی طریق سے۔  
 نائٹرک الیڈر۔ جس بوائیسی میں خون بہنا بند ہو گیا ہو، لیکن درد بہت ہو تا ہو اور اسے مستقیم  
 نیچے لگ گیا ہو۔ اس میں سوئی چھٹھ جیسی درد تیز ہوتی ہو۔

کلکیر یا کارب۔ مٹے باہر نکلتے ہوئے چلنے پر شدید تکلیف دینے پر افاتہ پانچانہ کے وقت  
 بہت درد ہو اور خون بہے۔

فاسفورس۔ ہر پانچانہ کے بعد باریک دھار میں خون بہے۔

کالی کارب۔ بوا ایرس پر درد۔ انگ کی طرح جلن اور بہت زیادہ خون ہے۔ اندر بہت زیادہ  
تناؤ اور سوزش۔ مقعد کا ناسور۔ ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے سے ٹھنڈی پٹیاں لگانے سے وقتی  
طور پر افاقہ ہو جائے۔

ایلو۔ جب پانی کے تلی کی طرح خون ہے بوا ایرس کے سر کے انگوٹھے کی طرح باہر نکلیں۔  
ٹھنڈے پانی سے افاقہ۔ پانخانے کے ساتھ ہوا خارج ہو۔ مقعد میں شدید خارش اور جلن اس لئے  
متواتر مقعد میں انگلی ڈالے رکھے یعنی انگلی ڈالے خارش کرتا رہے۔ مدام لگنے سے جلن زیادہ ہو۔  
میوٹرک لیٹڈ۔ بوا ایرس انگوٹھے کی طرح جو بیگنی رنگ کے ہوں اور چھوٹے پر چلیں۔  
بچوں میں بوا ایرس باہر نکلنے والی سرخی مائل نیلی۔

سینگلو نیر یا۔ انٹریوں سے مسلسل خون پانی کی طرح بہے۔  
اگنیشیا۔ اندھی بوا ایرس کھڑے یا بیٹھے ہونے پر درد کرے۔ درد میں چلنے پر افاقہ ہو۔  
امعائے مستقیم میں تیز دبانے والے درد۔

لیکس۔ جب بوا ایرس سوزش زدہ ہو، ہتھوڑے لگنے جیسے درد۔  
ایلو منا۔ شام کے وقت بوا ایرس میں تکلیف رات کے وقت آرام کرنے پر افاقہ۔ خون کے  
بوٹھے مقعد میں سے نکلیں۔ پانخانہ گروہ دار بھڑکی میگنیول جیسی مقعد میں کاٹنے والی تکلیف  
جس کے بعد خون ہے۔

ایسیکوسس پرپ۔ پر درد اندھی یا باہر نکلنے والی بوا ایرس۔ بیگنی رنگ کی مسلسل درد کے پہلے  
بہت دیکھیں۔ جلن اور خارش امعائے مستقیم میں چفتیوں اور ککڑیوں کے گھٹے ہونے کا احساس  
شاذ و نادر خون ہے۔ سخت خشک پانخانے جو مشکل سے خارج ہوں اور اس کے بعد امعائے مستقیم کے  
باہر نکلنے کا احساس۔ کمر اور کولہوں میں درد۔ خون بہنے سے درد کو افاقہ ہو۔

ایپس۔ تیز ڈنگ لگنے جیسی درد جس کو ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افاقہ ہو۔  
آرمینکلم البرم۔ جلن درد اور بے چینی جس کو گرم چیزیں لگانے سے افاقہ ہو۔  
کاسٹیکیم۔ ناقابل برداشت درد والی بوا ایرس جس کو چلنے سے زیادہ ہوا۔

ڈال سکویا۔ بوایسرا انگوڑ کے گچھوں جیسی نظر آئے جس در در جگر تک جائے۔

پنی اونیا۔ ناسور کے ساتھ بوایسر۔ مقعد اور اس کے ارد گرد کے چھ بیگنی رنگ کے اچھوں یا ہتھوں سے پھرے ہوئے ہوں۔ مقعد کے اندر ناسور بہت در در والے تمام بلغمی پھٹی ناسور اور چیلوں سے بھری ہوئی۔ کاٹنے والے در در مقعد میں خارش جو کھرتے پر چبوا کرے۔

پوڑو فائیکم۔ زچگی کے بعد بوایسر اور بوایسر اور مقعد کا خروج۔ جگر میں اجتماع خون اور قبض۔ پلنڈرا۔ بیرونی بوایسر امعائے مستقیم کے باہر نکلے کے ساتھ۔ خونی بوایسر۔

رٹا کس۔ اندھی بوایسر ہر بار پاخانے پر باہر نکلے، مکر در در اور امعائے مستقیم میں بوجھ گیا تھا۔ کیلکٹس جی۔ خونی بوایسر۔ دریدوں کے سروں کے موٹے ہرنے کی وجہ سے گوڑے بن جائیں۔ جن میں سے کافی مقدار میں خرن نکلے۔

کالسنوینا۔ مکر در در اور خدی قبض کے ساتھ بوایسر۔ امعائے مستقیم باہر نکلے۔ خونی بوایسر یا اور باہر نکلے۔ قبض اور اسہال ادل بدل کر ہو سکتے ہیں۔

سیلیگ۔ مقعد میں زبردست خارش کے ساتھ بوایسر گھٹنوں کی خیشیوں میں دوکھن اور در در۔ امونیا کارب۔ پاخانے کے بعد بوایسری مئے باہر نکلیں بہت زیادہ دیر تک رہنے والی در در چل نہ سکے۔ بغیر پاخانے کے بھی بوایسری مئے باہر نکلیں۔ جلن اور خارش مقعد میں جو کرنے نہ دے۔ حیض کے وقت بوایسر بہت ہی زیادہ ہو۔

کیسپیکم۔ بوایسری مئے۔ جلن دار۔ موبے ہوئے۔ خارش والے مقعد میں نیکن دار دوکھن۔ خون ہے یا بغیر۔ خون بہنے کے۔ رطوبت کا اخراج کے پہلو۔ موٹے لوگوں میں جو آسانی سے تھک جاتے ہوں۔

کارلو بوتیج۔ باہر کو نکلے ہوئے نیلے مئے۔ پیپ بھی ہے۔ بدبودار، موبے ہوئے امعائے مستقیم میں سے رطوبت رے گیس۔ سر میں اجتماع خون پر تکلیف زدگی کی وجہ سے ناک سے خون ہے۔

مرک سال۔ اسہال اور پچیش کے ساتھ۔

جیلسمیم۔ فالج سے۔

## ہائپرکیم - خونی بلاسر - درد اور رکھن کے ساتھ - امعاء مستقیم یا ریگیم کی سوزش

آگنیشیا - رکنے والی درد، گولی لگنے کی طرح کے درد اور دیگر درد -  
کیپسکیم - انتڑیوں کی سوزش - جلن اور شدید درد -  
فاسفورس - بھلا لگنے جیسی گولی لگنے جیسی دردیں متعدد جلن کے ہمراہ -  
ایلو - { حاد کیسوں میں ترتیب سے استعمال کرائی جائیں -  
پروڈو فائلم - نیم حاد کیسوں میں بہت زیادہ ظہور کے ہمراہ -  
کالچیکم - مزمن کیسوں میں جب تنگ ہونے کا احساس -  
ٹائٹرک ایسڈ -

## بدبودار - امعاء مستقیم میں درد یا ریگیم ہیں درد (دیکھئے بدبودار پاخانہ)

روٹا - پاخانے کے بعد درد - یہ کئی گھنٹے بعد تک جاری رہے ۹ طاقت میں دیکھئے -  
ٹرنہیا - جیروں کی وجہ سے پاخانے کے بعد جلن دار دردیں جو کئی گھنٹے جاری رہیں -  
ٹراکس - پیشاب کرتے وقت متعدد درد ہو -  
میوٹرک ایسڈ { امعاء مستقیم میں جلن دار درد -  
ٹائٹرک ایسڈ {

ایلو ایس { اسہال کے دوران درد اور گیس کے بعد درد -  
سلفر {

کیپسکیم - پیچش کے دوران درد -  
کاسٹیکم - امعاء مستقیم میں درد چلنے کے دوران -  
آگنیشیا - تیز دردیں جو امعاء مستقیم میں اوپر کو جائیں -

گو مڑ۔ بوا سیر (دیکھئے بوا سیر)

میو کو کیم۔ امعائے مستقیم میں گو مڑ۔  
امعائے مستقیم کا باہر نکلنا یا نکل جانا۔

دیکھئے امعاء مستقیم کی سوزش۔

ایلو الیس۔ اسہال کے ساتھ خون ہے اور امعاء مستقیم کی سوزش۔

لوڈ و فاسلم۔ ہر پاخانے کے بعد یا اچانک حرکت پر اسہال کے چھینکیں خاص طور پر صبح کے وقت۔

گیمبوجیا۔ سبز یا زرد اسہال کے ساتھ جلن دار دریا سخت لاکافی پاخانہ اور پاخانہ کی شدید سوزش۔

میوڑیک الیڈ۔ پیشاب کرتے وقت امعائے مستقیم کا خروج اور بوا سیری مسوں کے ساتھ۔

روٹا۔ زچگی میں باز چگی کے بعد یا پاخانے کی معمولی کوشش کے ساتھ۔

بیلادوننا۔ امعائے مستقیم کے نکلنے کی چوٹی کی دوائی ہے۔ پیٹ میں زبردست تناؤ۔ اور

امعائے مستقیم کے نکلنے کے ساتھ اسہال۔

اگنیشیا۔ امعائے مستقیم کا نمایاں طور پر خارج ہونا۔

ایسکولس ہرپ۔ پاخانے کے بعد خروج مقعد بہت سے بڑے بڑے متے امعاء مستقیم کو

بند کر دیں۔ جلن دار بوا سیر چاقو چٹنے جیسے درد۔

## سپازم

کالی بائیکرومیکم۔ امعاء مستقیم کا تشنج۔ پیشاب والے راستے میں درد عامعت یا مباشرت کے بعد۔

نکس مارکٹا۔ منہ کی خشکی کی وجہ سے نرم پاخانہ خارج کرنے میں بھی مشکل پیش آئے۔

بردقت نیند آئے۔ آسانی سے سیہوش ہو جائے۔

چائٹنا۔ بوا سیری رحجان والے مریضوں میں نرم پاخانہ خارج کرنے میں بھی مشکل پیش آئے۔

دیر تک رہے۔ درد اور کمزور۔ پیٹ تنا ہوا اور گیس۔ کافی دوا کر گیس خارج ہو لیکن افادہ نہ ہو۔

سار سپرٹلا۔ پاخانے کے ساتھ خون ہے۔ پیشاب کی زیادہ حاجت۔ یادداشت کی کمی۔  
پیشاب گاڑھا۔ بادلوں کی طرح کا البین والا۔

سلیشیا۔ دباؤ والا۔ خواہش زیادہ صحت و طوبت خارج ہو یا سخت پاخانے مشکل سے

خارج ہوں۔  
امعائے مستقیم کا بند ہو جانا۔ یا گھٹن

تھیں سینا میں۔ امعائے مستقیم میں گھٹن یا بند ہو جانا۔

نایٹرک ایسڈ۔ کینسر کی وجہ سے یا سادہ گھٹن۔

ہائیڈرائٹس۔ کینسر کی وجہ سے گھٹن ۹x طاقت میں دبیجئے۔

رڈنا۔ جب ہائیڈرائٹس ناکام ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔

پاخانے پر دباؤ۔ پاخانے کی بار بار حاجت

مرک کار۔ نہ ختم ہونے والی حاجت بہت ہی پریشان کرنے والی۔

ایلوئیس۔ پاخانے کا دباؤ قابو نہ کی جانے والی پاخانے کی خواہش۔

بیلادونا۔ پاخانے کی خواہش لیکن پاخانہ نہ آئے یا بہت تھوڑا آئے۔

اگنیشیا۔ اگر پاخانے کا بہت دباؤ ہو لیکن پاخانہ نہ آئے۔ امعائے مستقیم باہر نکل آئے۔

نکس و امیکا۔ اکثر خواہش لیکن پاخانہ نہ آئے۔

پلوڈون فاسلیم۔ دباؤ ڈالنے پر آسانی سے مقعد کا خروج۔

سلفر۔ امعائے مستقیم پر متواتر بوجھ۔ پاخانے پتلے۔ ریم یا پیپ والے غونی یا قبض دار

پاخانے سے پہلے یا بعد میں دباؤ ڈالیں۔

کرم۔ چمڑے۔ کدو دانے

سینا۔ یہ دھاگے جیسے گول یا کدو دانے نکالنے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ جب مریض ملت

پیسے ۹ طاقت میں دی جائے۔ مریض بے چین متواتر تاک کوئے۔ بھوک بالکل نہ ہو یا بہت زیادہ ہو کمزوری کی وجہ سے تشنگ یا اینٹھن کو دور کرتی ہے۔ اس سلسلہ میں ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں دی جائے۔  
 ابرو میٹم۔ ٹیپ درم شدہ بھوک کے ہمراہ رات کو جگا دیں۔ یعنی رات کو بھوک کی زیادتی کی وجہ سے مریض کو تھکائے  
 چینیو پوڈیم { خاص طور پر بکب درم کے لئے موزوں ہے۔  
 تھائیمول۔

کوسو۔ ٹیپ درم نکالنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔  
 فائیکلس ماس۔ ٹیپ درم نکالنے کے لئے شاندار دوائی ہے خاص طور پر قیض کے ہمراہ۔  
 انتھرم۔ ٹیپ درم شدید بھوک کے ہمراہ رات کو جگا دیں یعنی رات کو بھوک کی زیادتی کی وجہ سے مریض تھک جائے۔  
 مسٹوٹین۔ جب سنا ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔ سنا اور مسٹوٹین اکثر کیلکس کو ٹھیک کرتے ہیں۔  
 یہ ۲۷ طاقت میں ہر دو گھنٹے کے بعد دن میں ۶ دفعہ دی جانی چاہیے۔

کیلیڈیم۔ جب سیون بر درم پلیس پھریں اور بھوٹی پتھریوں کے فرج میں  
 ٹوکریم۔ چھوٹے بے اور گول کریم جب اعلاے مستقیم میں ہیجان ہو۔ مڈکچر یا ۹ طاقت میں دیجئے۔  
 سنا پلیس نائیگرا۔ بن درم کے لئے ایک اچھی ادوائی ہے جب ٹوکریم ناکام ہو جائے تو یہ دوائی استعمال کرائی جائے۔


سپائیکلیا۔ بھینگاپن۔ بھرے کی زردی کے ساتھ جھکے۔ آنکھوں کے نیلے حلقے۔ جی تھلانے  
 کے ساتھ خشکی۔ درد قویغ ناف کے قریب کمزوری کی وجہ سے۔ دمال پر مڈکچر منوگھمانے سے اکثر  
 کمزوری کی وجہ سے اینٹھن کو دور کر دے گا۔

سٹانم۔ یہ دوائی کمزوری کو بیہوش کر دیتی ہے جن کو مہلاب دینے سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔  
 زرد دھنسا ہوا جہو اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔ سست طبیعت۔ عام طور پر بے حس بدبودار ماس  
 اور معمولی بخار۔ مریض صدمہ کی پریشا پسند کرے۔  
 کلگیر یا کرب۔ خازری موٹے۔ زرد بھمی مزاج۔ سرگرم اور رات کو پسینے آئیں ایسے بچوں کیلئے مفید ہے۔  
 ٹیلیوریم۔ یہ تھریڈ درم کو خارج کر دیتی ہے۔

کیوپریم ایک ڈیٹیم ٹائیگریم - ہر قسم کے کمروں کے لئے شاندار دروائی ہے۔ یہ عورتوں اور بچوں میں دی جاتا ہے۔  $9 \times$  طاقت میں نکس وایکا  $20 \times$  کے ساتھ اول بدل کردن میں چار بار پانچ مرتبہ جارہا ہے۔ ہفتہ تک دی جائے۔

نیرٹرم فاس - انتڑیوں کے لیے۔ گول یا تقریباً درم ناک کھجکھانے پر اور گنٹھیا کے رحبان کیساتھ۔ ٹیڑھ بٹھنا۔ مقعد میں جلن اور کٹیروں کے چلنے کا احساس جیسے کہ درم باہر آگئے ہوں اور یہ گول اور ٹیپ درم خارج کر دیتی ہے۔

سلفر - ٹیپ درموں کے لئے چوٹی کی دروائی ہے۔ یہ کافی لمبے عرصہ تک دینی چاہیے۔ مسکریں نہم۔ جب سنا اور ٹوکریم درم نکالنے میں ناکام ہو جائے تو یہ مدد دیتی ہے۔



دسواں

باب

پیشاب کے نظام

کی بیماریاں

پیشاب ، مشانہ

گر دے

## پیشاب میں جراثیم

’مقہوجا۔‘ پیشاب میں جراثیم کے لئے مخصوص ہے۔ ہر منقہ ایک لمب طاقت میں دبیجے جب انافق شروع ہو جائے تو دفعہ ایک ماہ میں ایک خوراک تک مٹھا دیا جائے۔  
فاریکا۔ پیشاب کے لئے بہت موزوں دوائی ہے۔ رات کو بہت زیادہ گدلا اور گندی بو والا پیشاب آئے۔

بیسلیس۔ کولائی x ۲۰۔ جراثیم کے نمایاں کیسوں میں مفید ہے۔  
میتھلین بلیو۔ بخار کے کیسوں میں۔ کان کے مھول کی سوزش میں۔ نڈیان اور پیشاب میں پیپ۔ گردوں کی سوزش۔ سبز رنگ کا پیشاب۔

اکنیشیا۔

## گردوں کی سوزش

اکونائٹ این۔ جب ٹھنڈی زمین پر بیٹھے یا لیٹے سے یا پسینے کے اچانک دب جانے سے یا ٹھنڈ لگ جانے سے بے چینی۔ پیاس، سردی اور پیشاب کا اچانک دب جانے سے۔  
ایپس ایم۔ گردوں کی سوزش کے حاد کیس، بغیر پیاس کے۔ اس میں چہرے اور ہاتھ پاؤں پر سوزش اور استفاد۔ سرکرازوں اور گردوں میں درد پیشاب اکثر لیکن کم مقدار میں۔ پیشاب میں البیون، گھٹن کا احساس اور مشکل سے سانس لے، بھولا ہوا سانس۔ دباؤ ڈالنے پر گرٹھا پڑے تمام علامات گرمی سے مٹیں۔ اور ٹھنڈک سے کم ہوں۔ چھوٹی طاقت میں دینے سے بہترین کام کرتا ہے۔  
میلی بوریس۔ گردوں کی سوزش کی وجہ سے استفاد۔ پیشاب کم اور گہرا۔ پیشاب میں زہر سبز۔ بہوشی کے ساتھ تپان بھیلی ہوئی اور ردھنی کے لئے بے حس۔ انٹیٹھن۔ جسم سے پیشاب کی سختی۔  
دماغ سے اخراج نمایاں علامات ہیں۔

آرمینیکم البم۔ گردوں کی سوزش کی وجہ سے استسقاء۔ پیشاب کم اور گہرا پیشاب میں زہر۔ گردوں کی سوزش کی تمام حالتوں کو کنٹرول کرتی ہے جب پانی جیسے اسہال۔ زرد جلد موم جیسی ظہر حالت۔ پیشاب میں کثیر مقدار میں بھلیاں اور البیومن آئے۔ حقوڑے حقوڑے وقفے پر حقوڑے حقوڑے ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ گرمی کی خواہش۔ بے چینی۔ چہرہ کی سوجن۔ سخت اذیت۔ موت کا ڈرائیمن۔ کینائلس ٹائیوا۔ پیشاب کی نالی پیپ اور مواد سے بندش۔ پیشاب گدلا۔ سرخی نابل قطره قرہ پیشاب آئے۔ پیشاب کی نالی میں سوئی لگنے جیسی درد اور جلن۔

کالی کلور۔ گردوں کی شدید سوزش۔ کم مقدار میں گہرا البیومن بلا پیشاب جس میں بھلیاں ہوں۔ کلکیر یا سلف۔ کمی خون جس میں لاغری اور ناخوشی بڑھے۔ پیشاب میں پیپ، پیشاب کے دوران جلن۔ پیپ کا کافی تناؤ۔ نزلہ دی سردرد۔

مرک کار۔ بڑے سفید گڑے میں منظر ہوتی ہے۔ پیشاب مقدار کم اور سرخ البیومن اور بھلیوں کے ساتھ۔ حمل کے دوران سوزش گردہ۔ پیپ والی سوزش گردہ حمل کے پانچویں سے ساتویں ماہ میں پاؤں پر سوزش۔

پیکرک الیڈ۔ پیشاب میں خون کو لال رنگ دیتے والے مادے کی موجودگی پیشاب میں انگلیں دانے اور روغنی اجزاء آتے ہیں۔ گردوں کی سوزش شدید کمزوری کے ہمراہ۔ گہرا۔ خونی۔ کم مقدار میں پیشاب۔ رات کو پیشاب زیادہ آئے۔

فاسفورس۔ پیشاب میں خون کو لال رنگ دینے والے مادے کی موجودگی پیشاب گدلا بھجورا۔ سرخ تلچھٹ اور خون کے ساتھ۔

کینتھرس۔ پیشاب میں زہر کا توہم جس کے ساتھ تکلیف کا احساس ہو۔ پیشاب کاکم ہو جانا بے چینی کے ہمراہ، چہرہ سرخ۔ آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوں۔ پیشاب خارج کرنے کی خواہش لیکن پیشاب نہیں ہوتا بلکہ غالی ہوتا ہے۔ شامہ میں نہیں ہوتا۔ سوخ بخار یا خناق کے استسقاء، پیشاب کا عمل تکلیف دہ ہو، صرف چند قطرے ایک وقت میں آئیں۔ پیشاب بہت گرم اور خونی۔ ڈیجیٹلیس۔ گردوں میں دانے اور تنزیلی دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ سٹ نبض۔

نیر بنھنا۔ گردوں میں اجتماع خون کے ابتدائی دور میں خونی پیشاب ہو۔ یورٹرا اور اس کے نیچے کی طرف تکلیف جائے۔

پلیم۔ گردوں کی دانے اور تنزی دل۔ گنٹھیاوی گردے۔ زرد۔ پھولا ہوا۔ وزنی دکھاوا۔ قبض۔ البیومن۔ گردے ٹکڑے ہوئے۔

بنسرواک الیٹڈ۔ گردوں کی دردیں جو تیز اور شدید ہوں جو کمر سے نکلیں اور چھاتی تک جائیں۔ پیشاب گہرا اور شدید۔ امونیا کی بو والا۔ بو بہت ہی خفیفے والی۔ گردوں کی سوزش گنٹھیا نما لیاں علامات ہیں۔

مرکیورس سائینٹ۔ پہلے اور دوسرے درجہ کے لئے شاندار دوائی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں۔ گہرا۔ البیومن والا۔ گردوں کی نالیوں میں درد۔

ایپورائٹم۔ استقامتی حالت، پیشاب کم اور پیاس۔ ایپس میں پیاس نہیں ہوتی جس کے ساتھ اس دوائی کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے حمل کے دوران سوزش گردے میں بے ہوشی اور لٹھن ہوتی ہے۔ ویسکیریا۔ درد گردے۔ گردے میں اعصابی درد۔ پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔ پیشاب کی نالی میں جلن اور شازہ میں ہیجان۔ ایک رات میں تقریباً تین دفعہ پیشاب کی حاجت ہو۔ سوزاک اینٹوں جیسی لمبھٹ، پیشاب میں، تکلیف دہ پیشاب، پیشاب میں پیپ۔ البیومن اور خونی پیشاب استقامی میں۔

کالچیکیم۔ پیشاب میں البیومن جو سیاہ ہو جائے۔ پیشاب کم استقامتی سوجن کے ساتھ گردوں کی سوزش حاد قسم کی۔

سولید گیو۔ تھوڑا سا چھونے سے بھی گردوں میں درد جو گردوں سے پیٹ شانہ اور نیچے شانہ اور نیچے ٹانگوں تک جائے۔ پیشاب سُرخ، بھورا، کم، گاڑھا۔ بمشکل آئے۔ البیومن والا۔ مواد۔ فاسفیٹ والا پیشاب۔ ۲ یا ۹ طاقت میں دیجئے۔

لائیکو پوڈیم۔ جب پیشاب کے سُرخ ذرات ریت آئے، گردوں کی سوزش اور استقام کے ساتھ۔

ایسڈ ٹائٹرک - جب گردوں کی تکلیف کے ساتھ کان سے زردی مائل سفید رطوبت ہے  
پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب جیسی بو آئے۔  
آرسینک بروم - جب شوگر کے ہمارہ البیون خارج ہو۔ جب لمبیم ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔

## پیشاب کے راستے میں پتھری سنگریزے و پتھری

بریمس ولگیرس - گردوں کے درد کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ خاص طور پر جب درد بائیں  
طرف ہو، گردے سے پیشاب والی نالی تک بڑھے۔ پیشاب کی خواہش کے ساتھ۔ دائیں طرف  
کی بھی ایسی ہی علامات کو ٹھیک کرتی ہے۔

اویمیم کین - سخت اور بل کھلانے والی یا بیچ ذراب کھلانے والی تکلیف جس کی وجہ سے  
مریض بلبلائے اور ٹرپے۔ سرخ پیشاب اینٹوں جیسی لمچٹ کے ساتھ یا سفید لمچٹ پیشاب  
گدلا۔ سرخ اور غنی۔

لائیکو پوڈیم - مزمن کیسوں میں جب عادت تکلیف مرک جائے۔ پیٹ میں ہوا خاص طور دائیں  
جانب پیشاب میں سرخ ریت کے ہمارہ۔ یہ ۳ طاقت میں صبح و شام دو خوراکیں ۲ ماہ تک بخائیں۔  
چائنا سلف - جب اینٹوں جیسی لمچٹ یا ہلکی زرد لمچٹ پیشاب میں ہو۔

سارمیرلا - سفید لمچٹ کے لئے پیشاب کرنے کے فوراً بعد کبھی مٹی جیسا گولا ہو جائے  
پیشاب کے آخر کار میں بہت تکلیف ہو۔ پیشاب کم لیسدار اور جھلیوں والا۔ شانہ میں اینٹیں۔  
پیریرا، بریوا - جب اور تمام ادویات ناکام ہو جائیں اسکی مدد کچھ کے پانچ قطرے فی  
کے تین بار دن میں دیئے جائیں۔

کلکیریا کرب - گردوں کا درد جب پتھری لورک ایسڈ کی وجہ سے بن رہی ہو۔  
آرٹیکا یورنٹس - گردے میں پتھری، پیشاب گاڑھا۔ یہ گردے سے پتھری اور کنکر یا سنگ  
منڈ کو مٹا دیتی ہے۔

نیرم فاس - پتھری بننے سے روکتی ہے۔ چونے کے اگزیٹ کو حل کر کے معلول بناتی ہے۔

اور جگر کو سخت نہیں کرنے دیتی۔ ۹x طاقت میں دن چار بار دیکھئے۔

**ٹیسٹیکٹھنا**۔ گردوں کے علاقہ میں شدید کھینچنے والے درد۔ پیشاب میں شدید جلن اور اور کٹھنٹھنے والے درد۔ پیشاب کی نالی میں جلن۔ پیشاب میں خون اور البیومن اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ گردے کی پتھری بننے سے روکتی ہے۔ اور اس کو گھٹلا دیتی ہے یا مل کر دیتی ہے۔ یہ ایک۔ ایم طاقت میں دی جانی چاہیئے۔ پیشاب سرخ۔ مجبوراً سیاہ یا دھوئیں کے رنگ جیسا۔ سیلا ڈونا۔ گردوں کے علاقہ میں گولی لگنے جیسے درد۔ پیشاب کی نالی کے ساتھ جس میں سے پتھری جاری ہو۔

**ڈائسکوریہ**۔ سخت ازیت۔ خشک اور اینٹھن دار دردی۔ گردے کی پتھری کے اخراج کے ساتھ پیشاب کی نالیوں کی گھٹن۔ اینٹھن ناف کے قریب۔ درد جس کو دبائے سے افاقہ ہو۔

**کینتھرس**۔ گردوں مثانہ اور پیشاب والی نالی کی سوزش۔ تیز پھارنے والی اور چھنے والی درد۔ گردے میں پیشاب شکل میں خارج ہو۔ قطرہ قطرہ پیشاب خارج ہو۔ ہائیڈینجیا آریورز۔ پتھری کو توڑنے والی دوائی۔ خونی پیشاب قطرہ قطرہ پیشاب میں سفید سفوف رابطہ رکھتا ہو۔

**ملی فوکیم**۔ مثانے میں پتھری، پیشاب نہ آئے یا رک جائے۔ خونی پیشاب۔ کاسٹیکم۔ شدید تکلیف جو گردے سے خیموں تک جائے۔ سوتے وقت درد کا حملہ ہو۔ پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔

**ورم مثانہ**۔ (دیکھیے پیشاب)

**اکونائٹ نیپ**۔ حاد کیوں میں سخت بخار۔ جلد خشک۔ پیاس۔ ڈر۔ بے چینی مثانہ میں متواتر جلن دار تکلیف۔ پیشاب تکالیف سے آئے اور بمشکل بچے چھین اور آلت ناسل کو مضبوطی سے پکڑیں۔

ایپس ایم۔ مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کے کیس زیادہ ٹھیک کئے ہیں۔ پیشاب کم گدلا اور غونی۔

کینتھرس۔ شانہ میں ناقابل برداشت درد۔ تشنجی درد۔ پیشاب کی نالی اور سیون کے ساتھ ساتھ جو خفصیوں تک جائے جو اوپر کو کھینچے جائیں۔ سر زکر، خفص یا سپاری میں جلن۔ پیشاب والا سوراخ سرخ۔ پیشاب بکشل آئے۔ قطرہ قطرہ آئے۔ پیشاب سے پہلے، دوران میں اور بعد میں شدید جلن اور دباؤ۔ پیشاب کم اور غونی تکلیف دہ خیزش۔ بے چینی۔ بخار کے ہمارے پیاس لیکن پانی کا دیکھنا یا پینا ہر قسم کی تکلیف کو بڑھاتی ہے۔ حاد اور متعدی کیسوں کے لئے زود اثر ہے۔

ڈولکامار۔ سردی لگنے کی وجہ سے شانہ کا زلزلہ کام ٹھنڈے موسم میں۔ پیشاب کرنے کی مستقل حاجت پیٹ میں گہری محسوس ہو، شانہ اور پیشاب کی نالی کا نیچے کی طرف ناپسندیدہ دباؤ کا احساس پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جائے۔ پیشاب کم۔ بدبودار گدلا تیل نا جس میں سخت جلی کی طرح بھند یا سرخ مواد جو خون کے ساتھ ملا ہوا ہو پیشاب دودھیا۔ بدبودار یا مواد اور سپ ملا۔ سرخی نال جلدار۔ قطرہ قطرہ خارج ہو لیسڈار تلچھٹ۔ بہت سے بوڑھے لوگوں نے جن میں شدید سوزش شانہ ہو لیکن پروٹینٹ غدد بڑھے ہوئے نہ ہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔

ٹیپینٹھنا۔ بہت ہی غونی قسم کا پیشاب جس کا گارھی لیسڈار، گارھی کچڑ جیسی تلچھٹ۔ ایکویریم۔ بہت ہی رنگدار اور کم پیشاب جو درد کے ساتھ بار بار خارج ہو مواد دھمی تبھٹ پر۔

بریریس ونگرس۔ گارھے مواد کے ساتھ پیشاب چمکدار سرخ گوشت جیسی تلچھٹ۔ کوپیویا۔ مزمن سوزش شانہ خاص طور پر عورتوں میں استسقاء میں پیشاب کا بند ہو جانا۔ پیشاب کرنے کی لا حاصل متواتر کوشش۔

## اپنی جگہ سے ہلے ہوئے گردے۔

کلکیر یا آئیوڈائیڈ۔ سب سے پہلے آزمائی جائے۔

سیسیا۔ اگر کلکیر یا آئیوڈائیڈ ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔  
گردے کی پیلوئس میں رکاوٹ کی وجہ پیشاب کا جمع ہو جانا۔

پلمبم { پلمبم چوٹی کی دوائی ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے  
آرسینک { تو آرسینک الیم دی جائے۔

### ورم گردہ

دیکھئے سوزش گردہ۔ پیشاب میں نقصان دہ مادہ کارہ جانا جو کہ عام طور پر گردے خارج کر دیتے ہیں جبکہ وجہ سے پیشاب کم۔ اینٹھن اور بیہوش ہو سکتے ہیں دسوزش گردہ بیلادونا۔ پُر خون اور تندرست مریضوں میں جب گردہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پیشاب گہرا اور گدلا ہوتا ہے۔ پٹھوں کا شدید اینٹھن کے ساتھ پھپر پھڑانا۔ ہسلی بورس۔ بیہوشی کے ساتھ یوریمیا۔ پتلیاں کھلی ہوئی اور روشنی سے متاثر نہ ہوں۔ اینٹھن یا تشنج جسم سے پیشاب کی شدید موج۔

کینتھرکس۔ یوریمیا کا تو ہم مسلسل ایذا یا تکلیف کے احساس کے ساتھ۔ پیشاب کا رنگ جانا بے چینی کے ساتھ۔ چہرہ متما یا ہوا۔ آنکھوں سے شعلے نکلیں۔ پیشاب کی زبردست خواہش لیکن کچھ بھی خارج نہ ہو مثلاً میں پیشاب نہ ہو۔

کیو پرم آرسینک۔ حاد کم کا یوریمیا، اہمال، بچوں کا ہیضہ اور بد ہضمی کے ہلکے۔ مریض شوگر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پیشاب اچانک کم۔ گہرا سُرخ اور لہسن جیسی بودا آتا ہے۔

آرمیکا یورنئس۔ پیشاب کی رکاوٹ کے ساتھ یوریمیا جس میں جسم سے پیشاب کی شدید بو آئے گرم پانی میں مد رنگہ کے پانچ قطروں کی خوراکیں دیجئے۔

پہنچم۔ نات پر کھینچاؤ کے احساس کے ساتھ یوریک میہوشی۔ پیشاب دبا ہوا۔ مثانہ میں پیشاب نہ ہو۔ چہرہ مردوں جیسا زرد۔ سانس آہستہ لے ایک اہم طاقت میں ایک ہی خوراک دیتے۔

ٹیرینٹھنا۔ اینٹھن اور جڑے کا فالج کے ساتھ یعنی دانٹوں کا بند ہو جانا۔ جو ہر پندرہ منٹ بعد ہو سکتی ہے شدید اینٹھن اور پیٹ کی خطرناک اگڑن کے ساتھ۔

## پیشاب کرنا۔

### جلن

کینتھرس۔ ایسا دگی کے بعد پیشاب میں جلن اور قطرہ قطرہ آئے، پیشاب کے بعد جلن۔  
سٹیف سگیریا۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن کو چھانے۔  
نیزم کارب۔ پیشاب کے بعد جلن۔

مرک سال۔ پیشاب کے شروع میں جلن دن رات ہر گھنٹہ پیشاب آئے۔  
بیلادونا۔ مثانہ میں شدید میجان پیشاب کرنے کی متواتر خواہش۔ پیشاب کی تمام نالی کے ساتھ جلن، شور سے متاثر ہو۔

سلفر۔ پیشاب میں جلن اور بلا ارادہ پیشاب ہو جائے۔  
ٹیرینٹھنا۔ پیشاب کی کمی کے ساتھ جلن۔ پیشاب کرتے وقت جلن۔ پیشاب کم اور غولی۔  
پلسٹیل۔ پیشاب سے پہلے جلن۔  
کلیٹیس۔ جب پیشاب کا آخری قطرہ بہت میجان اور جلن پیدا کرے۔

## خواہش

لیلمنگ۔ پیشاب کی متواتر خواہش لیکن مقدس کم۔ اگر پیشاب نہ کیا جائے تو چھاتی میں خون کے اجتماع کا احساس۔

ایکوزیٹم۔ متواتر پیشاب کرے۔ شانہ میں دردیسے کہ بہت بھرا ہوا ہو۔ پیشاب کرنے سے افاقہ نہ ہو۔ پیشاب کم کافی چپ ہو۔ بوڑھے لوگوں میں شانہ کے بھان کے لئے حیران کن دوائی ہے۔ لگاتار تنگ کرنے والی پیشاب کی خواہش جس کے بعد کم یا معمول افاقہ نہ ہو۔ مزین بھان شانہ کے لئے شاندار دوائی ہے۔ پیشاب کرنے کی شدید خواہش لیکن پیشاب کی تھوڑی سی مقدار خارج ہو۔

سلفر۔ چلتے پانی کو دیکھ کر پیشاب کرنے کی نہ رکنے والی خواہش ۱۔ ایم ٹی میں دیکھے۔ پیٹر ویلنیم۔ پیشاب کی زبردست خواہش اگر جلدی خارج نہ کیا جائے خود بخود نکل جائے۔ آرڈیٹم میٹ۔ پانے اور پیشاب کی زبردست خواہش۔ کوئیم۔ رحم میں درد کے ساتھ پیشاب کی متواتر خواہش۔ نیٹرم میور۔ پیشاب کی زبردست خواہش کم اخراج کے ہمراہ۔ تھوچا۔ پیشاب کی اکثر اور شدید خواہش۔ دھار کمزور۔ احساس کر پیشاب کی نالی میں ایک قطرہ رہ گیا ہے پیشاب کرنے کے بعد مندرجہ بالا علامات کے ساتھ جکڑ جی ہوں۔ لائیسین۔ چلتے پانی کو دیکھ کر پیشاب کی خواہش۔ کینتھرس۔ اگر لائیسین ناکام ہو جائے تو دما دی جائے۔ اینتھیم۔ پیشاب کی متواتر خواہش۔ پیشاب گہرا زرد۔ گھوڑے کے پیشاب جیسی تیز بو۔ سیٹفسگیر یا۔ نوجوان شادی شدہ عورتوں میں پیشاب کی لگاتار خواہش۔ اریٹج کو۔ ہر آدھ گھنٹہ بعد دن رات پیشاب کرنے کی خواہش۔ پیشاب کے دوران اور بعد میں جلن۔

## پیشاب تکلیف سے آئے۔

کینتھرس۔ جلن یا گرمی پیشاب تکلیف سے خارج ہو۔ قطرہ قطرہ خارج ہو۔ کوپیو یا۔ لگاتار لا حاصل پیشاب کی خواہش پیشاب کی نالی میں گھٹن قطرہ قطرہ

خارج ہو۔ عورتوں کے لئے مخصوص دوائی ہے۔ شلنے کی مزین سوزش۔

اگنیشیا۔ ہسٹرکل کیسوں میں پیشاب کا دباؤ۔

ایس میلفییکا۔ پیشاب کرتے وقت جلن اور دھن پیشاب کی زیادہ خواہش۔ صرف چند

قطرے پیشاب کم مقدار میں اور زنجین۔

کلیٹس۔ جب پیشاب کا بہاؤ پیشاب والی نالی کے اچانک تشنج کی وجہ سے رک پیشاب

کبھی کم کبھی زیادہ۔ پیشاب کا ایسا دار مواد لیکن پیٹ نہ ہو۔ سوزش کا آغاز ہو۔

کونیم۔ پیشاب اچانک رک جائے کچھ وقت کے لئے جاری نہ ہو۔

کیمفر۔ حاد کیسوں میں زہر یا ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے پیشاب تکلیف سے آئے پھوٹی

طاقت میں دیجئے۔

یئر بنیٹھنا۔ پیشاب تکلیف سے آئے کمزور رہو۔

میگنیشیا میور۔ پیشاب مرن پیٹ کے ٹپوں کو دبانے سے آئے۔

ساربریل۔ پیشاب کے بعد شدید تکلیف۔ پیشاب مرن کھڑے ہونے پر کر سکے۔ دیکھئے

پر مرن قطرہ قطرہ ہو۔ ہر نیندہ دن بعد ایک ایم طاقت کی ایک غور کر دیجئے۔

کینا بس انڈیکا۔ جلن۔ گرمی پیشاب سے پہلے۔ دوران میں اور بعد میں پیشاب کا دباؤ

اور خواہش لیکن پیشاب کا قطرہ بھی نہ آئے۔

چمائیلا امبیلیکا۔ پیشاب گرم اور جلن دار بعض اوقات بڑی دھار میں زور سے نکلے۔

بعض اوقات دھانگے جیسی دھار اور خاتمے کے قریب قطرہ قطرہ آئے۔

پروٹس پائٹوسا۔ پیشاب کرنے کے لئے آرتھرائس کو دباؤ پڑے۔ سرزد کر تک پیشاب بھتا

ہوا محسوس ہوا اور داپس ہو جائے اور پیشاب کی نالی میں تکلیف ہو۔

ہیپر سلفر۔ پیشاب رکا ہوا۔ پیشاب خارج کرنے سے پہلے انتظار کرنا پڑے اور تب آہستہ

خارج ہو۔ محسوس کرے کہ ہمیشہ کچھ پیشاب شانہ میں رہ جاتا ہے۔

نیٹرم میور۔ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں پیشاب نہ کر سکے عام گڑگاہ میں پیشاب نہ کر سکے۔

میوٹرکیم الیڈیکم۔ انٹرنیو کو ہلائے بغیر پیشاب نہ کر سکے۔

نکس و امیکا۔ پیشاب کا تشبیہ اسکاؤ۔ پیشاب کرتے وقت دباؤ ڈالنا پڑے۔ پیشاب کی بار بار حاجت اور خواہش۔ مثلاً بھرا ہوا اور پیشاب قطرہ قطرہ آئے لیکن جب وہ دباؤ ر لے یہ قطرہ قطرہ بھی رگ جائے۔

امبرگریہ۔ در سکر لوگوں کی موجودگی میں پیشاب نہ کر سکے۔ خونی پیشاب سرخ تلچھٹ کے ہمراہ۔ الیوٹنا سلیکیٹ۔ مثلاً نہ کی نالچی کمزوری۔ پیشاب کی لا حاصل کوشش۔ پیشاب کی نالی سے یسدرامادہ اور سیپ کا اخراج۔ پیشاب کے دوران جلن۔ پیشاب کرکھنے کے بعد شانہ میں تلی کا احساس نہ ہو۔

مرک معلق۔ پیشاب خارج کرنے میں تکلیف جو باریک دھار ہوتی۔ بعض اوقات دو حصوں میں۔ جلن دار بعض اوقات شانہ خارج کرنے میں کافی وقت لگتا ہے بعض اوقات آخر میں خون کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں۔

پیریرا۔ صرف گھٹنوں کے بل ہونے پر پیشاب خارج ہوزرنگی سے یا درہفتے بعد رنگ چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں پر ٹیک لگائے۔

لورکس۔ پیشاب پہلے پھر چلائے (بلغنی بھلی کی سوزش) گرم پیشاب آگ کی طرح جلے۔ الیوٹنا۔ اعلیٰ مستقیم اور شانہ کے فالج کی وجہ سے پاخانہ اور پیشاب آہستہ آہستہ آئے۔ پیشاب سے کافی دیر پہلے بیٹھنا پڑے۔ پیشاب خارج نہ کر سکے، تب کمزور دھار۔ جلدی سے پیشاب خارج نہ کر سکے۔ بعض اوقات پیشاب رگ جاتا ہے۔ یہ قطرہ قطرہ آتا ہے۔ جب پاخانے پر دباؤ ڈالے تو پیشاب نہ ہو یا بغیر دباؤ کے پیشاب نہ کر سکے۔

## بستر پر پیشاب کر دینا۔ بلا ارادہ پیشاب کرنا

کاسٹیکم۔ رات کے پہلے حصہ میں لاشوری طور پر بستر پر پیشاب کر دینا۔ جب ناک بہے۔ رات کے وقت جب ٹھنڈا ہو۔ کھانسنے کے دوران، ہستے وقت یا بھیجکے وقت۔ ٹھنڈے زیادتی ہو۔

شانے کے پھوں کا فالج جو پیشاب خارج کرنے پر اثر انداز ہوں جس کے نتیجے کے طور پر پیشاب  
رک جائے۔ پیشاب کے سوراخ کے پھوں کا فالج جس کی وجہ سے بلا ارادہ پیشاب پیشاب  
کی دھار کا احساس ہی نہ ہو۔

جلیسمیم - سر درد والے مریضوں میں رات کو بستر پر پیشاب کر دینا۔ جب کاسٹیکم ناکام ہو  
جائے تو یہ دوائی آرام دیتی ہے۔

پلسٹیکلا - پیشاب رات کے پچھلے حصہ میں کر دیں خاص طور پر گرم مریضوں میں جب کھانے تو بلا  
ارادہ پیشاب خارج ہو جائے۔ شریف الطبع - تبدیل ہونے والا ارادہ - کھلی ہوا میں جانے کی بڑی  
خواہش - چربی کو پسند نہ کرے۔ چڑچڑی طبیعت بے رنج - چھچک کے بعد بستر پر پیشاب کرنے کی عادت۔

سیدیا - زرد رو بیمار لڑکیوں میں بلا ارادہ پیشاب کا خارج ہو جانا۔ رات کے پہلے  
حصہ میں پیشاب کے لئے مخصوص ہے۔ بچہ جو نبی سوتا ہے وہ پیشاب خارج کر دیتا ہے۔ یا  
سونے کے دو گھنٹے کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔

رٹاکس - جب سکون سے مریض بیٹھا ہو تو پیشاب خارج کر دے جب چلے تو پیشاب  
رکنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔

برائی کو نیا - جب چلے تو پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہو جائے۔ جب چلے تو پیشاب رکنے  
میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ یہ چلتے وقت پہلے لیکن سکون سے بیٹھنے پر فاقہ ہو۔  
مائیکروسائیمس - پتلے پانی کی آواز سن کر بلا ارادہ پیشاب خارج ہونا ٹیفائیڈ کے بعد۔  
ایٹھن کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو۔

بنزرواک ایسڈ - نیند کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہورات میں کئی دفعہ پیشاب  
صاف نہ کیا جاسکے۔ یہ گارھے پیشاب کی طرح بوندے۔ کثافت اضافی کم ہو۔  
ایموننا - شانے کے فالج کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ ہے یہ رک جاتا ہے اور پھر قطرہ  
قطرہ بہہ جاتا ہے۔

کریوزوٹم - نیند کے پہلے حصہ میں جب نیند کی شدت کی وجہ سے بچہ کو جگایا جاسکے

بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے۔ مریض خواب میں دیکھ کر وہ ابھی طرح سے مزوں جگہ پر پیشاب کر رہا ہے۔

ایک نوٹ۔ بستر پر پلاٹ کے پیشاب اور پیشاب نہ آنے کے لئے دوائی ہے جب بستر پر پیشاب بغیر کسی قابل فہم درجہ کے نہ ہو سوائے عادت کے۔

انتھرم۔ چلتے وقت یا سوتے وقت بلا ارادہ پیشاب خارج ہو۔

آرٹیکلیم الیم۔ بلا ارادہ پیشاب حمل کے دوران میں یا زچگی کے بعد۔

اکونائٹ این۔ پیاس اور ڈر کے ہوا بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے

کلکیریا سلف۔ رات کے وقت بستر میں پیشاب خارج کر دے۔ ٹھنڈ میں اناتہ محسوس کرے

سلف۔ زرد۔ دبیلے پتلے بچے بڑھے ہوئے پیٹ والے جو صبحی اور مسالہ دار غذا کو بہت

پسند کریں۔ دھوئے جانے سے نفرت کریں۔ پیشاب خارج کرنے کی متواتر خواہش۔ چند قطرے

بلا ارادہ خارج کرنے کی خواہش۔ چند ایک قطرے پانی کے نل کو دیکھ کر باوجود کٹرول کے خارج

ہو جائیں۔ پیشاب کی ناقابل کٹرول خواہش۔

سورائیم۔ ایک عمل انگیز کے طور پر دوائی جب دوسری اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی اشیاء

ناکام ہو جائیں۔ اگر میا کے دب جانے یا پھوڑے ٹھنڈیوں یا شدید حاد، بیماری کے بعد۔

مریض ٹھنڈ محسوس کر رہا ہے اور دھونے سے ڈرتا ہے۔ پورے چاند کے دوران بستر پر پیشاب کرے

میدوریم۔ رات کے وقت بستر پر پیشاب۔ زیادہ مقدار میں بہت ہی تیز بودالا۔ پیشاب

یا کم ہوا بہت ہی نگہدار یا کافی زرد پیشاب چھبے والی بو کے ساتھ حیض کے دوران زیادتی

پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔ شانہ کا تکلیف دہ تشج۔ پیشاب کے اختتام پر شدید درد۔

لائیکو لوڈیم۔ نیند کے دوران بلا ارادہ پیشاب۔ رات کے وقت بہت زیادہ پیشاب آئے

لیکن دن کے وقت ٹھیک ہو۔ کھانڈ اور گرم چیزوں کی خواہش۔

سنا۔ کربوں کی علامات کے ساتھ کافی پیشاب اور بلا ارادہ خارج ہو۔

سائیکوٹم۔ بد مزاج بچے جو اندھیرے سے ڈریں یا اکیلے رہنے سے ڈریں۔ عام بڑھاپہ۔

چہرے کے پھونکوں کا پھڑپھڑانا۔ ہلکوں کا چھسکنا۔ تیل والی جلد۔ ٹی بی سے پہلے کے آثار۔  
آلات تناسل کے گرد معمولی سوزش خاص طور پر عورتوں میں ہو۔

فیرم میٹ۔ حرکت کرتے وقت یا کھیل کے دوران میں بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے جب  
قطرہ قطرہ بہے تو کپڑوں کو تر رکھے۔ حالت سکون میں پیشاب بند ہو جائے۔

لیکٹ کنیم۔ رات کے وقت کے بستر پر پیشاب کر دینا۔ خواب میں مرض پیشاب کرے جو اسے جگا دے۔

کلکیر یا کرب۔ دن کے وقت لگا کر پیشاب خارج کرنے کی حاجت رات کو بستر پر پیشاب کرے  
جلدی پسینہ آئے۔ جو اسے جگا دے۔ بھوک نہ ہونے کے برابر۔ مضبوطی سے پکڑے ہوئے کیلے عورتوں میں۔

ایسٹ فاس۔ پیشاب کا بلا ارادہ اخراج خاص طور پر کھانے پر یا حرکت کرنے پر۔  
سکوٹا اور روسا۔ جب اٹھنے کی کوشش کرے تو جگر آئیں۔ آنکھوں کے آگے چیزیں گھومتی نظر آئیں  
دوبارہ ایٹ جانا پڑے۔ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی آنکھ کی پتلیاں سکڑی ہوئی شانے کا نالاج اس  
لئے بلا ارادہ پیشاب خارج ہو۔

میگنیٹس پولسٹرٹریس۔ بطور عمل انگریز درائی کے کام آئے پہلے قطرہ قطرہ پیشاب ہر  
نصف گھنٹہ بعد چند قطرے بلا ارادہ خارج ہو جائیں۔ بعد میں پیٹ کے دبانے سے زیادہ  
پیشاب خارج ہو۔ رات کے وقت بلا ارادہ پیشاب جس کا جاگنے پر بہتہ چلے۔

## پیشاب زیادہ آئے

آر جیٹم ناٹیریکم۔ پیشاب زیادہ بار آور زیادہ مقدار میں آئے۔

نکس و امیکا۔ بدھیمی کی وجہ سے پیشاب زیادہ بار آئے ۲۰ طاقت میں دیجئے۔  
ولیکیر یا۔ رات میں تقریباً ۳۰ دفعہ پیشاب آئے درد گردہ اور دم شانہ، پیشاب

قطرہ قطرہ یہ پیشاب آنے، استقاء، تکلیف دہ پیشاب۔ پیپ۔ البیومن اور پیشاب۔  
میں خون کو ٹھیک کرتی ہے۔

مائیکل - بڑھا ہوا پیشاب گرم تکلیف دہ اور ڈنگ لگنے جیسا - درد پیشاب کی نالی میں  
پلسٹیل - زیادہ پیشاب - جذبات میں تھوڑی سی براگتختگی سے قطرہ قطرہ پیشاب -  
ہر وقت اس کا خیال رکھے یا پیشاب خارج ہو جائے -

کاسٹیکم - رات کو پیشاب کی بہت زیادہ حاجت لیکن پیشاب خارج کرنے میں کافی دیر لگے -  
اگنیشیا - کافی پینے کے بعد زیادہ پیشاب آئے ہٹیا میں

سیبل سیرولیا - رات کے وقت پیشاب کرنے کی لگاتار خواہش - درم شانہ شکل سے پیشاب  
آئے - سستی سب پر دوائی - لالعلق - ہمدردی کو پسند نہ کرے - پروسیٹ غدود کی تکلیف  
مدرنگر یا بچلی طاعتوں میں دیکھے -

میورٹیک الیڈ - دن رات بہت کثرت سے پیشاب جب ہوا خارج کرے تو پیشاب خارج کرے  
لیڈم پال - پیشاب بکثرت کبھی کم مقدار میں کبھی زیادہ پیشاب بہنے کے دوران دھار رگ  
جائے - خارش سرخی اور پیپ کا اخراج -

مرک سال - مشروبات کے پینے مقابلے میں زیادہ پیشاب آئے اکثر اور کثرت سے پیشاب آئے -  
الیومنا - پیشاب کثرت سے جو کافی دباؤ سے خارج ہو - اسے پاخانہ پر دباؤ ڈالنا پڑے -  
پیشاب خارج کرتے وقت - پیشاب کی نالی سے مکمل ہلکی پٹی پیپ جو جلن کے ساتھ خارج ہو -  
ایرنیم - دن رات میں ہر نصف گھنٹہ بعد کثرت پیشاب جلن دار پیشاب - پیشاب کرتے وقت  
جلن اور بعض اوقات پیشاب کے بعد جلن - متواتر تکلیف - پیشاب قطرہ قطرہ آئے -  
جیلیڈونیم - بہت ہی زیادہ اور کثرت سے سفید اور جھاگ دار پیشاب آئے -

## خون میں پیشاب

ٹیرینیتھنا - پیشاب میں خون کے لئے چوٹی کی دوائی ہے - پسی ہوئی کافی کی طرح  
پلچٹ - جلن دار اور پیشاب کا تکلیف کے ساتھ قطرہ قطرہ آنا - بنفشہ جیسی بو آئے اور کثرت ہو -  
فاسفورس - پیشاب میں خون خاص طور پر گرم گرم - گردوں اور جگر پیشاب گداسن تلخ دکھاتے -

چائنا سلف - پیشاب میں خون لیں تکلیف یا پریشانی کے -  
 ہیما میلنس - پیشاب میں خون گردوں میں دھسے درد کے ساتھ -  
 آرٹیکا - ایم - میکا کی زخم کی وجہ سے پیشاب میں خون -  
 تھلاپی - بی - گہرا خون اور گڑھا پیشاب -  
 اویم کین - غنی پیشاب سُرخ تلچھٹ کے ساتھ -  
 پلسٹیل - گہرے رنگ کا غنی پیشاب سوزاک کے دب جانے سے -  
 نیرم فاس - رات کے وقت کثرت پیشاب - پسینے کے دوران رات کو نیند کے دوران  
 بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے - پیشاب کی خا کا کرنے کیلئے انتظار کرنا پڑے -  
 شیفلر گیبریا - اکثر دور کثرت سے پیشاب کی حاجت تازہ شادی شدہ اعصابی عورتوں  
 میں جو بہت ہی تکلیف دہ ہو -  
 الفلفا کیو - اکثر اور کثرت سے پیشاب جس کے دوران ذرن اور گوشت میں کمی واقع ہو  
 بھوک کم اور کمزوری -

## پیشاب کا دب جانا

آرٹیکا - زخموں یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے پیشاب کا دب جانا -  
 اکوناٹ این - ٹھنڈے موسم میں پیشاب کا دب جانا خاص طور پر بے چین بچوں میں جو  
 تکلیف کی وجہ سے چلاؤں -  
 اویم - بچوں میں جب ڈر یا دایہ کے یعنی دودھ پلانے والی عورت کے جذبات  
 کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب یا شانہ بھرا ہوا - پیشاب والے سوراخ کے سکڑنے یا فنڈس کے  
 فالج کی وجہ سے -  
 کینتھرکس - دبے ہوئے سوزاک میں پیشاب تکلیف سے خارج ہو - جلن کے ساتھ  
 قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے -

ایپس میلیفیکا۔ کھلی ہوا لگنے سے پیشاب کا دب جانا یا بخار کے بعد۔ مریض اونگھتا ہے۔ غشی سی محسوس کرتا ہے یا بیہوشی سی محسوس کرتا ہے۔ نمایاں سوجن کے ساتھ بچوں کو درد دھڑلانے کے دوران میں پیشاب کا دب جانا یا رکاوٹ۔ ۹ طاقت یا ۱۱ مہما میں دیکھے۔ بائوسائیمس۔ پیشاب کی رکاوٹ۔ شاذ تہا ہوا۔ مشکل سے پیشاب آئے۔ دباؤ سے دایا۔ ٹیڑھ پھٹھا۔ پیشاب بوند بوند آئے۔ شانہ کی اینٹھن۔ کم مقدار میں چمکدار رنگ بلغوی پیشاب از خود نکل جائے۔

لارویہ اسبس۔ جزوی فالج کی وجہ سے پیشاب کا کرک جانا۔ دھار کمزور۔ پیشاب۔ از خود نکل جائے۔

آر سینکم البم۔ ایپس ایم والی علامات لیکن آر سینک البم کا مریض بہت ہی بے چین ہوتا ہے۔ وہ اونگھتا ہے اور نہ ہی بے ہوش ہوتا ہے۔

پیٹر وکیلینم۔ بچوں میں اوپر چپے اُچھلے کودنے سے پیشاب کا کرک جانا، درد اور جھنجھ چلانے کے ہمراہ۔ بچہ پیشاب خارج کرنے کے قابل نہ ہو۔

کینا لیس انڈیکا۔ پیشاب سے پہلے دوران میں اور بعد میں جلن اور پیشاب میں گری۔ دباؤ لیکن ایک قطرہ بھی خارج نہ کر سکے۔

روٹا۔ رات کے وقت پیشاب غیر ارادی طور پر نچلتے رہنا یا دن کے وقت کثرت پیشاب جس سے پیشاب کرنا دو بھر ہو جائے معلوم ہو کر شانہ کا فالج ہو اور جب پیشاب کرنے جائے تو نہ آئے۔ پلمیم میٹ۔ ایک عورت میں دو روز تک پیشاب نہ آیا جو بیہوش تھی کینٹھ سے معلوم ہو کر شانہ میں پیشاب نہیں ہے۔ علاج کیا گیا۔ مریضہ واقعی علامات مرض سے کئی روز پہلے ظاہر کرتی تھی سورج میں سُستی اور سمجھنے میں سُستی۔

ورٹیرم البم۔ بیضہ میں پیشاب کا کرک جانا۔

ویسلی بورکس۔ خون میں زہر پھیل جانا اس کے ساتھ پیشاب کا کرک جانا۔ ٹیلیوں کے پھیل جانے کے ساتھ مکمل طور پر بیہوشی، روشنی سے قاصر نہ ہو۔ خون میں زہر کی وجہ سے اینٹھن سے پیشاب کی بوا آئے

## از خود یا بلا ارادہ پیشاب خارج ہو

### تکلیف دہ

اکونائٹس ایٹن - اچانک سردی کی وجہ سے مثانہ میں جلن دار درد۔ تیز کھانٹنے والی درد گرم جلن دار گرم۔ شرج پیشاب جس میں خون ہو۔ پیشاب کرتے وقت دباؤ ہو۔  
کینتھرس - چند ایک خونی پیشاب کے قطروں کا اخراج اور ریش درد سے دہرا ہو جائے اور جھنجھے چلائے اور کمر میں اذیت کی وجہ سے دانس کرے یا اچھلے کودے۔  
پروفنس پائوسا - پیشاب سرزد کر تک گزرتا ہوا محسوس ہوا رتب واپس آجائے اور پیشاب خارج کرتے وقت کافی دیر تک دباؤ ڈالے۔

پیسٹروسلینیم - تکلیف کانپنے پر مجبور کر دے اور اذیت کی وجہ سے دانس کرے یا اچھلے کودے۔  
ایپس ایم - پروسیٹٹ غدود کی وجہ سے دانس کرے یا اچھلے کودے۔  
ایسٹنایٹرک - گوشت خور پھوٹا۔ پیشاب دلے آلات پر جو درد کرتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت اور جماعت کے دوران آسانی سے نکلے۔

نکس ماسکانا - مکمل کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرتے وقت تکلیف۔

کینابلس انڈریکا - پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے دوران تکلیف

کینابلس ٹائوسا - پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے دوران میں تکلیف۔ یہ گوشت خور پھوٹے کی وجہ سے ہو سکتی (پیشاب کی نالی کے رستے کے پھلے ہوٹ پر اگاؤ) جیسے آسانی سے خون ہے۔

سار سپرلا - بچہ پیشاب سے پہلے چلائے پیشاب تکلیف دہ ہو۔

### کثرت پیشاب

نکس دامیکا - جب بدھنچی کی وجہ سے رات کے وقت کئی دفعہ پیشاب آئے۔ ۲۴ میں خوراک میٹھے۔

یونینیم نائٹریکیم - ضعفِ معدہ کی وجہ سے کثرتِ پیشاب -  
 ایسڈفاس - جو پیشاب گھٹنے میں جتنا پانی پئے اس سے زیادہ پیشاب آئے -  
 چائنا - برائے کثرتِ پیشاب کی وجہ سے کثرتِ پیشاب -  
 فائٹولاکا - حیض کے دوران میں کثرتِ پیشاب -  
 اگنیشیا - گلے کی خشکی کے ساتھ کثرتِ پیشاب -  
 سٹرامونیم - اعصابی سردرد کی وجہ سے کثرتِ پیشاب -  
 ایکوینریٹم - صاف اور ہلکا پیشاب کثرت میں خارج کرے -  
 ویکیریا - جب یونینیم نائٹریکیم ناکام ہو جائے -  
 سینٹی کولا - زرد اور بے رنگ کثرتِ پیشاب - کثافتِ اضافی ۱۰۰۰۰ تھکاوٹ محسوس کرے اور  
 سخت تھکا ہوا - نہ کا ذائقہ بُرا اور بھوک نہ ہو - پانی کی زیادہ مقدار کے لئے شدید پیاس -  
 میوٹیکس - دن رات پیشاب کرنے کی زیادہ خواہش - پیشاب کا رنگ بے رنگ ہو -  
 آرنیٹیم نائٹریکیم - زیادہ پیاس یا اس کے بغیر کثرتِ پیشاب -  
 میڈورینیم - جب دوسری ادویات ناکام ہو جائے تو یہ کثرتِ پیشاب کو ٹھیک کریتی ہے -

## پیشاب کی نالی کی تنگی

سیلیشیا - اعضائے تناسل میں زخم کی وجہ سے نالی کی تنگی اور پیپ وقفہ وقفہ سے خارج ہو -  
 گریفائیٹس - پیشاب کے بہاؤ کا اچانک رک جانا - نسوری رنگ کا مواد لمبے دھاگوں کی شکل میں -  
 ادویم - قلعہ تنگی نامکمل غیر شہ تراب پینے کی وجہ سے اور شرابیوں میں بھی -  
 سٹرامونیم - جیسے کہ نالی کی تنگی کی وجہ سے پیشاب خارج نہ کیا جا سکے - پیشاب کا رنگ جانا -  
 البیومن والا پیشاب -

ایپس میل - حملِ محدودِ ران میں البیومن کے لئے چوٹی کی دوائی ہے - سرخ بخار میں کھلنے والے  
 کے دوران میں -

یو پیٹوریم پرف - استسقا کے ساتھ پیشاب میں البیومن  
ہیلی بولرس - پیشاب کم مقدار میں البیومن کے ساتھ تمام حجم کی استسقا سوچن۔  
گلوٹائین - گردوں کی نالیوں کی سوزش سرور کے ہمارہ جو دھوپ میں پلنے کی وجہ سے ہو۔  
بازوؤں اور ہاتھوں کا سن ہو مانا - شدید پھنھنا ہٹ سے تبدیل ہو۔ البیومن دالے پیشاب کی  
کثرت رت کے وقت اکثر پیشاب کیلے اٹھنا پڑے۔

کالی کلور پٹم - دم گروہ - پیشاب میں خون اور البیومن پھیلیاں کثرت پیشاب۔  
چمپا فیلا - البیومن پیشاب میں خون کافی عرصہ کے سوزاک کی وجہ سے، پیشاب کم گہرا  
بدبودار - گاڑھا نمایاں تلچھٹ - مواد۔

فیرم لیوڈ - نثرابیوں میں استسقا کے ساتھ البیومن، پیشاب میں دو دھیا تلچھٹ  
اور میٹھی بو آئے۔

مرکال - کم پیشاب کے ساتھ البیومن اور بیاں زہو - ٹھنڈے مشروبات کی خواہش ہو  
لیکن اس سے متاثر ہو - چہرہ سوجا ہوا غبارے کی طرح دکھائی دے۔  
ایٹونینم - نصف گلاس پانی میں ۲ گرین و طاقت کی دوائی حل کیجئے اور ہر گھنٹہ بعد  
ایک چمچہ دیجئے یہ استسقا جس میں پیشاب میں البیومن ہو ٹھیک کر دیتی ہے۔  
کاپچیکم - پیشاب میں البیومن جو روشنائی کی طرح سیاہ ہو جائے۔

ایسٹرفاس - ٹائیفائیڈ کے دوران میں یا بعد میں پیشاب میں البیومن۔  
ییرینیتھنا - لال بخار کے بعد پیشاب میں خون، البیومن اور چند پھیلیاں ہوں پیشاب  
بنفغہ کی بو والا، گہرا، بادلوں کی طرح اور دھوئیں جیسا۔

میدرینیم - پیشاب میں البیومن - شیشے کی طرح کی پھیلیاں یا بلورنا پھیلیاں جب بعض  
موم کی طرح - پاؤں اور گھٹنوں کی سوچن اور تلیوں کی دکھن۔

مرک کار - حمل کے ابتدائی دور میں البیومن۔  
فاسفورس - حمل کے اخیر میں اور مکمل حمل کے دوران میں۔

لیکڑی فلو۔ ٹائیفائیڈ کے دوران میں یا بعد میں پیشاب میں البیومن۔  
 بڑھے ہوئے البیومن وقفے دار پیشاب کے بعد۔

## کھار والا پیشاب۔

پیشاب۔ ٹائیفس میں۔  
 کینتھرس۔ شانے کے زکام میں  
 نیٹرم میور۔ سُرخ پمچٹ۔

## سیاہ

کالچیکم۔ لال بخار کے بعد روشنائی کی طرح سیاہ استفاد میں اور دم گڑھے میں (گردوں کی بوش)  
 ایکس۔ پیشاب تقریباً گہرا سُرخ سوچن کے ہمراہ لال بخار کے بعد۔  
 ٹیرینٹھنا۔ جگر کی تکالیف میں پسّی ہوئی کافی پمچٹ کے ساتھ۔  
 ایسڈ کاربائلک۔ پیشاب گہرا۔ سیاہ یا سیاہی مائل زیتون کی طرح سبز یا گھاس کی طرح ہنر  
 دیکھئے۔ پیشاب میں خون۔ پیشاب میں چربی۔

## بھورا

ہائپیریکیم۔ سرمی زخم کی وجہ سے سُرخ (شراب) کی طرح کا پیشاب۔  
 آریٹھم الکیم۔ گہرائی سے سُرخ (شراب) کی طرح کا ٹائیفس میں۔  
 سیپیا۔ گہری آمیزش والا۔  
 پلنڈرا۔ جگر کی خرابیوں کی وجہ سے۔  
 ہنزواک ایسڈ۔ شانے کے زلزلہ زکام۔ پیشاب بہت ہی رنگ دار۔ بدبودار۔ گھوڑے  
 کے پیشاب کی طرح ہو۔ جلاور کا گھاس۔  
 ہیلی پورس۔ پسّی ہوئی کافی کی طرح۔  
 ایپس میل۔ جلدور میں (پیٹ کے پھولنے میں) پسّی ہوئی کافی کی طرح۔

## پیشاب میں جھلیاں

کینتھرس - سٹڈر یا نالی کی طرح کی جھلیاں -  
 فاسفورس - چربیلی یا مومی جھلیاں -  
 مرکار - چربیلی دانے دار کافی مقدار میں جھلیاں - اس کی سطح پر لعابدار جھلی کے ٹکڑے  
 اور چربیلی تنزی کی کالت میں -  
 ٹیٹریٹھنٹھا - نالی دار سکڑی ہوئی یا جھٹی جھلیاں (الیمین دلی) -

## پیشاب ٹھنڈا

ٹائٹریک ایسڈ - جب پیشاب چھوٹے ٹھنڈے محسوس ہو - جب خارج ہو رہا ہو تو اسے  
 ٹھنڈا محسوس ہو -

## پیشاب میں چربی

مرککار - پیشاب میں چربی بکھر گولیاں ہوں -

## سبیری مائل پیشاب

کارباکلیک ایسڈ - پیشاب بن رہا ہو جیسا ازخود خارج ہو جائے یا بلا ارادہ خارج ہو جائے -  
 مقعد سے مواد خارج ہو - گھاس کی طرح کے بنر پیشاب کے ساتھ -  
 چیلڈونیم - جب خرابیوں کی وجہ سے جگر ہو -

## پیشاب میں انڈیکین

انڈول - پیشاب میں انڈیکین موجود ہو -

## پیشاب دودھیا -

آئینہ دیم - دودھیا پیشاب یا خراش دار - گدلا یا زردی مائل سبز اور جسم کو گھلانے والا۔  
 طہیم نگ - صبح کے وقت پیشاب دودھیا - صاف اور سفید - اہلے ہوئے تیل کی طرح  
 فاسفٹ - کثرت سے پیشاب آئے - تلچھٹ سفید یا سرخ -

ایسڈ فاس - جیسے کہ چاک ہلا کر ملا گیا ہو - چاک اور پانی ملا یا مکھن والے دودھ کی طرح -  
 فاسفورس - پھٹے ہوئے دودھ کی طرح ، اینٹوں کی طرح سُرخ رنگ کی تلچھٹ دودھ جیسی -  
 کالوسٹھ - ٹھنڈا کرنے پر دودھ کی طرح - ذیابیطس میں -  
 پیونجیا - بھورا مائل -

ایس میل - دماغ کے پردوں میں ماری پانی آجانے یا بچوں کے دماغ میں پانی آجانے خرابی  
 آرم میٹ - دودھ کے مکھن کی طرح -  
 اگرکیس - شام کے وقت دودھیا پیشاب -

## پیشاب میں مواد

مرکازر - پیشاب میں دھاگے ملتے ہوئے ہوں ، بعد میں گاڑھا اور بادلوں جیسا بھیلی کی طرح  
 کے ٹکڑے پیشاب کے -

پیریرا - گاڑھا لیس دار پیشاب -  
 چافیلدا - رسیوں کی طرح گھٹا پیشاب نمایاں تلچھٹ کم پیشاب - تلچھٹ میں مواد اور پریو  
 ایسڈنز واک - پیشاب میں فاسفٹ بطور تلچھٹ ہوں - شام کا نزلہ پر وٹمیٹ غدود  
 کا بڑھ جانا - پیشاب کے تحت بُرد دیکھئے -

لو - تیل جیسی بو

ایس پلفرم  
 لائیکوپوڈیم } گرہن جیسا کالا یا بھیلیاں -

کوکا۔ پھپھڑوں کی دق میں تیل کی تہہ۔

گلگیر یا کلب۔ بچوں میں تیل کی طرح کا پیشاب۔

سمبل۔ پیشاب میں تیل دار ہلکیاں۔

### بچوں کے اگزیلیٹ

اگزیلیٹ لیسڈ۔ پیشاب میں اگزیلیٹ کے لئے جوئی کی دوائی ہے

کاسٹیکم۔ البیومن کے ہمراہ پیشاب میں اگزیلیٹ موجود ہوں۔

ٹیرینٹینا۔ اگزیلیٹ کثرت سے۔

### پیشاب میں فاسفیٹ

رفیس۔ پیشاب میں فاسفیٹس کی کمی یا کثرت۔

ایسڈ فاس۔ امونیم اور میگنیشیم کا فاسفیٹ کثرت سے ہو۔

مگنیشیا فاس۔ پیشاب میں مٹی جیسا فاسفیٹ۔ ٹائیفائیڈ کے بعد پیشاب میں چربی آئے۔

ایسڈ ٹائیرک۔ پیشاب خونی یا البیومن والا۔ فاسفیٹ والا پیشاب۔ خارج ہوتے وقت

ٹھنڈا۔ گھوٹے کے پیشاب جیسی بو والا

پریپ۔

### سرخ رنگ کا پیشاب

بلوڈ سٹا۔ جب سرخ رنگ کا پیشاب ہو۔

### پیشاب۔ کم مقدار۔

ہیلی بھرس۔ پیشاب کم البیومن والا۔ تمام بڑے متعلقہ سوچنے والے متعلقہ کے بعد۔

ایپس ایم۔ پیٹ کی سوچ میں۔

کروکس میٹ۔ دماغ کی خوابوں میں (دماغ متاثر ہو چکا ہو۔)

اکونائٹ (این۔)۔ درمیں پیشاب سیاہ۔ گھینے میں

آرڈینمنٹ ٹائٹلیم - رحم کا خدو ج میں -  
 ڈیجی ٹالس - دل کے استقام میں -  
 کیلیب ڈیم - شام کے وقت - بانٹھ پرن میں -  
 مرک سال - کمزور دھار میں -  
 لیکس - لال بخار کے بعد استقام میں -  
 بیٹشیا - ٹائفس میں -  
 کلیر یا آریٹم - کم جلندار پیشاب البیومن اور بھلیاں ہوں - مٹی کی ٹالیوں میں دباؤ کے  
 بعد اور بانی پینے کے بعد -

### پیشاب میں تلچھٹ

سیدیا - اینٹوں جیسی گرد - دماغی تکالیف میں سرخ سفوت - زرد چکنے  
 والی تلچھٹ - سفید چکنے والی جھلی -  
 لائیکو پوڈیم - پیشاب میں سرخ ریت جیسی تلچھٹ گردوں میں درد کے ہمراہ یا اس کے بغیر -  
 میفائٹس - اینٹوں جیسی تلچھٹ دمر میں -  
 کاسٹیکم - اینٹوں جیسی تلچھٹ براککائٹس میں -  
 ایسکیسوس ہپ - اینٹوں جیسی تلچھٹ، گہرے بیورے رنگ کی -  
 ایپس میل - پیسی ہوئی کافی کی طرح اینٹوں جیسی تلچھٹ -  
 سارپیرلا - پیشاب میں سفید ریت آئے -  
 سیلینیم - سفید مٹی جیسی تلچھٹ - چاندی کی طرح سفید تلچھٹ -  
 بربریس ولکیس - گہری سرخ یا ماہگنی کے رنگ جیسی گرد جلی کی طرح تیری ہوئی  
 ٹکڑیاں - گردوں میں درد جو پیشاب کی نالی اور خزانہ تک جائے -  
 نیٹرم میور - گاڑھا سرخ پکھڑا لا پیشاب، تلچھٹ کے ساتھ اور گندی بو گندہ  
 چھو - کمزوری اور ماتھے کا درد -

کو پیو یا۔ تلچھٹ زیادہ مقدار میں۔ بروٹھائی اور شانہ کا نزلہ۔  
 فاسفورس۔ بدبودار پیشاب سرخ اور بھوری تلچھٹ۔ اعصابی قسم کے لوگ جو طفلان۔  
 باڈنارن یا آوازوں سے متاثر ہوں۔ آسانی سے ڈر مائیں یا ذہل جائیں مثلاً میا پھر کارنگ۔  
 کینتھرس۔ گردوں میں دکھن، کاٹنے والی تحلیف جو پیشاب والی نالی اور شانے  
 تک بڑھے۔ پیشاب کم مقدار میں۔ گہر رنگ پرانے کارے کی طرح کی تلچھٹ یا اینٹو لاجی سرخ تلچھٹ۔  
 لیڈم پال۔ پیشاب میں سرخ ریت۔ پیشاب والی نالی میں جلن پیشاب کرنے کے بعد۔

## پیشاب کی بو۔

سیپا۔ بدبودار اور کھٹی بدبو کمرے میں برداشت نہ ہو سکے۔  
 ٹائیرک الیڈ۔ گھوٹے کے پیشاب جیسی بو تیز بو۔ گرمی سے زیادتی۔  
 ایکسس۔ گیس میں اور اعصابی بخار میں امونیا جیسی بو۔  
 کوکا۔ دبے ہوئے سوزاک میں امونیا جیسی بو۔  
 اسنتھم۔ گھوٹے کے پیشاب جیسی شدید بدبو۔ زرد رنگ پیشاب کرنے کی تواتر خواہ۔  
 ایکسس۔ بغیر دوسری علامات کے امونیا جیسی بو۔  
 کاجو بیٹم۔ جلی کے پیشاب جیسی بو۔ گیس کا قوت خف۔  
 پیشیا۔ پیشاب میں گلے شے اندوں جیسی بو۔ ٹائیفائیڈ بخار میں گندی بو۔  
 بنزواک الیڈ۔ بہت ہی گاڑھا پیشاب گھوٹے کے پیشاب جیسی بو۔ بدبودار گندی بو، بہت گرا پیشاب۔  
 برٹیا میور۔ غدد کے سوختے میں۔ بدبودار پیشاب۔  
 یوریکسس۔ گرم پیشاب پیچھے والی بو کے ساتھ۔  
 اوکسیم۔ ہنفتہ جیسی بو والا پیشاب۔  
 انڈیکو۔ تھوڑا وقت ٹھہرنے کے بعد شدید گندی بدبو۔  
 فیرم ایوڈیکم۔ پیشاب کی میٹھی بو۔

## پیشاب کی کثافت اضافی

- یورنیم نامیٹرکیم - کثافت اضافی بہت زیادتی ۱۰۳۰ سے ۱۰۳۴ کے درمیان -

ٹیسٹ بنتھن - کثافت اضافی ۱۰۱۸ جہتی آنے والی بیماری میں -

پلمبیم - کثافت اضافی کم ۱۰۰۲ جب ۱۰۱۶ اور ۱۰۱۷ ہو -

بریکنگ گلاس ۱۰۰۳ - ۱۰۰۸ - ۱۰۲۰ جب ۱۰۱۶ اور ۱۰۲۳، ۱۰۲۴ اور ۱۰۲۳ کثافت اضافی کیلئے -

آرٹھکائیم - اونچی کثافت اضافی کے لئے -

سینی کو لا - کثافت اضافی ۱۰۰۰ زیادہ پیشاب آئے -

یورک الیڈ کے مرکبات میں پیشاب میں آمیں -

تھلاکسی بی - پیشاب میں یورٹیس کی موجودگی کی وجہ سے بیماریاں -

نیزم سلفٹ - پیشاب میں یورک الیڈ گیس اور گنٹھیاوی تکالیف کے ساتھ -

سیسپیا - یوریکائیٹ ملکر کی خرابیوں کی وجہ سے پروٹینٹ خدود کی سوزش کی وجہ سے -

پلسٹیل - امونیا کے یورٹیس جن میں ضائع شدہ مواد ہو -

بنزواک الیڈ - یورک الیڈ بہت ہی زیادہ رنگ کے ساتھ اور بہت ہی بدبودار گنٹھیاوی

علامات کے ساتھ - گردوں کی ناکردگی -



گیارھواں

باب

آلاتِ تناسل کی بیماریاں

عام بیماریاں

سوزاک

## سوزاک۔

پلسٹیلہ۔ { یہ دونوں دوائیاں ایک دوسرے اول بدل کر ہر گھنٹہ کے بعد اکونائٹراین۔ } دی جانی چاہیے۔ مرض کے ابتدائی دور یعنی سوزش کی حالت میں،  
 x9 طاقت میں دیجئے۔ پلسٹیلہ بڑی طاقت میں اس وقت دی جائے جب مریض نرم طبیعت  
 بغیر پیاس۔ بغیر تکلیف کے پیشاب خارج کرے۔ زیادہ مقدار میں گاڑھا زرد مواد خفییوں  
 کے سوزش کے ہمراہ یہ سب علامات ملی ہوئی ہونی چاہئیں کوئی ایک بھی غائب نہ ہو یعنی ضد جوبالا  
 علامات مکمل اور یقینی طور پر ہوں۔

کیوبیڈا۔ جب سوزش والی حالت گزر جائے۔ پیشاب والی نالی میں پیشاب کرتے وقت ملن  
 ہو۔ گاڑھا زرد اور پیپ کی طرح کا گہرا سرخ مواد خارج ہوتا ہے۔ یہ گاڑھا اور سوزاک ہو سکتا ہے۔  
 دوسرے اور آخری درجہ کے سوزاک کے لئے۔

سیلشیا۔ مزین سوزاک کے لئے مخصوص دوائی ہے۔ پیپ یا پیپ کی طرح پیشاب  
 کی نالی سے اخراج، معمولی قسم کے جھپٹھے شامل ہوں۔ خونی اخراج جو پیپ دار ہو۔  
 پیشاب کی نالی سے گاڑھی بدبو دار پیپ کا اخراج۔ یہ دوائی تقریباً تمام قسم کے سوزاکوں میں  
 اعتماد کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ x100 طاقت میں استعمال کرائے۔

کوپیوا۔ مزین سوزاک میں کارآمد ہے۔ خزانہ کے ٹپٹ اور پیشاب والی نالی میں پیشاب  
 کرتے وقت اور بعد میں کاٹنے والی، جلن دار تکلیف۔ پیشاب میں سے نقشہ جیسی خارش ہوتی ہے۔  
 تھوہا۔ مزین سوزاک میں جب اخراج تپلا اور سبز پیشاب کرتے وقت جلن دار تکلیف ہو۔  
 ٹسیلا گوپیٹ۔ سوزاک نہایت شدید زرد اور سفید مواد کے اخراج کے ہمراہ پیشاب کی نالی  
 میں ریگے۔ منی کی نالیوں اور خفییوں میں جھٹکے اور کھنچاؤ۔

پیشاب کی نالی میں شدید سوزش اور خارش۔ پیشاب کی نالی میں کوئی چیز  
کھرجنے کے لئے ڈالنا چاہیے۔

میدورینجیم۔ دہے ہوئے سوزاک کے لئے جسمانی ساخت کے لحاظ دوائی ہے۔ پیشاب  
زیادہ رنگین۔ تیز نوب والا۔ گہری گیس جیسی تہ سے ڈھانپا ہوا۔ شدید زرد۔ آہستہ آہستہ  
تھال کی جڑ میں کاٹنے والا درد۔

سیلیپیا۔ حاد سوزاک کوب جانے کے بعد سوزاک اور سوزاک کی مسوں کے لئے کارآمد ہے۔  
آرتھرائٹس کے سرے پر گومڑ یعنی سوزاک کو مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہو۔ پیشاب والی نالی میں  
بھلا لگنے اور گولی لگنے جیسے درد۔ پیشاب بہت بدبودار۔

کینتھکس۔ سوزاک کے دہ جانے سے جب یہ شائع کو متاثر کر دے۔ پیشاب رک جائے۔  
پانی پینے سے جلن دار جھجھے والی درد۔ خفگیوں کی تکلیف دہ سوزش۔ خارش ڈالنے والے لیکوٹیا۔  
کے ہمراہ پھر دانیوں کی سوزش۔

سنا بیریس۔ پرانی سوزاک، پیچیدہ آتشک کے ہمراہ۔  
کیپسکیم۔ پیپ دار خونی، بدبودار اخراج۔ دہی ہوئی آتشک و سوزاک۔ آلات تھال کی  
معدنک اور سکٹن، بانجھ پن۔

الیومن۔ پیشاب کی نالی میں پھوڑے اور سختی، زرد رنگ کے اخراج۔ مزمن سوزاک میں  
رحم یا فٹرس ج پر خفگیوں والے دھبے سے ہوں۔

نیرم سلف۔ ایسے مریض جن میں پھوڑے اور پانی پڑا ہوا ہو یا سوجے ہوں کو دی جانی  
چاہیے۔ زردی نابل سبز اخراج کے ہمراہ مزمن سوزاک۔ سرور اور خفگیوں کی تھلی کی سوزش۔  
آلات تھال۔ سرور اور آلات تھال کی خارش اسے ملنے پر مجبور کرے۔ ملنے پر جلن۔ یہ دوا  
بہت سی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ غددوں کی سوزش۔ خون کا پانی کی طرح پتلا ہو جانا۔  
خون کا نوٹھڑوں میں تبدیل ہو جانا۔ جلدی دانوں۔ پھوڑے پھنسی۔ اچھو پاؤں میں پھید کرنے کی تکلیف۔

پھنسی۔ آبلے۔ تھیلیاں دکھیں۔ تپلا پانی سا خارج ہو۔ بسہری۔ آتشکے گھاؤ۔ ناخن بد شکل  
یہ تمام علامات آتشک یا سوزاک کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔

آر سینکم سلف فلیو۔ شدید تکلیف کے ساتھ سوزاک۔ کافی زیادہ اخراج زرد جلندار  
پیشاب کی تمام نالی کے ارد گرد جلن اور بے چینی۔

سلفر۔ بطور عمل ایگزیردوائی کے کام آتی ہے۔ ایسے مریض جو جلدی نزلہ زکام میں مبتلا  
ہو جاتے ہیں یا ابھی طرح سے علاج نہ ہو سکے کی وجہ سے خواب ہو جائے۔ متاثرہ حصوں  
میں بہت زیادہ ہیجان۔ مکھن اور جلن پائی جاتی ہے۔

کینا بس سٹاسیوا۔ پیشاب والی نالی میں جلن اور مکھن پیشاب والے سوراخ سے لیکر  
شانہ تک۔ پیشاب دلی نالی سوچی ہوئی ہو۔ اور دکھے۔ پیشاب کے دوران سوئی گئے جیسی  
چھن۔ جلن دار درد پیشاب کے خلتے پر زیادہ تکلیف۔ پیشاب کرنے کی تقریباً متواتر  
خواہش۔ پیشاب ٹھیدی مائل اور گدلا۔

ملی فولیم۔ آلت تناسل اور خضیوں کی سوزش خونی اور لیسدار پانی کے اخراج کے ساتھ۔

ایسڈ فلوئوریزا سوزاک۔ پیشاب کی نالی کی سکڑن۔ سوزا کی مادہ رات کو ت خارج ہو۔ جو جلن  
پر زرد دھبہ ڈالے۔ پیشاب خارج کرنیکی بہت زیادہ خواہش پیشاب والی نالی میں جلن کے ہمار

آر جنٹم ٹائٹریکم۔ پرانے سوزاک اور سوزاک کے افزائات۔ پیشاب کرنے کی بہت زیادہ خواہش کے  
ساتھ پیشاب والی نالی میں جلن۔ پیشاب خارج کرنے کے بعد چند ایک قطرہ خارج کرنے کی خواہش۔

کریوزوٹم۔ سوزاک اور پیشاب والی نالی کی سوزش۔ خاص طور پر جوتوں میں۔ خارج ہونے والا مادہ  
خونی اور بہت ہی بدبودار خراشدار اور خارش پیدا کرنے والا اور ب فرج پر خارش اور درد۔

کیکفر۔ پیشاب کا بوند بوند آجاس کو پیشاب خارج کرنے سے افادہ ہو۔ شدید تشنگی اور پیشاب  
کرنے کی لاماصل کوشش۔ جبکہ مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہو۔

فرگوس۔ پیشاب کا بوند بوند آنا۔ سوزاک۔ پیشاب خارج کرنے سے افادہ ہو۔ پیشاب  
نہ دھارے آئے اور کاٹنے والی درد ہو۔ لب فرج سرخ اور سوجھے ہوئے۔ اندام نہانی یا فرج کی

سوزش۔ جو سوجی ہوئی ہو سرخ اور گرم۔ بڑی مائل اندازات۔ رات کے پینے۔ ہڈیوں میں دریں جو پینے کے دوران زیادہ ہوں۔

## زیرِ ناف بال یا پیسٹروکے بال۔

ٹائٹل ایڈز { زیرِ ناف بال گرجائیں۔  
سیلیم

سلفر۔ بدبودار پسینہ کی وجہ سے زیرِ ناف بال تباہ ہو جائیں۔

## آتشک

مرکب سال۔ یہ دوائی آتشک کی ہر شے کے لئے غیر موثری اور خود حاصل کردہ آتشک کے لئے چوٹی کی دوائی ہے حاد کیسوں میں چھوٹی طاقت میں اور مزمن کیسوں میں بہت اونچی طاقتوں میں دی جانی چاہئے۔ آتشک کے زخم سرخ جو اندرونی طرف پھیلیں۔ ندری مائل۔ بدبودار اخراج کے ساتھ خون بہنے کا رجحان ہو۔ زبان پر نگے یا پھیپھڑوں پر آنکلی چھوڑے۔ آنکلی گنٹھیا۔ آرم میٹ۔ دوسری شے کی آتشک کیلئے یہاں بارہ کا غلط استعمال کیا گیا ہو کے لئے مفرد ہے۔ چکلی دار چھوڑے میں سوراخ کرنے والی تکلیف۔ آتشک سے ناک کی ہڈیاں متاثر ہوئی ہوئی ہو۔ دماغ میں گٹر شدید تکلیف دینے والا سرد درد۔ نالو کا گھٹنا اور دوسری چپٹی ہڈیوں کا گھٹنا۔ عام پرانے نزلہ کے ہلہ۔

سنائیبرس۔ آتشک جس میں سوزا کی پچیدگیاں شامل ہوں۔ زخم سخت اور اُبھرے ہوئے پناب والے راستے سے پھینکے۔

مرکب ڈلس۔ عورتوں کی آتشک میں مفید ہے جب حالات خالص میں اور اسکے ارد گرد گھٹنوں۔ ایسڈ ٹائٹل مرکب۔ یہ آنکلی چھوڑوں کے لئے مفید ہے جو گہرائی کا نسبت ارد گرد زیادہ پھیلے ہوئے ہوں۔ ڈنگ لگنے جیسی درد جیسے کہ بہت سی لکڑی کی نوکدار چفتیاں ہر وقت چھب رہی ہوں خون

پہننے کا رجحان۔ دانے بکثرت ہوں۔ بے قاعدہ کنارے گومڑوں جیسی درد جیسے کہ بہت سی لکڑی کی پھٹتیاں جنس رہی ہوں۔ گوجھی کے پھول جیسا اکاؤ۔ آتشکی بچے کی رات کی تکالیف جب اور تکالیف کے لئے دی گئی اور رات ناکام ہو جائیں۔ بچوں کا اور فرح کے لبوں کا آتشک۔ انجیر جیسے تنقہ کے ارد گرد چھاتی پر تانبے کے رنگ کے چھوڑے پھنیاں۔

مرک کار۔ آتشکی چھوڑے۔ منہ۔ مسوڑھوں اور گلے میں بہت ہی زیادہ چھوڑوں کے ساتھ۔ بدبودار سنس۔ بہت زیادہ تھوک۔ ٹانسلیز یا گلے کے خرد دربرھے ہوئے۔ زبان خنجر اور پھپھڑوں پر آتشکی چھوڑے۔

کیلو ٹروئیس۔ دوسری بیچ پر آتشک جب ناخوں کے سرے موٹے ہو جائیں۔ مدرنگ کے پانچ قطرے فی خوراک دیں۔

ٹسٹلنجیا رسل۔ دوسری بیچ کی آتشک ہڈیوں میں تکلیف کے ساتھ گنٹھیا۔ ماتھے پر۔ پنڈلی کی ہڈی پر گانٹھیں۔ آتشکی کھانسی۔

ٹائیگیل۔ گرم پیشاب زیادہ مقدار میں پیشاب کی نالی میں جلن اور ڈنگ لگنے جیسے درد۔ کالی ایوڈ۔ گہرے آتشکی گھاؤ اور خنجر کی بھین، پھپھڑوں اور زبان پر آتشکی چھوڑے۔ آتشکی گنٹھیا خاص طور پر انگلیوں اور پنجوں کا۔ ہاتھ کی انگلیوں کی ہڈیوں کا آہستہ آہستہ ٹھننا۔ بغیر تکلیف یا تکلیف کے ساتھ جلد پھیلنے والا زکام۔ تنھوں اور نثرٹوں پر پھالے ڈائے تبکن دار اور جلن ناک کی ہڈیوں اور پیشانی کی ہڈیوں میں۔ کترنے والی ہڈیوں میں سوراخ کرنے والی دردیں کھوڑی اور کرکر گومڑ دار چھوڑے۔

فلورک الیڈ۔ منہ گلے اور ناک کے آتشکی چھوڑے جب افلازات کا گھٹھے خواشدار ہوں۔ مریض چڑچڑا اور زرد رنج۔ ہڈیوں کا گٹنا ستر خاص طور پر ناک کی ہڈی اور پنڈلی کی ہڈیوں کا۔ کرلیوزوٹ۔ آتشکی حاد زکام جو دانتوں کو سیاہ کر دے اور گلا دے۔ منہ اور گلا دکھے چھوڑے ہوں اور پھٹے ہوئے ہوں۔

کالی بانگیر ویکم۔ آتشکی زکام جو منہ ناک اور گلے کی بلغمی جھیلیوں کو متاثر کریں۔ منہ اور ناک

میں سوراخ دار بھوڑے، بدبودار اور تباہ کن پرانا نزلہ کاڑھے زرد رطوبت ناک سے بہیں۔  
تھوہا۔ ٹبی والی آنک۔ جلد پر گوڑ۔ بھوڑے۔ پیرے۔ مواد نکلے جو خراشدار ہو،  
اور ناراض پیدا کرے۔

بیڈیاگا۔ آنکھی بچے غدد سخت اور سوہے ہوئے۔  
سفلینیم۔ یہ ایک نو سوڈ ہے۔ علاج کے شروع میں دی جانی چاہئے۔ یا بطور عمل انگیز کے  
جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہوں۔  
لیکسس۔ یہ آنکھی پرانا زکام اور پارے کے غلط استعمال کے بعد آواز کے آواز  
کے جاتے رہنے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔

## مردوں کی بیماریاں

### دوسرا حصہ

مادہ متویہ میں تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی

### غیر صحت مند حالت

ڈیمانہ۔ ضعف اعصاب کی وجہ سے پانچ پن میں تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی۔ پروٹیکٹ وغیرہ  
کامن اخراج۔

چینیئم۔ جنسی خواہش کے دب جانے یا کم ہو جانے کی وجہ سے تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی  
شکرکینیئم۔ جب تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی، شدید جنسی خواہشات کے ساتھ ماضیوں  
کی سوزش کے ساتھ۔

کونیم۔ تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی پانچ پن کے ساتھ نامکمل ایتادگی یا ایتادگی کے  
بغیر مجامعت میں طاقت کی کمی۔ عورت کی موجودگی ہی سے انزال ہو جائے یعنی عمل مجامعت شروع  
کرنے سے پہلے ہی انزال ہو یا سرعت انزال ہو۔

آئیوڈم۔ ان لوگوں کیلئے جن میں شدید یا متواتر ایسا لگی ہو۔ برسی ہر جنسی خواہش کے ہمراہ۔ خُصیت چھوٹے ہو جائیں اور تکلیف دہ ہوں۔

## کینسر کے تحت کینسر بھی دیکھیے

کونیم۔ آرتھرائٹس کا کینسر۔

سپونجیا۔ خُصیوں کا کینسر۔

## جماعت یا مباحثت

گرفیٹیس۔ بانجھ پن کے ساتھ جماعت سے نفرت۔ جماعت کے دوران میں چانگ طاقت کھو بیٹھے۔ جماعت کے بعد ٹانگوں کی ٹھنڈک۔ جماعت کے پسینہ۔ اگر لیس ایم۔ جماعت کے پسینہ۔

سیلینیم۔ جماعت کے بعد بد مزاج اور کمزوری محسوس کرے۔ کلکیر یا کلارب۔ جماعت کے بعد گھٹنے جواب دے جائیں۔ جماعت کے بعد غیر مطمئن اور ناراض۔ کمزوری لاحق ہو جائے۔

سٹیفیگیہ یا۔ جنسی براہ روی کے بُرے اثرات۔ داغ ہر وقت جنسی خیالات پر ہی مرکوز رہے۔ جماعت کے دوران اور بعد میں تلخی تنفس۔ جماعت کے بعد پیشاب کی خواہش۔ نیٹرم کلارب۔ جماعت کے بعد پسینہ کی شدید رعبت۔ جماعت کے بعد بہت پسینہ آئے۔ ٹائٹینیم۔ جنسی کمزوری، مادہ منویہ کا بہت اخراج و انزال یا سرعت انزال۔

سپیا۔ جماعت سے تکلیف۔ خاص طور پر چکر۔

ہاکس۔ جماعت کے بعد تھک۔

کینتھر۔ پیشاب کی نالی میں جماعت کے بعد تکلیف۔

ڈفنے۔ جماعت کے بعد کھانسی و انت درد۔

سٹرکٹیم فاس۔ جماعت کے وقت ایسا دگی نہ ہو جیسا کہ وہ سے یا اس خیال سے کہ نامزد ہے جبکہ ایسا ہرگز نہ ہو۔ ۲ طاقت میں استعمال کیجئے۔

ایسٹ فاس۔ آؤ تامل اچانک ڈھیلا پڑ جائے اور مادہ منوریہ خارج نہ ہو۔ جماعت کے بعد خواہش جماع بہت بڑھ جائے و اختتام۔

سلفر۔ مکمل ایسا دگی سے پہلے ہی مادہ منوریہ خارج ہو جائے۔

برٹیا کارب۔ جماع کے دوران سو جائے۔

لائٹسین۔ مادہ منوریہ بہت دیر سے خارج ہو۔ یا خارج ہی نہ ہو۔

لائیکو نوڈیم۔ جماع سے نفرت آؤ تامل بھیا یا ہوا۔ جماع کے سو جائے۔ جماع کے دوران اچانک قوت و طاقت کھو بیٹھے یا جماعت کی طاقت ہی نہ رہے۔

امبرگر لیا۔ جماعت کرتے وقت دمر۔

کالی کارب۔ جماع کے بعد نظر کمزور ہو جائے یا کمزور کرے۔

بیوفو۔ جماع کے دوران قبض۔

سیبل سیرڈالٹا۔ جماع کے بعد پیشاب کی تکلیف۔

مرک کار۔ جماع کے بعد امعاء مستقیم میں درد کے دورے۔

کریوزوٹ۔ جماع کے بعد آؤ تامل میں جلن۔ جماع کے دوران میں۔ رحم کی طوہتوں کے آؤ تامل پر لگنے سے جلن پیدا ہو۔

سٹرکٹیم۔ جنسی ہیجان۔ ہاتھ متواتر آلات تناسل پر رہیں۔

مٹی فولیم۔ جماع کے دوران مادہ منوریہ کا اخراج نہ ہو۔

**نامزدی۔ خواہش جماع کم ہو۔**

نیوفر۔ ایسا دگی باسکل نہ ہو اور جماع کی خواہش باسکل نہ ہو۔ یا خانہ یا پیشاب کے دوران از خود مادہ منوریہ خارج ہو جائے۔

سیبل سیرولیا۔ نامردی۔ آلات تناسل ٹھنڈے۔ خبیثہ سکرٹے۔ آلت تناسل سکرٹا ہوا  
ٹھنڈا اور بچیاں کی تکالیف۔

اؤسموڈیم۔ خواہش جماع کم سرگز میں ٹھنڈک کا احساس۔ رات کو احتلام۔ جلدی سے  
مادہ منویہ خارج ہو جائے۔ نامکمل ایسا دگی کم لطف آئے۔

ڈامیانہ۔ نامردی کے لیے شاندار دوائی ہے۔ مدد کر کے پانچ سے دس قطرے دن دیکھائے۔  
ٹائیٹینیم۔ جنسی کمزوری مادہ منویہ بہت جلد خارج ہو جائے یا سرعت انزال بار دیکھے۔

کیلیڈیم۔ جلق یا تھوڑی سی وجہ سے نامردی۔ آلت تناسل ڈھیلا شدید جنسی خواہشات  
کے ساتھ نیم خوابی کی حالت میں ایسا دگی جب مکمل طور پر جاگ جائے تو ایسا دگی ختم ہو جائے۔

بوڑھے عیاشوں میں نامردی جو زوجہ کا کام کرنے کے نابلل ہوں ایسا دگی ختم ہو جائے۔ بوڑھے  
اور پرانے باپوں کیلئے۔ ایسا دگی کے نہ ہونے کی وجہ سے، جنسی بے اعتدالیوں۔ تباہ کنوشی

یا تباہ کن جانے کی وجہ سے دماغی اور جنسی طور پر شدید کمزور۔  
لائیکو لوڈیم۔ بوڑھے میں نامردی۔ نیم نامرد۔ ہر ماہ ایم طاقت میں استعمال کیجئے!

سیٹیفیکس۔  
فاسفورس { بے اعتدالیوں کی وجہ سے نامردی۔

ہاکس  
کیورپریم میٹ { ذیابیطس کے ہمراہ نامردی۔

نیٹرم میور۔ بنگلیگ ہونے کے دوران مادہ منویہ کا کم اخراج۔  
یوہیمیم۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے نامردی کے لیے شاندار دوائی ہے۔

گرفیٹالس۔ پوشیدہ گناہ کے بعد اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد نامردی۔

آزیکا  
ہائیپریمیم { گرنے سے یا ضرب یا ٹکڑ لگنے سے نامردی۔

ستر کفر فاس۔ جماعت کے وقت ایسا دگی نہ ہو جیسا کہ دوسرے یا اس خیال سے کہ وہ نامزد ہے جبکہ  
 ایسا ہرگز نہ ہو۔ ۲۰ طاق میں استعمال کیجئے۔  
 ایسا فاس۔ آرتھرائٹس اچانک ڈھیلے پڑ جائے اور مادہ منورہ خارج نہ ہو۔ جماعت کے بعد  
 خواہش جماعت بہت بڑھ جائے و اختلام۔  
 سلفر۔ مکمل ایسا دگی سے پہلے ہی مادہ منورہ خارج ہو جائے۔  
 بریٹاکارب۔ جماعت کے دوران سو جائے۔  
 لائیسین۔ مادہ منورہ بہت در سے خارج ہو۔ یا خارج ہی نہ ہو۔  
 لائیکو لوڈیم۔ جماعت سے نفرت آرتھرائٹس بھیا یا ہوا۔ جماعت کے سو جائے۔ جماعت کے دوران  
 اچانک قوت و طاقت کھو بیٹھے یا جماعت کی طاقت ہی نہ رہے۔  
 امبرگریسا۔ جماعت کرتے وقت دمر۔  
 کالی کارب۔ جماعت کے بعد نظر کمزور ہو جائے یا کمزور کرے۔  
 بیوفور۔ جماعت کے دوران تبخ۔  
 سیبلیرولٹا۔ جماعت کے بعد پیشاب کی تکلیف۔  
 مرک کار۔ جماعت کے بعد اعصاب مستقیم میں درد کے دورے۔  
 کرلیوزوٹ۔ جماعت کے بعد آرتھرائٹس میں جلن۔ جماعت کے دوران میں۔ رحم کی ٹوہنوں کے  
 آرتھرائٹس پر لگنے سے جلن پیدا ہو۔  
 سٹر امونیم۔ جنسی ہیجان۔ ہاتھ متواتر آلات تناسل پر رہیں۔  
 ملی فولیم۔ جماعت کے دوران مادہ منورہ کا اخراج نہ ہو۔  
 نامردی۔ خواہش جماعت کم ہو۔

نیوفور۔ ایسا دگی با سکل نہ ہو اور جماعت کی خواہش با سکل نہ ہو۔ پانخانہ یا پیشاب کے دوران  
 از خود مادہ منورہ خارج ہو جائے۔

سیبل سیر ولینا۔ نامردی۔ آلات تناسل ٹھنڈے۔ خبیثے سکڑے۔ آلات تناسل سکڑا ہوا  
ٹھنڈا اور پشیم کی تکالیف۔

اوسمودیم۔ خواہش جماع کم سبب میں ٹھنڈک کا احساس۔ رات کو احتلام۔ جلدی سے  
مادہ منویہ خارج ہو جائے۔ نامکمل ایسا دگی کم لطف آئے۔

ڈامیانہ۔ نامردی کے لئے شاندار دوائی ہے۔ مدر نکچر کے پانچ سے دس قطرہ دن دفعہ دیئے۔  
ٹائیٹینیم۔ جنسی کمزوری مادہ منویہ بہت جلد خارج ہو جائے یا سرعت انزال بار دیجئے۔

کیلڈیٹیم۔ جلق یا پتھری کی وجہ سے نامردی۔ آلات تناسل دھیرا دھیرا جنسی خواہشات  
کے ساتھ نیم خرابی کی حالت میں ایسا دگی جب مکمل طور پر جاگ جائے تو ایسا دگی ختم ہو جائے۔

بوڑھے عیاشوں میں نامردی جو زوجہ کام کرنے کے نااہل ہوں ایسا دگی ختم ہو جائے۔ بوڑھے  
اور پرانے پاپیوں کیلئے۔ ایسا دگی کے نہ ہونے کی وجہ سے، جنسی بے اعتدالیوں۔ تمباکو نوشی

یا تمباکو جانے کی وجہ سے دماغی اور جنسی طور پر شدید کمزور۔  
لائیکو لودیم۔ بوڑھے میں نامردی۔ نیم نامرد۔ ہر ماہ ایم طاقت میں استعمال کیجئے!

سٹیفٹگیٹا۔  
فاسفورس { بے اعتدالیوں کی وجہ سے نامردی۔

ہاکس  
کیوریم میٹ { ذیابیطس کے ہمراہ نامردی۔

نیٹرم میور۔ بنگلیگ ہونے کے دوران مادہ منویہ کا کم اخراج۔  
یوہیمبیم۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے نامردی کے لئے شاندار دوائی ہے۔

گرفیٹلیس۔ پوشیدہ گناہ کے بعد اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد نامردی۔

آزیکا  
ہائیڈریم { گرنے سے یا ضرب یا ٹکڑ لگنے سے نامردی۔

## مرکبوس کالی آیوڈینم { آنشک کی وجہ سے نامردی۔ خواہش جماع بڑھی ہوئی

ایسٹ فلورک۔ گھٹیا قسم کے آدمی جب ایک آدمی ایک عورت سے مطمئن نہ ہو۔ ایک بیوی سے دوسری بیوی تبدیل کرے۔ گلی کی ٹکڑ پر کھڑے ہو کر معصوم عورتوں سے نظر بازی کرے۔ پرانے پاپیوں کے لئے بہترین دوائی ہے جو اپنی بیوی سے مطمئن نہ ہوں اپنے بچوں اور سیکر دو متوں سے نفرت کرے۔

فاسفورس۔ ایسٹادگیاں بہت زیادہ ہوں اور ناقابل کنٹرول جنسی خیالات۔ نوجوانوں میں ایسٹادگیاں جبکہ وہ جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں جب دماغی اور اعصابی، خرابیاں ہوں۔

ٹیرنٹولا پینچ۔ شدید جنسی براہیختگی۔

سٹیفسکیہ۔ نوجوانوں میں ناشائستہ جنسی بھوک۔

پکرک ایسٹ۔ دماغی اور اعصابی خرابیوں کی وجہ سے شدید بے تحاشا ایسٹادگیاں

آلہ تناسل، اتنا تھکا ہوا کہ تقریباً پھٹنے کے قریب ہو۔

اورینگینیم۔ ایسٹادگیوں کی شدید لہریں اور حلق یا ہتھکڑی کی حادثات ۳۲ طاہیں دیکھئے۔

انتھرم۔ { خطرناک قسم کی جنسی بھوک جس کی تسکین کی ہر کوشش اسے تیز تر کر دے۔

کینتھرس { حتیٰ کہ خود لذتی اختیار کرے اور پاگل ہو جائے۔ شدید ایسٹادگیاں۔ دی

گئی ترتیب میں استعمال کیجئے!

کیلٹیڈیم۔ شدید جنسی خواہش نامردی کے ساتھ آلہ تناسل ڈھیلا ڈھالا۔ صبح کے وقت

نیم خوابی میں ایسٹادگیاں جب جاگ جائے تو ایسٹادگیاں ختم۔ بغیر خواہش کے خود بخود ایسٹادگیاں

زبردست اور تکلیف دہ ہوں۔

نکس دامیکا۔ شراب نوشی کی زیادتی کی وجہ سے جنسی بھوک۔  
 کوئیم۔ تھوڑی سی ایسا دگی سے ماہ منورہ خانہ ہو جائے۔ پروٹیسٹ خدو کا سخت  
 ہو جانا۔ دبی خواہش جنسی کے بڑے اثرات۔  
 ماسکس۔ جنسی خواہش بڑی ہوئی۔  
 پلاٹینا۔ لڑکوں سے بد فعلی کی زبردست خواہش اور مقعد کٹیر سے جماع یا مباشرتی خواہش۔

## ایسا دگیاں۔ خواہش جماع۔ جماع بھی دیکھئے۔

کوئیم۔ ایسا دگیاں نہ ہوں۔ نیم ایسا دگی یا با سکل ہی نہ ہو۔  
 ڈائسکوریا۔ دن اور رات۔  
 نیٹرم میور۔ اکثر ایسا دگیاں اور انزال۔  
 پلاٹینم۔ رات کے وقت شدید ایسا دگیاں۔  
 کینتھرس۔ شدید تکلیف دہ ایسا دگیاں۔  
 کیمفر۔ خوابوں میں شدید ایسا دگیاں  
 فاسفورس۔ ایسا دگیاں نہ ہوں یا کمزور ہوں۔  
 کینا بس انڈیکا۔ حسب معمول ایسا دگیاں اور تکلیف دہ بڑھی ہوئی خواہشات۔  
 ایسڈ پرک۔ شدید ایسا دگیاں جو نیند کو خراب کر دیں یا شدید ایسا دگیوں کی وجہ سے نیند نہ آئے۔  
 مردوں اور عورتوں میں جنسی نظام کی ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی ہو یا دماغ کے متاثر ہونے پر  
 اوبیم۔ صبح سویرے اٹھنے پر شدید ایسا دگیاں۔  
 آرنیکا مانٹ۔ چلنے کے بعد ایسا دگیاں۔  
 سمرز کر۔ آلہ تناسل کا نرم مسر۔ مسر کر کے پرک سوزش بھی دیکھئے۔

آر سینک البم۔ مسر کر کا چھنڈا یا چیرے۔ پیشاب کرتے وقت مسر کر میں جلن۔

مرگ کر۔ سر ذکر کی مرن سوزش۔ چھٹی بد بھوار افزائت۔ سر ذکر حساس ہو۔ دھن ہو۔  
 مرکبوس۔ گوشت خود چھوڑے سر ذکر پر۔  
 نائیرنگ ایسڈ۔ سر ذکر کے گردنی۔  
 کو سیوا۔ سوزاک کے بعد سر ذکر میں درد۔  
 رشاکس۔ سر ذکر کے پردہ کی سوزش کیوجہ پردہ کا بیچ ہیٹ جانا اور سر ذکر میں تکلیف۔  
 سٹار سیر مللا۔ سر ذکر میں بھاڑنے والی تکلیف۔  
 آرم میور نیٹ۔ سر ذکر پر گہرے نامور (گوشت خود چھوڑے)۔  
 ایسٹ فاس۔ سر ذکر پر مٹے ہندی قسم کا لگاؤ۔  
 کالی میور۔ آتشک کے زخم کے بعد سر ذکر پر پٹے۔  
 سلفر۔ نرم مرع کی کافی جیسے۔ اسفنج کی طرح آسانی سے خون ہے۔ سر ذکر برن کی طرح ٹنڈا۔  
 تھوجا۔ سوزاک کے بعد مٹے چھوڑے۔ نوکلار۔ ایسڈ اور اکر افرج۔  
 آرم سلف۔ سر ذکر پر گھوڑا مٹے نامردی یا نامردی کے بغیر۔ سر ذکر پر سوزش۔  
**خصیوں کی تھیلی میں پانی بھرنا۔ نامردی۔ حلق یا تھڑی**  
 خصیوں کی سوزش۔ خواہش کم ہو جائے دیکھے۔  
 پلاٹینم۔ بلوغت سے پہلے حلق اور اس کے اثرات۔  
 کوئم۔ حلق کے برے اثرات اور جنسی بے اعتدالیوں کے برے اثرات۔  
 اگنس کاسٹس۔ حلق اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد عضو مخصوص کی کمزوری۔ اس خوبصورت  
 نوجوان بیوی بھی ایسا دلگلی دہر بن کے۔  
 کیلیڈیم۔ حلق کی عادت ہٹانے کیلئے اور اس کے اثرات کو دور کیلئے اچھی دوائی ہے عضو  
 مخصوص اور سر ذکر پہلا ہو جائے۔ عضو مخصوص ڈھیلا ڈھالا۔  
 سیوفو۔ حلق کیلئے علاج کی خواہش۔ ذہنی حالت کمزور۔ ٹھٹھے میں گھر کے اندر دوڑتا پھرے اور زمین ہو۔  
 اوگنٹنیم ایم۔ حلق کا شدید خواہش جو روکی نہ جا سکے۔ جنسی خواہش اسے پاگل بنا دے۔

اسٹیل لگو۔ جلن کی دہائی نہ جلنے والی خواہش۔ احمقانہ لگن خواب۔  
 سیٹیفیکریا۔ بچوں میں جلن کی حادث اور اس کے بُرے اثرات۔  
لڑکوں میں دودھ۔

مرکب سال۔ لڑکوں کی پھیلتیوں میں دودھ۔  
 غلبہ شہوت۔ خواتین میں خواہش جماع انتہائی عروج پر پہنچنا۔  
 کینتھرس۔ اگر آلات تناسل میں پیچان کی وجہ سے ہو۔  
 بکس و امیکا۔ شراب نوشی کی بے اعتدالیوں سے وجہ سے۔  
 فاسفورس {  
 یکرک ایسڈ {  
 دماغی یا اعمالی خواہشوں کی وجہ سے۔

آلہ تناسل (احاس کہ آلہ تناسل نہ ہو)  
 کوکین { احاس کہ آلہ تناسل نہیں ہے  
 کوکا {

جلن کریازوٹ۔ آلہ تناسل میں جماعت کے دوران جلن اور پھر دوسرے دن سوزش پڑنے۔  
 میگنٹیا میور۔ صبح کے وقت ایسا لگنے کے ساتھ جلن۔  
 پیریرا۔ بوند بوند پیشاب کے ساتھ جلن وقفے وقفے کے ساتھ ہو۔  
آلہ تناسل ٹھنڈا۔

اگنس کاسٹس { آلہ تناسل ٹھنڈا  
 لائیکوپوڈیم {

پھنسیاں۔ گریٹیس۔ واہیمی پھنسیاں آلہ تناسل پر۔

کروٹن حکیم۔ پھلے دار پھنسیاں آلہ تناسل پر۔ واہیمی پھنسیاں آلہ تناسل پر۔  
 آرنیکا مانٹ۔ زخموں کے بعد جلن۔ چھلے دار پھنسیاں۔ جامنی رنگ کی پھنسیاں آلہ تناسل پر۔

کاسٹیکم - آرناسل کی نارش -

آرناسل پکڑے کھنا - کھینچنا -

سٹر اوٹیم - ہر وقت آلات تناسل پر ہاتھ رکھے رہے -

بیوفو - ہر وقت آلات تناسل پر ہاتھ انہیں کھینچ رہے -

آلات تناسل میں درد -

اگنیشیا - کھانتے وقت درد ہو -

ویٹی ٹیلیس - مادہ منور کے اخراج پر درد -

پیٹرو ویلینیم - پشاب کی نالی کی بیماریوں میں جڑ میں درد خاص طور پر سوزاک میں -

کیسپیکم - رات کے وقت پرورد ایستادگیاں -

ہکس و ایمیکا - صبح کے وقت پرورد ایستادگیاں

کالی کارب - کافی زیادہ انزال یا مادہ منور کے اخراج پر درد -

نایٹرک لیٹڈ - رات کے وقت تشنجی درد

کھینچنا -

مرک ٹمال - بچہ متواتر آرناسل کو کھینچتا ہے

کینتھرس - دی گئی ترتیب میں دوائیاں استعمال کرائیں -

آرناسل سکڑا ہوا

اگنیشیا - چھوٹا ہو جائے -

بیوفو - آرناسل کا سکڑ جانا -

بچھوٹا -

لایکو پوڈیم - جلق یا تھڑی کے بعد آرناسل چھوٹا ہو جائے -

اگنس کاسٹس - آرناسل ٹھنڈا اور چھوٹا ہو جائے -

اگنیشیا - آرناسل چھوٹا اور سکڑا ہوا -

ناٹریل الیڈ - آرتھرائسٹ کی ساری جلد کا گنا سٹنا، عضو مخصوص کو مکمل طور پر ننگا کر دے۔  
لیکسس - آرتھرائسٹ کی اندرونی جلد کا خراب ہونا۔ اور ملین زیادہ ہو۔

### انزال

آرتھرائسٹ کے گھونگھٹ - سرخباد۔  
ایس ایم - غصہ کے بعد سرخباد۔

### آرتھرائسٹ کی سوزش

مرکب کورس - آرتھرائسٹ کا گھونگھٹ سوجا ہوا، پانی سے بھرا ہوا تانا ہوا، سر ذکر کے ہمراہ کے لئے مہل کی دوائی ہے۔ ہارک سرخ چٹیاں - پیرے اور کٹ چٹا ملین کے ہمراہ - کاٹنے والا درد، عارض اور درد۔  
گلیر یا کارب - زرد پیپ کے ہمراہ سوزش سے سرخ نہیں ہوتے بلکہ مفید ہوتے ہیں۔ سر ذکر میں  
کاٹنے والی تکلیف اور ملین آرتھرائسٹ کا گھونگھٹ سرخ اور سوجا ہوا۔  
کورٹیم - دکن جیسے کہ سوئیاں بھوئی جاری ہوں۔

میر سلفر - پیپ کو رد کرنے کیلئے یا پیپ بنانے کے لئے بہترین دوائی ہے۔

ناٹریل الیڈ - اندرونی سطح کی سوزش اور اس کے کناروں کی سوزش پیپ نکلنے والے ناسور جو چٹے ہوں۔ ڈنگ لگنے والے اور پھاٹنے والے درد۔ شام کے وقت زیادتی ہو اور تمام رات نیند خراب کریں۔  
اکونائٹ این - گھونگھٹ اور سر ذکر میں ریگنے اور ڈنگ لگنے والے درد۔ گھونگھٹ سوجا ہوا اور سوزش  
زرد - سر ذکر میں کاٹنے والے درد۔

ایس ایم - آرتھرائسٹ کی سوزش اور استقامت ڈنگ لگنے اور ملین دار درویں۔

آرٹیکا ایم - زخم کی وجہ سے سوزش کیفیت - چٹنے کے بعد لیتا دیں۔

کروٹن ٹیکسٹیم - گھونٹ یا لاکھ کی اندرونی سطح کی سوزش سر ذکر میں پیشاب کرتے وقت ملین۔ سر ذکر اور  
خیموں پر سخت ناسور جس سے دل گھرا جائے۔

کو نیم۔ گھونگھٹ کی سوزش ڈنگ لگنے جیسی اور کاٹنے والی درد۔ پیشاب کرتے وقت آرتھرائس میں  
پھاڑنے والی درد۔

رٹاکس۔ سر ذکر آرتھرائس اور گھونگھٹ کی سُرخی اور سوزش پیشاب کی نالی میں پیشاب  
کرنے کے بعد جلن اور کاٹنے والا درد۔

سٹائیرس۔ گھونگھٹ کی سوزش شدید غارش کے ساتھ۔

## خارش

سٹائیرس۔ غارش کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔

اگیشیا۔ اندرونی سطح پر غارش۔

کو نیم۔ گھونگھٹ پر غارش ہر حرکت پر پریڈیٹ غدد کے اس کا اخراج۔

رٹاکس۔ عیاشانہ غارش جو رات کو زیادہ ہو۔

بیوفورزیم۔ [ " " " " " ]

وایو لائٹر۔ سوزش کے ساتھ غارش۔

سار سپر بلا۔ گھونگھٹ پر ناقابل برداشت غارگی اخراج کے ہمراہ۔ سر ذکر سرخ اور سوجا ہوا۔

## گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی

مرکیورس۔ گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی کے لئے بہترین دوائی ہے۔

سلفر۔ بچوں میں بدبودار پیپ کے اخراج کے ہمراہ

ہیمپیر سلفر۔ پیپ کا نفعنا نیکن دار درد۔

سٹائیرس۔ پیپ کی طرح کا اخراج۔ بدبودار پیپ (دوسری طبیع کی آتشک) گھونگھٹ سوجا ہوا۔

نائیٹرک الیڈ۔ گھونگھٹ کی تنگی سوزش کے ہمراہ۔ آتشکی گھونگھٹ کی تنگی کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔

ایسٹک الیڈ۔ گھونگھٹ موٹا۔ چلا ہوا ایکٹرانہ جا کے اور شدید غارش ہو۔

مرکیورس۔ آتشک کی وجہ سے ہو۔

جیکازنڈا۔ گھونگھٹ کی سوزش تکلیف دہ اور سوجی ہوئی۔

اکونائٹ این۔  
ایپس ایم۔  
بیلادونا۔

## سوزش

گرنیٹلس۔ پانی کے جبرے ہونے پر بچھالے کی سوزش بغیر تکلیف کے۔  
ریٹاکس۔ گہری سوزش تکلیف اور جلن کے ہمراہ۔  
کیلیدٹیم۔ کناروں کے ساتھ ساتھ سوزش۔  
میک سال۔ جلد پر زکرتنگ کھینچی نہ جاسکے۔ ایسا کرنے پر نمایاں زردی مائل پیپ کا اخراج۔  
خیرنس۔ پروٹھیٹ غدود۔ ناسور

کروٹلیس ایچ۔ پروٹھیٹ میں کینسرے خون آئے۔

## اخراج مواد

کوئیم۔ ہر خیزش یا ایستادگی پر اخراج مواد ہو گھونگھٹ پر غارتج کے ساتھ۔

نکسوا میکا۔  
سیپیا۔  
سیلینیم۔

کالی بائیکرو میکم۔ پروٹھیٹ غدود کی مزمن سوزش میں پاخانے کے دوران مواد خارج ہو۔

سلیشیا۔ پاخانہ کے لئے زور لگاتے وقت مواد خارج ہو۔

ٹائیرک ایڈٹ۔ پاخانہ کے بعد مواد خارج ہو۔

تھوجا۔ جب مواد بیزی مائل خارج ہو۔

سٹیف فگییر یا۔ جنسی اعضاء کے بعد پروٹھیٹ کس کا اخراج۔

پروٹیسٹ غدود کا بڑھ جانا۔

اکونائٹ { ابتدائی سوزش کے لئے موزوں دوائیاں ہیں۔  
سیلاڈونا " " "

پتو نجیا۔ جب پشاپ کے دھار چھوٹی ہو کر کے لئے موزوں ہے۔ دھار بھاگ دار۔  
خصیوں کی سوزش اور منی کی نالیوں کی سوزش۔

خصیصوں کی سوزش اور مٹی کی نالیوں کی سوزش۔

بریٹیا کا رب - بڑھاپے میں یروشلمیت غدر کا بڑھ جانا -

آرنیکا مانٹے۔ زخموں کی صورت میں جب بھوڑی زخم کی وجہ سے ہو۔ احاسن جیسے کہ  
خوش دار اور کڑا پٹیا گیا۔ تیرکی طرح کے درد اور جھنجھٹا ہٹ سکن ہونے کے بہرہ۔  
تھو جوا۔ حاد سوزش جیسے کہ سوزاک سے ہو۔

تھو جا۔ عاد سوزش جیسے کہ سوزاک سے ہو۔

اوسیم - پشایاب میں خون آئے پڑوسیٹ خود کے ٹوٹ ہونے کی وجہ سے یا پڑوسیٹ کی بواہیر۔

کوئیم۔ پروٹیسٹ غدد کے بڑھ جانے کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔

سیدیل سر۔ مزمین یا عادی بھوٹری پشیا ب کے اخراج میں میں تکلیف ہو یا جلن ہو۔

کینا بس انڈیکا۔ معقد کے جسد میں بیٹھے وقت کو لے کا احساس ہو۔

فاسفورس - پروٹینٹ غدد کا نرم تر ہو - پروٹینٹ رس بہنے کے ہمراہ -

سولید ٹیگو - مزمن بھوتری پر ۲۲ طاقت میں دیجے۔

شیفگیس یا۔ پنجاب کی اکثر خواہش کم مقدار میں باریک دھاریا قطرہ قطرہ پشیاپ

کے دوران اور بعد میں جلن پدیشاب کے بعد پیشاب کی خواہش ہو جیسے کہ شاز خالی نہ ہوا ہو۔  
پھر پیرا۔ پروٹسٹینٹ خدود کے برصغیر کے ساتھ پیشاب میں رکاوٹ ہو۔

پیر میرا۔ پرنسٹن فڈز کے برصغیر کے ساتھ مشابہت میں رکاوٹ ہو۔

آئیوڈیم - خنزیری اور ٹی بی کے مریض لوگوں میں پروٹینٹ غدود کی سوزش -

مرک ایٹوم - جن کیسوں میں پروٹینٹ خوردوں میں پیپ ٹرگٹی ہو۔

ڈیجیٹل ٹیس - دل کی تکلیف کے ساتھ پروسٹیٹ غدود کا بڑھ جانا۔ پیشاب کا رنگ جانا۔  
یا قطرہ قطرہ آنا پروسٹیٹ غدود کے بڑھنے کے ساتھ۔ پیشاب کے دب جانے سے استسقاء،  
جسریان اور اختلام۔

### شدید جنسی خواہش - مادہ منویہ کا اخراج

(دیکھئے خصیوں کی سوزش - خصیوں کا گوشت بھدا چھوڑا - عورتوں میں خواہش جماع کا  
غیر معمولی غلبہ - خواہش بڑھی ہوئی - انزال - جریان منی - )  
ایسڈ فاس - مادہ منویہ کا اخراج شدید کمزوری محسوس ہو جائیگی کمزور ہو جائیں - ریڑھ  
میں جلن - آلتہ ناسل ڈھیلا اور خستہ پیلے - آلتہ ناسل میں ایستادگی کی طاقت نہ ہو ایستادگی  
غیر تسلی بخش - جماعت کے دوران جلد ہی انزال ہو جائے - آلتہ ناسل کا اچانک ڈھیلا پڑ جانا -  
انزال نہ ہو - غلبہ شہوت کے ساتھ یا اس کے بغیر مادہ منویہ کا اخراج -  
سیلیئم - مادہ منویہ کے اخراج کے لئے چوٹی کی دوائی ہے - یہ تقریباً ۹۵ فیصد کیوں  
کوٹھیک کر دیتی ہے - انزال جلد ہو جذبہ شہوت دیکر رہے -

کالی بروم { یہ دونوں دوائیاں زیادہ اخراج منی کے لئے موزوں ہیں جب دل کے  
ڈیجیٹل ٹیس } دھڑکن ساتھ ہو اخراج ہو تو ڈیجیٹل ٹیس موزوں ہے -  
پیکر ایسڈ - شدید ایستادگیاں یا خیرش اور بہت زیادہ خواہش جماع -  
سیلیشیا - پاخانہ کے وقت مادہ منویہ کا اخراج جبکہ پاخانہ بڑا ہوا خارج کرنا مشکل ہو -  
کاسٹیکم - جب غوطی مادہ منویہ خارج ہو  
سلفر - مکمل ایستادگی سے پہلے مادہ منویہ خارج ہو جائے -  
گرفائیٹس - مادہ منویہ خارج نہ ہو -

کلیریا کا رب - مادہ منویہ کا اخراج آہستہ آہستہ مہین اور ڈنگ لگے جیسے درد انزال میرا ہو -  
سیپیا - نامکمل ایستادگی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج -  
کاربوووج - انزال بہت جلد اور سر میں گرج محسوس ہو -

لائی سبین - مادہ منویہ کا اخراج نہ ہو یا دیر سے ہو۔  
 فارمیکا - مادہ منویہ کا اخراج کم نامکمل ایستادگی کے برابر۔  
 کوئیم - معمولی سے جذبات کی بڑھ چٹکی کے پر مادہ منویہ خارج ہو جائے عورتوں کی موجودگی میں  
 آسانی سے ایستادگی ہو جائے اور مادہ منویہ خارج ہو جائے۔  
 چائٹا - مادہ منویہ کے اخراج کی وجہ سے کمزوری کے لئے۔  
 جلیسیم - بغیر خواب کے انفرادہ منویہ کے اخراج کے ساتھ رات کے وقت بغیر غلبہ شہوت  
 کے خاص طور پر صبح کے وقت کمزور کرے۔  
 ویسجی ٹیس - گہری نیند میں مادہ منویہ کا اخراج ہو بغیر جاگنے کے۔  
 شائٹم - شدید کمزوری کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج - آسانی سے غلبہ شہوت ہو، بازو کھیلنے  
 پر ہی غلبہ شہوت ہو جائے۔  
 پیرسویکا - پانخانہ کے دوران مادہ منویہ کا اخراج بغیر ایستادگی کے زیریں بطن میں خالی پن کا  
 احساس اور آلات تناسل میں درد۔  
 ایسٹیک الیڈٹ - کمزور کرنے والے مادہ منویہ کے اخراج - پانخانہ کے وقت مادہ منویہ کا اخراج ہو۔  
 اکونائٹ کیم - شہوانی خوابوں کے بغیر مادہ منویہ کا اخراج۔  
 کالی بروم - مادہ منویہ کا اخراج جلیقین طبیعت - گند خیالات - کمزور - لکھڑائی چال اور شدید  
 کمزوری یہ غلبہ شہوت کے ساتھ یا اس کے بغیر ہو سکتا ہے۔  
 ٹرکم میڈٹ - آلات تناسل کا غلط بہت زیادہ استعمال افسردگی اور ناامیدی کے ساتھ نرور  
 دھنا ہوا بہرہ، آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔  
 کینٹھرس - شدید ایستادگی کے ساتھ انزال۔  
 کیلیڈیم - جنسی بے اعتدالیوں کے برے اثرات کے بعد مادہ منویہ کا انزال بغیر کسی جنسی  
 خواہش کے یا جذبات کی بڑھ چٹکی کے انزال - رات کو خوابوں کے بغیر یا بغیر جنسی خوابوں کی بغیر اور  
 جلق اور اس کے مابعد اثرات - آلات تناسل اور سر ذکر پھلا۔

اگنس کاٹس۔ پرانے پاپوں میں جہلان۔ جنسی اعضاء ٹھنڈا اور جنسی اعضاء کی ٹھوک نہ ہو

اور رلیف افسردہ ہو۔

لائیکوٹوڈیم۔ مکمل نامردی میں مادہ منویہ کا اخراج جبکہ ایستادگی بالکل ہی نہ ہوں یا غیر مکمل آلات تاسل ٹھنڈے اور سڑے ہوئے۔

ٹائٹنیم۔

سٹیفگیبیا۔ خلق کی وجہ سے شدید کمزوری جس کی وجہ سے مادہ منویہ کا اخراج۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے۔ بے نور چہرہ۔ نمایاں چڑچڑاہٹ اور شر میلہ پن۔

ڈائسکوریہ۔ ناموافق سے مادہ منویہ کا اخراج۔ عضو مخصوص اتنا ڈھیلا ڈھالا کہ ایک رات میں دو دو تین تین بار انزال ہو۔ خواب میں جس کے بعد کمزوری ہو۔ خاص طور گھٹنوں کی کمزوری۔ اوبیم۔ زیادہ مقدار میں منویہ مادہ کا اخراج اور دیر تک جاری رہے۔

اسٹیلڈگو۔ جسران خواب میں ایستادگی اور شاندار خواب۔ ٹیرنٹولا۔ ایچ۔ مادہ منویہ غنی جلیں اور گرمی کے ہمراہ۔

ایونجیم اکو۔ مادہ منویہ کا اخراج بغیر ایستادگی کے لئے چوٹی کی دوائی ہے ۲ طاقتیں دیکھئے۔ فیرم برڈیم۔ قلت خون یا انیمیا کے ساتھ۔

جنسی۔ تھکے۔ دیکھیے مجامعت۔۔۔

لائسری۔

آرم میٹ۔ رگوں میں بڑی کے ساتھ اور خضیوں کی لاغری اور ان کاٹس ہو جانا۔

کیپسکیم۔ نامردی میں خضیوں کی پتیلی ٹھنڈی اور خضیوں کی لاغری۔

ایوڈیم۔ خضیوں کا گھٹنے گھٹنے کم ہو جانا۔ خوابوں میں مادہ منویہ کا اخراج۔ نامردی۔

کارپور ایمیلیس۔ غدود سخت سوجھے ہوئے۔ جلیں کے ساتھ درد ہو۔ بھال لگنے جیسے درد اور کاٹنے والے درد۔

کوینیم۔ خستہ پتھر کی طرح سخت جلیں اور کاٹنے والی دریں۔

ایپس ایم۔ دوسرے حصوں میں استفادہ کے ساتھ دنگ لگنے والے دروں کے ساتھ خصلوں کی خصل کا استفادہ خارش اور کسختی کے ساتھ۔

کالی آیوڈ۔ خصلوں کی ماکزوری۔ دایاں خصلہ غائب ہو جائے۔

ایونینا سیرٹ۔ جنسی مشاغل میں زیادہ پڑنے کی وجہ سے مادہ منویہ کا اخراج نامنظم کیا تھا۔

آزیکا مانٹ۔ چوٹ یا دوسرے زخم خراش کے ساتھ درد۔ جامنی سرخ سوزش۔

رموڈونڈرون۔ چھوٹے پر حساس۔ نمدار موسم میں زیادتی حرکت سے افاقہ۔

کلیریا کرب۔  
سلیشیا۔ جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو دی گئی ترتیب میں دیجئے۔  
سلفر۔

## خصلوں کا کینسر۔ ناسور

آرینک البم۔ جب درد کیوجہ سے مریض بے چین ہو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس۔ ۱۔ ایم طاقت دن میں ۲ بار دیجئے۔ حتیٰ کہ افادہ شروع ہو جائے تب وقفے کو بڑھا دیا جائے۔

کونیم۔ کینسر کے شاندار دوائی ہے، یہ آرینک البم کی ہی طرح دی جانی چاہیے۔  
سکریمینم۔ یہ ایک نوٹوڈ ہے۔ ۲ یا ایک ایم طاقت میں علی المجیزی دی جانی چاہیے۔ اس دن کوئی دوسری دوائی نہ دی جائے۔

## خصلوں کا اعصابی درد

الکیشا۔ جب جنسی غلط کاریوں کی وجہ سے درد ہو۔

ہیما میلرس۔ گرمی اور حصوں کے شدید کھن کے ہمراہ دریا شدید حساسیت۔  
آرم میٹ۔ جب سخت اور ٹھوس مسوں کے اکاؤ کے ساتھ کے اعصابی درد ہو۔

کالوننتھ۔ جب سبب معلوم نہ ہو۔

میگنیشیا فاس۔ " " " " " "

## خصیوں کی سوزش

خصیوں کی ٹی بی خصیوں میں پانی بھرنا دیکھئے۔

برائی اونیا۔ جب پیدائشی طور پر خصیوں میں پانی بھرا ہوا ہوتا۔

ایروٹیم۔ بچوں میں خصیوں میں پانی بھر جانا جب ریٹروڈن ناکام ہو جائے۔

آرم سلف۔ بچوں میں خصیوں میں پانی بڑھ جانا خصیوں کا سخت ہو جانا۔ سر ذکر کا سوج جانا

آرتاسل کے ناسور۔ خصیوں کا سوج جانا۔ خاص طور پر دائیں طرف کے خبیصے۔

مرکیوس۔ جب سوزاک کا اچھی طرح علاج نہ کیا گیا ہو۔ سوزاک دب گیا ہو لیکن دبنے سے پہلے بعض

کاٹھی سبز پیپ خارج کرنا ہو۔ دائیں خبیصے کی سوزش شدید درد کے ہمراہ جو میٹ تک جائے اور پتلی

ٹانگوں تک خبیصے کی پتیلی سرخ اور چمکدار۔

پلسٹیل۔ اگر مرکوریس ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے، خصیوں میں جلن اور درد سوزش

کے ساتھ یا سوزش کے بغیر رحم سے گہرے رنگ کے خون کے اخراج کے ساتھ سکڑن۔ آنکھوں

کی سوزش کا رجحان۔ گنٹھیا۔ دریں ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی جلدی جائیں۔ دائیں یا

بائیں خبیصے کی سوزش۔ ٹھنڈک۔ جھوک نہ رہے اور بیاس نہ ہو۔ اس دوائی کے استعمال کے

بعد زردی مائل سبز پیپ کا اخراج۔ خصیوں میں پانی پڑنے کے لئے جو ٹی کی دوائی ہے۔

آرم میٹ۔ خصیوں میں گوشت کی سوزش خصیوں کا گوشت بھرا مچھوڑا۔ مزمن قسم کا۔

ایوڈوم۔ خبیصے سخت اور سوجے ہوئے۔ آلات تناسل پر یہ بودا رپینز۔

ایپس میل۔ خصیوں اور پروٹیٹ غدود کی درد والی سوزش۔

تھو جہا۔ خصیوں کی سوزش بار بار سوزاک اور سوس یا گوڑوں کی دھب سے۔

کلیٹیس۔ خصیوں کی سوزش کے لئے ایک اور دوائی جو سوزاک کے دب جانے پر پلسٹیل

کے ناکام ہو جانے پر دیکھئے۔ دونوں ادویات میں گرم ٹپوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

آرنیکا مانت - جب خضیوں کی سوزش زخم کی وجہ سے ہو اور دکھن ہو۔  
 کو نیم - خضیے بڑھے ہوئے اور بہت سخت خاص طور پر زخموں کے نیچے کے طور پر۔  
 ربوڈرڈ ٹنڈرون - خضیوں کی سوزش اس احساس کے ساتھ خضیے کے خضیے کچلے گئے ہوں  
 خضیوں میں کھینچنے والی تکلیف جو انوں تک اور پیٹ تک بڑھے خاص طور پر اسی طرف چھوٹنے  
 پر حس اور دکھن ہو خضیوں میں پانی پڑ جانا - نمدار موسم میں زیادتی اور حرکت پر ناقہ۔  
 پنونجیا - سوزاک کے دب جانے کی وجہ سے خضیوں کی سوزش آہستہ آہستہ خفی میں اضافہ ہو۔  
 اولیم انمیل - خضیوں کا اعصابی درد اور منی کی نالیوں کا اعصابی درد۔  
 اگزاک الیڈر - منی کی نالیوں اعصابی درد۔

## خضیوں کا نیچے نہ اترنا

آرم میوزنٹ ونٹیم - خضیے چڑھے ہوئے لڑکوں کا لڑکیوں جیسا ظاہری رویہ - طبیعت اور  
 جسمانی ساخت ایک فیصد سلوشن آرٹ سوڈیکلو رڈی ایک اونس پانی میں ملا کر دیں - دن میں صبح و شام  
 دو دفعہ دیکھئے اس کا ہومیو پیتھک نام - آرم میوزنٹیم - میوزنٹیم یہ ایک طاقت میں دی جانی چاہیے۔

## خضیوں کی ٹی۔ بی

پنونجیا - حاد یا مزمن خضیوں کی ٹی بی والی سوزش - خضیے ہموار - سوچے ہوئے کاوٹ کے ساتھ  
 زیادہ چکن دار درد، درد جو مادہ منویہ کی نالیوں تک جائے۔  
 آرم میٹ - خضیوں کی مزمن سوزش یا ٹی بی والی اعصابی درد، شدید درد کے ساتھ خضیے  
 سوچے ہوئے، خاص طور پر رات کو - خضیے مائل بہ تنزلی - خضیوں میں پانی کا بھر جانا - کم حوصلہ  
 بے جان سا - یادداشت کی کمی - حرام مغز میں اعصابی درد۔  
 کلکیر یا کارب - خنزیری مریضوں میں کھینچنے والا ڈبانے والا - اور خراش دار درد  
 مرک بن آیوڈ - خضیوں کی آنکشی سوزش منی کی نالیوں کی دکھن کے ساتھ۔

میلشیا۔ خضیوں کی تھیلی کی شدید سوزش۔ پانی پڑ جانا۔ خضیوں کی تھیلی پر غارش اور  
 ننداز خضیوں میں ریگنے والی دردیں۔ خضیوں کا پھوڑا یا اجتماع پیپ اور ہرنیا۔  
 سلفر۔ خضیے ڈھیلے اور بچے تلک جائیں۔ خضیوں کی تھیلی پر نمی۔ منی کی نالیوں پر باد کھجواٹ۔

## فوطوں کی رگوں کا پھول کر کانٹھوں میں جانا

ہیما میلس۔ فوطوں کی رگوں کو پھولنے کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ خضیے سوجے ہوئے اور  
 منی کی نالیوں میں کھینچنے والے درد اعصاب بہت ڈھیلے اور پسینہ ہو۔ تیر کی طرح نکلنے والا درد  
 خضیوں کی تھیلی سے پیٹ ہٹ۔

لیکسس۔ جب خربائیں نیلگوں رنگ اختیار کر جائیں، دماغی افسردگی کے ہمراہ۔  
 پلسٹیللا۔ شربائیں نیلی نظر آئیں تسکین دہ کھجواٹ کے ساتھ منی کی نالیوں کو حرکت دے دیں ہوں ہو۔  
 اور درد کرے۔

امونیا میور۔ بائیں طرف مادہ منویہ کی نالی میں سوجی جھنجھ جیسا اور تکیں دار درد۔ علامات  
 کھانسی کے ہمراہ ہوں۔

آرنیکا مانٹ۔ مادہ منویہ کی نالی درد سے سوجی ہوئی پیٹ میں سوجی جھنجھ جیسا درد۔ زخم کی تسکین۔  
 بیلادونا۔ پھٹانے والی درد جو اوپر کو جائے شام کو اور رات میں زیادتی ہو۔  
 چائنا آف۔ مادہ منویہ کی نالی اور خضیوں کی تسکین دہ سوزش۔ بائیں خضیہ میں اور مرکز کے  
 بائیں طرف درد۔ دریں اکٹھی ہوں یا جمع ہوں۔  
 کلیٹیس۔ دائیں مادہ منویہ کی نالی حساس خضیے کھینچے ہوئے خضیوں میں درد۔ مادہ منویہ  
 میں کھینچنے والا درد۔

کالی کارب۔ خضیوں کی اور مادہ منویہ کی نالی کی سوزش۔ خضیوں کی تھیلی، غراشا دار،  
 بائیں خضیہ اور آلتہ ناس میں کھجواٹ دار درد۔ کانٹے والے درد اس دوائی کی نمایاں خصوصیت ہے۔

سیٹھ گیارہ۔ مادہ منویہ کی نالی میں تیر لگنے جیسے اور کھینچنے والے درد، غصہ، غم۔ افسردگی، احمک  
گناہ۔ رطوبات زندگی کی کمی۔ جلق یا مشت زنی۔ جنسی بے اعتدالی۔ متاثرہ جگہ کو چھونے سے تباکو  
نوشی۔ پارے کے غلط استعمال سے زیادتی ہوتی ہے۔

سلفر۔ خضیوں میں اور مادہ منویہ کی نالی میں دباؤ۔ وہ ڈھیلے ہو کر نچے لگ جائیں اور خضیوں  
کی خضی نمدار ہو اور شدید رکھن ہو۔

دیکھیے مگکڑی

تیسرے حصہ

کینسر۔ موقوفی حیض۔



سلفر۔ تحکات۔ وزن میں کمی۔ جلد کھردری اور گندری نظر آئے۔ اس کے نزدیک ہر چیز گندری  
اور ناقابل بیان ناصات یہ دوائی بطور عمل انگیز کے استعمال کی جاتی ہے، جب بھی طرح سے منتخب کی  
ہوئی ادویات مکمل طور پر آرام دینے میں ناکام ہو جائیں۔

کیمفر۔ گرم کرے میں گرمی اور پسینہ کے جھکڑ۔ بازو اور پیٹ بہت ٹھنڈے جب ڈھانپ  
دی جائے تو پسینہ میں شراب اور درجہ تک کی کر دی جائے تو سردی محسوس کرے۔

پلسٹیل۔ یہ سجان والی طبیعت جو تبدیل ہوتی ہو، بند اور گرم کرے میں گرم پسینہ آئے۔  
روئے بغیر اپنی علامت نہ بتائے۔

اکلیاریموسا۔ شدید سردی سے کھوٹا پھٹ رہی ہو۔ کمر اور گردن کے پٹھے دیکھیں گھٹیا  
یا گھٹیا دی رحمان۔

لیکس۔ موقوفی حیض کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ شدید سردی سے کمر سے شرف ہو کر  
سر کے اگلے حصے تک آئے۔ چھوٹے پر بہت ہی حساس۔ پریشان کرنے والی دل کی دھڑکن اور جسم  
کی ٹپکن دار گرمی سے رنگ کا خون ہے مریض بہت ہی باتو فی ہو۔ جلن کا احساس جیسے کہ جلتے ہوئے کوئلے  
جسم پر رکھے ہوں۔ خون دھوکے۔ غمزہ اور بڑبڑا۔ غشی کے دوزخے اور ہوا میر۔

گلونائٹن۔ آندھنی ہوئی ٹپکن اور سردی سے گھٹے لگیں۔ گرم کرے اور سوڑھ کی گرمی میں

زیادتی۔ بستر پر نہ پڑ سکے۔ پہاڑی پر چڑھتے وقت دل کی دھڑکن۔

کلکیر یا کارب۔ زرد۔ ڈھیلے۔ دھالے اور ٹھنڈے روضوں کے لئے جو کلام کی وجہ سے  
تھک چکے ہوں۔ سلفر کی طرح یہ دو آئی بطور عمل انجین استعمال کی جانے والی ہے۔  
نمکس و امیکا۔ حساس لڑاکی اور چٹپڑی عورتوں میں بہت زیادہ خون ہے۔ وہ جلدی  
سے ناراض ہو جاتیں۔ یہ دو آئی اس وقت استعمال کرنی چاہیے۔ جب مندرجہ ذیل تمام  
علامات کے ہمراہ نظام انہ نظام کا بگاڑ بھی ہو۔

سپیا۔ خروج رحم کے ساتھ خون ہے نیچے دبا دینے والی دریں۔ روض جسمانی طور پر پلٹا پلٹا  
اور آسانی سے حوصلہ چھوڑنے والا۔ ٹھنڈی جلیلی۔ کینہ پرورہ محبت سے نفرت کرنے والی۔ ہمدردی  
کو پسند نہ کرے۔ قبض کے ساتھ لیکوریا۔ اچانک گرمی کے دورے سے پسینہ کے ساتھ۔ کمزوری  
اور غش کھانے کا رجحان۔

سیلگونیویریا۔ لیکوریا۔ خراشدار۔ بدبودار حیض کے بعد جاری رہے۔

بلاٹینیا۔ بچہ دانی میں درد بہت زیادہ خون بہنے کے ساتھ۔

سبائٹا۔ چمکدار خون ہے بہت زیادہ درد کے ساتھ پڑوسے نکلتی ہو اور زمان کے اگلے  
مرے تک جاتی ہوئی درد۔

کروکس۔ ہسٹریائی عورتوں میں گہرے لوتھڑوں والا خون ہے پیٹ کے پگلے حصہ میں دباؤ  
احساس جیسے کہ بچہ کو جنم دے رہی ہو۔

میسلیٹینم۔ بائیں طرف کے چہرہ کا درد حوات کو زیادہ ہو۔

میڈورینم۔ چہرہ کا درد ٹیکوں کے لگنے کی وجہ سے لیکوریا کے دہنے سے صبح کے وقت چھوٹی  
ہٹیوں میں تیزابیت کے ساتھ درد زبان پر میل کی تہہ منہ کا ذائقہ گندا اور بدبودار سانس صاف  
نہ کے جانے والی گندی زبان۔ کمزوری۔ پیلاہن۔ ٹھنڈا۔ ٹھنڈے مندر موسم میں زیادتی۔

بلیس پر۔ موقوف حیض کے دوران رگین بھولی ہوئی۔

فریکٹینس ایم۔ موقوف حیض پر داغی امراض کیلئے مفید ہے۔ رحم کی کمزوری کے ساتھ۔

ٹریٹیم۔ شدید کمزوری کے ساتھ خون کا اخراج۔

کمیفر۔ گرم مکہ میں گرمی اور پسینے کے ٹھکڑے، بازو پیٹ بہت ٹھنڈے۔ جب نگی ہو تو سردی محسوس ہو جب کپڑا اور لے لے تو پسینہ آئے۔

اودو فو رینم۔ موقوفی حیض پر مہاسے اور دیگر جلدی خرابیاں۔

## مباشرت۔ مجامعت

مباشرت کے دوران اور بعد میں تکلیف

سیلیسیا۔ مباشرت سے نفرت کے لئے اندام نہانی کی خشکی کے لئے چوٹی کی دوائی ہے سب سے پہلے یہ آزمائی جائے قبض کے ساتھ لیکوریا۔

نیٹرم میور۔ مباشرت سے نفرت کی خون دانی عورتوں جن کے منہ اور جلد پر خشکی ہو کیلئے موزوں ہے۔ اندام نہانی کی خشکی تکلیف دہ مجامعت۔

ہائیڈرائٹس۔ مباشرت کا خیال ہی نہ کر سکے۔ یعنی خیال ہی تکلیف دہ ہو یا تکلیف کی وجہ سے مباشرت کی رغبت ہی نہ ہو۔ لیکوریا جو اندے کی سفیدی کی طرح کا ہو کے وقت تکلیف زیادہ ہو۔

امبر اگر لسیا۔ مجامعت کے دوران دماغ شروع ہو جائے۔

کریو لوزوٹ۔ اندام نہانی میں مجامعت کے دوران اور بعد میں جلن اور تیز درد اور خراش۔ مجامعت کے بعد خون بہے۔

سیٹیفیکریا۔ مجامعت کے خاتمے کے قریب تنگی نفس ہو، رحم کا کینسر نئی شادی شدہ عورتوں میں مباشرت تکلیف دہ ہو۔

گرفیٹیس۔ مجامعت سے نفرت۔ بڑھی ہوئی سخت بچہ دانی۔ رحم اور بچہ دانی میں دھن ہو۔ کیٹکٹس۔ مباشرت کے دوران اندام نہانی کا سکڑنا۔

برومیم۔ مباشرت کے دوران جذبات کی کمی

پلسٹیللا۔ جماعت کے دوران پھوٹنے پر خاسکس ہو یا دکھن ہو۔

فیرم میٹ۔ جماعت کے دوران دکھن اور کاٹنے والے درد۔

پلاٹینا۔ جماعت کے دوران اندام نہانی میں شدید دکھن۔

فاسفورس۔ جماعت کے دوران میں لطف نہ آئے۔

لائیکو لوطیم۔ جماعت کے دوران اور بعد میں اندام نہانی میں یا فرج میں شدید جلن۔

فرج کی خدی خشکی۔ چڑے میں نیچے کی طرف دباؤ دینے سے کرحیض شروع ہونے والا ہو۔

میڈرن۔ عورتیں مباشرت کے ہکلائیں۔

امبرگر لسیا۔ مباشرت کرنے پر درد شروع ہو جائے۔

### مباشرت سے لطف نہ آئے

بروئیرس ولگیرس۔ مباشرت کے دوران لطف بالکل نہ آئے۔ صحتے آپس میں جکپٹ مائیں۔

کاسٹیکم۔ جنسی خواہش بہت ہی کمزور ہو لطف نہ آئے۔

سیسیا۔ مباشرت سے نفرت کے ساتھ لطف نہ آئے۔

### غلبہ شہوت

سٹانم۔ آسانی سے غلبہ شہوت ہو، جیسے کہ پاؤں پہلانے سے ناقابل برداشت غلبہ شہوت ہو جائے۔

بروئیرس ولگیرس۔ شہوت دیر سے آئے یا لطف نہ آئے۔

بروئیم۔ لطف نہ آئے۔

اویمیم۔ انزال کے وقت متوقع لطف نہ آئے۔

### مباشرت تکلیف دہ

فیرم میٹ۔ جماعت تکلیف دہ بعد میں خون آئے۔ رحم میں دکھن اور کاٹنے والی درد۔

کرلوزوٹ۔ جماعت کے دوران اور بعد میں تکلیف ہو۔

آر جنٹلمن ٹریٹمنٹ۔ مجامعت کے دوران تکلیف ہو۔  
 نیٹریم میور۔ مباشرت کے دوران تکلیف، رحم کی خشکی کیساتھ احساس کرا اندام نہانی کی دیواروں  
 کے ساتھ چھتی دلی ہوئی ہے۔  
 لائیسین۔ تکلیف مباشرت سے نفرت، بچے کی پیدائش سے شروع ہو۔  
 سیسیا۔ لیکوریا کے ساتھ مباشرت کے دوران شدید تکلیف۔  
 ہائیڈرائٹس۔ تکلیف ہو جنسی خواہشات متواتر ہوں خاص طور پر جب عورت کے اندام  
 نہانی سے انڈول کی نفی جیسا مواد خارج ہو۔  
 مرکلر۔ فرج کو چھونے سے یا دبانے سے سسل درد۔  
 بربریس و لیکرس۔ اخراج تکلیف دہ ہو یا زیادہ دیر سے ہو۔

### بچہ کی پیدائش یا جناح

پہلے، دوران اور بعد کی تکلیف۔  
 اکیٹا ریسومسا۔ یہ دوائی تین یا چار ماہ بچہ کی پیدائش سے پہلے ہی جملے تاکہ محفوظ اور  
 بغیر تکلیف کے بچہ کی پیدائش ہو جائے۔ اگر پیدائش سے چند دن پہلے بھی دیکھ جائے تو بھی محفوظ  
 اور بغیر تکلیف کے پیدائش ہو سکتی ہے۔ یہ زندہ بچوں کی پیدائش کی ضامن ہے اگر پیدائش سے  
 چھ ماہ یا سات ماہ پہلے دن میں ۳ دفعہ متواتر دیکھ جائے۔ یہ بھوٹی در دوں کو بھی روکتی ہے۔  
 پلسٹیل۔ بھوٹی در دوں کو روکنے کے لئے اور محفوظ پیدائش کے لئے مناسب وقت  
 پر ایک ہزار طاقت کی خوراک ہر پندرہ منٹ کے بعد دیں۔ تیسری خوراک کے بعد محفوظ پیدائش ہو  
 جملے گی اور آئندہ خوراک ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگرچہ دو یا تین دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔  
 یہ بچہ دانی یا رحم میں بچہ کی پوزیشن کو بھی درست کر دے گی اگر غلط ہو جائے۔ اگر جھلی کے  
 پھٹنے سے قبل دس دی جملے۔ نفاس کم مقدار میں۔  
 و سکم الہم۔ آئول کا اخراج ترک جائے۔

بیلاڈونا۔ آئول رک جائے، کافی زیادہ گرم خون ہے۔  
 کینتھرس۔ آئول رک جائے اور تکلیف دہ پیشاب ہو۔  
 سبائنا۔ کمزوری کی وجہ سے آئول رک جائے۔  
 اکوناٹ این۔ جب نفاس دب جائے، نفاس (۵ مواد جو بچہ کی پیدائش کے بعد گرم سے بہتا ہے)۔  
 نائٹرک الیڈ۔ خواش دار نفاس۔  
 ٹریلیم۔ خونی نفاس۔  
 بیلاڈونا۔ نفاس گرم اور کم مقدار میں۔  
 کریوزوٹ۔ نفاس خواشدار اور وقفہ دار۔  
 آرم میوزنیرم۔ یہ آنکھ میں بتلاؤ ماؤں کو دیکھنا ناگوار ہے اس مرض سے محفوظ ہو جائیں۔  
 آرنیکا مانٹ۔ بچہ کی پیدائش کے بعد کی دردوں کے لئے بہترین دوائی ہے  
 کالوفائیلم۔ دردزہ کم وقفہ کے لئے۔ بے قاعدہ بچہ کی پیدائش کے شروع میں تشنجی جھوٹی درد۔  
 جلد پیدائش کے بعد خون ہے۔ بچہ کی کمی کی وجہ سے۔ کافی دیر تک دردزہ کی وجہ سے بعد کی  
 تکلیف۔ تشنجی۔ پیٹ کے نچلے حصہ سے چڑنے تک بڑھیں۔ پلسٹیلہ کی مددگار دوائی ہے۔  
 جبکہ رحم میں بچہ غلط حالت میں ہو۔ دن میں ۳۰ طاقت کی ایک دویاتین ہفتے پیدائش سے  
 پہلے پیدائش کو آسان بنا دیتی ہے اور جھوٹی دردوں کو روکتی ہے۔  
 چائنا۔ بچہ کی پیدائش کے بعد بہت زیادہ خون بہنے پر ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک ملینہ  
 کی طاقت کو بحال کر دیتی ہے۔  
 سٹرامونیم۔ شدید غلبہ شہوت زہنگی کے دوران۔  
 پیچوٹرین۔ سست دردزہ کے لئے رحم کا جمود۔ دردزہ کی دوسری سطح میں جبکہ فرج کا  
 منہ کھلا ہوا ہو۔  
 روٹا۔ بچہ کی پیدائش کے بعد اعضاء مستقیم یا یقیم کا اخراج۔  
 نکسوامیکا۔ زہنگی کے دوران بچہ کی جھکائی نے پیٹے اور نیند کو روک دے۔

کیوسرپم میٹ - بچہ جننے کے دوران مریضہ چانک اندھی ہو جائے۔ درد دس جا میں۔  
 اور انگلیوں اور انگوٹھوں میں انگوٹھیں اور تشیع شروع ہو جائے۔  
 پلاٹینا - زچگی کے دوران شدید غلہ نہ ہو۔  
 کالی کارب - خون کی نالیوں کی کمزور حالت کی وجہ سے بچہ جننے کے ایک ہفتہ بعد بہنا شروع ہو جائے۔  
 کاسٹیکم - بچہ جننے کے بعد پیشاب بند ہو جائے۔  
 وائرنم ایپلو - دروزہ کی جھوٹی درویدس جو ایک عورت کو ہفتوں تکلیف میں مبتلا رکھنے لگی ہیں  
 بعد کی تکلیف چھکے لئے ہر درد کے بعد ایک خوراک دیں۔

## جنسی خواہش

برصی ہوئی جنسی خواہش  
 دیکھئے زیادہ خواہش۔

ماسکس - بغیر کسی ظاہری وجہ کے برصی ہوئی جنسی خواہش۔  
 پلاٹینا - نوجوان لڑکیوں میں ناقابل کنٹرول جنسی خواہش وقت سے پہلے جنسی اعضاء اور  
 خواہش کا بڑھ جانا۔ یہ خواہش زچگی والی عورتوں میں شدید ہوتی ہے۔  
 ایسٹریا ریب - برصی ہوئی جنسی خواہش جس کی جماعت کے بعد بھی تسکین نہ ہو۔ رحم  
 میں ٹکین - باہر آنے کا احساس، مسج کے وقت شدید خواہش جماع۔  
 مائوسائیمس - شدید جنسی بھوک۔ بے حیائی سے اپنے آپ کو تنگی کرے فحش باتوں کی لگن ہو۔  
 کالی فاس - کنواری لڑکیوں میں جنسی برائگی تنگی ہر حیض کے بعد جنسی خواہش برصی ہوئی ہو۔  
 لیم ٹنگ - بچہ دانی تکلیف کے ہمراہ نہ بچنے والی جنسی بھوک پیاس۔ اندام نہانی میں بھرپور  
 غارش جلاؤ کے احساس کے ساتھ۔ شدید جنسی خواہش اسے دبانے کے لئے اپنے آپ کو معرکت  
 اور بگینم - جب عورتوں میں شدید جنسی خواہشات کے ساتھ وہ حلق پر پھیر رہی ہو جائے کیے  
 موزوں ہے۔

لیکے یک فلوک - جب پھالتی کو ہاتھ چھو جائیں تو آسانی سے جذبات اُٹھائیں۔  
 نیرٹم کارب - گلے ملنے یا ہم آغوش ہونے کے بعد عورت مادہ منویہ کو تالو میں نہ رکھ سکے۔

فاسفورس۔ بیوہ عورتوں میں شدید خواہش جامع۔ مجبوری کے تحت کیوجہ سے شدید جنسی خواہش۔  
 ٹیسٹوسٹولیا۔ بڑھاپے میں شدید جنسی خواہش چلانے کی خواہش کے ساتھ۔ رحم میں درد سکر اوڈ  
 بند ہونے کے احساس کے ساتھ سختی۔

میوہ رکیں۔ جنسی اعضاء کے ساتھ معمولی سا چھو جانا بھی شدید جنسی جذبات کو برانگیختہ کر دیتا ہے۔

## جنسی خواہش میں کمی

### دبائی ہوئی جنسی خواہش

کونیم۔ بچہ دانیوں اور رحم کی سختی اور بڑھ جانا۔ خردج رحم سرور کس کی سختی اور نامور کے ساتھ  
 شدید لیکوریا۔ یہ سب جنسی خواہشات کے دبائے سے ہوتا ہے۔  
 انڈوسٹوڈیم ویر۔ جنسی خواہش مکمل طور پر تباہ ہو یعنی بالکل ہی نہ ہو۔ رحم کی دوسری خرابیوں کے  
 ساتھ بالان کے بغیر جیسے کہ بچے کی طرف دباؤ۔ اینٹھن۔ رحم میں دکھن۔ چھائیاں سوجی ہوئی ملکی  
 ہوں اور اجتماع خون ہو۔ یہی ایم طاقت میں دیکھئے۔

### رحم اور بچہ دانیوں کی سوزش۔

نکس و امیکا۔ بچہ دانی کی حاد سوزش۔ پیرٹونیم کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر جب  
 بخار زیادہ تیز نہ ہو یا جب بخار کم ہو گیا ہو۔ پیٹ کے غلے حصہ میں درد۔ چھوٹی کمر میں درد۔ رحم  
 کے سوراخ کی سوزش پیٹ میں بوجھ اور ملن ہو۔

سیپیا۔ بچہ دانی کی حاد سوزش میں۔ اندام نہانی کی تکلیف دہ سختی۔ بچے کی طرف دباؤ  
 جیسے کہ ہر چیز رحم کے راستے خارج ہو گیا۔ رحم کا گر جانا۔

گرگرفیٹیس۔ رحم کی حاد سوزش بچہ دانی کی سوزش کے ساتھ یا بغیر لیکن جلد ہی باطل ہو۔  
 پلائینٹا۔ رحم کی حاد سوزش اور بچہ دانی کی حاد سوزش زچگی کے بعد جنسی خواہش بڑھی  
 ہوئی اور رحم کی خارش۔

کو نیم۔ رحم کی مزن سوزش پھر دانیوں کی یا پھیٹوں کی سوزش کے پہلو یا اس کے بغیر پیٹ تھاہوا۔  
 رحم میں چکیاں ہی بھر ہوں اور سکڑن۔ پیچھے کی طرف پروردہ داؤد خونی یا دودھیا لیکوریا سے بچکی۔  
 برائی اونیا۔ پیٹ اچھا ہوا اور بھلا لگنے جیسے درد سے دکھے قبض۔ بخار۔ ٹھنڈے پانی کی  
 پیاس کے ساتھ۔

کیومیلا۔ مادہ سوزش رحم جو شدید محدودی غصے کا درد و حیض کے دوران باز مگی کے بعد ہوا کی وجہ  
 سے پیٹ پھولا ہوا اور دکھے۔

کالوٹیکس۔ جب دبے ہوئے حیض یا نفاس کے دب جانے کے بعد کیومیلا ناکام ہو جائے۔  
 کرلیورٹ۔ پھر دانی کی مزن سوزش۔ فرج اور رحم بجلی کے جھٹکوں جیسے پھنبے والے  
 درد۔ لیکوریا جو لنن پر پھورادارغ ڈالے۔

سیلاڈونا۔ غصے کے بعد سوزش، خاص طور پر بچگی کے بعد۔ آلات ناسل پر پروردہ داؤد۔  
 چہرے کی سسختی کے ساتھ کھورنے والا درد۔

چائنا۔ خون کی کمی کے بعد یا بہت زیادہ مباشرت کے بعد۔  
 آر سینک البم۔ پیچھے کی پیدائش کے دوران۔  
 رسٹاکس۔ پیچھے کی پیدائش کے بعد یا سفائید کی علامات کے ساتھ۔  
 پیلا سیٹیل۔ پاؤں ٹھنڈے ہو جانے کے بعد حیض کے دب جانے پر۔ دودھ کی کمی  
 ٹھنڈک اور پیاس نہ سونچے کھینچاؤ اور پیٹ کے پچھلے حصہ میں سکڑن۔  
 ایپس۔ پچھن میں پھر دانی کی سوزش۔

اکوٹائٹ۔ حیض کے دب جانے یا ڈر کی وجہ سے سوزش۔ علاج کے شروع میں دیمائے۔  
 لیکس۔ صبح کے وقت تکلیف یا سونے کے بعد تکلیف۔

آلات ناسل کی خارش۔ سلفر۔ خشک غارش جو بہت شدید ہو مریض غارش  
 کرتا ہے۔ حتیٰ کہ غارش زردہ حصوں کو خون ہے۔

کانسوینیا۔ اندام نہانی کی خارش خاص طور پر حمل کے دوران۔  
 ٹیڑنٹولا آپتھ۔ خارش جس کے ساتھ اندام نہانی سے ہوا خارج ہو۔ جنسی جذبات اور ہڑیا  
 چلانے کی خواہش کے ساتھ۔ اندام نہانی میں درد۔ سکٹن۔ سختی بند ہونے کے احساس کیساتھ۔  
 اٹریکالیورنٹس۔ فرج کی خارش حمل کے ساتھ فرج کے ہنٹوں کی سوزش اور موٹاپا۔ انگریزا  
 کیلیڈیم۔ فرج اور اندام نہانی کی خارش کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ خارش بعض اوقات  
 انٹریوں کے کرموں کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہے جو فرج میں آجاتے ہیں اور جلن کا باعث بنتے  
 ہیں اور جنسی جذبات کی شدت فرج پر خارش جو حمل کے دوران جلتی پر مجبور کرے۔  
 امبرگر لیبیا۔ فرج کے بیرونی حصے کی دکھن اور سوزش۔ حیض کے دفعے کے دوران  
 خون ہے۔ نیلگوں لیکوریا۔  
 ہیلونیاس۔ فرج اور اندام نہانی کی خارش۔ شدید خارش کہ گوشت اکھڑ بھٹکنے  
 کو چھی چاہے۔ جلد سرخ اور سوجی ہوئی ہو جیتی دہی جیسی جلتی سے ڈھانپی ہوئی ہو۔  
 ارم میوزنیٹرو۔ اندام نہانی کی اگلی جلد پر ناسور۔ اندام نہانی کے گوٹر۔  
 سیسیا۔ لیکوریا کے براہ اندام نہانی کی خارش۔  
 برومیم۔ ذہنی خرابیوں کے ساتھ اندام نہانی کی خارش۔  
 کیلیوزوٹ۔ فرج میں گہری مزیدار خارش اندام نہانی کے لبوں کی سوزش اور حمل  
 کے ساتھ۔ ہر وقت ملنا پڑے زرد، خراشدار لیکوریا۔  
 یلیم ملگ۔ شہوت انگیز خارش متعلقہ حصوں کے بھراؤ کے ساتھ۔  
 لورکیس۔ حمل کے دوران خارش۔  
 مرکوریس۔ خارش جو پیشاب لگنے سے زیادہ جو دھوا پڑے لیکوریا جو خراشدار اور  
 رات کے وقت زیادہ ہو۔  
 اروفورنیم۔ خارش کے لئے جو خارش کچھ عرصہ کے لئے حیض کے بعد ہو۔

## لیکوریا

سیدیا - قبض کے ساتھ تپلا لیکوریا - خراشدار - کھا جانے والا - زرد - پانی کی طرح یا سرخی مائل سبز لیکوریا - فرج میں گرمی اور خارش - حیض سے پہلے لیکوریا ، بیرونی اعضا متاثر کی دُکھن کے ساتھ - چھوٹی بچپن میں لیکوریا -

مرکبوس - خراشدار لیکوریا - جلن ، خارش دُکھن کے ساتھ - ہمیشہ رات کو زیادتی - خارش جو پیشاب لگنے سے زیادہ ہو جو دھونا پڑے -

بورکیس - دہی کی طرح کالا لیکوریا - انڈے کی طرح سفیدی والا لیکوریا - احساس گرگم پانی نیچے کی طرف بہہ رہا ہے - خراشدار لیکوریا - کلکیر یا کارب - تپلا دودھیا لیکوریا -

کیوبیسیا - شدید - زرد - سبزی مائل خراشدار اور بدبودار لیکوریا - چھوٹی بچپن میں لیکوریا - ہائیڈراسٹس - چکنے والا گارٹھا رحم یا فرج بے دھاگوں جیسا ایک قسم کی خارش کنو والا - آرسینکیم آئیوڈ - جب اخراج جلن پیدا کرنے والا ہو اور خراشدار - شدید جلن پیدا کریں - ایسڈ ٹائٹریک - خراشدار پھلکے دار پرت دُور میں - فرج کے ہونٹوں کے بچہ دانی کے حصّہ میں جلن دار اور پھاڑنے والے درد ہوں

بربریس و لگیرس - لیکوریا پیشاب کی تکلیف کے ساتھ -

ملی فولیم - بچپن میں لیکوریا -

پلسٹیل - پانی جیسا خراشدار اور جلندار لیکوریا - دودھیا ، گارٹھا اور سفید لیکوریا -

لائیکوپوڈیم - کبھی کم اور کبھی زیادہ ، دودھیا یا پورے چاند پر اعصابی ، لیکوریا سے پہلے پیٹ کے نچلے حصّہ میں درد قوی -

فامفورس - حیض کی بجائے لیکوریا - حیض سے پہلے انڈے کی سفیدی جیسا لیکوریا - رونے کی رغبت اور پیشاب کی اکثر خواہش یا زیادتی - سوڑھے سوچے ہوئے -

نیرٹم کارب - گاڑھا، زرد، بدبودار - لیکوریا -

سٹانم میٹ - سبز، گاڑھا - زرد زیادہ لیکوریا، اعصابی درد کے محو ہونے کے بعد -  
گر فیاٹس - حیض کے بجائے لیکوریا - حیض کے دوران شدید سستی - اندام نہانی کی

شدید خارش حیض سے پہلے -

کاربودتج - جب اخراج شروع ہو تو مریض اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے جو نہی یہ بند ہو -

تو دوسری بیماریاں اکھیریں -

میڈرونیٹم - جب اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوائی دی جانی  
چاہئے - ہر پندرہ دن کے بعد ایک ایم طاقت کی ایک خوراک دیجئے -

کریوزوٹ - جب اخراج خراشدار - خونی ہو - سفیدی مائل لیکوریا جو سفید لٹن پر پھیلاؤ  
دے - چھوٹی کمریں درد - ٹانگوں کی کمزوری -

الیومنا - جب لیکوریا اتنا زیادہ ہو کہ یہ نیچے ایڑیوں تک پہنچ جائے - یہ خراشدار بجھنے والا  
بہت زیادہ جھیلنے والا - گاڑھا اور زرد - خراج سے خارش -

ادائیٹسا - یہ لیکوریا کے لئے تقریباً مخصوص دوائی ہے -  $3 \times$  طاقت میں استعمال کر لئی جائے -  
کالوفائیلیم - چھوٹی بچیوں کے لئے لیکوریا میں دی جائے -

کینابلس سٹائووا - " " " " -

کالولس آئی - - چھوٹی بچیوں میں لیکوریا - حیض کی بجائے لیکوریا -

آئیوڈین - رحم کی گردن کی سوزش کے ساتھ لیکوریا - پہلو دکھیں کیونکہ اخراج خراشدار  
ہوتا ہے - مزمن لیکوریا جو گاڑھا ہوتا ہے، لیسدار اور بعض اوقات خونی -

نیرٹم فاس - حیض کے بعد لیکوریا - خراشدار کثرت سے، بالائی جیسا، شہد جیسا رنگ کا -  
کشیوڈالا - زرد پانی جیسا - بڑھی ہوئی جنسی خواہش -

ایلو - خونی آنول کے ساتھ لیکوریا جس سے پہلے درد قلع ہو -

تھلاپی - خونی، بدبودار لیکوریا کثرت سے حیض کے دوران میں بہت دیر تک خون ہے -

اوسموٹیم۔ لیکوریا ہلکا زرد، بدبودار، غراشدار اور کثرت سے نیچے ٹانگوں تک ہے۔  
ایسکولس ہرپ۔ لیکوریا گہرا زرد گاڑھا اور چپکنے والا بجلی کر کے لنگڑے پن کے ساتھ جو چلنے

پر جواب دے دے۔

تھو جا۔ حیض کے دوران یا حیض کے عوض جب ٹیکہ لگایا جائے یا لگایا گیا ہو ٹیکے کی ہٹری

ہو یا جب کئی دفعہ ٹیکہ لگایا جا چکا ہو۔

سینی کو لا۔ مچلی کے پھینکے میسی شدید بُردالا لیکوریا۔

چائنا۔ حیض سے پہلے لیکوریا۔ بدبودار خونی لیکوریا۔ چڑے اور معقد کثیر تکلیف دہ واؤ۔

میوریکس۔ لیکوریا جب ہے تو مریضہ باسومل ہو لیکن رکنے پر اس کے برعکس یعنی ابھی

طبیعت نہ رہے۔ مزاج بگڑ جائے۔

کاربو انیمیلس۔ لیکوریا جو لنن کے کپڑے پر زرد شان ڈال دے۔

سفلیٹنیم۔ لیکوریا کی زیادتی جس سے وہ مال بھیگ جائے اور ایلویوں تک بھیگ جائے۔

الیومن۔ لیکوریا کی کثرت، رحم کے نامور اور سختی کے ساتھ کثرت بھی ہو سکتا ہے۔ مریض

زرد رہتا ہے۔

## زندہ بچے کی پیدائش۔ پستان۔ چھاتیاں

### پھوڑا۔ (حمل کے نیچے دیکھئے)

ہیمپسلفر۔ سوزش جس میں پیپ بننا شروع ہو چکی ہو یا شروع ہونے کے قریب ہو۔ یہ

پیپ بننے کو روکتی ہے۔ چھاتیوں کی سوزش شدید گرمی کے ساتھ اور تکین ہو۔

بیلارڈونا۔ سوزش کے اعتبار سے ابتدائی دور میں جب حصے سُرخ اور سخت ہوں۔

فائوٹولا کا۔ ٹیکوں کی طرح کی سختی جب پیپ ناگزیر ہو۔ چھاتیوں میں سخت ٹیکوں کے لئے

جو بچے کے سر کے مارنے پر زخم یا دودھ کے اکٹھا ہونے پر ہوں، اکیلے شاندار دوائی ہے۔

برائی اونیا۔ ابتدائی سلیج میں چھاتیوں کی سختی جب دودھ کے اکٹھا ہونا اور حرارت

سے ہو یہ دوستو ملقات میں دی جانی چاہیے ہر چھ گھنٹے بعد تین یا چار غور اکیس ٹھیک کریں گی۔  
 سلیشیا۔ ایک جھٹ یا دوسرا جھٹ چھوڑے سے پھر دود کے ساتھ ایک ہی شستر کر  
 عام چھوڑے سے اخراج ہو یا کئی سواریں ہوں۔ ہر گز کے لیے علیحدہ پیپ دلزالی میں پیپ  
 کی طرح کا اخراج نکلتا محسوس ہو۔

لیکس۔ جب متاثرہ جھٹ نیلا یا میٹنی رنگ کا اظہار کریں۔ مریض رات کو ٹھنڈک اور  
 دن میں گرمی کے درمیان محسوس کرے۔

### چھاتیوں کا گھٹنا۔

اولس موڈیم۔ چھوٹی ہو جائیں یا عام جسامت سے بھی چھوٹی ہو جائیں یہ کم طاقتی کی خوراک  
 چما فیلا۔ چھاتیوں کے گھٹنے یا بہت زیادہ بڑھ جانے کیلئے شاندار دوائی ہے۔  
 سیبل سر۔ حیض کے دیر سے آنے کی وجہ سے چھاتیاں سوکھ جائیں یا رحم کی دوسری بیماریوں  
 کی وجہ سے۔

نکس باسکاٹا۔ چھاتیاں چپٹی ہو جائیں جو پہلے ٹھیک ٹھاک گول تھیں۔ چھاتیاں بہت  
 چھوٹی اور بغیر دودھ کے نپل اندر دھنسنے ہوئے۔

کرلوزوٹ۔ چھاتیوں کا گھٹنے گھٹنے پھوٹے ہونا۔ پروردہ جھیلے سے بن جائیں۔  
 کوٹیم۔ چھاتیوں کا چھوٹا ہونا۔ نرم پلپی پھیلنے کی طرح کی جلد رہ جائے۔ یہ بڑھ بھی  
 سکتی ہیں اور سخت ہوں۔

ڈولکا مارا۔ جب لیکوریا اور حیض کی کمی کے ہمراہ ہو۔

ایوڈیم۔ چھاتیوں کا گھٹ جانا جب کہ دوسرے غدود بڑھ جائیں۔

### خون بہنا۔

لائیکوپوڈیم۔ چھاتیوں میں خون بچہ اتنی مقدار میں پی لے  
 کہ جب قے کرے تو خون کی ہی ہو۔ پستانوں سے خون اور پانی کا اخراج جلدی سے خون ہے۔

ہیما میلنس - شدید دُکھن کے ساتھ خون ہے۔  
سیپیا - خون ہے پیپ کا بھی امکان ہو۔

کینسر - پستانوں کا حجم بڑھ جانا۔

(دیکھئے رسولیاں)

فائٹولا کا - پستان بڑھ جائیں - بھرے ہوئے کہ دودھ ابل پڑے گا۔  
فریگریا ولیسکا - یہ پستانوں کے حجم کو کم کر دیتا ہے اور دودھ کو سکھا دیتا ہے۔  
کونیم - عام بڑھوتری یا جھٹے کی بڑھوتری۔  
چماقیلا - یہ دوائی پستانوں کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا دونوں کو ٹھیک کرتی ہے۔

سوزش

برائی اونیا - دودھ کے حجم جانے یا کسی اور وجہ سے پستانوں کی سوزش۔  
بیلادونا - جب جھٹے مرنے اور گرم ہوں۔  
مرکوریس - جب بیلادونا اور برائی اونیا ناکام ہو جائیں۔  
بلیس پر - جوٹ یا نکالنے کے بعد جب سوزش اور سختی قائم رہے۔  
کونیم - سوزش کی سختی کی شیع - جھٹے مضبوط سخت اور پردہ ہو جائیں۔ بائیں پستان  
میں سوئیاں سی چھیں سوزش اور سختی کے ساتھ۔  
فائٹولا کا - جب پستان زیادہ تکلیف کے ساتھ پتھر کی طرح سخت ہوں۔ پستانوں میں  
سوزش اور پیپ کا پڑ جانا۔ پستانوں میں دُکھن اور ڈھیلے۔

دودھ

کلیر یا کرب - دودھ بڑھانے کے لئے۔  
لیک ویک ڈیفیلو - دودھ کم کرنے کے لئے۔

چھوٹے شخص - دودھ کو روکنے کے لئے۔

سیبل سر - دودھ کی پیدائش بڑھانے کے لئے۔

لیکٹورا ٹرڈسا - دودھ بڑھانے کے لئے۔

ر سینس - دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ بڑھانا اور کنواریوں میں بھی۔

سکٹافاس - کم دودھ یا دودھ کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے جبکہ دودھ دب گیا ہو تب بھی دودھ کی کمی کا راز ماروئے۔

لوریکس - دودھ بہت گاڑھا اس کا ذائقہ بُرا۔ یہ بات والدہ کو بچہ کو دودھ پلانے سے

روکتی ہے (یہ دوائی حمل کے دوران دی جانی چاہیئے تاکہ پیدائش کے بعد دودھ منروں اور

ذائقہ دار ہو جائے۔ بچہ بُرے ذائقہ کی وجہ سے چھاتیوں کو منہ میں لینا پسند نہ کرے۔

آرٹھیکا لیورینس - چھاتیوں کی سوزش کے ساتھ دودھ کم اترے۔ جو عورتیں دودھ چھڑانا

چاہیں۔ ان کا دودھ سکھا دیتا ہے۔

پلسٹیللا - دودھ کو روکنے کے لئے ان ماؤں میں جو اپنے بچوں کا دودھ چھڑانا چاہیں۔

یہ دودھ چھڑانے کے فوراً بعد دی جانی چاہیئے اگر یہ درد سے افات زدہ یا آسانی پیدا نہ کر سکے

تو کلیرا کارب دی جانی چاہیئے۔ یہ دودھ کو دبانے اور سوجی ہوئی چھاتیوں اور درد کو روکنے

کے لئے مفید ہے۔

ایسا فوٹو میڈا - دودھ بڑھانے کے لئے اس کو قسم بھی کرنے کے لئے پستان دودھ

سے تھمے حمل کے بغیر بھی۔

لیسی تھین - دودھ بڑھانے والی شاندار دوائی ہے۔ یہ دودھ زیادہ تقویت

دینے والا اور مقدار میں زیادہ ہو۔

مرکوریس - حیض کی بجائے پستانوں میں دودھ۔ لڑکوں میں بھی چھاتیوں میں دودھ

ہو سکتا ہے کے لئے مفید ہے۔ غیر شادی شدہ۔

## لڑکیوں کی چھاتیوں میں دودھ

کلیر یا فاس - پختہ دودھ پینے سے اسکار کر دے کیونکہ دودھ نمکین ذائقہ کا ہو۔  
 فائٹولا کا - چھاتیوں کی سوزش جب دودھ تاردار ہو اور نپل سے نیچے نکلے جما ہوا دودھ۔  
 دودھ کم گاڑھا غیر مستحکم اور جلد خشک ہو۔ پانی کی طرح کا خونی اخراج جو برسوں جاری رہے بچے کو  
 دودھ چھوڑنے کے بعد اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

نیوفو - جب دودھ خونی ہو۔

آرم سلف - پستانوں کی سوزش کے ساتھ دودھ دب جائے یا بالکل نہ رہے۔

لیک کینیم - دودھ کو مکھانے کے لئے جب وہ بہت کثرت سے ہو۔

سیکل کار - بچہ کی پیدائش کے بعد دودھ دب جائے یا قلم ہر ہی نہ ہو یعنی نہ اترے۔

اگنس کاٹس - دودھ کی کمی ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو جب اس ذہنی کیفیت کے بغیر بچی

پر دودھ نکلا ہر نہ ہو۔

کیمو میلا - جب غصے کے ذرے کی وجہ سے دودھ دب جائے۔

الفلقا - دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ۵ سے ۱۰ قطرے

مدر نکچر دن میں چار بار دی جائے۔

## سر لیستان - بھٹنی - نپل -

فائٹولا کا - بھٹیاں دکھیں اور لیستانوں میں پھوڑے کا رجحان - بھٹیاں اندر کو دھنس

جائیں بچوں کو دودھ ملتے وقت شدید درد - بھٹیاں بھٹی ہوئی یا چمڑی ہوئی بھٹیاں

حساس دکھیں اور حیرے آئے ہوئے - دودھ پلانے پر زیادتی ہو۔

ساربر لایا - بھٹیاں سڑی ہوئیں درد والے حوض کے ہمراہ - اسہال - قے اور فشی کے

دورے - بھٹیاں پھوٹی مرجائی ہوئی اور غیر خوش پذیر ہوں - یعنی جذبات برا بیگختہ نہ ہوں۔

کیسٹر کوئی۔ بھٹیاں دکھیں۔ چری ہوئی اور بھی ہوئی۔ شدید حساس پھو جانا برداشت  
نہ کر سکیں۔

پائیدار ایٹمس۔ دودھ پلانے والی عورتوں میں پستانوں پر خارش۔ بھٹیاں اندر کوڑھنی ہوئیں  
گر لیفاٹس۔ کھا جانے والے چھالے یا پھوڑے یا ناسور جن سے چپکنے والا مادہ خارج  
وقت آتا رہا۔ لیکن دوبارہ ہو جائے۔ بھٹیاں دودھ پلانے سے چر جائیں یا پھٹ جائیں۔  
کاسٹیکم۔ بھٹیاں جن کے گرد داہو۔

کاروائی ایٹمس۔ بھٹیوں پر گومڑ سخت اور مرغیوں کے اندے کے برابر ہوں۔  
کروٹن ٹیکم۔ بھٹیوں سے درد کمر تک جائے، بچوں کو دودھ پلاتے وقت۔ بھٹیوں  
کا درد کی وجہ سے کھینچا دے جیسے کر رہی ہے کھینچا جا رہا ہو۔

سلیٹیا۔ سارے جسم اور بھٹیوں میں دودھ پلاتے وقت درد۔

فلنڈیریم۔ دوران دودھ پلانے کے ناقابل برداشت ہو۔

بوریکس۔ جب دودھ پلانے تو مخالف بھٹنی میں درد ہو۔

رہنہیا۔ بھٹیاں دودھ پلانے سے پھٹ جائیں اور چر جائیں۔

## جلق

اور یگنیم۔ جلق میں موثر ہے اور شدید بھٹی ہوئی سنہی خواہش لیکوریا ہو گیا  
غش خیالات اور خواب۔

کیلیڈیم۔ اندام نہانی اور رحم کی خارش جس سے طبع کار جھان ہو رات کے وقت رحم  
میں تشنجی دریں۔

دیکھئے۔ موقوفی حیض، ۱۔

## موقوفی حیض۔ حیض رُک جائے

پلسٹیللا۔ جب کسی ظاہری وجہ کے بغیر موقوفی پر حیض نہ آئیں۔ جب لیض مزاجا ڈپرک

مرض بتاتے وقت رو پڑے۔ کھلی ہوا میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے۔ پاؤں کو گھٹا کرنے سے حیض دب جائیں۔

فرم میٹ۔ جب حیض کا دب جانا یا حیض میں تاخیر کمزوری یا کمی خون کی وجہ سے ہو سکتی کاہلی اور دل کی دھڑکن ہمارا ہو۔

سائیکلیمین۔ گھٹا ہونے کی وجہ سے حیض کا دب جانا۔ جب پلسٹیلوالی علامات موجود ہوں لیکن مریض کھلی ہوا میں تکلیف محسوس کرے۔ سر چکرائے اور سرور محسوس کرے۔

اکونائٹ امین۔ جب ٹھنڈے گنے سے حیض دب جائیں۔ اگر رافانڈر کرے تو پلسٹیلوالی بجائے۔

سلفر۔ جب مذکورہ بالا تمام ادویات ناکام ہو جائیں۔ خاص طور پر جب معدہ کے گڑھے خالی بن کا احساس ہو، سر دھکنے کے ساتھ۔

سینشو آرنیس۔ حیض کے دب جانے سے کھانسی بہڑیا۔ عرشہ سبز زبان۔ گلاب ٹھنڈا۔ اور تنگی تنفس جیسی بیماریاں لاحق ہو جائیں۔

ٹرنیرا۔ خواتین میں افسردگی۔ نوجوان لڑکیوں میں باقاعدہ حیض جاری کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مڈنچجر کے ۱۰ یا ۱۵ قطرے دن میں دو بار کھانا کھانے کے نصف گھنٹہ کے بعد۔ ڈیمانہ۔ مندرجہ بالا ادویات علامات رکھتی ہے۔

سٹرمونیم۔ حیض یا نفاس کے دب جانے کے بعد کی تکالیف کے لئے۔

سیبل سر۔ رحم کی بیماریوں کی وجہ سے حیض دیر سے آئیں اور چھاتیاں سڑ جائیں۔

لیک ویک ڈیفلو۔ ٹھنڈا پانی پینے یا اتھ ٹھنڈے پانی میں ڈالنے سے حیض دب جائے

رحم کے حصے میں شدید درد۔ سر درد شدید۔

نکس مارسکا۔ ذہنی ہلچل بھنگنے سے یا بھیگنے سے، غنودگی کے ساتھ غشی اور اتھ پاؤں ٹھنڈے۔ فرج سے ہوا خارج ہونے کے ساتھ حیض دب جائیں۔

۔ لولپی اوئم۔ جب حیض بہنے کا وقفہ ہو تو ناک سے خون بہہ کا ٹرک جاتی ہے۔

جب حیض بہنے لگے۔ زرد لیکوریا کے ساتھ کرمیں درد ہو۔

میگنٹیا میور۔ حیض سیاہ رنگ کے۔

مرکیورس۔ پستان درد کریں جیسے کہ ہر حیض پر ان پر ناسور یا پھوڑے نکلیں گے۔ حیض کی بجائے چھاتیوں میں دودھ یا حیض کے وقت چھاتیوں میں دودھ۔

ایپس میل۔ اعصابی۔ ہسٹیریائی۔ شرمیلی اور بوقوف مریض خواتین کی بلوغت پر حیض کی بجائے یہ قدرتی بعد اپن نہیں بلکہ پھٹوں کی ایک دوسرے سے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

کیسٹورم۔ حیض نہ آنے پر درد اچھارے کے ساتھ۔ رحم کی کمزوری کی وجہ سے حیض کا خون قطرہ قطرہ آئے۔ اعضائی درد۔ پیٹن کے ہلرہ۔ ٹھنڈے پسینے جذبات کی براہگشتی کی وجہ سے اچانک کمزوری۔ پاؤں ٹھنڈے۔ ناف کے قریب کترن سی۔ پیٹ ہوا کی وجہ سے تالہ۔

چڈے میں کھنچاؤ حیض کے دوران پاخانے کا رجحان۔

کوکولس انڈر۔ حیض دے ہوئے غم اور پریشانی کی وجہ سے چکروں کے ساتھ۔ سر درد اور تلی۔

سیپیا۔ حیض نہ آئے۔ شدید ہسٹیریائی سر درد کے ہلرہ لیکوریا اور دانت درد نرم مزاج چہرہ پر زردی مائل دھبے۔ کانپے اور گرمی محسوس کرے کیے بعد دیگرے۔ نازک سی عورتوں میں بلوغت پر حیض رک جاتے۔

لائیکوپوڈیم۔ ڈرکیو جے حیض رک جائیں۔ سر درد۔ کھٹی تے۔ پاؤں کی سوزش۔ غشی کے دورے اور لیکوریا۔ جب وہ ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ سال کی ہو جائے بغیر حیض کے چھاتیاں

بڑھیں اور بچہ داناں اپنا معمولی کام نہ کریں۔ اندام نہانی سے ہوا کا اخراج ہو۔

ڈلکا مارا۔ ٹھنڈی وجہ سے یا ٹھنڈی جگہوں پر رہنے سے حیض کا رب جانا چھاتیوں میں اجتماع خون اور سخت۔ ہاتھوں پر مٹے۔ ہر حیض پر جلد پر پھوڑے ظاہر ہوں۔

کالی کارب۔ ابتدائی یا ثانوی طور پر حیض کی بندش۔ تنگی نفس۔ دل کی دھڑکن۔ پیٹ میں تشنگی۔ رخساروں اور مسوٹوں کی سوزش۔ لیکوریا۔

پیچو متھس۔ یرقان کی وجہ سے حیض نہ آئے۔

نوٹ۔ کئی خون یا ٹی بی جیسی بیماریوں کی وجہ سے اگر حیض رک جائے تو مہربانی کر کے پہلے لکاح علاج مناسب ادویات سے کیجئے۔

## دیر سے یا درد کے ساتھ حیض آئے۔

اکیٹا ریسیموسا۔ حیض کے دوران یا بعد میں درد حیض بے قاعدہ، بہت جلد یا بہت دیر سے۔ جتنا زیادہ حیض ہے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہو۔ لیٹرل اعصابی بے چین اور افسردہ ہوتی ہے۔ حیض کے دوران خراج رحم ہو۔ گن گنھیا۔ حیض نہ آئے۔ اندام ہناتی میں اور بچہ میں بکھن۔ نگڑا پن محسوس ہو۔ تمام جسم پر جھکے نمایاں علامات ہیں۔

ایسٹراڈیوٹرک۔ حیض درد والے جن میں پیشاب کی متواتر خواہش ہو۔

ایٹرس مو فانوسا۔ قبض۔ حیض کثرت سے اور قبل از وقت۔ درد زہ جیسی تکلیف یا حیض نہ آئے طو بات کی کمی وجہ سے کمزوری۔ بانچہ پن۔ اسقاط کارحمان۔ خراج رحم۔

وائبرنم اوپولس۔ حیض سے پہلے شدید درد جو آگے کی طرف دہرا ہونے پر کم ہو جو نئی حیض شروع ہو۔ درد غائب ہو جائے۔ پیٹ کے نچلے حصہ میں درد قریح جو ناقابل برداشت ہو دریں اہلک شدت کے ساتھ آئیں۔ مڈ کچر کے تین قطرے یا ۹x طاقت میں دیجئے۔

یکمومیل۔ کثرت حیض کے نتیجے کے طور پر شدید قریحی درد اور پُر درد حیض۔ اطراف میں درد زہ جیسی دریں اسہال کے ہمراہ۔

کریوزوٹ۔ حیض بہت جلد۔ کثرت سے گہرے رنگ اور جمے ہوئے خون کے ساتھ کافی دیر تک رہیں۔ حیض مٹ لینے پر مایوں۔ بیٹھنے یا لیٹنے یا چلنے پر رک جائیں۔ جب شدید درد قریح۔ اخراجات صاف اور پانی جیسا تپلا خون۔ ناف پر درد۔ جس کے بعد سفیدی مائل لکیر یا ہو۔ حیض کے دوران تے اور سینے کی جلن۔

لیکس۔ حیض کے ہمراہ بولیر۔ دیر سے کم مقدار میں اور بہت کم مدت تک آئیں۔ ناک سے خون ہے۔ خونی پاخانے۔ قبض۔ لیکوریا۔ اور دانت درد۔

لایسکولوپٹم۔ حیض بہت کم مقدار میں اور بہت دیر سے یا بہت جلد اور کثرت سے ہر چھ یا آٹھ دن بعد ظاہر ہوں۔ معمولی ڈر کی وجہ سے حیض دب جائیں۔ پیٹ میں گیس۔

پلسٹیل - ڈپرک لڑکیوں میں پُر درد حیض جو نرم مزاج کی وجہ سے جلد بڑھکتی ہو جائیں۔ وہ علامات بتاتے وقت ہی رو پڑیں۔ چھوٹا جسم ٹھنڈا رکھ لی ہو اگر پسند کریں۔ جوئی حیض شروع ہوں، درد بند ہو جائیں۔

لیپس الیس - حیض میں اتنی تکلیف کروم بہوشی ہو جائے کے قریب ہو۔ جوئی حیض بہنا شروع ہو تکلیف رک جائے۔ پہلے دن گہرے، لوقہ ٹرے اور سیاہ خون کے ڈھیلے سے ہوں۔ کندھے کے جوڑوں میں درد۔ سر میں درد۔ گھرے باہر مانا چاہے۔  
سبارٹا - حیض کے دوران۔ شدید پریشان کن درد جو پیچے کی طرف دباؤ ڈالے۔ درد زہ جیسے درد۔ رحم اور بچہ دانیوں کی سوزش۔

کالو انیمیلس - رحم کے بڑھ جانے اور بچہ کے ساتھ پُر درد حیض۔ گرمی شدید درد جو کھٹے تک جائے اور قبض۔

کیو پرم میٹ - نشج اور ادھام کے ساتھ شدید درد۔

میوفو - حیض سے پہلے یا دوران حیض پیڑ اور رحم میں جلن کے ساتھ درد۔

کالو فائلم - پیٹ میں شدید تشنجی درد۔

کالو سنکس - حیض سے پہلے حیض کا درد قویج جو جلدی شروع ہو جائے۔ خون سیاہ

اکثر لوقہ ٹروں میں خراشدار لیکوریا۔ حیض کے درد قویج کو آگے کی طرف دہرا ہونے سے اور سخت

دباؤ سے امانت۔ درد رحم یا بچہ دانیوں میں ہو۔ مریض اعصابی ہو۔

سارپیر بلایا - حیض اسہال کے ساتھ پُر درد۔ قے اور بہوشی حیض کے وقت۔ بھینٹاں لکڑی ہوئیں۔

لوپیلیا الفلیڈا - پُر درد حیض جو بے قاعدہ ہوں۔ تمام پیٹ میں درد خاص طور پر پیچ

دانیوں اور ٹانگوں میں شدید درد ہو۔ تمام جسم میں شدید درد متواتر غش کھائے جب حیض کو

دیر ہو جائے تو قے اور متلی ہو حیض سے پہلے اور بعد میں قے اور مریض شدید تھکی ہوئی اور

بخار محسوس کرے۔ حیض کی بے قاعدگی کے ساتھ اسہال۔

گن پاؤڈر - پُر درد اور کم حیض کے لئے شاندار دوائی ہے حیض کا بہنا بند ہو جاتا ہے شروع

ہو جاتا ہے۔ x۲ طاقت میں دیکھئے۔

کیسٹوریم۔ حیض کا درد قریح پیلایا پن اور ٹھنڈے پسینے۔

کالی کارب۔ حیض یا تو دیر سے آئیں اور بہت کم مقدار میں یا پھر جلدی جلدی اور کثرت سے کافی عرصہ تک رہیں۔

سیسیا۔ ناکافی یا سست یا قبل از وقت کثرت سے حیض انیٹھن دار در دوں کے ساتھ ڈبلے پتلے اور کثرت انسانوں میں پہلے حیض میں دیر جہاں لیکور یا ہو حیض کے عوض چھاتیوں میں خون باعث نقصان ہو۔ پڑوس میں بچے کی طرت بھاری پن کا احساس۔ زرد رزخ طبیعت بھوک کی کمی کے ساتھ۔ حیض کے بعد تھکے اور کھینچے کی حالت۔

گرفیٹیس۔ بہت ہی دیر سے حیض آئے۔ بہت ہی کم حیض آئیں یا حیض نساؤ نہاد ہی آئیں۔ بچکنے والا پانازہ، گرہ دار مواد کے ساتھ۔ بائیں رحم میں بچہ دانی کی سختی پتھر کی طرح۔ جلدی لڑھن۔ کارجمان موٹاپے کا رجحان۔

کالسنویا۔ حیض کی شدید بندش یا اس کے ساتھ شدید انیٹھن جس سے پہلے رحم میں درد ہو۔ دل کے اعصاب کی زود حسنی جب دل کی تکلیف ترک جائے تو دوبارے حیض پھر سے جاری ہو جائیں۔

میگینٹیا فاس۔ پُرورد حیض کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ تکلیف دہا ہونے لگی اور گرم چیزیں لگنے سے کم ہوتی ہے۔ ماؤکیوں میں x۶ طاقت اور بڑی طاقت مثلاً۔ ۱۔ ایم یا سی ایم طاقت کی ہر سفتہ یا پندرہ دن بعد مکمل علاج کے لئے دیکھئے۔

وریریم ایلیم۔ تکلیف دہ حیض کے لئے موت جیسی ٹھنڈک کے ساتھ ہونٹ نیلے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور نیلے۔ دل ڈوبنے کا احساس۔ ہر کسی کو چوسنے کی خواہش۔

کلکیریا فاس۔ لڑکیوں میں بلوغت پر تکلیف دہ حیض بے احتیاطی کی وجہ سے جو بانجھ پر منتج ہو یا جس کا نتیجہ بانجھ پن ہو۔ رحم میں تکلیف جو جوانی سے متعلقہ ہو۔ بچے کی طرت دباؤ کے ساتھ درزہ جیسی در دیں۔

لیکوریس۔ لیکوریا کے ساتھ جو انڈے کی سفیدی کی طرح اور رگی کی طرح ہو۔ حیض سے کئی روز پہلے۔ دردِ زہ جیسی تکلیف۔

جبرائلی۔ جب حیض ٹھنڈک اور غشی کے احساس کے ساتھ ہو۔ سر اور پیرو میں تپن دار درد۔ سردی کے ہمراہ۔ جبرائلی کے ایک یا دو قطرے گرم پانی کے ہمراہ فوراً درکار فائدہ کر دیں گے۔ سیدکل کار۔ حیض کا قونجی درد۔ ٹھنڈک اور گرمی برداشت نہ کر سکنے کے ساتھ۔ رحم میں جلن دار۔ بھورا۔ بدبودار۔ لیکوریا۔ لگاتار پانی جیسا پتلا خون رسے حتیٰ کہ دوسرا حیض شروع ہو جائے۔

کلیریا کارب۔ ایک نازدارانہ سورک مزاجی دوائی ہے۔ پچھلانی کی تکلیف نرمی پہلے پلان کے ساتھ۔ تھائی رائیڈ اور پچھتری غدود کے کام کرنے کی خرابی۔ موٹاپے کا رجحان ظاہری اعضا تھال پر خارش اور ان پر کثرت سے ٹھنڈا پسینہ۔ قبل از وقت حیض دوا تین روز پہلے۔ فحش خواب سر درد۔ اعصابی کمزوری اور بھاتیوں کی سوزش حیض سے پہلے۔ رحم میں گوٹھ۔ ہیلونیاس۔ سست۔ تھکی ہوئی مریضوں جو اکیلی رہنا پسند کریں۔ رحم کی نااہلیت کی وجہ سے حیض دیر سے آئیں۔ حیض بدبودار اور جھمے ہوئے۔ گردوں کی سوزش۔ ذیابیطس۔ البیومن اور ناسفیٹ کی تکلیف کے ہمراہ۔

کونیم۔ کم حیض پچھلانیوں میں شدید درد کے ہمراہ۔ اکثر جہرہ اور دھڑپ پر خارش کے ساتھ۔ غیر شادی شدہ افسردہ۔ بزدل اور رونے کی طرف مائل لڑکیوں کیلئے مفید ہے۔ اد فورنیم۔ حیض ہر ۴۰ سے ۶۵ روز بعد ظاہر ہوں جو پُر درد اور تھوڑے وقت تک رہیں۔ نسرج کی خارش۔

زینتھوزائیکم۔ دے ہوئے حیض پُر درد حیض لیکوریا کے بغیر یا لیکوریا کے ہمراہ ۹ طاقت میں ہر تین گھنٹہ بعد دیجئے۔

میگنیشیا کارب۔ پُر درد حیض جو عام طور پر بہت دیر سے اور کم مقدار میں آئیں حیض کا اخراج رات کے وقت کثرت سے ہوا اور لیٹنے کے دوران جب کھڑی ہو یا چلے تو لوگ جائیں شدید

کھوک اور معدہ میں درد۔ متلی۔ انگڑاپن اور مسلسل درد حیض سے پہلے شدید درد قوئح۔  
 نکسوا میکا۔ حیض بہت پہلے اور زیادہ دیر تک رہیں چڑے کے پچھلے اعصاب میں  
 کھینچنے والے درد سستی بیوقوفی کے ساتھ ہاتھ پاؤں میں گٹھیا۔ بے چینی۔ زرد رنج اور  
 لڑاکا طبیعت۔ رحم میں انٹھن۔

فاسفورس۔ حیض بہت جلد اور کثرت سے درد زہ جیسی تکلیف اور درد قوئح اور بہت  
 دیر تک رہیں اور اطراف میں تکلیف کے ساتھ درد جھٹوں کے درمیان خون کا اخراج۔ جب  
 حیض کم مقدار میں ہوں ان سے پہلے لیکوریا۔ کاٹنے والی تکلیف جیسے کہ چاقوؤں سے کاٹا  
 جاتا ہو۔ رونے والی طبیعت اور مواد کی قے۔

پلاٹینا۔ حیض بہت جلد اور کثرت سے درد زہ جیسی تکلیف اور انٹھن۔ سیاہ اخراج  
 جس کے بعد لیکوریا ہو بے چینی۔ بے خوابی۔ نسکی مزاج۔ برزی کا احساس۔ انٹھن  
 قوئح دباؤ کے ساتھ رحم کے ساتھ۔ جڈوں میں کھنچاؤ۔ قبض اور شباب کی کثرت سے خواہش  
 سلفر۔ رُکے ہوئے اور پُر درد حیض بے چینی کے ساتھ۔ دباؤ۔ قبض اور پیٹ تھوڑا مزاجی دوائی  
 جب دوسری منتخب ادویات ناکام ہو جائیں۔

آرجنٹم نائٹرکیم پُر درد حیض شدید خون بہنے کے ہمراہ منہ دم ہی سے خون نہ بہے بلکہ ناک  
 پھلتا اور منہ وغیرہ سے خون ہے۔

## بدبودار حیض

پلاٹینا۔ بدبودار اور متعفن اسقاط کے بعد بہت زیادہ خون ہے۔  
 کرڈلیس۔ بدبودار حیض رُکے ہوئے اور گلتے مٹرتے باقی ماندہ مواد سے۔  
 لیٹمگ۔ پہلے کم مقدار میں۔ گہرا۔ لوتھڑے دار، بدبودار منہ حرکت کرتے وقت  
 سے۔ پیچ کی طرف دباؤ کا احساس۔  
 کالوسٹیکس۔ پیچ دانی میں گورٹے کے ساتھ بدبودار۔

سلفر۔ کھٹی بروالا

کالی کارب۔ ٹنڈک کے ساتھ، انیٹھن واردر دیں پیٹ میں۔ جھننے والا۔

## قبل از وقت حیض۔

کلکیہ یا فاس۔ کمزور لڑکیوں میں ماسب عمر سے قبل حیض شروع۔ حیض بہت جلد بہت زیادہ مقدار میں اور چکدار۔ اگر دیسے آئیں تو گہرا خون۔ اندسے کی سفیدی جیسا لیکوریا۔ سبانا۔ حیض موزوں عمر سے قبل، کثرت سے اور چکدار۔ سرخ۔ رحم کی ناطقاتی کلیت۔ کلکیہ یا کارب۔ چھوٹی لڑکیوں میں حیض جنسی اعضا میں جلن اور خارش حیض سے پہلے اور دودھیا۔ لیکوریا۔ حیض سے پہلے سرد در اور درد تو لچ۔

کاربووکیج۔ قبل از وقت اور کثرت سے حیض۔ زرد خون۔ فرج سوچی ہوئی حیض کے تلوؤں اور تھیاؤں میں جلن۔

## کثرت حیض۔

چاننا۔ زیادہ خون بہنے اور دیر تک خون بہنے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ سب سے پہلے یہ آزمائی جائے خاص طور پر جب مریضہ کمزور اور ناتواں ہو۔

رس ایرو میٹکا۔ رحم کی ناطقاتی کی حالت کی وجہ سے خون قطروں میں ڈرنے پر دیکھئے۔ تھلاچی۔ آہستہ آہستہ خون بہنا شروع ہو۔ تب کثرت سے خون ہے حتیٰ کہ مریض شدید کمزور ہو جائے۔ وہ بنسکل سے اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ دوسرے ماہ کا حیض شروع ہو جائے۔ ڈرنے کی قطروں میں خوراک دیجئے۔

مچھیللا۔ کثرت پیشاب کے ساتھ خون ہے جو کہ زیادہ آزاد نہ ہو اور تسلی بخش نہ ہو۔ خون سرخ چکدار۔ تکلیف دہ پیشاب کرنے کے ساتھ۔

سیلا ڈونا۔ قبل از وقت اور کثرت سے حیض اس احساس کے ساتھ کہ ہر چیز رحم سے باہر

خارج ہو جائے گی۔ گندی بودالا، جما ہوا خون، نیکن دار سرد درد، سرخ اور سوجا ہوا چہرہ۔  
سٹر امونیم۔ سیاہ خون کا کثرت سے اخراج۔ جما ہوا خون۔ پیٹ میں کھینچنے والے درد۔  
پہلوؤں اور بازوؤں میں کھینچنے والے درد۔ باتونی۔

انگیشیا۔ ہر پندرہ روز کے بعد حیض دیر تک رہیں۔ پیٹ میں اینٹھن اور سختی ہٹایا  
عشی کے ہمراہ تلی۔ روشنی کو برداشت نہ کر سکے۔ نظر دھندلی۔  
آرنیکا مانٹ۔ جب کثرت خون دباؤ یا غلط اقدام اٹھانے سے یا زخم کی وجہ سے ہے۔  
کیموسیل۔ کثرت حیض کھینچاؤ پیٹ کی اطراف اینٹھن دار درد تو لے۔  
رٹنہیا۔ رحم سے خون نہیں بہیٹ اور چڈے میں درد کے ساتھ جوتھ کی طرف منجمی اعضا  
کو دبائے اس کے بعد لیکو ریا ہو۔

سلیمشیا۔ جس وقت بھی بچہ چھاتی سے دودھ پیئے۔ اندام بنانی سے خون ہے۔  
لیکسس۔ گہرے لوتھڑوں والا خون کثرت سے خون ہے اور اذیت بخش در دیں۔  
جونہی بہاؤ شروع ہو۔ افادہ ہوا اور لوتھڑے خارج ہو جائیں۔ گرمی اور گرم موسم میں زیادتی۔  
ٹھنڈ میں افادہ۔ گندی بلب کے ساتھ کثرت سے پسینہ۔ چھاتیاں نامکمل یا اچھی طرح سے بڑھی  
ہوئی نہ ہوں۔

وسکم البم۔ ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونے سے کثرت سے خون ہے۔  
ایسی فرسٹیم۔

الیٹرس فارسیوسا۔ رحم کی کمزوری کی وجہ سے حیض کثرت سے اور قبل از وقت آئے۔  
حیض نہ ہونے کی وجہ سے درد زہ جیسی در دیں۔ رطوبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے  
کمزوری۔ بانجھ پن۔ اسقاط کی عادت کا رجحان۔ خروج رحم قبض۔ خوراک سے نفرت۔ تلی۔  
بڑھتی۔ رحم سے خون ہے یہ اسقاط کا یا حیض کا ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوتھڑے جس کے  
بعد کثرت سے خون ہے۔

امبرگر لیسیا۔ اعصابی خواتین میں حیض کے دوران میں تھوڑے سے دباؤ کی وجہ سے  
خون بہنے لگے۔ بہت جلد اور کثرت سے ۷ روز پہلے پہنا شروع ہو جائے اور تب شدید غارش۔

دکھن اور بنی اعضا کی سوجن۔

فائیکس ریل۔ جسم کے کسی بھی حصہ سے بسمول رحم بغیر کسی ظاہری وجہ کے خون ہے۔  
کریوزوٹ۔ کوئی چیز اٹھانے یا طاقت سے زیادہ کام کرنے سے اور ہمیشہ مباشرت کے  
بعد رحم سے خون ہے، مباشرت کے دوران درد نہ ہو۔ حیض باقاعدہ لیکن کثرت سے اور تو قدر  
دار بعض اوقات سیاہ۔ شدید بدبودار۔ جنسی اعضاء پر اور کوہوں پر دکھن پیدا کریں۔ رکتا  
ہے دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ جلدی شروع ہوتا ہے اور کافی دیر تک رہے۔ کمر میں متواتر  
دھما دھما درد۔ خون بہنے کے ایک روز بعد بائیں طرف شدید سر درد۔ دودھیا لیکوریا  
حیض صحت یٹنے پر یا چلنے پر گرگ جائیں۔

سبائنا۔ نیچے کی طرف دباؤ کے ساتھ خون ہے۔ بعض اوقات خون کا بہاؤ لگے  
حیض تک نہ رکے۔ گٹھیا اور خون کا بہاؤ بالترتیب جیسے کہ خون ہے جب گٹھیا رک جائے۔  
یا اس کے الٹ۔

کارلوانیمیلس۔ حیض بہت پہلے، دیر تک رہیں اور کثرت سے۔ ہر حیض پر شدید  
کمزوری۔ رحم میں جلن کر جلتے ہوئے کوئلے اس پر رکھے ہوں۔ جھاتیوں میں خالی پن کا احساس  
جب بھی بچہ کو درد دھر پلانا چاہے۔

کارلورنچ۔ رحم میں لچک نہ ہونے کی وجہ سے رحم کے دسکڑنے کی وجہ سے خون  
ہے۔ یہ زچگی کے بعد۔ حیض کے بعد یا اتفاقہ خون بہنے کے بعد۔

فاسفورس۔ خون بہے قابو میں نہ آنے والی ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ سرگرم۔  
امونیا کارب۔ حیض بہت جلد۔ خون سیاہی مائل اکثر تو تھڑوں میں۔ لیکوریا خراشا دار  
جنسی اعضاء کی سوزش۔ پکڑن اور درد قریب حیض سے پہلے۔ ہر حیض پر ریکیم یا معائے  
مستقیم سے خون ہے۔

امونیا ایم۔ حیض بہت جلد۔ خون حیض کے ہمراہ انٹریوں سے اور معائے مستقیم  
سے خون ہے۔ خاص طور پر زرد بیمار اور نازک عورتوں میں جو گرمی میں مبتلا ہوں۔ حیض پہلے

جلد آئیں کمر میں درد کے ساتھ۔ رات کے وقت خون ہے۔

سینکل کار۔ سیاہ رنگ کا خون کثرت سے ہے۔ برف۔ جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جی اور تپتی عورتوں میں جو گرمی میں مبتلا ہوں۔ مریضہ اپنے آپ کو تنگ کرنا چاہے اور ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ خون پتلا اور بدبودار۔ خون تو تھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔

اسٹیلنگو۔ رحم کے پیچھے کی طرف جھکے ہونے کی وجہ سے خون ہے۔ خون سرخ چمکدار۔ نیم سیال، نیم تو تھڑے دار معائنہ کرنے والی انگلی کو رحم نرم اور اسفنج کی طرح معلوم دے۔ ٹریٹیم۔ چمکدار سرخ اور کثرت سے بالائی بیٹ میں سختی کا احساس۔ کمر میں درد ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کمزوری۔ نہایت باریک نبض رحم کے ریشوں کی وجہ سے خون ہے۔ یہ خون کو بند کر دیتی اور گاد کو جذب کر لے گی۔

الونائٹ این۔ جب ایلے ہوئے چمکدار سرخ خون کے ساتھ موت کا واضح درہو۔  
فیرم میٹ۔ حیض بہت جلد۔ کثرت سے بہت زیادہ دیر تک رہیں، مریضہ میں کمزوری پھیلے گی۔  
ایپیکاک۔ خون ہے کمزوری کے ساتھ چمکدار سرخ خون کی دھار ابل کر کمر لمبوں سے بستر پر اور جوڑ کی طرح فرش پر ہو۔ خون جلدی سے نہتھے۔ مریضہ زرد متلائے اور غشی طاری ہو۔  
۲۰ یا ۱۔ اہم طاقت میں ہر چندہ منٹ کے بعد دیکھے مضمیٰ اگر افادہ شروع ہو جائے تب دوائی بند کر دی جائے۔

پلاٹینم۔ حیض ۶ یا ۴ روز پہلے آئیں اور بہت کثرت سے ہوں۔

کلکیر یا کارب۔ رحم سے خون بڑے بڑے تو تھڑوں، چمکدار سرخ مائع کی شکل میں کثرت سے خارج ہو۔ ذہنی صدمہ سے خون ہے۔ پاؤں ٹھنڈے مندار۔ یہ دوائی ناگزیر ہوتی ہے جب حیض چند دن پہلے بہنا شروع کر دیں اور بہت زیادہ خون ہے۔

ونکا مائینر۔ کثرت حیض یا کم حیض جب خون ایک متوازی اور متواتر دھار کی صورت میں ہے جس کے ساتھ شدید کمزوری ہو۔

کاکولس انڈ۔ حیض بہت جلد اور بہت دیر تک رہیں، ایسی عورتوں میں جو غم اور پریشانی کی وجہ سے کمزور ہوں۔

# فرکینسنس امریکانو۔ شدید پُر درد حیض دیرے لیکن کثرت کے حیض کم

سائیکلین۔ حیض کم، چکرا درد درد کے ہمراہ۔ پیٹ میں شدید درد جو کوئی ٹہری سے شروع ہو کر پیٹ کے دونوں طرف سے پیڑ ٹنگ جائے۔ بے تاہرہ حیض کئی ماہ بعد ظاہر ہوں۔ مریضہ غلگن۔ افسردہ کوئی کام کرنے کے ناقابل ہست۔

پلسٹیللا۔ دیرے اور مختصر حیض سائیکلین والی تمام علامات کے ساتھ سوائے اس کے کہ پلسٹیللا کا مریض کھلی ہوا میں ہمیشہ افادہ محسوس کرتا ہے۔

سلفر۔ دیرے حیض قبض کے ہمراہ جلدی پھنسیوں کا رجحان۔ چہرے کی سرخی قبل از دوپہر معدہ میں شدید جھجک کا احساس۔

الیومنا۔ حیض کم جن کے بعد عورت جسمانی طور پر اور دماغی طور پر بہت ہی تھک جائے۔

دو حیض کے درمیان لیکوریا کثرت سے ہو۔ خراشدار اور پھیلنے والا، ایٹریوں تک پہنچنے والا۔

گرفیٹس۔ حیض کا کبھی کبھار بہنا جو بہت زرد اور تھوڑے وقت کے لئے ہوں۔

پیٹ میں درد۔ اندام ہنائی کی انٹھن۔ بازوؤں میں گنٹھیاوی در دیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کا

استسقاء۔ کم حیض جس کے ہمراہ دوسری تکلیف جیسے کہ سرد درد اور جلدی بیماریاں ہوں۔

میگنیم۔ کئی خون والی ٹرکیوں میں حیض کم اور اکثر ہوں۔

نیٹرم میور۔ مٹی کے رنگ جیسی مریضوں میں قبض کے ساتھ کم حیض۔

اکٹیاریمیوسا۔ حیض کم۔ گہرے اور جھمے ہوئے۔ شدید عا کمزوری۔ دو حیضوں کے درمیان

کم مقدار میں ہے۔

گن پاؤڈر۔ کم اور پُر درد حیض کے لئے شاندار دوائی ہے حیض رکھتا ہے پھر بارہ گھنٹے

بعد شروع ہوتا ہے۔  $2 \times$  طاقت میں دیجئے۔



میوہ مکس۔ جنسی اعضا میں شدید اکساہٹ ہم آغوش ہونے کی شدید خواہش۔ اعضا کا معمولی سا چھونا بھی شدید جنسی اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔

کیلیڈیم۔ رحم میں کرموں کے ریگنے کی وجہ خواہش جماع کا غیر معمولی غلبہ اور ہجانہ پیدار۔ اور ریگنیم۔ حلق کی خواہش کے ساتھ۔

سٹرامونم۔ حیض کے وقت کلکیہ یا کرب۔ ذہنی اکساہٹ لیکن جسمانی خواہش نہ ہو۔

## بچہ دانیال

رحم۔ بچہ دانیوں کی سوزش بھی دیکھے۔

ایپس میل۔ دانی بچہ دانی میں اجتماع خون اور سوزش کو لے تک سُن ہونے کے ساتھ۔ یا

اس کے بغیر بھاتی کی تنگی اور از خود یا بلارادہ کھانسی بھی ساتھ ہو۔

بیلادونا۔ بچہ دانیوں کی حاد سوزش۔ بچن دانی در دیں۔ بائیں طرف زیادہ تھوڑی

سی کرخت آواز پر درد شدید حساسیت۔

لیکسس۔ بائیں بچہ دانی میں درد جس کو رحم سے مواد کے اخراج کے ساتھ افاقہ

ہو۔ کوئی دزنی چیز اس جگہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ بائیں طرف بچہ دانی کے لئے مندرجہ بالا اعضا

کے ساتھ کے لئے بھی مفید ہے۔

آر سینکلم البم۔ بچہ دانیوں۔ جلن دار شدید درد جن کو گرم بیبیوں سے افاقہ ہو۔ بے چینی۔

تھوڑے تھوڑے وقفوں پر تھوڑی تھوڑی مقدار پانی کی پیاس۔

پلاٹینم۔ بچہ دانیوں میں جلن دار درد حساسیت اور جنسی اکساہٹ کے ساتھ دباؤ سے

درد زیادہ ہو۔

لیئم ٹنگ۔ بچہ دانیوں کا اعصابی درد۔ بچہ دانی سے جلن دار در دیں اور اوپر پٹ تک

اور نیچے کو لہوں تک۔ گولی لگے جیسے درد بائیں بچہ دانی سے پٹر تک یا پستان تک۔

کالوسنتھس۔ بچہ دانیوں کا قولنج۔ پکرنے والی در دیں جسکو دہرا ہونے پر ناتھو۔

ایوڈین۔ دائیں بچہ دانی میں اجتماع خون اور استسقاء اور پستان کا گھٹنے گھٹنے کم ہونے کے ساتھ رحم میں جھیمی دہانے والی درد۔ دائیں بچہ کے علاقہ میں بچانے کی طرح کا درد۔ اور دوفریم۔ بچہ دانی کی تھیلی کے لئے۔

پیلوڈیم۔ دائیں بچہ دانی میں درد جس کو دہانے سے فائدہ ہو۔  
سچرس۔ بچہ دانی میں سوزش اور درد کے ساتھ دائیں بچہ دانی میں انٹیکشن۔  
نیوفو۔ بچہ دانیوں میں بہن دار گرمی اور درد جو بچہ کو کہوں تک جائیں حیض نہ آئے جو انٹیکشن اور کدو دانوں کی تھیلی بچہ دانیوں میں۔

کاربونیم سلف۔ بچہ دانیوں کی لاغری۔ مجامعت سے نفرت۔ فرج میں غارش۔  
زیتھوزائٹم۔ بچہ دانیوں کا اعصابی درد، حیض سے بہت پہلے اور درد بھرے پیٹ کے نیچے حصہ اور چودوں میں درد کے ساتھ۔ ماضیہ ناقص۔ بخوابی، پشت سر میں درد۔  
مرک سال۔ دائیں بچہ دانی میں درد جس کو گرمی چیز سے لپٹنے سے افتادہ ہو، اور پسینہ سے افتادہ ہو۔ دنگ لگنے جیسی بھاٹنے والی اور کاٹنے والی در دیں۔ بچہ دانیوں میں۔  
ویسپا۔ بائیں بچہ دانی میں درد۔ جلندار کثرت پیشاب کے ساتھ۔ باہر کے سوراخ کے ارد گرد پھیلن یا پھیل جانا۔

## اسقاط حمل — حمل

کونائٹ۔ این۔ خطرناک خوابوں کی وجہ سے اسقاط جیسے کڑا کو دیکھنا۔ آگ یا سمندر میں ڈوب جانے وغیرہ کے خواب دیکھنا۔ ۲۰۰ طاقت میں دیکھئے۔  
آزیکا مانٹ۔ جب اسقاط غلط پاؤں پڑ جانے کی وجہ سے یا زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے یا زیادہ جہانی محنت کرنے سے۔ صدموں سے۔ گرنے سے۔ خراشوں سے چوٹ سے۔ درد اخراج مواد کے ساتھ یا اس کے بغیر یا مواد درد کے ساتھ یا اس کے بغیر ہے۔

سائنا۔ ہر دس یا تیس ماہ کے اسقاط کے لئے، اسقاط کی عادت گہرے خون کا بہنا۔ چھوٹی

کرا اور جنسی اعضاء میں درد۔

426

واٹر نم پرو۔ حمل کے گرنے کے لئے شاندار دوائی خاص طور پر آٹھویں ماہ جب نیچے پیدا ہو کر، پیدائش کے بعد جلدی مر جاتے ہیں۔ اسقاط کے لئے لی گی ادویات کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ اگر یہ دوائی دے دی جائے تو کوئی عورت آسانی سے اسقاط نہیں کر سکتی۔  
سیپیا۔ پانچویں یا ساتویں ماہ میں اسقاط۔ مریضہ دہلی پٹی اور نازک۔ لیکوریا اور قبض والا مزاج۔

جلیسیم۔ ذہنی اکساہٹ کی وجہ سے اسقاط۔ درد پیٹ سے شروع ہو کر اوپر جائے اور کمر ٹھہر جائے۔

آرم میو رینیٹ۔ جب سروکس کی سختی کی وجہ سے ہو۔

پلسٹیل۔ اسقاط کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ ایک ماہ یا اس سے زائد عرصہ تک ۴۹ طاقت میں دی جائے۔ یہ اگر ۲۰ طاقت میں دی جائے تو ولادت قبل از وقت کو روکتی ہے۔  
مریضہ بزدل۔ ٹھنڈا۔ پیاسہ ہو اور مواد وقفے وقفے سے بہے۔

کروکس۔ تیسرے ماہ کا اسقاط، جیسے کہ کوئی چیز زندہ پیٹ کے اندر ہو۔

تھلاپسی۔ جب مستقل خون بہنے سے اسقاط ہو مدر ٹنگر استعمال کیجئے۔

گوپییم۔ یہ ایک دوائی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسقاط کر دیتی ہے۔ یہ مدر ٹنگر میں قطروں میں دی جاتی ہے۔

کلکیریا کرب۔ یہ پُر خون کثرت حیض اور قبل از وقت حیض اور لیکوریا والی عورتوں کے لئے ہے۔ جھوٹی کمر میں درد۔

فرم میٹ۔ یہ بزریقان والی مریضوں جن میں حیض ٹرک گیا ہو اور لیکوریا میں مبتلا ہوں۔  
کیمفر۔ کمزور عورتوں کے لئے جو لیکوریا میں مبتلا ہوں۔ سینے پر ٹھنڈا سر پر ٹھنڈا زکام کے اخراج۔

اپریکاک۔ لگاتار سرخ چمکدار قو لچ پیٹ میں کاٹنے والے درد۔ رحم پر شدید دباؤ۔

پلاٹینا - جب اپکا ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔

سیکل کار - جب رحم بیمار ہو جائے یا طاقت کی کمی۔ کمزور اور سخت تھکی ہوئی عورتوں کے لئے مفید ہے۔ تیسرے ماہ اسقاط۔

نوٹ: - یہ بات ابھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ میوہ جتنی میں ایسی ادویات نہیں ہیں جو بیماری پیدا کرتی ہوں۔ پس اسقاط حمل میں ناکام ہو جانا عام اصول کی بات ہے۔ مندرجہ بالا ادویات البتہ ایسے کیسوں میں استعمال کرائی جاسکتی ہے جہاں مریضہ کی صحت کی بہتری کے لئے ضرورت ہو۔ صحت مند عورتوں میں اسقاط کرنا جرم ہے۔

## پیشاب میں البیومن -

ایپس میل - حمل کے دوران پیشاب میں البیومن کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔  
 کینتھرکس - پیشاب میں البیومن آئے جلن اور گری پیشاب کرتے وقت۔ پیشاب کم مقدار میں۔  
 ٹریفٹھنا - پیشاب رک جانے کے ساتھ البیومن۔ پیشاب قطرہ کی صورت میں آئے۔  
 یونیمن - حمل کے دوران البیومن آئے۔ آدھے گلاس میں پانی اور اس میں ۲ گرین x۹  
 طاقت دوائی ڈال کر دبیجیے۔ ہر گھنٹہ کے بعد چائے کا ایک چمچہ دوائی فی خوراک کے دیکھیے۔  
 ہیلونیاسکس - حمل کے دوران البیومن آئے۔  
 مرک کار - حمل میں گردوں کی سوزش کے ساتھ البیومن آئے  
 فاسفورکس - حمل کے آخر میں اور دیر میں البیومن پیشاب میں آئے۔

## مقعد

کیپیکم - حمل کے دوران مقعد میں جلن۔

## نفرت

سیپیا - حمل کے دوران روٹی سے نفرت۔ خوراک کے متعلق سوچ بھی نہیں لگتی جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتی ہے۔

لارو پیرالسس - حمل کے دوران خوراک سے نفرت -

## بچے کی طرف دباؤ

(رحم کے ضمن میں بچے کی طرف دباؤ - خروجِ رحم دیکھیے)

سیدیا - حمل کے دوران یا اس کے علاوہ بچے کی طرف دباؤ کے لیے چھوٹی کی دوائی ہے۔ ساتویں ماہ دروزہ جیسی تنکالیف ۱۰۰ یا سی ایم طاقت میں دیکھیے۔

سار سپرٹا - کمزور کھینچنے والی درد جو باپتھوں، پاؤں اور پنجوں تک جائے۔ پانچانے سے پہلے اور دورانِ کمزور سخت درد۔

کالی کارب چھوٹی کمزور شدید جیسے کہ بڑی میں ایک ذرت دن رکھا ہوا ہے۔ ایک ہزار طاقت میں خوراک دیجئے۔ تین یا چار روز تک انتظار کیجئے۔

سیکل کار - اکثر اور دیر تک رہنے والی طاقت دروزہ جسمانی طور پر تپلی اور بد مزاج۔ پلسٹیل - بچے کی طرف دباؤ کے ساتھ دروزہ جیسی دردیں۔ یہ رات کو نگرانی کرنے یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

اسٹیلگو - پُر درد اور لمبی مدت حمل کے لئے موزوں ہے۔

## حمل کے دوران سانس

نکسوامیکا - حمل کے دوران مشکل سے سانس لے۔

## حمل کے دوران کھانسی

کالی بانی - کھردری کھانسی۔ اعصابی استقاط کا ڈر پیدا کرنے والی کھانسی۔ کالی بزم - حاملہ عورتوں میں از خود کھانسی یعنی بلا ارادہ کے خشک تنگ کرنے والی کھانسی رات کے وقت۔

کاشیکم - خشک کھانسی

کونیم - خشک کھانسی متواتر ہر روز صبح اور شبانی زیادہ کام کرنے، بولنے، چلنے، رات کو زیادہ ہو۔

بیل۔ کھڑی کھانسی خشک چہرہ۔ مریخ ہو جائے۔

## موت

اکونائٹ این۔ حمل کے دوران میں موت کا ڈر۔ ۲ طاقت میں دیکھے دو یا تین خوراکیں چار گھنٹے کے وقفے سے دیکھے کافی ہوں گی۔

## خواہش

درہم البم۔ کھٹی یا تیزابی چیزوں کی خواہش۔ ٹھنڈی نمکین خوراک کی خواہش ہو۔  
سلفر۔ کھانڈ یا اجار کی خواہش۔  
میگنیشیا کارب۔ خاص قسم کی خوراک کی خواہش۔  
نیرٹرم میور۔ نمک اور نمکین خوراک کی خواہش۔  
چیلیدونیم۔ غیر معمولی اشیاء کی خواہش۔  
نائٹرک ایسڈ۔ مٹی۔ چاک یا چونا کی خواہش۔  
ایسومنا۔ کوئلہ۔ چاک یا چونا کی خواہش۔

## استسقاء

ایلیس۔ پاؤں اور چہرہ کے استسقاء کے لئے شاندار دوائی ہے۔ پیاس نہیں ہوتی۔  
ایورسائیم۔ جب استسقاء جگر کی وجہ سے ہو۔ پیاس ہو اور ریاض کھلی ہوا میں نہا جائے۔  
آرسینک البم۔ دل کی خرابیوں کی وجہ سے استسقاء تھوڑے وقفے پر تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس۔  
ڈیجیٹلیس۔ دل کی بھرکن کے ساتھ استسقاء۔  
جھوٹا حمل۔

کروکس۔ رحم میں بچے کی شدید حرکات یا خیالی حمل۔  
کالوفائیل۔ جھوٹا حمل۔ خیالی حمل۔

## جنین کا متحرک ہونا۔

پلسٹیل۔ جنین یا بچہ کو صبح جب کہ پر لانے کیلئے شاندار دوائی ہے۔ جب بچہ اٹا ہوا ہے تب ٹھیک کر دیتی ہے۔

کالوفائیل۔ جب حرکات رک جائیں۔

کروکس۔ جب حرکات شدید ہوں اور پردہ ہوں۔

تھوجا۔ ساتویں یا آٹھویں ماہ میں شدید حرکات جو حاملہ کی نیند میں خلل ڈالیں اور پیٹ

کرنے کی خواہش کو ابھاریں۔

آرنیکا مانٹ۔ جب جنین کی حرکات سے رحم میں حساسیت دھکن محسوس ہو۔

لائیکو پوڈیم۔ جب رحم میں جنین کی حرکت سے بہت زیادہ تنگی ہو۔

سلفر۔ ایسا محسوس ہو کہ بچہ رحم میں نکلے مار رہا ہے۔

## پاگل پن

سٹر امونیم۔ حمل کے دوران پاگل پن  $200 \times$  طاقت میں دیجئے۔

بچہ کی زندہ پیدائش (پیدائش۔ بھوٹی درزہ بھی دیکھے)

اکیٹاریمیوسا۔ ایسی عورتیں جن کے پہلے مردہ بچے پیدا ہوئے ہوں یا زندہ بچے ہوں۔

## درد

وائبرٹم اوپ۔ حمل کے دوران پیٹ یا ٹانگوں میں تکلیف یا انیٹھن

## بے خوابی

اینا کارڈیم۔ حمل کے دوران بے خوابی کے لئے  $200 \times$  طاقت میں یہ دوائی دی جائے۔

کافیا۔ اگر اینا کارڈیم ناکام ہو جائے تو دوائی استعمال کر لائی جائے  $200 \times$  طاقت کی ایک غولک ہی کافی ہوگی۔

اکونائٹ۔ اگر درد سخت نفوت یا پریشانی۔  
 بائیموسائیمس۔ اگر اعصابیت اور عیجان کی وجہ سے بے خوابی ہو۔  
 اگنیشیا۔ اگر فکر والے خیالات، غم، افسردگی یا جذبات کی افسردگی ہو۔

## حمل کے دوران دانت درد

میٹفیسگیر یا۔ چکن دار درد کاٹنے یا کھینچنے کا احساس دانتوں اور مسوڑھوں میں ہوتو  
 بنانے والا۔ یا سوراخ کرنے والا سرد درد۔ دانت ڈھیلے سیاہ۔ گلے ہوئے اور ٹوٹنے والے۔  
 سپاٹھیلیا۔ پھاڑنے والی اور ناقابلِ برداشت درد۔ درد بھرے جھجکوں کے ساتھ  
 ٹھنڈے زیادہ ہو۔ جب آرام کے لئے توشید درد ہو سر کو بستر پر جھکا دے اور زیادہ درد  
 اور پراٹھائے سے کم ہو۔

سپیشیا۔ حمل کے دوران دانت درد کے لئے جوٹی کی دوائی ہے۔  
 کیومیلدا۔ جب درد ایک گلے ہوئے دانت سے بڑھے۔  
 پلسٹیلدا۔ جب جڑے کی ایک طرف درد سے متاثر ہو یا درد جگہ بدلے۔  
 کافیا۔ جب شدید ہونہ میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے افادہ ہو۔  
 نکس و امیکا۔ جب درد گلے دانت سے اٹھ کر چہرے کی ہڈیوں تک بڑھے شراب کافی  
 اور ذہنی کام سے زیادہ ہو۔ درد ناقابلِ برداشت۔ کھینچنے والی۔ پھاڑنے والی۔ کھودنے والی اور  
 جھٹکے دار درد۔

سیلاڈونا۔ جب سرد درد کے ساتھ پھاڑنے والا۔ کھینچنے والا اور تپکن والا درد۔

## حمل کے دوران پیشاب رگ جائے

نکس و امیکا { حمل کے دوران پیشاب رگ جانے کے لئے دی گئی ترتیب میں آدیت  
 کیوفر  
 پٹیلدا { دیں۔ اگر ۲ گھنٹے میں افادہ نہ ہو تو کئی گھر استعمال کیا جاوے۔

سیسیا۔ پیشاب کی بہت زیادہ خواہش۔ جلے پیشاب پر پہنچنے سے پہلے چند قطرے  
کاشیکم۔ پیشاب خارج ہو جائیں۔

## ایام حمل کی تسلی اور ترقی

نکس و امیکا { اگر یہ ادویات چند کے لئے اول بدل دی جائیں تو ترقی رگ جاتی ہے۔  
انٹم کروڈ { نکس و امیکا x ۹ طاقت اور انٹم کروڈ ۶ طاقت میں دی جائے، علاوہ تسلی ترقی  
کے ہو۔ نکس و امیکا سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ زبان پر کریم کی طرح کی فرجی ہوتی ہے۔ تیزابیت اور  
کچھ کی جلن، معدہ کا نظام بگڑا ہوا۔

ممنغور بیکارپس ریس۔ جان نکالنے والی تسلی لگا تار ترقی۔ شدید الجھائیاں چوٹی کی دوائی ہے۔  
x ۲۰ طاقت میں دیجئے۔

ایریکاک۔ شدید گیس تسلی اور ترقی کے ساتھ اور کچھ کی جلن۔ حاملہ کی ترقی اور تسلی کیلئے شاندار  
دوائی ہے۔

کالچیکم۔ سرسبلی عسکس ہو۔ گاڑی میں یا سمندری سفر کرتے وقت زیادتی ہو۔ خوراک کی بو  
ہی سے تسلی ہو۔

کالی کارب۔ ترقی کے علاوہ تسلی جب چلے جب کوئی چیز کھائے تو شدید زہن داسے اس  
دوائی کی نمایاں علامت ہے۔

کلبیر مٹا پیپس۔ ترقی اور کثرت لعاب یا تھوک حمل کے دوران شدید کمبوں میں یہ دوائی  
آرمائی بانی چلیے۔ ٹیپ دروں کے لئے شاندار دوائی ہے۔

اسام یوروپم۔ حمل کے دوران تسلی۔  
فاسفورس۔ جب پانی کو دیکھ کر حمل کے دوران تسلی ہو۔ بہاتے وقت اپنی آنکھیں لانی  
بندر کھے۔ گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے سے زیادتی ہو۔  
نکس و امیکا۔ رحم میں پیسری پہننے پر تسلی اور ترقی حمل کے دوران۔

کالی کلور - گلے کی دھن کے ساتھ حمل کی تسلی کے لئے شائع ہے۔

کریوزوٹم - میٹھے پانی کی تسلی ادرتے۔

ایٹرس - زرد، بیمار اور سبز بھس والے چھوٹے ساتھ تھے۔ لیٹ جانا چاہیے سوائے آرام کے کچھ نہ کرنا چاہیے۔ ایسی کنزور - حاملہ عورتوں میں تے۔

سپیا - حمل کے دوران تسلی ادرتے معدہ میں خالی پن کا احساس کھانا کھاتے کو لانا پڑ

## بانجھ پن

سپیا - بانجھ پن کے لئے جوئی کی دوائی ہے حیض کی بنے نامدگی لیکوریا اور قبض کے بہارہ۔

بریٹاکارب - پھر دانیوں اور بتانوں کے گھٹتے گھٹتے کم ہونے کی وجہ سے بانجھ پن لیکن  
لفائی قدرد بڑھ جائیں۔

آرم میوزیٹ - بانجھ پن کے لئے مخصوص دوا۔ یہ  $3 \times 3$  طاقت میں دی جائے پھر دانی

میں ناسور - سخت ہونا - پھر دانی کی نرمی سوزش - او - ایس کے پھوٹے کو - پھر دانی کی  
سوزش کو دور کرتی ہے۔ عادی اسقاط اور خرد رحم کو ٹھیک کرتی ہے۔

فاسفورس - دیر سے کثرت سے حیض - زیادہ عیاشی کے ساتھ۔

کالی بزمیٹم - پچھ دانیوں کی لاغری کی وجہ سے بانجھ۔

آرم میٹ - دماغی افسردگی کی وجہ سے بانجھ پن۔

نیٹرم کارب - عورت ہم آغوش ہوتے ہی مواد کا خارج ہو جانا اور اس کے نتیجے کے طور پر بانجھ پن۔

چمکوٹرین - یہ دوائی عورت کی منی گرنے کے بعد بیضہ دانی کے پھیلاؤ متوازن کر دیتی ہے۔

بانجھ عورتوں میں حمل ٹھہر دیتی ہے۔

ایگنس کاسٹس - جب جنس خواہش یا حیض نہ آئیں - زرد دھبہ ڈالنے والا لیکوریا ہو۔

ایٹرس فار - جب رحم کی کمزوری کی وجہ سے بانجھ پن ہو۔ یہ دوائی رحم کو طاقتور دیتی ہے۔

پلاٹینا - شدید جنسی خواہش والی عورتوں میں بانجھ پن - اس کا سال کے بانجھ پن کا علاج کیا

جاچکے۔

کھنچو جا۔ لیکوریا کے ساتھ بانجھ پن۔ کئی خون بھی ہو عورت کے چہرہ اور ٹانگوں پر بال ہوں۔  
جنسی اعضاء پر بدبودار پسینہ ہو۔

## بچہ کا دودھ چونگنے سے انکار۔

سنا۔ جب بچہ پستان میں لینے سے انکار کر دے۔ اگر پیدائش کے چند گھنٹوں بعد پستان میں دیا جائے۔  $200 \times$  طاقت کی مرث ایک غوراک کافی ہے۔

مرک کار۔ اگر بتانا کام ہو جائے تو  $4 \times$  طاقت میں دی جائے۔

سیلشیا۔ جب بچہ فوراً پستان کو منہ میں لے لے۔ لیکن فوراً بعد دودھ واپس کر دے۔

گوٹر۔ (کینسر، پتیلی، ناک وغیرہ کا گوٹر)

متفرق کے نیچے کینسر بھی دیکھئے۔

پلسٹیللا۔ ریشہ دار گوٹروں کے لئے شاندار دوائی ہے۔ رحم کی دیواروں پر۔ رحم کے

پنڈے کے قریب  $100 \times$  طاقت میں دوائی دیکھیے ہر ماہ یا ۳ ہفتے بعد غوراک کو دہرائیے۔

ہائیڈراٹس۔ چھاتیوں کے گوٹر۔ سخت اور درد کرنے والے۔ ٹھنٹیاں اندر دھنی ہوئی

رحم کے کینسر کے لئے بھی۔ پستانوں کے کینسر کے لئے بھی جورات کو زیادہ دیکھیں۔

اسٹریس رب۔ چھاتیوں کا گوٹر خطرناک یا عام۔

چمافیللا۔ چھاتیوں کا کینسر۔ سخت آگاہ ہو۔

کالی آئیوڈ۔ رحم کا ریشہ دار گوٹر۔ اگر پلسٹیللا نام ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔ رحم

ریشہ دار گوٹر سے بند ہو جائے۔ بازوؤں پر تھکاوٹ اور نیند محسوس کرے۔ پاؤں گرم جلین بعض

اوقات تمام جسم کانپے۔

کریوزوٹ۔ رحم کا کینسر خاص طور پر سرکس کا شدید بدبودار خوشی اور ناگوار لہو والا مادہ سے

لیکس۔ ریشہ دار گوٹر ٹنگین۔ پریشانی اور باقوی رضیوں میں۔

آرم آرٹیکم۔ رحم کا کینسر شدید بڑھی ہوئی جنسی خواہش۔ بچہ دانیوں کی سورش۔ اندام نہانی پر

مچھلیاں حیض نہ آئیں یا کثرت سے خواہندار اور کثرت سے اندام نہانی کی خارش۔

فریکسینس ایم۔ { اول بدل پیشہ دار گوٹروں کے لئے درد والے حیضوں کے  
دریٹیم ایلم۔ { ساتھ فریکسینس ایم۔ رات سوتے وقت ۲ قطرے مدد کچھ کے دیئے  
جانبیں دریٹیم ایلم ہر صبح ۲۰ ملاقات میں دی جائے۔

لیپس ایلمس۔ رحم کا ریشہ دار گوٹر شدید جلن دار دردیں کمزور کرنے والا خون کثرت  
سے بہے۔ رحم کا کینسر۔

کوہیوا۔ عورتوں میں مزمن درم شانہ۔ پیشاب کرنے کی لاماصل مگر متواتر کوشش  
پیشاب کی بندش۔ شانہ میں درد کے ساتھ۔

ٹریٹیم پنڈولم۔ رحم میں ریشوں کی وجہ سے خونی ہے۔ شدید دباؤ کے ساتھ خروج جم  
لیکورا۔ شدید زرد اور جھبھے والا۔

سلفر۔ چھاتی کا گوٹر یا کینسر اندرونی خارش اور بوایر سے خون بہے۔ ہر حیض پر ۱۔ ایم  
یاسی ایم کی ایک خوراک دیجئے۔

بلاڈیم۔ پچھراہیوں کا گوٹر

تھلاپیسی برسار۔ رحم کا کینسر جس سے خون بہے۔

یوکریم۔ رحم میں کینسر۔

ایوومن۔ رحم کا گوٹر مندی قبض کے ہمراہ ہر ہفتہ ۲ ملاقات کی ایک خوراک دیجئے۔

کالی کارب۔ رحم کا کینسر کوہیو سے شدید درد گھٹنے تک جلے۔ خاص طور پر دائیں طرف

ٹانگ میں درد ایک نمایاں علامت ہے۔ اس دوائی میں۔

تھوجا۔ رحم کی سرکس پر گوٹر خروج رحم۔ بگڑے ہوئے حیض۔ رحم کے حصے میں درد  
کم اور جلن دار پیشاب کے ساتھ۔

کنڈورا انگو۔ پستانوں کا کینسر۔ اندے کے حجم کا بائیں چھاتی پر گوٹر جو بائیں راستے اور  
نایٹولا کا دیکھنے کے دوران بڑھتا۔ کوئیم سے عارضی طور پر مدد دیا گیا۔ کنڈورا انگو ملاقات سے ٹھیک ہوا۔

کونیم۔ چھاتیوں پر مضبوط سخت گوڑ۔

سلیشیا۔ رحم میں مٹریا سنگترے کے حجم کے گوڑ جو رحم سے باہر کو ابھر ہوئے ہوں۔  
فائیٹولاکما۔ چھاتیوں میں ٹھنڈے ڈھیلے۔ دودھ جم جائے۔ درد کرنے والا اور کاڑھا ہو  
جائے دودھ پلانے والی عورتوں میں خونی دودھ اور دوسری عورتوں میں اس سے علاج کیا جاسکتا ہے۔  
ڈھیلے اور بڑھے ہوئے خند درد دھنی ہوئی بھٹیٹیوں کے ساتھ۔

کیڈیم میٹ {  
کیڈیم ایوڈ  
کیڈیم سلف  
رحم کا کینسر جب ریڈیم کا علاج ناکام ہو جائے۔  
دی گئی ترتیب میں سی ایم طاقت  
میں دی جائے۔

بیوفور۔ سرخ دھاریوں کے ساتھ کینسر۔

سکروفولیریا۔ چھاتیوں میں گٹھنیں۔

رحم۔ رحم میں پیچھے کی طرف دباؤ

حمل کے دوران بھی پیچھے کی طرف بھی دیکھیے  
سپیا۔ یہ رحم کے پیچھے کی طرف دباؤ کے لئے یا خروج رحم کے لئے کمرے لیکر پیٹیک دباؤ  
یہ اونچی طاقت میں دی جائے جیسے کہ ایک ہزار یا سی ایم ہر پندرہ روز کے بعد کمرے لیکر پیٹ  
یک دباؤ یا درجہ سانس لینے میں دباؤ ڈالے۔ ماں کا ابھرا ہوا پیٹ۔

بیلادونا۔ جیسے کہ پیٹیک ہر شے باہر آجائے گی۔ کھڑے ہونے پر نافہ محسوس کرے۔  
لیٹم برگ۔ یہ سپیا جیسی ہے۔ جب سپیا ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔ رحم کے پیچھے کی  
طرف دباؤ کا احساس، احساس کہ جو کچھ بیڑو میں ہے۔ فرج یا اندام نہانی نے نکل جائے گا۔  
فرج کو ہاتھ سے تقویت دینا پڑے، حیض قبل از وقت۔ کم مقدار میں۔ گہرے۔ لو تھڑے دار۔  
اور بدبودار۔ متواتر پیشاب نہیں۔ پیشاب کرنے کی متواتر خواہش خروج رحم کی وجہ سے۔  
آرنیکا مانٹ۔ بچوں کی وجہ سے خروج رحم۔ خروج رحم کی وجہ سے یدھی نہ چل سکے۔  
لیکس۔ سن یاں کے دوران خروج رحم۔ گرمی کے درد۔ سر کی چوٹی پر گرمی۔ سر میں امتحان خون۔

ہیلونیاس - رحم کے بھاری پن کی وجہ سے خروچِ رحم - رحم نیچے گرا ہوا رحم کا پینڈا لگنے کی طرف  
 ٹڑکا ہوا - یا بھکا ہوا - اور ایس اور اسعاء مستقیم کے درمیان سے نکلنے سے منگی گزرے -  
 میمو رکیس - شدید نیچے کی طرف دباؤ جس کو ٹانگیں ایک دوسرے سے کراس کر کے رکھنے پر لگتے ہیں -  
 فارکیس ایم - یہ رحم کا ٹانگ ہے جس میں رحم کی بھاری حالتوں میں خروچ کی حالت نیچے  
 کی طرف دباؤ یا پٹھوں کے ڈھیلے ہونے پر تکالیف یعنی خروچِ رحم -  
 سٹانم - جب پانسانے کے دوران دباؤ کی وجہ سے خروچِ رحم زیادہ ہو -  
 اگرکیس ایم - نیچے کی طرف شدید بانے والی دردیں جو تقریباً ناقابلِ برداشت ہوں -  
 ایسکلس ہیب - رحم کی سرکس سوچی ہوئی اور پر کی طرف چڑھنا - خروچِ رحم - رحم کا بڑھ جانا  
 اور سختی جب شدید - گرمی اور تپکن دار -  
 آرم میٹ - زیادہ وزن اٹھانے سے خروچِ رحم جس کی زیادتی حیض کے دوران ہو -  
 پلوڈوفاسٹیکم - کمزوری کی وجہ سے رحم اور فرج کا خروچ - طاعت سے زیادہ وزن اٹھانا -  
 خاص طور پر بچگی کے بعد شدید کمزوری کے ساتھ اور تھوڑا بہت خروچ مقعد بھی ہو -  
 آرجنٹم میٹ - بٹھے - بڑا چڑا بندھن وغیرہ ڈھیلے ہو جائیں جس کی وجہ سے خروچِ رحم ہو -  
 سرکس میں اجتماعِ خون اور سخت کینسر کے ساتھ اور ملین اور ڈنگ لگنے جیسے درد - پیپار -  
 رحم سے بتلا مواد ہے -  
 ایلو - کافی عرصہ سے خروچِ رحم ہو رہا ہو - احساس کہ پیڑوں کی ٹہری اور دچی کی ٹہری کے  
 دوران بھانڈا گڑا ہوا ہو - چٹان اور کمر میں درد جیسا درد کھڑے ہونے پر زیادہ ہو - رحم  
 کا نیچے کی طرف کھینچاؤ جیسے کہ پیڑوں کے تمام اعضاء یہاں سے نکل جائیں گے -  
 ایسٹریاس رپ - رحم میں باہر دھکیلنے کا احساس انٹھن کے ساتھ -  
 نیٹرم بائیو کلور - پیڑوں کا نیچے کی طرف دباؤ - رحم پانی سے تریا دل دل کی طرح -  
 پیٹیللا - نیچے کی طرف دباؤ جو ایٹھ پر زیادہ ہو -

## رحم کی حسائیت

ہیلونیاس - رحم کی حسائیت - سروکس کا ناسور - خروخ رحم - گہرا بدبودار لیکوریا - پرمیجان - ہر کسی میں نقص نکالے - بے چین - جب جسم اور ذہن معرّف ہوں تو افاقہ ہو -

## رحم کی اینٹھن

کاسٹیکم - معدہ میں اچھاتی میں اور چھوٹی کمر میں اینٹھن دہری ہونے پر مجبور ہو جائے - کھانا کھانے پر زیادتی -

کاکولس - رحم میں درد والا دباؤ اور چھاتی میں اینٹھن - بے صبری اور غشی - تے اور چکڑے -

کونیم - رحم میں اینٹھن مزاج میں سرگرائی - پیٹ تناہوا - اور چھاتی میں درد -

میگنیشیا میور - رحم کی اینٹھن درد کے ہمراہ جو کوکھوں تک جائے، جس کے بعد لیکوریا -

اگنیشیا - رحم کی اینٹھن درد زہ جیسی تسکلیف جس کے بعد لیکوریا ہو -

## رحم کا اپنی جگہ سے ٹلنا

بیللا ڈونا - پرخون ریزیوں میں رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا -

پوڈوفائلم - پیچیدہ اور خروخ مقعد کے ساتھ -

لیم ٹگ - اٹا ہوا رحم، سوراخ پیڑ رحم کا پیندہ ٹکونیہ بڑی کے خلاف - رحم کا تضییع

کے ہمراہ ٹیڑھا پن یا اٹا پن - سوراخ نیچے پیڑ و پر دھکیلا ہوا -

سیسیا - اٹا ہوا رحم سوراخ پیڑ کے ساتھ سختی کے ساتھ لگا ہوا - رحم کا پیندہ - نیچے

ٹکونیہ بڑی تک آیا ہوا -

ہیلونیاس - نیچے کی طرف ناہٹل جانا - پیندہ آگے کی طرف اڑکا ہوا - سوراخ فرج اور

امعاء مستقیم کے درمیان سے شکل سے انکلی گزاری جاسکے - کمزور ریزیوں میں -

نکسوا میدکا۔ رحم کا گر جانا۔ رحم کا ہر نیا۔ میڑھا ہو جانا۔ الٹ جانا۔ سوزش کے ساتھ رحم سے خون کا بہنا۔

سببنا۔ ہوتے یا چھپے ماہِ حمل کے گر جانے کے بعد۔  
 آرٹیکا ایم۔ زیریں بطن پر چوٹ یا ٹکالنے کے بعد  
 مرکورس۔ جب رحم کی جھلیوں یعنی کی سوزش کی وجہ سے ٹل جانا رحم کا۔  
رحم میں پانی کا پھرنا۔ استسقاء رحم۔

پلسٹیل۔ حیض نیکور یا انفاس کے دب جانے کی وجہ سے استسقاء۔  
 کروڑوٹ۔ جب کینسر کی وجہ سے۔

آرٹیکلم البم۔ جب وجہ معلوم نہ ہو۔ پیاس کے ہمراہ۔ بے چینی۔ گرم کو یا گرم پیوں سے آفات۔  
 کلکیر یا کارب { جب رحم کے گوشہ کی وجہ سے توری گئی ترتیب  
 کو نیم { میں ادویات دی جائیں۔

مٹھو جا۔ قبل از وقت درزہ کی وجہ سے اپنے سائز سے دو گنی ہو گئی ہو۔  
 سیبا۔ سروکس چڑی اور موٹی ہو جائے۔

اسٹیلگو۔ رحم کا بڑھ جانا نرم اور انجنی اولیس اور سروکس کافی کھلا انگلی گز جائے۔  
 کو نیم۔ رحم کا بڑھ جانا، بھالا گئے جیسے درد۔ بچہ دانیوں اور رحم کی سختی، خود جرح رحم اور سروکس کا ناسور۔

کارلوانیمیلس۔ حیض کی خرابیوں کے ساتھ رحم کا بڑھ جانا اور سختی۔ کمر میں شدید درد جو کولہون تک جائے۔ قبض۔

نیٹرم میور۔ بڑھی عورتوں میں سروکس موٹی ہو جائے رحم کے منہ پر ناسور ہوں۔  
 گلنا سٹرنا۔ (زخموں کے مواد لگنے سے پھنسیاں نکلتا۔ رحم کے تحت ناسور بھی دیکھے)  
 سیکل کار۔ رحم کی کنٹین یا گلنا سٹرا کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ ۳۰ یا ۲۰۰ میں دیجئے۔ اگر نہ ناکام ہو جائے تو آرٹیکلم البم ۳۰ اور کروڑوٹ ۳۰ دیجئے۔

## گیس یا ہوا۔

ایسٹفاس - رحم سے ہوا خارج کرنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ رحم کی ڈرم جیسی سوجن کو درست کرتی ہے

لائیکو لوڈیم - جب رحم سے بیلوڈا گیس خارج ہو۔

کاربووینج - اگر مندرجہ بالا دونوں ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ ادویات چائنا - دی جائیں۔

رحم کی سختی - (ناسور) پچھ دانی میں گوشت کا لوتھڑا - پانی سے بھری ہوئی تھیلیاں اور (المنون) (دیکھیے)

کینتھرس { رحم سے گوشت کے لوتھڑے باہر نکالنے کے لئے میں مدد دیتی ہے۔ دی گئی۔  
سبائنا { ترتیب میں دیجئے۔

پلسٹیللا { رحم کے گوشت کے لوتھڑے کے لئے دی گئی ترتیب میں دیجئے۔  
سیکل کار

نائیک الیڈ { افراط خون اور لف کاٹھوس ہو جانے کے لئے  
ایسٹفاس { دی گئی ترتیب میں دوائی دیجئے۔

کلیریا کارب - رحم میں پانی سے بھری ہوئی تھیلیاں سی کے لئے  
سلیشیا - { دی گئی ترتیب میں دیجئے۔

رحم میں درد (سختی اور ناسور کا وجہ سے)

کونیم - سرکس میں جلن - ڈنگ لگنے جیسے درد تیر کی طرح لگنے جیسے درد - بھالا لگنے جیسے درد

رحم کا اعصابی درد

پلسٹیللا - رحم میں درد حیض کے رکنے کے ساتھ۔

لیکس۔ رحم میں درد جس کو خون پہننے پر افادہ ہو۔ بچہ دانیوں میں سخت مسلسل درد۔ ننگی کے بعد۔ حیض کے دوران۔

میوریکس۔ رحم کے دائیں طرف جو بیٹ میں جائے۔ بعض کیسوں میں سارے پیٹ کو غور کر کے اوپر بائیں پستان تک جائے۔

ہائپرکیم۔ اپریشن کے بعد سارے پیٹ میں درد اور مکمن  $\times 20$  طاقت میں دیجئے۔

سمبل۔ چٹ اور زندہ دل عورتوں میں چہرہ یا بچہ دانیوں کا اعصابی درد۔ بچہ دانیوں میں تیز درد بچے کی طرف دباؤ کے تحت۔

لیلم ٹنگ۔ چٹ اور زندہ دل عورتوں میں چہرہ یا بچہ دانیوں کا اعصابی درد۔ بچہ دانیوں کا اعصابی درد۔ بچہ دانیوں میں تیز درد بچے کی طرف دباؤ کے تحت۔

پلائینا۔ مزمن سوزاک کی وجہ سے بچہ دانیوں میں درد۔

پلوڈوفائیکم۔ کم حیض کے ساتھ بچہ دانیوں میں درد جن میں حرکت سے زیادتی ہو۔ لیٹے سے افادہ ہو، خراب جگر کی وجہ سے۔

اکٹیا ریموسا۔ رحم کی سروکس کی بھلی کی سوزش۔

لیک کینم۔ دائیں بچہ دانی میں درد جس سے چمکدار سرخ خون بہنے سے افادہ ہو۔

لوڈیم۔ دائیں بچہ دانی میں درد جو شروع اور نیچے رحم تک جائے۔

فاسفورس۔ حیض کے دوران بائیں بچہ دانی میں درد جو کولہوں تک بڑھے۔

برانی اوینا۔ دائیں بچہ دانی میں درد جو کولہوں تک جائے۔ آرام سے افادہ ہو حرکت پر زیادتی یا چھوٹے پر زیادتی۔

آرٹھرمیٹ۔ خراج رحم کے ساتھ بائیں بچہ دانی میں درد۔

لایڈر کوٹائل۔ فرج میں یا اندام نہانی میں گولی لگنے جیسا۔ تیر لگنے جیسا اور سبباً لگنے جیسا درد۔

کریازوٹ۔ اندام نہانی میں جلندار اور شدید درد جس کو لیٹے ہونے سے اٹھنے پر زیادتی ہو۔ اندام نہانی سوچی ہوئی۔



الیومن - رحم کے پھوڑنے یا ناسور - درد کی وجہ سے مجامعت ناممکن ہے ہو۔  
 رحم کا وزن یا بوجھ پیچھے کی طرف ہو جائے۔  
 آرم میٹ - بار بار کے استغاث کی وجہ سے رحم کی سختی اور اس پر پھوڑے  
 یا ناسور۔

### اندام نہانی - یا فُرج

دیکھئے۔ اندام نہانی کی خشکی - مجامعت کے تحت بھی دیکھئے۔



۱۲  
بارِ صواۓ  
باب ۱۳

ہدیوں، جوڑوں اور پچھوں  
کی  
سکائی

### ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔

کلکیر یا فاس - ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور گلتی شرتی ہوئی ہڈیوں کے لئے جب وہ نرم ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں نہ بچنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ ہڈیوں کا جھک جانا یا ٹھٹھکانا۔  
 آنکھ سوراخ دیرا۔ لمبی ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ جوڑوں کا ٹوٹ جانا۔ درد مکھ تک جائے۔  
 کلکیر یا کارب - ریڑھ کی ٹی بی۔ حوام مغز کی تچی کا گلنا سڑنا۔ ہڈیوں کا نہ بڑھنا۔ دانوں کا نکالنا۔

کلکیر یا فلور۔ ہڈیوں کا کسی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے بڑھنا۔ یہ دوائی کلکیر یا فاس سے اول بدل کر دی جاسکتی ہے۔ علامات کلکیر یا فاس سے ملتی جلتی ہیں۔  
 ایسٹروفلور۔ لمبی ہڈیوں کا پیپ کے ساتھ گلنا سڑنا، جوڑو وقفے وقفے سے اچھی ہو جائیں یا تکلیف بڑھ جائے، اور دیں رات کو زیادہ۔ شدید کمزوری۔ ہڈیوں کے گلنے کی وجہ سے کان اور ناک سے بدبودار مواد بہے۔

پلائٹیم۔ ہڈیوں کا گلنا سڑنا خاص طور پر پٹھنوں کی ہڈیوں کا۔  
 سلیشیا۔ ہڈیوں کا ٹھٹھکا ہونا۔ کوہلے کی ہڈیوں کا بودا ہو جانا اور دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ناسوری سوراخ بدبودار مواد کا اخراج اور اس کے گرد جھٹے سخت اور سوجے ہوئے ہیں۔  
 آرم میٹ۔ آتش کی ریغیوں میں جنہوں نے پارہ استعمال کیا ہو۔ سروریکل ہڈیوں کا گلنا سڑنا اور تالو کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔

ایسا فو میٹرا۔ بدبودار مواد کا اخراج کے ساتھ۔ ناقابلِ رواشت دھکن۔ ناسور کے قریب آتشی دھکن یا تکلیف کر پٹی بھی رواشت نہ ہو سکے۔ تکلیف یا درد میں متواتر کھینچنے والی اور جلندار آرام سے زیادتی ہو۔

ہیکلا لاوا۔ بڑیوں کی بیماریوں میں جن میں ہڈی کا کینسر۔ خنازیری اور بڑیوں آنکھ کی بیماریاں اور ہڈی کا چھوڑا۔

کالچیکم۔ بڑیوں کا گھٹنا سڑنا۔ خاص طور پر بڑیوں کے بڑھنے والا سرور کا گھٹنا سڑنا یا تانہ ہونا۔ فاسفورس۔ بڑیوں کے گتے سڑنے میں چوٹی کی دوائی ہے۔ جب سلیشیا مکمل آرام دینے میں ناکام ہو جائے یا ناقہ ہونا ٹھہر جائے۔

سٹیفٹگیگیا۔ بڑی بڑیوں میں تبدیل ہونے والی درویں۔ اعصابی دردوں میں لگنے سڑنے میں۔

### ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا۔

ایسٹراس۔ ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا۔ مہروں کے گتے سڑنے کی وجہ سے۔

کلکیہ یا کارب۔ ریڑھ کی ہڈی کا کمر کے حصہ میں ٹیڑھا ہو جانا اور لمبی ہڈیوں، گردن اور کمر کے خم میں سوزش۔

سلیشیا۔ یہ بڑیوں کی سوزش۔ نرم ہونا اور گھٹنا سڑنا جہاں کہیں بھی پایا جاتا ہے کراہم دیتی۔

بڑیوں کے چھوڑے۔ ناسوری سوراخ بدبودار پیپ کے اخراج۔

کلکیہ یا فاس۔ بڑیوں سے پیپ پہنا۔ کوہلے کے جوڑ کا گھٹنا سڑنا۔ بڑیوں کا نرم ہو جانا۔

مکرزور ٹھک جائے خاص طور پر بائیں جانب بوجھ نہ سہار کے۔

کلکیہ یا فلوور۔ جب کلکیہ یا کی دیگر اقسام ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے۔

سلفر۔ کمر کے حصہ میں مہروں کی وجہ سے ترخاش کے دب جانے۔ مکر کی ہڈی کا ٹھک جانا اور

پسلیوں کا بھی ہر سفتہ ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک دیں۔

کالی ہائیڈر۔ کوہوں کا بیماریوں سے ٹیڑھا ہو جانا۔ آنکھ کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کا

گھٹنا سڑنا۔

تھو جوا۔ فرش پر بیٹھے پر سر گھٹنوں میں گھس جائے۔ ٹیکوں کے اثرات بد۔ پیچھے کی طرف

مڑ جائے۔ سیدھا نہ بیٹھ سکے۔

## ہڈیوں کی سوزش

سلیشیا۔ کھوپڑی کی ہڈی کی سوزش۔  
 سٹینجیا۔ ران کی ہڈی۔ پتلی کی ہڈی۔ کندھے سے کہنی تک دیگر ہڈیوں کی سوزش یا تشنگ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔  
 سٹروٹشیا کارب۔ ہڈیوں کی سوزش خاص طور پر ران کی ہڈی۔ ناسور کے ساتھ جس میں سے کم دبیش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں نکلیں۔

سٹیفگیسیریا۔ ہڈی کے خلافت کی سوزش اور تکلیف ایک ہڈی سے دوسری ہڈی میں منتقل ہو  
 اعصابی دردوں اور گلے مڑنے۔

آرم میٹ۔ یہ ہڈیوں کے دردوں کی بہت اچھی دوائی ہے۔

اگر کیس ایم۔ ٹانگوں کی ہڈیوں میں در دیں۔

مینگنم۔ ہڈیوں میں دردیں جو رات کے وقت اور بھونے پر زیادہ ہوں کھلی ہوائیں افاق ہو۔

ایسٹفاس۔ رات کے وقت جلن۔ آتشکی۔ پارے کے یا خنازیری زہر کی وجہ سے۔

روٹا۔ زخموں کی وجہ سے ہڈیوں کی سوزش۔

سمفا ٹیم۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے یا زخم کی وجہ سے سوزش۔

ہیکلا لاوا۔ ہڈیوں پر چھوڑے ہو جانا یا جسم کے کسی حصہ پر۔ یہ جڑے پر یا کہیں

اور بھی ہو سکتے ہیں۔

کمر درد۔ (سوزاک اور آتشک بھی دیکھیے)

کالوسٹھس کمر درد اور چھوٹی کمر درد جو آٹھ کار کو ہلے کے اوپر جم جائے  
 اور چوڑے اوپر۔ درد ایک تھوڑی سی جگہ پر جو جس سے مریض لنگھائے۔ آخر کار وہ کھڑا نہ ہو سکے اور نہ  
 ہی چل سکے۔ تکونہ ہڈی کے ساتھ شدید جلن۔

رسٹاکس۔ جب تکلیف کو چلنے پر پافق ہو پہلی حرکت اور آرام کرنے پر زیادتی۔ یہ رات کے وقت  
 زیادہ ہو۔ تکونہ ہڈی کا درد۔ اگر افاق نہ ہو تو طاقت تبدیل کر دیجئے یعنی پوششی تبدیل کر دیجئے۔

انٹرمارٹ - تھکادینے والی مشقت کی وجہ سے کمر درد - کمر کے پچھلے حصہ میں اڑت ناک درد - چلنے کی تھوڑی سی کوشش بھی تھکے - ٹھنڈک اور سرد پسینہ آئے - نیچے ٹانگوں پر وزن کے نکلنے ہونے کا احساس یعنی ٹانگیں ذہنی محسوس ہوں -

امونیا کارب - کمر میں درد - سردی اور بخار کے ساتھ گردوں کو متاثر کریں -  
 اکیٹا ریسیرا - بے چینی اور بے خوابی کے ساتھ ٹھنڈک کی تھکاوٹ - مریض اعصابی - افسردہ اور بے چین -

برائی ادنیا - جب درد حرکت پر زیادہ اور لینے سے اور آرام کرنے پر رافقاہ کمر میں خراشوں کا احساس دباؤ چاہے یا کمر کے نیچے کوئی سخت شے کا خواہاں ہو - ۹ بجے یا ۳ بجے درد کی زیادتی ہو -  
 بریسس ولگیرس - پیشاب کی تکالیف کے ساتھ کمر درد -

ڈلکا مارا - جب انداز جگہوں پر رہنے یا جو میں گھٹنے کے اندر اندر درجہ حرارت کی شدید تبدیلی کی وجہ سے کمر درد ہو -

کالی کارب - کمر کے پچھلے حصہ میں درد - کمر درد حصوں میں ٹوٹی محسوس ہو - درد ٹانگوں کے نیچے تک جاتی محسوس ہو - مریض خبطی - مشکل - خواہ خواہ پریشان ہونے والا ٹھنڈا اور زرد جس ہو -  
 میڈورنیم - ۲۰۰ - کمر درد - لنگری کمر - کمر اور ٹھونہ ہڈی کی درد جو اکثر اوقات ٹانگوں تک جائے گردن کی گڈی میں کھینچاؤ - کمر میں درد - عمل انگیز دوائی کے طور پر کامیاب ہے -  
 ایلو - کمر درد جو سردی سے اول بدل کر ہو -

نیٹرمیور - کمر درد جب مریض درد والی جگہ پر دباؤ ڈالنا چاہے - وہ اپنے نیچے ایک کتے کی پٹکٹا چاہیے - گرمی میں اپنے نیچے سخت چیز رکھنا چاہیے - مریض اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر کسی میں ادھر ادھر ہوتا ہے -  
 ایونٹا - کمر میں درد جسے کمر کے پچھلے حصوں میں گرم لوہے کی سلاخ ڈالی گئی ہو -

نیکو امیکا - کمر کے بڑے ٹھنڈوں میں درد بہتر میں اپنے - درد سردی کی وجہ سے جس میں صبح زیادتی ہو - گرمی سے افاتہ ہو -

ٹائیسیریکم - کوہنے کے جوڑ میں شدید اعصابی درد -

ایسکولس ہرپ - زیادہ کام یا سخت مشقت کی وجہ سے تکنوینہ ہڈی کو لمبے پرداؤ کی وجہ سے درد کھڑے ہونے پر درد میں اضافہ۔

کلکیئر یا فاس - جب گردن میں درد اور سرویکل میں درد ہو۔ جب ریشا کس اور ایسکولس نام ہو جائیں تو یہ دوائی استعمال کرائی جائے۔ کو لمبے کے جوڑ کی شدید تکالیف۔  
یوٹیڈیوٹیک پرف - گہری کمزور جو ہڈیوں میں جائے۔ شدید پائیس اور سردی۔ یہ میڈیکل خرابیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

کلکیئر یا فلور - کمزور جو آرام کرتے وقت زیادہ ہو اور گرمی سے افاقہ ہو۔ کمزور جو تکنوینہ ہڈی تک جائے جب ریشا کس نام ہو جائے تو دبجے۔  
سلفر - عیاش لوگوں میں کمزور۔ یہ صے نہ چل سکیں۔ کندھوں کے درمیان کھینچنے والی درد آرام کرتے وقت زیادہ ہو۔ رات کے وقت پاؤں کے ٹھووں اور ہاتھوں میں جلن۔ لہسن جیسی بوڈا لاپسینہ۔  
رہوڈروڈینڈرون - تمام بازوؤں میں پھارنے والی دردیں۔ خشک ٹھنڈ لگنے سے کمزور۔  
آرام کے وقت زیادہ اور طوفان آنے پر زیادہ۔ گرمی اور کھانا کھانے کے افاقہ۔

### ہڈیوں کا ٹوٹ جانا اور بے قاعدہ بڑھوتری -

کلکیئر یا فاس - یہ نرم اور آسانی سے ٹوٹنے والی ہڈیوں کے لئے شاندار دوائی ہے۔ سر کی ہڈیاں بیت اور مقدار میں کم ہوں۔ وہ زیادہ موٹی اور تعداد میں کم۔ گردن کی ہڈیاں اتنی چھوٹی اور کمزور کڑے سر کو نہ حال نہ کر سکیں۔ ہاتھوں اور ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور اور ٹوٹنے والی۔ پانچازہ بنزیر خیر ہم شدہ اور بدبودار بھوک نہ لگنے۔ یہ ہڈیوں کو بنانے والی اور خون کے نئے نیلے بنانے والی ہے۔ یہ تمام جسم کو جنرل تقویت دیتی ہے۔

کلکیئر یا کارب - یہ کھلے تالو دے اور کھوٹری کی ہڈیوں کے کھلے جھڑوں والے مریضوں کے لئے مفید ہے۔ اگر ہڈیاں بنانے والے مواد کی بہم رسانی تو ٹھیک ہو لیکن وہ مناسب طور پر تقسیم نہ ہو۔

کلکیئر یا ایٹوڈ - جب پھوں کی کمزوری۔ چربی کی کمی اور ہڈیوں کی کمزوری تب اس کے متعلق مہیچا چاہئے۔ غدد کی غیر صحت مند حالت کے لئے یہ دوائی بہترین ہے۔

**کلکیر یا فلور**۔ اس دوائی کی نمایاں علامات دانتوں کا انکیل قبل از وقت خراب ہو جائے کسی  
 تھکے یا عضو کے ڈھیلے ہونے کی حالت۔ یہ شریانوں اور وریدوں کے پکدار رشتے تعمیر کرتی ہے۔  
 سیلشیا۔ کلکیر یا فاس کے بعد یہ دوا دی جائے۔ جب کڑی ہڈی مناسب طور پر ہڈی میں تبدیل ہو  
 سکے۔ ہڈی سیلشیا اور کڑی مواد سے بنتا ہے۔ اس لئے اس بیماری کے لئے سیلشیا بہت فوری ہے۔  
 پسینہ اور پیپ بننے کا سبب۔ اس دوائی کی نمایاں علامات ہیں۔ سیلشیا کے مریض کو ٹھنڈک بکالین  
 میں زیادتی کرتی ہے۔

## مغز ہڈی کی سوزش

**سوزش ریڑھ**۔ اعصابی نظام کے تحت۔  
 سیلشیا۔ زخموں کو ٹھیک کو ٹھیک رکھنے کے لئے یا انہیں مندل کرنے کے لئے تاندار دوائی ہے۔  
 یہ ہڈی کے چھوٹے ٹکڑے خارج کر دیتی ہے جو کہ زخم کے ٹھیک ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔  
 میڈورنیم۔ جب سیلشیا ناکام تو یہ دوائی دی جائے۔ مریض چڑچڑاہٹ۔ گرم۔ ہتھیلیاں گرم  
 قبض میں مبتلا۔ ٹھنڈی خوراک اور ٹھنڈے مشروب پسند کرے اور ٹھیک خوراک کو پسند کرے۔ ٹھنڈے  
 پانی سے بنانا پسند کرتا ہے۔ اگر چہ سخت ٹھنڈا موسم ہو۔ چھاتی اور گھٹنے ٹیکنے کی حالت میں نیٹے اس دوائی  
 کی خاص الخاص علامت ہے۔

**ایکینشیا**۔ یہ اندرونی طور پر ۳۲ طاقت میں دی جائے اور ہسیہ دنی طور پر نصف اونس  
 پانی میں ۱۰ قطرے ملا کر لگائی جائے

## **درد** گنٹھیا۔ وجع المفاصل

**برائی اونیا**۔ جب دردیں تھوڑی سی حرکت سے بڑھ جائیں۔ گرمی اور دبانے سے کم ہوں۔  
 جوڑوں کی سوجن جو گرم ہوں اور سوجے ہوئے ہوں۔ مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ یہ ۹ طاقت میں  
 دیجائے۔ جب یہ طاقت کام نہ کرے تو ۲۰ طاقت دیں۔

**لینڈم پال** - گنٹیٹے اور جڑوں کی دردوں کے لئے مخصوص ہے۔ جب درویں نیچے سے اوپر کو جائیں۔ انگلیوں کے جڑوں - کلائیوں اور پنجوں میں چاک کا پتھر جمع ہو جائے۔ جوڑوں کی سوجن ہو سکتی ہے۔ مریض ٹھنڈا محسوس کرتا ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افادہ ہو۔ جڑ چڑا۔ اکیلا رہنا پسند کرے۔ درد شراب نوشی۔ کیڑوں کے ڈنگ لگنے یا زخموں کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ گرم پیوں سے درد میں اضافہ۔

**کالیسیا لیسیفولیا** - گنٹھیاوی درویں جب اوپر سے نیچے کو جائیں اور اعضاء میں ہو جائیں۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ اور سخت نبض کے ساتھ درد۔ درویں تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں۔ کلائی کے اعصاب میں درد۔

**کالچیکم** - گنٹھیے کے لئے عمومی دوائی ہے۔ خوراک سے نفرت (خوراک جس کے کھاتے وقت خوراک کی بُرائے) جوڑوں کی سوزش جو سوزش یا زرد ہوں۔ پیٹ ہولے بھرا ہوا۔ پشیماب میں البیوسن جو سیاہی کی طرح سیاہ ہو جائے۔ پشیماب کم استقامتی سوزش کے ہمراہ۔ دردوں اور خوشبوؤں سے بہت ہی بے چینی ہو جائے۔ حرکت سے۔ پھوٹنے سے اور دماغی کام سے زیادتی ہو۔ گرمی سے آرام سے اور ٹیٹھنے سے افادہ ہو۔ تبا کو نوشوں میں گنٹھیا اور نقرس۔

**رشاکس** - جب گرم ہو اور ٹھنڈا ہو جاتے پر بار بار درد کے حملے۔ مندار موسم میں گنٹھیا اور موسم مندار میں زیادتی بے چینی اور پہلی حرکت پر زیادتی۔ کچھ حرکت کرنے پر افادہ لیکن، لیکن جب زیادہ دیر حرکت رہے تو تکلیف زیادہ ہو جاتی کہ مریض ٹھہرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ایم طاقت میں بہترین نتائج دیتی ہے۔

**کیکٹس گرینڈی** - استقامت کے ساتھ گنٹھیا یا تھنوں اور پاؤں کی استقامتی سوزش گروے اور اتر ٹریاں ملوث ہوں یا متاثر ہو چکی۔ دل کا درد جب دل متاثر ہو جوڑوں کے درد سے افادہ ہو۔ سٹیلیر یا میڈ - یہ تبدیل ہونے والی دردوں میں جو ہر حصہ میں شدید دھکن کے ساتھ ہوں۔ جگر میں درد کے ہمراہ۔ حرکت سے زیادتی ہو۔ بڑھے ہوئے اور سوجے ہوئے گنٹھیاوی جوڑوں درد کریں۔ (ایمڈرٹنچر میں روغن زیتون کے ساتھ ملا کر جوڑوں پر لگائی جاسکتی ہے)۔

ڈلکا مارا۔ ٹھنڈا اور گھٹا ہونے پر جوڑوں میں دردیں۔ غمدار جگہوں پر رہنے یا ۲ گھنٹے میں درجہ حرارت میں شدید تبدیلی کی وجہ سے گرمیوں کے گرم دنوں میں جب راتیں ٹھنڈی ہو جائیں پسینے کے دب جانے سے گھٹیا۔

پلسٹیللا۔ گھٹے ٹخنے اور ہاتھوں کے پھوٹے جوڑ اور پاؤں کو متاثر کرتی ہے۔ دردیں ایک جگہ سے دوسری مستقل ہوں رات کے وقت آئیں۔ گرم کمرہ میں اور آرام کی حالت میں کھلی ہوا۔ میں حرکت سے اور گرم چیزیں لگانے سے افاقہ۔ ایڑیوں میں سونیاں چھٹنے جیسی دردیں شریف الطبع۔ بڑول یا ڈرپوک اور آسانی سے آنسو بہنے لگیں۔

گلیٹھریا اٹکل۔ ۱۰۔ ۲۰ قطرے درد کو روکنے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ اسکی پیاز ٹیب۔ دردی آڑی تر چھی یا وتری یعنی ایک طرف کے بازو اور دوسری کی طرف کی ٹانگ میں دردیں ہوں۔

ملیریا آف۔ ملیریا بخار کے بعد گھٹیا دی دردیں۔

فیرم پکتریم۔ چلنے پر جو گھٹیا دی درد زیادہ ہو۔

لائیکو پوڈیم۔ انگلیوں کے جوڑوں کا گھٹیا پیٹ میں کیساتھ۔

لیکٹک الیڈر۔ زیابیس کے ہمراہ گھٹیا۔

گوئیٹیم۔ آنشکی اور ٹی بی والے مزاج کے آدمیوں میں گھٹیا اور نقرس۔ دکھنے والے نوجوے

ہونے جوڑ جن میں چلتے اور گرمی سے زیادتی ہو۔ جوڑوں پر گھٹیا دی پھوٹے۔ ٹانگ۔ ٹخنے

کی ہڈیاں خاص طور پر متاثر ہوں۔ ٹانگوں میں پاؤں سے گھٹنوں تک گولی لگنے جیسا درد ہو۔ پٹیل کی بڑی ہڈی میں درد ہو۔ ہنڈلی کی بڑی ہڈی میں درد۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے آرام حاصل ہو۔

فارمیکا اینڈ فارمک الیڈر۔ پیشاب میں لوربٹ اور البیومن خارج ہونے کی وجہ سے گھٹیا دی اور نقرسی درد۔ جوڑوں کی سوزش جو بہت تکلیف دہ ہو حرکت پر زیادہ۔ ٹھنڈا اور طوفان سے پہلے زلزلی دباؤ سے افاقہ۔

**فیصلہ کارب**۔ یورک لیسڈ کی وجہ سے نرس گنٹیا۔ دل کی ٹھنکن اور دل کے صدمے۔ لیوں کی دردیں اور جھوٹے جھڑوں میں درد اور جلن کا احساس۔

**کالی کارب**۔ سوئی لگنے سے پھر اگھونپنے جیسے اور بلند درد جو ٹھنڈی چیزیں لگانے سے وقتی طور پر افاقہ ہو۔ آرام اور حرکت سے افاقہ نہ ہو۔ درد کی وجہ سے مریض جلد تلبے شدید کمزوری کے ساتھ بہت زیادہ پسینے کے ساتھ کمزور ہو۔ اگر درد والے حصہ کو دھانپ لیا جائے تو ننگے حصہ پر درد چلے جاتے ہیں۔ کھانا کھانے اور ننگا کرنے پر زیادتی ہو۔ ایک ایم طاقت میں دبیجے۔

**کلکیریا کارب**۔ ہڈیوں کا آہستہ آہستہ بڑھنا۔ ہڈیوں کا بے قاعدہ طور پر تشوہ نما پانا۔ ہڈی کا ایک حصہ کو خوراک ملے جبکہ دوسرا حصہ بھوکا رہے۔ رٹاکس کی طرح اس درد میں بھی متواتر چلنے سے افاقہ اور لیٹنے سے زیادتی۔ گنٹیا دی سوزش یا ہاتھوں اور انگلیوں کے جھڑوں کا گرہ دار یا کھٹکھٹا گنٹیا یا گنٹوں کا پرگوشٹ یعنی موٹے تازے اور پسینے والے اشخاص میں۔ ٹھنڈک سے زیادتی ہو۔ میگنیشیا میوور۔ دردیں جب بیٹھنے سے زیادہ ہوں، حرکت سے اور لیٹنے سے مکمل طور پر ہٹ جائیں یا درد موحاشیں۔

**سیلسک لیسڈ**۔ جھڑوں کا گنٹیا طور پر کہنی اور گنٹے کے جھڑوں پر چھل اور سوں۔ شدید سوزش سرخی اور تیز بخار۔ حادہ رھچھپنے والی درد جس کو گری سے افاقہ ہو اور ٹھنڈے سے زیادتی ہو۔ شکشا پلمونیریا x۹۰۔ دائیں کندھے یا جھڑ کا گنٹیا۔ کلائی کے جوڑ کا۔ ٹخنے یا گنٹے کا۔ یہ گنٹوں میں رطوبات کو کم کرتا ہے۔

**لیسڈ ٹائریکیم**۔ پاؤں کی ایڑیوں اور لیوں میں درد۔ ٹرائیٹھائیل امیعم۔ کلائی اور ٹخنوں میں درد بخار کے ساتھ یوٹیس کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ سارپیرنلایا۔ x۲۰۰۔ سائیکوٹمی اشخاص میں سوزاک کے دہنے۔ لیوں کی وجہ سے یا دوسری چیزیں لگانے کی وجہ سے دردیں۔

**بربریس و لگیس**۔ ایڑیوں میں دردیں جن پر بہت زیادہ وزن ڈالنے سے افاقہ ہو۔ جھڑوں کی اور گنٹیا دی اثرات اگر گردوں میں چپکنے والی درد اور کمزور۔

مائسٹریک ایسی لیزا۔ جوڑوں کی سوزش یا ان میں پیپ پڑ جانا یا دوسرے حصوں میں انگلیوں کے ناخنوں اور باضوں کی جھوٹی ہڈیوں میں درد۔

بیجیلڈونیم۔ سوزش یا سوجن گرمی۔ نازک پن اور سختی کے ساتھ گنٹھیاوی دردیں۔ مفید باقلانے کے ساتھ قبض۔ تھوڑی حرکت یا جھونے پر درد یا زیادتی۔ صاف گرم پانی سے نہانے سے آرام آئے۔ کیو پریم ایسٹیکم۔ دائیں طرف کے پاؤں کے تہجے کے ٹھٹھوں کی اکڑن شدید درد کے ساتھ۔

نیفالیئم۔ ٹنگری کا درد زیادہ زور اور سن ہونے سے اول بدل کر ٹھنڈے میں غذا موسم میں زیادتی۔ گریٹی اولا۔ تیز آہستہ اور قبض کے ساتھ گنٹھیا۔ کندھوں، بازوؤں، انگلیوں خاص طور پر کپٹی اور کلائی کے جوڑوں میں گنٹھیاوی اور نقرسی درد۔

یوٹیویریم پیر۔ انگلیوں کے جوڑوں کی گنٹھیاوی سوزش۔ کہنی کے جوڑوں۔ پنجوں گنٹھیاوی اور اور نقرسی سرد جو جوڑوں کی درد سے اول بدل کر آئے۔

کالی آئیوڈ۔ گنٹھیاوی نقرس جو ہر جوڑ کو متاثر کرے۔ بوڑھے گنٹھیا کے نکاح نہیں کھلی ہوا میں حرکت سے آفاقہ، حرکت میں رہیں۔ جب وہ چپ کر کے لیٹ جائیں تو تھک جائیں۔ گرم۔ بذرات۔ پڑ پڑا اور سخت ہوتا ہے۔

روہوڈوڈنیزردن۔ گنٹھیاوی دردیں جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑ تک منتقل ہوں۔ جوڑوں کی سوزش کے ساتھ طحان سے پہلے یا طحان میں ٹھنڈے یا انداز یا ناصات موسم میں زیادتی ہو۔ گرم پڑے پینے سے آفاقہ۔ جوڑوں کا بڑھ بانا گنٹھیاوی مادہ جمع ہونے پر گنٹھیاوی گانٹھیں۔

فائٹولا کا۔ جسم کی نرم چیز کھائی ہوئی حالت یعنی بہت نرم و مست چیزیں لگن ہوئی ہوں۔ ہڈیاں دکھیں۔ جسم میں منتقل درد۔ جوڑوں میں درد۔ رات کو بستر کی گرمی سے یا گرم چیزیں لگانے سے درد دیکھیں اور درد میں زیادتی ہو۔ وہ ٹھنڈی چیزیں چاہتا ہے۔ جوڑوں کا گنٹھیا۔ کان کے پاس کے غدد اور نچلے جڑے کے غدد بڑھے ہوئے۔ دل کے حصے میں درد جو دائیں بازو تک جائے۔

نیٹرم سلف۔ جب پیشاب میں لکڑی لکڑی لکڑی کی کالیف کے ہمراہ ہو۔ میگنولیا۔ دل کی کالیف کے ساتھ گنٹھیا۔ تلی اور دل کی کالیف اول بدل کر مریض تھکا ہوا ہو۔

لیکن سخت نہ ہو۔ بے قاعدہ تبدیل ہونے والی دردی۔ تنگی تنفس۔ جب تیز چلتا تو دم گھٹنے کا احساس۔  
 بنزواک الیڈ۔ گنٹھیاوی اور قہری دردی۔ خون میں پیشاب یا پیشاب میں کھار والی طبیعتوں میں،  
 جب پیشاب کم مقدار میں بلغم زیادہ تکلیف محسوس کرے بر نسبت جب پیشاب میں زیادہ مواد پلچٹ  
 ہو اور کثرت سے ہو۔ تکلیف میں افادہ ہو۔ اس حالت میں پیشاب بہت ہی رنگدار اور گھوٹے کے  
 پیشاب کی بود الا ہو۔ اس مواد کو کم کرنے سے تکلیف بڑھ جائے۔ پیشاب میں یورک ایسڈ جو سرخ  
 پلچٹ بنائے نزلہ کلام ہونے پر گنٹھیاوی دردی رنگ جامیں زبان یا معدہ کی سوزش شروع ہو جائے  
 کی سوزش۔ بلغم ہر کھائی ہوئی چیز سے کرتا ہے۔ دلی ہوئی دردی معدہ میں چل جاتی ہیں تب بنزواک  
 ایسڈ۔ انٹم کروڈ۔ اور سیگنویز یا مفید ہو سکتے ہیں۔ دم کی پیچیدگیوں کے ساتھ۔ ٹانگوں کی سوزش  
 کھٹے وقت بھول جائے جب لپنے آئے۔ غلی اور پریشانی۔ یوریا یعنی خون میں پیشاب شامل ہو جائے۔  
 ٹھنڈا۔ اور رنگا ہونے پر۔ ٹھنڈی ہوا۔ موسم کی تبدیلی۔ حرکت اور شراب سے زیادتی ہو۔ گرمی یا زیادہ  
 پیشاب سے افادہ ہو۔ چلتی پھرتی دردی۔ جو اپنی حالت اچانک بدلیں۔ جڑوں پر گنٹھیاوی پلچٹ۔ گنٹھیا  
 کی دردیوں کو دور کرتی ہے۔

اگرز الک الیڈ۔ بائیں طرف گنٹھیا بائیں پیچھے کے پچھلے حصہ میں دردی خاص طور پر نمایاں  
 ہوں اس دوائی میں قابل غور ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ مرض خواہ کوئی ہو۔ پوری۔ نمونیا یا دق جب  
 درد موجود ہو اگرز الک الیڈ اسے آرام دے گا۔ جڑوں کا گنٹھیا خاص طور پر لپینوں سے زیادہ ہو۔ غلاب  
 معدہ بے ذائقہ ڈکار معدہ میں ملین وغیرہ یہ پیشاب میں کیسیم اگرز الیڈ کے اخراج کو دور کرتا ہے۔  
 کندھے کے جوڑے نیچے درد۔ کندھوں کے درمیان جو نیچے کی طرف چھوٹی کمر تک بڑھے۔ کمر میں شدید  
 درد جو کولہے تک جائے جس کو حالت بدلنے پر افادہ۔

میگنٹم۔ بازو بے چینی سے پر یعنی شدید بے چین گنٹھے کو بھی ہڈیاں دکھیں۔ تلوؤں میں ملین۔ جڑوں  
 کی سوزش کا بڑھ جانا۔ ہڈیوں کے خلاف میں درد۔ ہوڑ دکھیں۔ یہ دوائی بار بار آنے والی تکلیف میں مفید  
 ہے۔ اور پہلی دفعہ کے حملہ میں مشکل کام آتی ہے۔

کیسفر۔ تکلیف نیم خوابی کی کیفیت میں محسوس ہوں اور جب ان کے متعلق سوچا جائے تو ہوجائیں۔

کیومیلا۔ شدید تیز دریں جو چانک آئیں جو مریض کو غلطی بنادیں مریض کہتا ہے کہ وہ دروں کی بجائے موت کو ترجیح دے گا اور چیز کو پسند کرے بہ نسبت دروں کی تکلیف کے۔ سن ہونے کے ساتھ دروں کیلئے مخصوص ہے۔

سیکریم کیٹس۔ برف کی طرح ٹھنڈی دریں جو ہر طرف پھیلیں۔

انٹم کروڈ۔ گنٹھیا تے کے ساتھ ادل بدل کر جب گنٹھیا رک جائے تو تے شروع ہوں۔ انگلیوں کے جوڑوں پر گنٹھیاوی گانٹھیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونے والی دریں جس کے ہمراہ سفید تے والی زبان ناک اور منہ کے کناروں پر چیرے۔ ٹھنڈے پانی سے ہانے سے نفرت۔ مینٹائٹس۔ آوارہ دریں یا چلتی پھرتی دریں پشیماب کرنے کے لئے دباؤ ڈالیں۔

فیزولس این۔ گنٹھیاوی دریں جن کے ہمراہ ذیابیطس ہو۔

سبائنا۔ گنٹھیا اور رحم سے خون بہنے ادل بدل کر جیسے کہ خون کا بہنا شروع ہو جائے جب گنٹھیاوی درد کو فاقہ ہو یا اس کے الٹ۔

سلفر۔ گرمی کے موسم صاف اور بادلوں کے دن زیادہ دریں۔ نمدار اور ٹھنڈے دن میں فاقہ۔ مزین جوڑوں کی دریں۔ تلودوں کی جلن اور سر کی چوٹی کی جلن کے ہمراہ۔

لائیکوسپ وی۔ جب دریں گرم کرہ یا بستر میں کم ہوں۔ لیکن براہ راست گرمی سے کم نہ ہوں۔ اکونائٹ نیپ۔ گولی لگنے جیسی دریں جو شراب یا کسی محرک سے دوبارہ پیدا ہو جائیں۔ رات کے وقت زیادہ عام طور پر بیٹھ ہونے کی صورت میں غائب ہو جائیں۔

ایکٹ آر۔ گنٹھیا جس سے ریڑھ کے جوڑے خاص طور پر گردن کے تنازعہ میں گردن کی گدھی میں درد اس کا مخصوص درد ہے۔ جب گنٹھیاوی درد رک جائے تو دائمی علامات ظاہر ہوں یا جب دماغ پر گندہ نہ ہو تو اسہال شروع ہو جائیں۔ آرام حاصل کرنے کیلئے کچھ نہ کچھ رطوبات پہنی جائیں۔

اکٹیاپائیگیٹا۔ چھوٹے جوڑے اور کلائیوں میں پھارنے والے اور کھینچنے والے درد۔ تصویر کی شفت سے جوڑے سوچ جائیں۔

ابروٹیم۔ اسہال کو روکنے پر گنٹھیاوی درد شروع ہو جائیں۔ جوڑوں کا درد۔ دل کے درد میں

تبدیل ہو جائے۔ ریڑھ کے درد۔ کمزری اچانک درد جس کو حرکت کرنے پر افاقہ ہو۔ رات کو اور ٹھنڈی ہوا میں علامات زیادہ ہوں۔

آرٹھریکٹکلم البم۔ جلن دار دردیں آدھی رات کے وقت اور درد والی طرف لیٹنے سے گرمی اور متاثرہ جھٹکے کو بلانے سے افاقہ ہو۔ کہنی سے کندھے تک گٹھیا دی درد۔

جیلسیم۔ جلن دار دردیں جن کو گرمی سے افاقہ نہ ہو۔ ۱۰ بجے صبح زیادہ ہوں۔ چلتی پھرتی دریں ہڈیوں اور جوڑوں میں رات کے وقت۔

ہائپرکیم۔ گٹھیا دی جوڑوں کے درد۔ یہ زخمی اعصاب کو ٹھیک کرنے میں حیران کن اثر دکھاتی ہے۔ گھٹنا تنا ہوا۔ ٹانگ۔ پاؤں تنجے کافی سخت۔

مرک سال۔ گٹھیا دی اور قری دریں شدید بدبودار پسینے کے ساتھ تھنا زیادہ پسینہ آتا ہے اتنی ہی تکلیف بڑھتی ہیں۔ ناتوانی۔ بستر میں افاقہ، لیکن جو نہی بستر گرم ہو جائیں دریں بڑھ جائیں اسے اپنے پڑے در چھینکا پڑیں تاکہ اچھا ہو جائے یا دریں کم ہو جائیں۔ دوسری حالت بھی دروں کو بڑھاتی ہے تب دوبارہ اسے بستر میں اپنے آپ کو ڈھانپنا پڑے پس تمام وقت ایسا ہی ہوتا ہے رات کے وقت زیادتی۔

کالی بائیکرومیکم۔ دریں حرکت سے زیادہ اور گرمی سے افاقہ۔ ایکہ جوڑے دوسرے جوڑے چلتی ہے دریں کم ہوں جب اسہال یا نزل زکام کے اخراج دوبارہ ظاہر ہوں جو اس دوائی کی نمایاں علامات ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد بیٹھے وقت۔ تھوڑی جگہ میں دریں جن کو ایک انگلی سے ڈھانپا جاسکتا ہے چلتے وقت کو لیے اور گھٹنے کے جوڑوں میں تکلیف۔

ایس میل۔ جوڑوں کی سوزش۔ ڈنگ لگنے جیسے بلند در درد جو گرم کمرہ میں اور گرم پیوں زیادہ ٹھنڈی پیوں اور ٹھنڈی ہوا سے افاقہ۔ جھٹے سرخ نظر آئیں اور بھونے پر گرم محسوس ہوں۔ استقامت اپنی طاقت میں دیجئے۔

سیلیسیم۔ ٹی بی والا گٹھیا۔ بیسے بیمار کے بعد شدید کمزوری۔ بڑی اور بہت عام کمزوری۔ بازوؤں کا مرجھا جانا۔ بالوں کا گرنا۔ پھیل۔ شراب یا چائے پینے کے بعد اسہال۔

کاسٹیکم۔ گنٹھیاوی درد میں جو گرم اور خنک موسم میں ابھی ہوں۔ ٹھنڈے اور خشک موسم میں زیادہ بندھنوں کی سکڑن اور سختی کمزوری اور کانپنے کے ساتھ۔ گنٹھیاوی درد میں خاص طور پر جہاں جوڑ سخت اور بندھن چھوٹے ہو جائیں۔ بازوؤں بد وضع ہو جائیں۔ جوڑوں کی بد وضعی۔ جب بارش ہو تو مریض انفاق محسوس کرے۔ بازوؤں کا فالج کے نتیجے میں کانپنا اور کمزوری۔

میدورنیم۔ جب ابھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوائی دی جائے یہ ان گنٹھیاوی مریض کے لئے موزوں ہے جس میں دریں مریض کو فینڈ سے جگادیں۔ کم مقدار میں رنگ دار اور تیز بودالا۔ پشیاہ۔ سردی سے متاثر ہونے والے۔ تلوے دکھیں۔ ٹانگوں کو اوپر کھینچ کر لیٹے یہ حالت اس کو انفاق دیتی ہے۔ لمبوں میں درد۔ یادداشت کمزور۔ چرچری طبیعت۔ ۲۰۰

طاقت یا اس سے اوپر کی طاقت استعمال کریں۔

سفلیئم۔ آتش کی مریضوں میں یا مزاج والے مریضوں میں جب ابھی طرح سے ظاہر ہونے والی ادویات ناکام ہو جائیں۔ رات کے درد میں زیادہ ۱۰۰ طاقت میں سوتے وقت دیں۔

لیکس۔ گھٹنوں اور کہنوں میں گنٹھیاوی درد میں۔ گھٹنوں کا سوج جانا۔ غول ہونے سے پہلے زبرد۔ پانی کے لئے شدید پائیں۔ پائیروجینیم۔ پہلی حرکت پر درد میں انفاق اور درد زیادہ جب حرکت و تفوں کے بعد جاری رکھی جائے۔ (رٹکس کے آٹ) درد سے انفاق حاصل کرنے کیلئے مریض تصور ہی حرکت کرے پھر ٹھہر جائے تب پھر

تھوڑا سا چلے پھر ٹھہر جائے تب پھر تصور سا چلے پھر ٹھہر جائے اور اسی طرح مزید۔

ڈرومیرا۔ ران کی ہڈی میں اور لمبی ہڈیوں میں دریں۔

آرٹیکا مانٹ۔ گنٹھیاوی درد کے لئے جب مریض چھوٹے جانے یا قریب آنے سے ڈرے وہ محسوس کرتا ہے کہ جو بھی چیز اس کی طرف آتی ہے اسے تکلیف دے گی۔ کیونکہ اس کا جسم دکھتا ہے اور نرم ہے۔ گنٹھیاوی بخار جب دل ٹوٹ ہو۔

آرم میٹ۔ دریں ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں ٹھہر جائیں جس کے نتیجے کے طور پر ڈل ہو۔ جوڑوں کی سوزش ہو۔ کڑی ٹہریاں دکھیں۔ ہڈیوں کے غلاف کی سوزش رات کے وقت زیادتی ہو۔

آرم میور۔ بھانسنے والے اور کھینچنے والے درد۔ دہانے اور چکپنے والے درد جن کو ٹھنڈک سے افادہ ہوا اور گرمی سے اور گرم چیزیں لگنے سے زیادتی ہو۔ رات کے وقت زیادتی۔ زندگی سے سخت متغیر ہو۔

فیثرم فاس۔ راؤنڈ درمڑک وجر سے گنٹھیا۔ دل کے پندے میں درد جب بازوؤں اور پنجوں کی درووں میں افادہ ہو یا اس کے اُٹ ہو۔

آر جنٹم میٹ۔ گنٹھیاوی دردیں اعصاب کے ساتھ اور کڑی ہڈیوں خاص طور پر کپنی اور گھٹنے کی ڈانگیں کمزور اور کانپتی ہوئی۔ میٹھیاں اترتے وقت زیادہ دردیں۔ گنٹھوں کا سوج جانا۔ کڑی ہڈی سوجی ہوئی۔ اس میں تر بھاد ہو اور سخت گانٹھیں بن جائیں۔ کڑی ہڈیوں کا موٹے ہو جانا۔ کالوفا سلم۔ چھوٹے ٹپھوں کا گنٹھیا اور ہاتھوں اور پاؤں کے چھوٹے جوڑوں۔ انگلیوں کے جوڑوں اور کلائیوں اور انگلیوں کے جوڑوں کے درد۔ جیھض کے وقت گنٹھیاوی دردیں زیادہ ہوں۔ جگہ بدلنے والے درد ہر چند منٹ بعد جگہ میں تبدیل کر لیں۔

پیٹرو لیم۔ ایٹریوں میں سوئی بجھنے جیسی دردیں جیسے کان میں لکڑی کی نوک اور تیلیاں لگی ہوئی ہوں۔ جٹے پر زیادتی۔

ارمیکا یورنس۔ کارٹھ پشیاب کے ساتھ گنٹھیاوی دردیں۔ ہر دو یا تین گھنٹے بعد درد ٹنچر کے پانچ پانچ قطروں کی خوراکیں۔ یہ صرف درد کو ہی دور نہیں کرے گی بلکہ کافی زیادہ پتھریوں کو خارج کر دے گی۔

نیٹرم میور۔ ایسے مریضوں میں گنٹھیاوی دردیں جو ہمدردی، سہلکام یا شور۔ چربیلی غذا اور نمکین غذا کو پسند کریں۔ ایسے افراد میں گنٹھیا جنہوں نے بہت زیادہ کونین کھائی ہوئی ہو اور ٹھنڈے ہوں۔ سمندر کے کنارے رہتے ہوں۔

کلکیر یا فاس۔ ہڈیوں کی کمزوری اور نرمی۔ سردیوں میں یا ٹھنڈے موسم میں گنٹھیا آئے گرم موسم آنے پر بہتر ہو۔

کاربونیم سلف۔ مزین گنٹھیا اور قمر کے لئے خاص طور پر جوڑوں کے گنٹھے کے لئے۔

کو نیم۔ جب بازوؤں کو ٹکانے سے دردوں میں افاتہ ہو۔  
 اگر کیس میکس۔ آری ترچی دردی ہوں یعنی بایاں بازو اور دائیں ٹانگ یا اس کے الٹ۔  
 ٹیڑھ ٹولا۔ آری ترچی دردی جیسے کہ دایاں بازو اور بائیں ٹانگ میں درد ہو۔  
 لائیکو پریسم۔ گنٹھیاوی دردی جیسے کہ گھر سے باہر زیادہ ہوں۔ ذہن کندھے کے پٹھے میں  
 زیادہ تکلیف ہو۔

میلشیا۔ دچی کی ہڈی میں درد جیسے کہ گاڑی کے بلے پھر کے بعد دچی میں ڈنگ لگنے جیسے  
 درد جو دباؤ سے زیادہ ہوں۔ گھٹنے میں درد جیسے کہ سختی سے بندھا ہوا ہو۔  
 سٹیف سکیوریا۔ جوڑوں کا گنٹھیاوی۔ جوڑوں میں سختی اور سخت مشقت کا احساس۔  
 جوڑوں پر سوزشی کانٹھیں، معمولی پھوٹنے پر درد میں زیادتی۔ اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔  
 ایلوفا سلیکیٹا۔ جوڑوں میں دردی۔ بازوؤں میں کندھوں میں۔ کہنیوں میں۔ اگلے  
 بازو۔ ہاتھ، ٹانگوں اور پاؤں میں دردی۔ پیچھے سے اوپر کی طرف دردی جائیں۔  
 امونیا فاس۔ گنٹھیا اور نقرس کے لئے مزاجی دوائی ہے۔ جب جوڑوں میں کانٹھیں ہوں۔  
 جوڑوں میں ٹھوس جلاؤ اور ہاتھ ٹیڑھے ہو جائیں اور بد وضع ہو جائیں۔

تھو جہا۔ یہ گنٹھیاوی ریشہ دار ٹھوس مواد میں مدد دیتا ہے۔ خاص طور پر کندھے کے پیچھے  
 اور کہلوں کے حصوں میں۔ یہ گھٹنوں کی چکنائی نکلنے کو ٹھیک کرتی ہے۔ ۱۔ ایم طاقت میں  
 دیتے۔ سوز کی قسم کی جوڑوں کی گنٹھیاوی سوزش۔ یہ جوڑوں کو ڈھیلے کرنے میں حیران کن عمل  
 کرتا ہے حرکت کرنے کے عمل کو جاری کر دیتی ہے جبکہ دوسری نظر بخوبی ادویات ناکام ہو جائیں۔  
 ویلیمر بانیہ۔ تبدیل ہونے والی گنٹھیاوی دردی جن کو اوپر نیچے چلنے سے اور تلنے سے افاتہ  
 ہو۔ گرمی کے اچانک جھونکے سے پیاس اور متلی کے ساتھ۔ آدھی رات سے پہلے بے خوابی۔  
 کلکیر یا فلور۔ جو نقص دار ہڈیوں کے اکاڈ کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ ہڈیوں کو کمزور  
 اور پھوڑے۔ مریض گرمی سے افاتہ محسوس کرتا ہے اور سردی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔  
 فلورک ایسڈ۔ یہ ہڈیوں کو نرم کرنے اور کانٹھوں کو اور دوسری زائیدگی ہوئی چیزوں کو جذب

کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ کافی درد، کچھ کمزوری اور سرخی ہوتی ہے۔ نامنخول کا جلدی بڑھنا۔  
 پلرک الیڈ۔ ڈاکٹر مال برٹ کے تجربے کے مطابق اس دوائی نے سب سے زیادہ اچھے نتائج دیے ہیں۔  
 صفحہ ۱۸۴۔ زخم کی دہر سے یا ویسے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے لئے۔ یہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے لئے  
 بہترین دوائی ہے۔ خواہ وہ سادہ ہوں یا ٹکڑوں کی صورت میں پیچھے ہوں۔  
 روٹا۔ بڑی ہڈیوں میں درد خواہ زخم۔ گنتھے کیوجہ سے ہو۔ یہ زخموں اور ہڈی ٹوٹنے کیلئے  
 مفید ہے۔

یوفوریم۔ ہڈیوں میں جہن دار دردی یا کینسر کی طرح کے بجلی کے جھٹکے۔ گلے کے غدودوں  
 کی سوزش اور پیپ اور ہڈیوں کا گلنا سٹنا۔ مچھی کی ہڈی میں درد۔  
 تیمس۔ ہڈیوں کے بیرونی طور پر دروں پر لگانے کیلئے اس دوا کی مدد کیجی لگائی جائے۔

## ہڈیوں کا نرم ٹیڑھا جانا۔

کلکیر یا کارب۔ ریڑھ کی ہڈی کا خاص طور پر یا لمبی ہڈی کا خم کھا جانا۔ خنازیری لوگوں میں  
 ہڈیوں کا ٹھیک نہ بننا۔ ہڈیوں کے سرے غلط کے، بد وضع، ٹیڑھی۔ نامکمل طور پر بڑھنے والوں  
 کی ہڈیاں دیر بعد جڑیں۔ دانت دیر سے نکلیں اور تکلیف سے نکلیں۔ چھوٹے بچے ڈالا بچہ۔  
 کالی کارب۔ ہڈیوں کا گھٹ جانا۔

کلکیر یا فاس۔ ہڈیوں کا ٹھیک طرح سے نہ بننا وزن میں کمی کے برابر۔ ہڈیوں کے نرم ہونے  
 کے لئے لیٹرین دوائی ہے۔ بچہ دہلا پتلا۔ کمزور اور پیٹ پھولا ہوا ہونے کی بجائے اندر دھنسا  
 ہوا۔ بڑا سر اور تالو کھلا رہے۔ کلکیر یا کارب کے بچے کے مقابلہ میں۔

نیو برکولینم ۲۰۰ x۔ اس دوائی سے علاج شروع کیجئے اور ہر تیسرے ماہ ایک خوراک دہرائیے  
 اس دوائی سے دو دن پہلے اور دو دن بعد کوئی دوائی نہ دیجئے۔

فلورک الیڈ۔ آتش کی اور ریڑھ کی ہڈی کی سوزش کے میلان رکھنے والے اصحاب کیلئے بہترین  
 دوائی ہے۔ جسمانی حالت کمزور اور نر درو پٹھے نرم اور پیلے پاؤں اور ہاتھ تو اتر پینے میں نہائے رہیں۔

سیلیشیا - کھلے والو پیٹ بھولا ہوا اور گرم زیادہ مقدار میں سر پر کھٹا پسینہ اور جسم خشک بچھنے  
 ٹھنکیاں - غصہ و جن سے پیپ پھٹنے کا ڈر ہو اس دوائی سے ہوجاتے ہیں -  
 بریٹیا کارب - جب ذہنی اور جسمانی بونا پن ہو یعنی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر رجوع تری نہ ہو -  
 گلے کے ماسلز اور گردن کے غصہ و بڑھے ہوئے ہول اور سخت ہوں -  
 گلکیر یا فلور - نوزائیدہ بچوں کی کھوپڑی کی ہڈیاں بڑھ جائیں اور سوزش زدہ ہوں - دانتوں  
 پر کم مقدار انجیل - سردی کے غصہ و غیر معمولی طور سخت اور ہڈیوں پر کانٹھیں پیپ کے ہمراہ -  
 کریا روت - بچوں کے قبل از وقت دانت گلی سڑ جائیں - خاص طور پر دودھ کے دانت  
 جن پر سیاہ دھبے اور جو نہی نکلیں وہ ٹوٹ بھٹوٹ جائیں -  
 آر جینٹم یا ٹیرکیم - ذہین اور قبل از وقت دماغی طور پر بالغ بچوں کے لئے ، پانچانے نرم  
 اور سفید مٹھائیوں کی زبردست خواہش یعنی مٹھائیوں کے رسیا -  
 بریٹیا میور - زرد - کند ذہن اور کمزور ہڈیوں والے بچے جو بغیر مدد کے کھڑے نہ ہو سکیں -  
 ماسلز بڑھے ہوئے - کمزور دل اور بہت جلدی سردی سے متاثر ہوں یعنی ٹھنڈک جلے -  
 عرق النسا یا انگلٹری کا در دیا درد ریگن -

کالوسٹھ - حادثہ لنگری کے درد کے لئے چوٹی کی دوائی ہے - چوتھ میں کند سوئی جھنچھنی  
 در دیں جو اچانک آئیں اور بچے کی طرف ، پچھلے حصہ کو لے لے یا گھٹنے کو یا پاؤں کو جائیں - گرمی سے  
 درد کو آفت ، بھونے یا حرکت ، حرکت سے زیادتی - یہ بڑی طاقت میں دی جا سکتی ہے یعنی ۲۰۰ x  
 طاقت ۴ - ۵ گھنٹے پر تین یا چار خوراکیں دی جا سکتی ہیں -

رٹاکس - جب درد کھلا رکھنے یا پٹھوں کی شدید شفقت کی وجہ سے ہو - رات کے وقت  
 بستر میں زیادہ ہو - یا آرام کرتے وقت زیادہ ہو - پہلی حرکت سے بہت زیادہ تکلیف کو چلنے پر لاتا ہو -  
 نیفالیسم - اعصاب میں شدید درد ، جس کے ساتھ انٹھن اور من ہونے کے ساتھ ادل بدل  
 کر لیٹنے سے زیادہ پٹلی اور پاؤں میں در دیں ہوں -

میکروٹیم۔ لنگڑی کے درد کے لئے شاندار دوائی بتائی جاتی ہے ۲۴ طاقت میں دی جائے۔  
ڈائسکوریہ۔ ٹانگوں میں پھاڑنے والی درد جو حرکت کرنے پر یا بیٹھنے پر ہو۔

میگنیشیا فاس۔ بجلی کی تاری طرح کی دردیں جو گرمی سے کم ہوں۔ دائیں طرف کی دوائی ہے۔  
ایسڈ سلف۔ جب اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی دوائیاں ناکام ہو جائیں تو اس سے بہت  
کیس ٹھیک ہو گئے ہیں۔

آرسینکیم البم۔ جب مریض میریا کے بار بار کے حملوں کا نشانہ بن چکا ہو اور دردیں وقفہ دار  
ہوں۔ شدید کھینچنے والی۔ جلن دار۔ بائیں پوتڑ میں پھاڑنے والی دردیں جو کولہوں تک بڑھیں  
شدید بے چینی جس کو گرم چیزیں لگانے سے ناکارہ ہو۔

روٹا۔ یہ رشاکس سے ملتی جلتی ہے۔ ہر علامت میں سوائے اس کے کہ روٹا کی دردیں  
اعصاب کی برائچوں کو گہری جاتی ہے اندر کی طرف کو بجائے باہر کی طرف جانے کے ٹھنڈ اور لیٹنے  
سے زیادتی ہو۔

کیمومیل۔ لنگڑی کا درد جس کے ساتھ دماغی علامت کہ درد سے تو موت بہتر ہے۔  
کلکیریا کارب۔ لنگڑی کا درد پاؤں ٹھنڈے اور پیچھے رشاکس کی طرح چلنے سے ناکارہ ہو۔  
ماربیلینیم۔ جب جھپک کے بعد لنگڑی کا درد ہو تو یہ بطور مل انجینر کے دی جا سکتی ہے ایک ہزار  
طاقت میں دیکھئے۔

ایسکولس۔ لنگڑی کا درد گہری کم درد کے ہمراہ جس سے چلنا مشکل ہو۔ ٹیرھا ہونا اور دباں  
سے اٹھنا تکلیف دہ ہو۔

گلٹیک۔ لنگڑی کے درد کے لئے مخصوص ہے۔ جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔  
یہ تیزابیت۔ زبان پر تہہ جمی ہوئی۔ گندہ ذائقہ اور گندہ سانس یعنی منہ کا ذائقہ اور سانس گندہ۔  
ایک ایم طاقت میں دیکھئے۔

امونیم میور۔ لنگڑی کے درد میں کہ اعصابی پٹھے جھوٹے ہو گئے ہوں۔ بیٹھنے اور چلنے پر  
زیادتی ہو۔ اور تکلیف بہت زیادہ ہو۔

میتھو ریٹم۔-جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں اور مریض بہتر نہیں ٹانگوں کو کھینچ کر لیتا ہے۔ یہ حالت اس کے لئے افادہ بخشتی ہے۔  
کالچیکم۔-دائیں طرف کی تیز دردیں جو گھٹنوں تک بڑھیں حرکت سے زیادہ۔ اچانک دردی مستقل اور ناقابل برداشت۔  
برائی اونیا۔-لنگری کا درد گھٹیاوی قسم حرکت سے زیادہ سخت دباؤ سے افادہ ہو۔  
پلمیم۔-پٹھوں کے کمزور ہونے پر لنگری کا درد بجلی کی طرح کی دردیں دوروں میں ٹپٹھن ہو۔  
یا ٹپٹھن کے دورے

دوسرا حصہ

الحمد لله

جب پٹھے سکڑنے کے نااہل ہوں

جلیسیم۔ پٹھے ڈھیلے۔ آسانی سے تھک سے جائیں۔ تمام نظام میں کمزوری اور یکپا ہٹ اعصاب کا ڈھیلا پن۔ ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہے۔ گھٹنوں میں احساس کہ ہڈیاں ٹھیک طرح خست نہ آتی ہوں۔ اور ہڈیوں کو مضبوط ہو جاتی ہے۔  
کوکولس۔ جب پیکروں کے ہمراہ۔  
کاسٹیکم۔ جب جلیسیم ناکام ہو جائے تو یہ دوائی استعمال کی جائے۔ پٹھوں کا چھوٹے ہونا اور سخت ہونا جو ہاتھ سے محسوس کیا جاسکتا ہے جیسے کہ سخت کنارہ ہو۔ پٹھوں اور اعصابی بندھنوں کا یکسر ہونا۔

الینٹھن (لکھنے والی کی انٹھن بھی دیکھئے۔)

بسنزواک الیڈ۔ جب چلے تو جڑوں میں کرکمن۔  
رستاکس۔ ایسی اینٹھن جو آرام کرنے پر زیادہ اور چلنے پر لافاق ہو، حرکت کرتے وقت جڑوں میں۔

کلکیر یا کارب۔ اینٹھن رات کے وقت بستر میں اور ناگیس بھیلانے پر زیادہ ہو۔

کیوریم میٹ۔ شدید اینٹھن خاص طور پر پنڈلیوں میں۔

سیکل کار۔ پنڈلیوں میں اینٹھن  $200 \times$  طاقت میں دیکھئے۔

پٹرولیم۔ پٹھوں کی کڑن۔ جوڑوں کا کرکڑانا۔ جوڑوں کا نرم نہ ہونا یا نہ مڑنا۔ اینٹھن خاد۔

کلکیر یا فاس۔ پنڈلیوں میں اینٹھن۔ پنچوں میں دنگ گئے اور گولی گئے جیسے درد۔

میگنیشیا فاس۔ زیادہ شفت کی وجہ سے اینٹھن سختی میں ہو جانا۔ بدجہا پن۔ اعضا کا بڑھ ہو

جانا۔ لکھنے والوں کے ہاتھوں اور انگلیوں میں دیر تک لکھنے کی وجہ سے اینٹھن۔

نیرم فاس۔ پنڈلیوں اور پاؤں میں اینٹھن۔ لکھتے وقت ہاتھوں میں اینٹھن جوڑوں میں کڑن۔

کیمفر۔ بازوؤں اور پنڈلیوں میں برف جیسی ٹھنڈک کے ساتھ اینٹھن

## پٹھوں کی کمزوری۔

کلکیر یا کارب۔ کمر کے پیچھے بڑی طرح ریشہ دار نیچے کے بننے کی واضح علامات جن کی وجہ کمزوری ہو۔

کاسٹیکم۔ اس دوائی سے علاج شروع کیا جائے۔ ایک ایم پوٹیشی کی خوراک دیجئے۔ یہ پٹھوں

کی کمزوری کے لئے جس میں پیچھے پٹھوں میں مصنوعی یا جعلی فالج کا احساس ہو یا یہ ایک ایسی بیماری

رضاکہ پیٹھے شدید ناتواں ہو جاتے ہیں جن پر مکمل طور کنٹرول ہو جاتا ہے۔

فیرم میٹ۔ پٹھوں کی کمزوری کے لئے شاندار دوائی ہے۔ کئی خون کے ساتھ کمزوری۔

پلیمیم۔ پٹھوں کی نامحاتی پٹھوں کے فالج اور قبض۔ یہ ٹانگوں کے لئے خاص لگاؤ رکھتی ہے۔

سٹر امونیم۔ آسانی سے نقل و حرکت رضاکہ پیٹھے مرضی کے مطابق کام نہ کریں۔

اینا کارڈیم۔ رضاکہ پیٹھوں کو کنٹرول نہ کر سکے ضعیف العقلی کے ساتھ فالج۔

## پٹھوں کی سوزش

برائی اونیا۔ جب پٹھوں میں کام اور نوعیت کی تبدیلیاں ہو جائیں خاص طور پر بازوؤں

اور ٹانگوں میں پہلے پہل بھٹکے۔ سوئی لگنے جیسے پھاڑنے والے، جھنجھنے والی علامات اور بھر  
سوزش۔ گرمی اور سرخی اور بھر سختی اور چلنے میں نمایاں یا شدید تکلیف۔ یہ علامات جراثیم جسم میں  
داخل ہونے کی وجہ سے ٹپھوں کی سوزش میں پائی جاتی ہیں۔

آرٹیکالائٹ۔ جب سوزش کی وجہ سے جوٹ یا گندازارے زخم ہو۔

رٹسائٹس۔ جب مندرجہ بالا علامات گنٹھیاوی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوں۔

تھو جوا۔ جب سوزش میں بڑی بنا شروع ہو جائے۔ یہ بڑی کے بننے کو روک دیتی ہے۔

پٹھوں کی بڑھتی ہوئی ناطاقتی۔ لاغری۔

پٹھیم۔ یہ چوٹی کی دوا ہے۔ سادہ میکان سے لے کر پٹھوں کی مکمل تباہی تک کو درست کرتی ہے۔  
یہ صرف دماغ کے پٹھوں ہی کو درست نہیں کرتی بلکہ دھڑ، ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کے پٹھوں  
کو درست کرتی ہے۔ احساس کا مکمل طور پر جاتے رہنا۔ کمزوری اور کاٹنے والے درد۔ پکڑنے والے۔  
کا پٹنے ہوئے۔ بل کھائے۔ گردن میں گولی لگنے جیسے کھینچاؤٹ اور کندھے کے پٹھوں کی ناطاقتی۔  
استسقاء غیر مستقل چال یا لڑکھرائی چال۔ پٹھوں کا لمبائی میں کم ہونا۔ ۲۰-۳۰ سالہ خواتین دیکھئے۔  
آرٹیکل ٹائٹنیم۔ ریڑھ کی ہڈی کی حساسیت۔ ریڑھ کی ہڈی میں شدید دردرات کے وقت ہاتھ  
پاؤں کا عمومی طور پر کانپنا اور کمزوری۔ آنکھیں بند کر کے نہ چل سکے۔ پنڈلیوں کی سختی اور کمزوری بھی۔  
غیر مستقل یا ڈانواں ڈول چال چلے یا کھڑا ہو۔ رات کے وقت اور صبح سے زیادتی، تازہ ہونے لگتا ہو۔  
برٹیا کارب۔ بلوغت کی عمر میں پٹھوں کی ناطاقتی۔

فاسفورس۔ بعض حصوں کا زیادہ بڑھ جانا اور بعض کا کمزور ہو جانا۔ مریض کا ڈھانچہ لمبا  
کھوکھی چھاتی، ٹی بی اور آئسکی مزاج۔ جلن کا پٹنے کے ساتھ۔ سن ہو جانا اور کمزوری نمایاں  
علامت ہے۔


میورالید۔ انیم کے استعمال کی زیادتی کی وجہ سے پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔  
تھیلیم۔ پٹھوں کی کمزوری۔ لڑکھرائی چال میں تکلیف۔ لرزہ یا رعشہ۔ معدہ اور انٹسٹائن میں  
بجلی کے جھٹکوں جیسی تکلیف۔

کالی فاس - پٹھوں کی کمزوری کے لئے - یہ اس حالت سے متعلقہ دائرہ کو مار دیتی ہے  
یا تباہ کر دیتی ہے - یہ مزاحیہ دوائی ہے دوسری ادویات کے ہمراہ دی جائے -

آزیکا ایم { کیوریم میٹ  
برٹیا آئیوڈائیڈ  
جائیں - جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں -  
حرکت کرنے پر پٹھوں کا بہت زیادہ پھینچ جانا -

رٹاکس :- یہ صرف واحد دوائی ہے جو پٹھوں کی کھنڈاٹ میں دی جاسکتی ہے -  
پٹھوں کی عام سوزش اور اسکے ہمراہ بڑی کا بننا -

کلکیریا فلور - یہ ایک شاندار دوائی ہے - یہ لمبے عرصہ تک دی جانی چاہیے - اگر یہ دوائی ٹھیک  
کرنے میں ناکام ہو جائے تو درج ذیل ادویات دی گئی ترتیب میں دی جائیں -  
(۱) - کلکیریا فاس (۲) - ایسٹ فلور - (۳) سمفاٹیم -



تیرھوں

باب

جلد  
بالوں اور ناخنوں  
کی بیماریاں

468

## جلدی بیماریاں

۱۔ ایک معالج کے لئے جلد کی بیماریاں بہت اہمیت کی حامل ہیں اسلئے کچھ متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے لئے نہایت اہم باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چند ایک کے علاوہ تمام بیماریاں اندر سے ظاہر ہوتی ہیں، پس یہ اندرونی دوائی کے ذریعہ ہی اندر سے ٹھیک کی جائیں۔ جلد کی اپنی آزادانہ زندگی نہیں ہوتی۔ اس پر پھوڑے پھینسیاں اندرونی بگاڑ کا اظہار ہوتی ہیں۔ مکمل متحند جسم صحت مند جلد رکھتا ہے اور ایک بیمار جلد صحت مند جسم نہیں رہ سکتی۔ بیرونی طور پر دوائی استعمال کر کے مرض کو غائب کرنے کا مقصد اس کو دوبارہ کسی دوسرے عضو پر حملہ آور کرنا ہے۔ اور خطرناک نتائج ظاہر ہوں، جلدی بیماریوں کو بیرونی ادویات یا لوشنوں سے ٹھیک کرنا نظریاتی طور پر غلط ہے اور عملی طور پر نقصان دہ ہے۔

۲۔ جلد کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک مادے کو خارج کرنے والا عضو ہے۔ اور جسم کے ہر حصہ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اندرونی اعضاء کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جلد کا ہر حصہ کسی کسی اندرونی حصہ سے گرا تعلق رکھتا ہے پس جلدی بیماری کسی اندرونی بیماری کا اظہار ہوتی ہے بلکہ اس کو جسم کے اندر کی بیماری کا خبردار کرنے کا گنگل اور خطرے کی گھنٹی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

۳۔ جلدی بیماری میں مبتلا انسان کے لئے درد اور سوزناں اچھی خوراک ہیں۔ گوشت یا انڈوں سے پر سبز کرنا چاہیے۔ نظام انہضام کو صحیح حالت میں رکھنے کے لئے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔

۴۔ متاثرہ حصہ کو صابن کے ساتھ دھونے سے پرہیز کیا جائے۔ جو کرایا بورے کے پانی سے متاثرہ حصوں کو صاف کیا جائے۔

مرتب

## پہرے کے دانے

ایسٹریازوب - بلوغت پر چہرے کے دانوں یا پھنسیوں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔  
 کالی بروم - اگر ایسٹریازوب ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔  
 تھوجا - چہرے کے دانے ناک کے دانے اور ناک کی جلد کی سوزش۔  
 آرینک آئیوڈ { ضدی کیسوں میں دی جائے  
 سلفر آئیوڈ { جو شدید قسم کے ہوں۔  
 ہائیڈروکوتائیل - چہرے کے دانے جن کے ہزارہ رحم کی خرابیاں بھی ہوں۔  
 اگرکیس - چہرے کے دانوں کے ہزارہ بوائیوں کا بھی رجحان ہو۔  
 برومیرس اونیوولیم - لڑکیوں کے چہرے پر دانے۔ بڑی پھنسیاں اور کیل مہاسے۔ یہ چہرے کی رنگت کو نکھارتی بھی ہے۔  
 ڈلکامار - حیض سے پہلے چہرے پر دانے۔ نمدار پھنسیاں، ٹھنڈے اور سرد موسم میں زیادتی ہو۔  
 سٹریپٹو کوکین - دانے جو انڈے کھانے اور سردی سے زیادہ ہوں۔ سر کے اگلے سرکار در جس کو ٹھنڈی ہوائے افاقہ ہو۔  
 ایکوٹائیٹ لائیکوٹوٹم - چہرے پر سخت ٹی بی والے کیل مہاسے۔ ہونٹوں پر کیل مہاسے۔  
 سورانیئم - چہرے کے دانے جو حوض۔ چوبلی غذا۔ کھانڈ یا میٹھی چیزوں۔ کافی اھ گوشت سے زیادہ ہوں۔  
 کلیریناس - کئی خون والی لڑکیوں میں بلوغت پر چوٹی میں سرد دریا چند یا میں سرد دریا اور گیس کے ساتھ نگی تھن جس کو کھانا کھانے سے افاقہ ہو۔  
 تھوجا - چہرے پر دانے یا کیل مہاسے جبکہ گنے کے تاروں یا یکے لگائے گئے ہوں۔

بووسٹا۔ کاسٹیکس یا کریم پاؤڈر لگانے سے چہرے پر دانے خاص طور پر گرمیوں میں زیادہ ہوں۔  
 آرم آر سینکم۔ چہرے اور ماتھے پر دانے کیل ہمارے۔ بھوڑے۔ چہرے کی جلد کی دق۔  
 سینکونیر یا سی۔ چہرے کے دانے جو حیض کے دوران زیادہ ہو حیض کم مقدار میں ہوں۔  
 سلفر۔ یہ دوائی بطور ایک عمل انگیز کے دیکھائے جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات آرام  
 دینے میں ناکام ہو جائیں یا آرام آنے کی رفتار رک جائے۔ ۲۰۰ طاقت میں دیکھائے۔  
 ہیر سلفر۔ پھنسیاں جن میں سے سفید پیپ نکلتے۔

آر سینکم سلفٹ ابرم۔ جب اگر بیمار اور جلدی خارش بھی ساتھ ہو چہرے کے دانوں کیلے مفید ہے۔  
**تھام کے اُترے کی لاگ سے خارش**  
 (داد بھی دیکھئے)

لیتھیم کارب۔ خارش، رخا روں پر داد والی خارش سرخ دکھنے والی جلد۔ اگر ۲ طاقت ناکام  
 ہو جائے تو ۲۰۰ طاقت دیجئے۔

پیرولیم۔ جلد خشک۔ حساس۔ کھردری اور بھٹی ہوئی۔ چہروں سے جلدی غون ہے۔  
 سلفر۔ ایوڈ۔ چہرے پر گومڑ والی پھنسیاں۔ بال ایسے کھڑے محسوس ہوں۔  
 ٹیلیوریم۔ گول دائروں میں گڑھے متاثرہ حصوں سے بدبودار کوڑا آئے۔ جلد میں ڈنگ لگنے  
 جلد میں ڈنگ جیسا درد۔

رستاکس۔ نائی کے اُترے کی لاگ کی خارش کے لئے شاندار دوائی ہے کوئی اور دوائی  
 دینے سے پہلے یہ دی جائے۔

لیکس۔ نائی کے اُترے کی لاگ کی دگر سے جب مواد کے رسنے کیساتھ چہرے ہوں  
 دجنے کے بعد پھر سے ظاہر ہو جائیں۔

لائیکوپوڈیم۔ پرت دار جڑ میں سے زرد منہ کے کناروں پر غون ہے۔  
 سلفر۔ خشک خارش۔ ناک اور آنکھوں پر زیادہ ہو۔

گریفائیٹس۔ خارش۔ اگر بیماریا کی طرح کی چکنے والا مواد نکلتے۔  
 سکوٹاڈاٹر۔ تھام کے اُترے کی لاگ شیو کرنے پر۔

## پھوڑے

سیلا ڈونا۔ جب سوزش کی شے میں پھوڑے سرخ ہوں۔ پیپ بنے بغیر تکیں دار درد۔ خونی پھوڑے۔

گلگیر یا کارب۔ جب پھوڑے سرخ نہ ہوں لیکن زرد اور بہت درد کرنے والے۔ ہر چار گھنٹے کے بعد ۲۰۰ طاقت کی ایک پڑیا دیجئے۔ تین یا چار خوراکیں کافی ہوں گی۔

آرمیکلیم البم۔ گوشت خور پھوڑے کے لئے سب سے بڑی دوائی ہے جسے کراگ کے کوئی متاثرہ جگہ پر رکھے ہوئے ہوں۔ کاٹنے والی اور جلنے والی درد آدھی رات کے بعد جب انہیں کس نام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔

ایمپیرسلفر۔ پیپ بننے کے ابتدائی مراحل میں متاثرہ حصے شدید حساس ہوں تیز چھنے والی دروں کے ساتھ ہر نصف گھنٹے ۶ طاقت میں دیجئے۔ پیپ کا بننا بند کر دگی یا چند گھنٹوں میں پیپ کو ختم کر دے گی۔ جب پیپ باہر آنا شروع ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔ پیپ گاڑھی۔ زرد۔ اور مریض چھوڑنے پر حساس ہو۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرے لیکن سلیشیا کے مریض کے برخلاف مقدار موسم میں افادہ محسوس کرتا ہے۔ یہ پھوڑوں میں بہت بڑی تسکین دہانے والی دوائی ہے۔ ناخنوں کے ارد گرد اور انگلیوں کے سروں پر پیپ کے لئے بہت اچھی دوائی ہے۔

سلیشیا۔ جب تندرست کرنے کی رفتار کم ہو۔ پانی جیسی اور پتلی پیپ بغیر درد کے پھوڑے جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں۔ ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت ہفتہ بعد مہینہ بالترتیب دیجئے۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرے خشک اور گرم موسم میں افادہ محسوس کرے، انداز اور ٹھنڈے موسم میں زیادتی محسوس کرے۔ مرکا آئیوڈ۔ سوزش کی شے میں یہ ایک اچھی دوائی ہے جب پیپ نہ بن رہی ہو۔ غددوں کے پھوڑے میں جب پیپ پڑ جائے تو یہ بہتر پتلی پانی جیسی ہو۔ شدید جھکدار سرخی۔ تکیں دار اور ڈنگ لگنے جیسے درد۔

آرنیکا مانٹ۔ ایک بعد دوسرے پھوڑے کے نکلنے کا رجحان جو بہت درد کریں۔ پھوڑے چھوڑے۔ بہت زیادہ تعداد میں۔

سلفر۔ چھوٹے پھوڑے زیادہ مقدار میں جب سائیکاٹ ناکام ہو جائے۔  
 انتھر کینم۔ گوشت خور پھوڑوں کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ تیز بخار کے ساتھ جلن رکھتی ہے  
 ہر پندرہ روز کے بعد ۱۰۰۰ طاقت میں ایک ٹریڈ بجھے یا ٹوٹھیک کر دے گی یا حالت کو بہتر کرے گی۔  
 کلکیر یا سلف۔ پھوڑے جن کو آہستہ آہستہ آرام آئے متواتر زرد پیپ خارج ہو۔ مریض کھلی  
 ہوا کو پسند کرے لیکن جھونکوں سے حساس ہو۔ پھوڑوں کے بننے کا رجحان۔  
 لیکس۔ نیلے رنگ کے پھوڑے جن سے خراشدار۔ بدبو دار۔ پیپ خارج ہو۔ جلن دار  
 دردیں۔ پھونے سے حساس۔

ٹیرنٹولا کیو بنیز۔ پھنسیاں۔ پھوڑے۔ گوشت خور پھوڑے۔ لبہری۔ غیبت پھوڑے  
 اور گلیمرین۔ سخت۔ نرم سو جے ہوئے ہال توڑ۔ کسی بھی سٹیج کے پھوڑوں کے لئے مخصوص ہے  
 یعنی ہر قسم کے پھوڑے کے لئے مخصوص ہے۔ کھالی کے لئے بھی انتہائی مفید دوزوں ہے۔  
 گن یا وڈر۔ پھوڑے۔ داد۔ کرموں کا بلد میں داخل ہونا اور خون میں کھیلنے مفید ہے۔  
 مارٹینیکا ایس۔ پھوڑوں میں پیپ پڑ جانا۔ یہ پیپ پڑنے کے عمل کو تیز کرتی ہے اور اس کا وقت  
 کم کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے سروں پر پھوڑے اور پوروں پر پھوڑے۔ ۲ طاقت میں دیجئے۔  
 کاربالک ایسڈ۔ ذیابیطس کے ساتھ کر کے پھوڑے، کئی سوراخوں سے گندی بدبو دار پیپ  
 ہے۔ مریض تسلی اور بدبو دار قے میں مبتلا ہو۔ ۲۰۰ طاقت میں دیجئے۔

سٹر امونیم۔ شدید تکلیف دہ پھوڑے۔ سوزش۔ مزمن گوشت خور پھوڑے۔ پھوڑے جوڑوں  
 میں پھوڑے خاص طور پر پائیں چولے میں پھوڑے۔ بڑی زہریلی حالت اور پیپ بنے۔  
 لیڈم پال۔ سوئی چھیدنے سے پھوڑے یا لبہری۔  
 پیکرک ایسڈ۔ بیرونی کان میں پھوڑے۔

ملز بیلینیم۔ کان کے بیرونی چھید پر بار بار نکلنے والے پھوڑے شدید دردوں کے ساتھ پرانے  
 چچک کی تاریخ ملے۔

سیکل کار۔ چھوٹے چھوٹے پھوڑے۔ بہت دور کریں سبز مواد آہستہ آہستہ ٹھہریں۔

## گوشت خور پھوڑے (دیکھئے پھوڑے) کٹے پھٹے ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے پر چیرے۔

پٹرولیم۔ انگلیوں کے سروں پر چیرے اور ہاتھوں کی پشت پر چیرے۔ جلد کھردری یا ٹکی پھٹی۔ خون سے لیس سخت۔ اکثر بہت زیادہ خارش تھوڑی تھوڑی جگہ۔ مہوہ۔ کمر اور پیٹ میں ٹھنڈک۔ رستاکس۔ جلد کی خارش۔ جھینٹا ہٹ اور ملن کے ہمراہ۔ انگلیوں کے سر پر ریگنے کا احساس جلد سرخ اور سوجی ہوئی۔ ٹھنڈک میں۔ مندار اور بارشوں کے موسم میں زیادتی۔

سیلیشیا۔ نرم زرد دومی جلد۔ انگلیوں کے سرے پر چیرے۔ بدبودار سپ۔ انگلیاں خشک ہوتی کریں۔ انگلیوں پر وقت دن کے وقت اور شام کے وقت خارش ہو۔ مریض ٹھنڈا۔ ٹھنڈ محسوس کرے۔ آگ سے پیار کرتا ہے یعنی آگ تپتا ہے۔ جھونکوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ سلفر۔ چیرے۔ جلد پر دو آئیاں لگانے سے گھاؤ۔ کھرچنے اور دھونے پر زیادہ۔ جلد خشک۔ پرت دار اور غیر صحت مند۔ خارش ہو اور جلد گرم پسینے والے ہاتھ۔ نیند بکلی جلدی جاگ جائے۔ نیٹرم میور۔ انگلیوں کے ناخنوں کے قریب خشکی اور چیرے۔ تعیلیاں گرم اور پسینہ دار۔ ٹھنڈ میں شدید کمزوری اور تھکاوٹ۔ معمولی معمولی چیزوں پر ناراض ہو جائے۔ ہمدردی زیادہ کرے۔ گرمی لگنے کی طرح جلد۔

ایو مناسلیکٹا۔ ہاتھ متواتر پھٹے ہوئے۔ ہاتھوں کی ٹھنڈک۔ ٹانگوں اور پاؤں کی ٹھنڈک۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے اور انگلیاں نیلی۔ ناخن بھر بھرے۔ زخم کے نشان پر دانے دار ابھار۔ بوائیاں۔

اگر کیس مسکیس۔ چوٹی کی دوائی ہے۔ ٹھنڈے موسم تکلیف دہ بوائیاں۔ خارش۔ ٹھنڈکی وجہ سے زخموں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ سور اینیم۔ جلد کھردری آسانی سے پھٹ جائے یا جو جائے۔ موٹی اور پرت دار ہو جائے چیرے

چھوٹی چھوٹی پت دار پھنسیوں میں بدل جائیں۔ میلے یا غلیظ۔ گندے اور بُرے دکھائی دیں جیسے کہ گردے بھرے ہوئے ہوں۔

پٹرولیم۔ انگلیوں کے سروں اور ہاتھوں کی پشت پر چیرے۔ جلد کھردری۔ کٹی پھٹی۔ چربائے اور غون ہے۔ نیچیں سخت۔ بوئیاں ٹوٹ جائیں۔ مریض چڑچڑا اور آسانی سے ناراض ہو جائے۔ غارش والی بوئیاں اور کٹے پھٹے ہاتھ۔

رسوین۔ یہ غارش والی جلتی والی بوئیسوں کے لئے مفید ہے۔ مدر ٹیکو بوئیسوں پر لگانے فوراً افاقہ اور آرام ہو جائے۔

رٹاکس۔ سوٹی ہوئی بوئیسوں کے لئے مفید ہے۔

ہیمپریفلر۔ بوئیسوں میں جب پیپ متوقع ہو۔

سٹیس کمین۔ سخت جگہوں پر چیرے خاص طور پر ہاتھ سے کام کرنے والے آدمیوں میں۔

سلفر۔ یہ پریسیان، جلد والے لوگوں کے لئے مفید ہے۔

پلسٹیللا۔ دیر سے اور کم حیض والی لڑکیوں میں۔ کھلی ہوا میں افاقہ گرمی میں زیادتی۔

پایس نہ ہو۔ چربی سے نفرت کرے۔ بوئیاں جونیلی یا نیلی مائل سرخ ہوں۔

کروٹیلین۔ گلگڑین ہونے کے قریب۔ مزمن لیکن بہت گرم موسم میں نہ ہوں۔ ناخاتقی کی وجہ۔

ییمس۔ بوئیاں اور کٹے پھٹے ہاتھ۔

ایسڈ ٹائٹرک۔ بچوں میں بوئیاں۔ پاؤں کا پسینہ۔ بچوں میں دیکھن پیدا کرے ایض۔

جوسیلی اور نمکین چیزوں کو پسند کرے۔

اند مال رحم کے بعد کا نشان (زخموں کے نشان بھی دیکھئے)

مکڑی کا جالا۔

گریفائٹس۔ جلد پر متواتر مکڑی کے جالے کا احساس۔

زنکولس۔ جیسے کہ چہرہ مکڑی کے جالے سے ڈھانپا ہوا ہے۔

## جسم یا چہرے کا رنگ۔

آئیوڈم۔ جسم کے رنگ کو نکھارنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ چھ ماہ تک ہر ہندرو روز کے... طاقت میں استعمال کیجئے۔

کاسٹیکم  
لائیو پوڈیم } ہر ہفتہ ایک پڑیا استعمال اگر آئیوڈم ناکام ہو جائے۔  
سارپیرلا۔ رنگ کو نکھارنے کے لئے۔

## چندٹیاں۔

فیرم پیکریٹ۔ چندٹیاں زرد بھدے رنگ والی۔  
تھوجا۔ چندٹیوں کے لئے جوئی کی دوائی ہے بیرونی طور پر ڈنکچو لگائی جائے۔  
سلفر۔ دباؤ کی وجہ سے گئے اور چندٹیاں۔ اگر ایک جوتا کہیں زیادہ دباؤ ڈالے بہت بڑی چندٹی بن جائے یا سوجن ہو جائے۔  
زنکولس۔ جب چندٹیاں پھوٹنے پر دکھیں۔  
اگنیشیا۔ پروردی سے کو زخم ہو۔  
اٹم کرورڈ۔ چندٹیاں سوجی ہوئی۔ پاؤں کے نمونوں کی جلد پر سینگ جیسی جگہیں۔ نمونوں کی شدید حساسیت، تمام جسم کا استغائی سرجن۔ نمونوں اور پاؤں کی جلد موٹی ہو۔  
نیٹرم میور۔ چندٹیاں۔ پروردنشان۔

## بیرونی ہیجان کی وجہ جلد کی حاد سوزش

کیلنڈرولا۔ جب بیرونی زخموں کی وجہ سے جو اس کی قسم کے ہوں ۳۰ طاقت میں کھلائے اور ۸ حصے پانی ایک حصہ مدرنکچو لگا کر کھائے۔ ناسور کے نتیجے کے طور پر جلد کا برباد ہو جانا۔

آرنیکا مانٹ - لاشی کی چوٹ سے آٹے ہوئے زخموں کی سوزش۔ مددکنچر لگائیے ہر دنی طور پر اور ۱۰۰۰ طاقت کی ایک خوراک ہر آٹھ گھنٹے بعد دیجئے حتیٰ اگر افادہ شردہ ہو جائے، پھر سر جیتے روز بعد ایک خوراک دیجئے۔

ایپس ایم - حرارت کی وجہ سے یا زہریلی خارش جو ٹھنڈ یا گرمی کی وجہ سے ہو۔ ملین - سرخی اور جلد کی سوزش، یہ پارہ یا کاربالک لیڈ کو کپڑے سے بھی ہو سکتی ہے۔

کیتھرس - پیشاب کی تکالیف کے ساتھ جلن۔ پیشاب جلندار اور خراشدار - گرمی کی خارش۔

رٹاکس - پارہ یا کاربالک لیڈ کپڑے والے لوگوں میں زہریلی خارش۔ دھوبی۔ رنگریز یا کانکن

ای طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔

## کھال کا اتزنا۔ بے رنگ ہونا۔ (دیکھئے کھال تازنا)

آرسینکیم الیم - جلد دھبوں میں سیاہی نائل یا نیلی۔

سلفیورک لیڈ - جلد پر سیاہ یا نیلے دھبے۔

فاسفورس - پیٹ پر زرد یا بھورے دھبے۔

آئیوڈیم - جب زرد جلد بھوری ہو جائے۔

لیکس - کائے جانے یا بخار کے بعد جلد نیلی ہو جائے۔ جلد جامنی۔

ایٹھوزا - سیاہ یا نیلے دھبے تمام جسم پر یا تمام جسم سیاہ یا نیلے رنگ کا ہو جائے۔

فاسٹولاکا - جلد سے کے رنگ کی ہو جائے۔

ہائیپرکیم - بازو یا ٹانگ تک سرخ لائیں یا دھاریاں جائیں۔

آرسینکیم آئیوڈیم - پیٹے میں جلد کا سیاہ ہو جانا۔

آرٹس درس - جب پچش کے بعد جلد نیلی ہو جائے۔

کونیم - سبز جلد۔

لائیکوپوڈیم - جگر کے دھبوں کے لئے مخصوص ہے۔

کٹلی آر سینکیم۔ کھجلی اور کوڑھ کے بعد جلد کا رنگ بدل جائے۔  
نیزم میور۔ بھوری جلد

سلفر۔ جب جلد ٹھنڈی معلوم دے۔ مریض عادت کے لحاظ سے گندہ ہو۔ نہانے سے نفرت ہو۔  
برومیس و لیکریس۔ زرد چہرہ گندہ بھو این۔ خراشیں دھنسی ہوئی۔ اندر گئی ہوئی آنکھیں نیلی  
یا سیاہی نامل بھورے حلقوں میں۔

بسمتھ۔ چہرہ مردوں میں زرد۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقوں کے ساتھ۔  
کیپیکم۔ خراش سرخ اور گرم یہ زردی کے بدلیں یعنی کبھی سرخ اور گرم ہوں کسی زرد ہوں۔  
پھرے پر سرخ نقطے سے ظاہر ہوں۔

چارٹا آف۔ چہرہ زرد۔ مرجھایا ہوا۔ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور نیلے کن روں کا اندر ہوں۔  
سنا۔ چہرہ زرد مردوں اور بیماروں میں۔ منہ کے ارد گرد سفید درنیلہ اور آنکھوں کے نیچے گہرے دھڑے۔  
سیپیا۔ چہرہ اور آنکھیں سفید پرے کی زردی۔ چھاتی پر زرد دھبے۔ خراش اور ناک کے  
اوپر والے حصے میں زرد کاٹھی۔

### بہرے کا بد صورت ہو جانا۔

دیر یولینیم۔ { چھوٹی چچک کی درجہ سے چہرہ بد صورت بلے عرصہ تک دیر یولینیم ۲۰۰  
سارینیاپی { ہر پندرہ روز بعد اور سارینیاپی ۲۶ دن میں تین دفعہ دیجئے۔  
سلیشیا۔ { بہرے کے دانوں اور زخموں کے نشانوں کی درجہ سے  
کلکیر یا فلور { جو ناسور اور پھوڑوں سے پھوڑ گئے ہوں۔

اگزیمیا۔ دیکھئے پھنسیاں

سلفر۔ شدید ملین اور خارش کے اگزیمیا جو دھونے اور کھرچنے سے زیادہ ہو۔ جلد کھری اور موٹی  
خشک اور پرت دار جسم کے ماب سوراخ آگ کی طرح سرخ ہوئے اور کان وغیرہ بھی سرخ جسم سے

بہت بدبودار ہو آئے۔ معدہ میں ڈوبنے کا احساس۔ ہاتھ اور سر گرم۔ بستر کی گرمی۔ سرانے کی گرمی سے ہیجان اور غارش زیادہ ہو۔ بالوں کے رنگ لگانے سے اگزیمیا۔ مریض عموماً گندہ اور بے سلیقہ ہوتا ہے۔ بنانے دھونے سے بے رغبت رہے۔

گر لیفائیٹس۔ بہنے والا اگزیمیا۔ کھرچنے پر شہد کی طرح کا چپکنا والا مادہ خارج ہو۔ ہاتھوں چہرہ۔ ہونٹ اور کانوں کے پیچھے جلد گلنے کے بعد دکھے اور سخت ہو جائے۔ گرمی سے اور رات کو زیادہ ہو۔ حاد کیسوں میں پختی طاقت دن میں پھر دفو۔ مزمن کیسوں میں ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ x دیکھئے۔ اول الذکر ہفتہ ایک خوراک جبکہ موخر الذکر ایک ماہ بعد ایک خوراک دیکھئے۔ اخراج چپکنے والا۔ چھٹنے والا اور لیس وار ہوتا ہے۔

وسٹاکس۔ خشک اگزیمیا سرخی اور سوزش کے ساتھ ناقابل برداشت غارش اور جلن کے ہمراہ جو گرمی سے زیادہ ہو۔ چھوٹے پتوں کی کھوٹری کا اگزیمیا۔ پھنسیاں گڑھے دار جن میں پانی کی طرح کا مواد انتہائی بدبودار خارج ہو جو رپت سے بنائے گڑھوں سے پیپ کا رجحان ۲۰ طاقت ہفتہ میں ایک بار یا ۱۰۰ x طاقت کی ایک خوراک مہینہ بھر کے لئے کافی ہے۔

اڑیکا یورٹیس۔ حاد کیسوں میں جب جلن اور غارش ہو۔  
لوو سٹا۔ ہاتھ کی پشت پر اگزیمیا۔ نانبائیوں کا اگزیمیا۔ گھٹنوں کے اندر کی طرف مندار اگزیمیا جو پورے پانڈ میں ظاہر ہو۔ اکثر عورتوں میں جن کو پُر در حیسض آئیں۔  
کالی بائیکرومیکم۔ کھوٹری کا اگزیمیا، گارٹھے دزنی پھلکے جن میں سے زرد۔ گارٹھا اور چپکنے والا اور بہنے والا مواد۔

ایومونا۔ خشک اور بہت ہی پُر ہیجان اگزیمیا قبض کے ساتھ۔  
سکو کم چیک۔ اگزیمیا۔ غارش۔ الرجی وغیرہ یا پتی اٹھنا۔  
سکوٹاموی۔ بالوں والے حصوں میں اگزیمیا۔ پھنسیاں قریب قریب ہوں۔ پیپ والا اگزیمیا جو خشک ہونے پر سخت پھلکے ہوں اور ٹوپی کی طرح سخت ہو جائیں۔  
نیٹرم سلف۔ دمد کے ہمراہ سانس لینے اور جلد کی علامات کے ساتھ۔

سورائیم۔ کھوڑی اور چہرے پر خشک اور پرت دار اگر یا کھوڑی پر پھلکے۔ بال اگر جائیں  
خارج ہونے والا مادہ پھلکوں کو اوپر اٹھائے اور نئے گڑھے سے ظاہر ہوں۔ رات کے وقت اور  
بستر کی گرمی سے زیادتی۔ مریض یا بوس۔ کم حوصلہ اور ناامید ہوتا ہے۔ پتلا۔ بدبودار۔ چمچھے والا  
گلے شرتے گوشت کی بدبودار۔ تسلی اور ہمار کر دینے والی بودا مواد دے۔ یہ سورائیم کی علامات  
کے خلاف ہے جو ٹھنڈے زیادہ ہو۔

میننگم۔ جلد تندرست نہ ہو۔ معمولی سے زخم یا خراشیں یا سور بن جائیں۔

انٹھرم۔ کھوڑی۔ آرتھرائٹ اور شرمگاہ پر پھنسیاں۔

ہیپر سلفر۔ جلد کی تہوں میں نندار پھنسیاں جوڑوں کے مٹنے والی جگہوں پر خارش۔ جلد پر  
پیپ بن جائے اور جلا پھوڑے نہیں۔ پارہ یا جھٹ کو پکڑنے یا پارے اور جھٹ کا کام  
کرنے سے ہو۔ چھوٹے پر حساس ہو۔ خشک ٹھنڈی ہواؤں میں زیادہ۔ نندار موسم اور گرمی میں ناقدر۔  
پٹرولیم۔ زردی نائل بنر موٹے موٹے پھلکے چہرے اور گردن پر جن میں بہت مواد ہے۔ یہ غفری  
جیروں والے اگر یا کھوٹھیک کرتا ہے۔ جس میں معمولی یا بالکل مواد نہ ہے۔ اگر یا خشک پرتدار  
یا نندار جو گرمیوں میں غائب ہو جائے، سردیوں میں یا سرد موسم میں دوبارہ ہو جائے۔ یا حصول کی پشت  
یا کالوں کے نیچے اگر یا پتلا پانی جیسا مواد ہے۔

سٹریٹو کوئین۔ بار بار کا ظاہر ہونے والا اگر یا، خون بہنے والے چہرے مریض خارش کرنے  
میں لطف اٹھاتا ہے ایک ایم یا سی ایم طاقت میں دیکھے۔

میزریم۔ ناقابل برداشت خارش جو بستر میں اور پھوٹے پر زیادہ ہو۔ کافی زیادہ خون آب  
مواد ہے۔ سرموٹی پھوٹے۔ پھلکوں سے سر بھرا ہوتا ہے جس کے پیچے سفید پیپ کی طرح کا  
مواد ہے۔ بال ایک دوسرے سے چپکے ہوئے اور اکٹھے ہو جائیں۔ پیپ کچھ دیر بعد بدبودار  
بن جاتی ہے اور کپڑے پیدا کر دیتی ہے۔ بالوں والی جگہ پر اگر یا۔ ۲۰۰ میں دیکھے۔  
گلکیر یا کارب۔ ہر وقت شدید خارش صبح کے وقت بستر میں زیادہ۔ احساس جیسے کہ نندار اور ٹھنڈی  
جواہیں پہنے ہوئے۔ بوائوں میں مبتلا ہو نیکا رحمان۔ گلکیر یا کارب کا مزاج رکھنے والے بچوں میں اگر یا  
۲۰۰ طاقت میں دیکھے۔

لونا۔ جلدی بیماریاں۔ اگزیمیا۔ جو پورے چاند میں زیادہ ہو۔

ٹیلیوریسم۔ ہاتھوں اور پاؤں کی خارش۔ داد کی طرح کی پھنسیاں۔ گولائی میں گہرے زخم بدبودار اخراج کے ہمراہ۔ نائی کے آسترے کی لاگ سے خارش۔ ڈنگ لگنے جیسی کانوں کی پشت پر اگزیمیا۔ اور کھوڑی پر اگزیمیا۔ پاؤں کا بدبودار پسینہ۔

لائیکولودیم۔ کانوں پر اور ان کے پیچھے اگزیمیا۔

کلکیریا سلف۔ بچوں میں خشک اگزیمیا۔ زرد پیپ دار پرت اور چھلکے۔ بالوں پر پھوٹے پھوٹے بھوٹے

جن کو کھرچنے پر خون ہے۔

آریمیکم البم۔ جلن اور بے چینی کے ساتھ اگزیمیا۔ خارش جلن اور سوزش جو سردی اور کھرچنے پر زیادہ خشک کھوڑی پرت دار جلد گری اور گرم مشروبات سے افادہ۔ تھوڑی سی بھی سخت کرنے پر شدید کھوڑی انگلیوں میں اگزیمیا اور انگلیوں کے سروں پر جیسے۔ کھوڑی اور چہرے پر پرت دار پھوٹے۔ خراش دار اور بدبودار مواد خارج ہو۔ شدید جلن اور خارش۔

انٹم کروڈ۔ معدہ کی خرابیوں کے ساتھ اگزیمیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے حساس جب بستر میں گرم ہو تو خارش۔ موٹے، سخت اور شہد کے رنگ کے پرت۔ بہت زیادہ جلن رات کو زیادتی۔

کالی سلف۔ دانے جو زرد پیپ دار اور پانی کی طرح کے مواد سے بھرے ہوئے ہوں۔ ہاتھوں اور انگلیوں کے اندر کی طرف بہت زیادہ۔ ہونٹ پھٹے ہوئے۔ ٹھکائیوں کی زبردست خواہش جس کی تکلیف دہ۔ زنگولس بلب۔ جلد کے موٹا ہونے کے ساتھ اگزیمیا اور سخت، سینک جیسے پرتوں کا بننا۔

سیفسیگیا۔ اگزیمیا۔ زرد خراش دار مواد پرتوں کے پیچھے سے ہے۔ مواد کے لگنے سے نئے پھوٹے بنیں۔ یعنی جہاں جہاں مواد لگے نئے پھوٹے بن جائیں۔ تر خارش۔ سر اور کانوں کے پیچھے بدبودار پھنسیاں۔ کھرچنے سے جگہ بدل جائے لیکن مواد زیادہ ہے۔

نیٹرم میور۔ بالوں کے کناروں پر خاص طور پر سر کے پھیلی طرف اگزیمیا۔

مانسینیل۔ جلد کی سوزش بہت زیادہ پھالوں کے ساتھ۔ چپکنے والا خون آپ مواد سے پرت میں بھاری بھورے پرت اور تھیں بنیں۔

کلیٹس۔ سوزش دار اور چوڑوں والا اگر کیا۔ پیپ دار اور پانی کی طرح کا مواد سے جس پر تار  
تہیں نہیں جو سوجی ہوئی ہوں۔ بڑھتے چاند پر اور خشک گھٹنے چاند پر بگڑی کھردری اور مضغی سے جکینے  
دار پر ت کھوڑی پر کھال اُدھرنے کے ساتھ زرد مواد ہے۔ خارش بستی گرمی اور دھونے پر زیادہ ہو۔  
کاچلیکم۔ بوزھوں میں سرخ اگر کیا۔ شیر۔ شراب نوشوں میں نمایاں یورک حالتوں یا نظام کی کھلائی  
حالتوں میں۔

اگر کیس میکریس۔ جلن یکشن اور شدید خارش کے ساتھ اگر کیا سوئوں سے پھیدنا جیسے درد  
جلد میں بجلی لگنے کے سے درد۔ جلد میں گہرے چھوٹے چھوٹے دانے یا گہرے مردلوں میں اگر کیا  
شدید اور بواہوں کے ہمراہ۔

تھوچا۔ سائیکوٹک مریضوں میں سوزاک کے دب جانے یا ٹیکے لگانے کے بعد اگر کیا۔  
گندی بھوری جلد۔ خارش والی پھنسیوں سے بھری ہوئی۔ اگر کیا کانیکوں کی وجہ سے دب جانا  
یا جب ٹیکوں کی وجہ سے اگر کیا ہو جائے۔

ایکسٹریز۔ ہاتھوں اور پاؤں میں گھٹنوں اور جوڑوں کے پھیلنے والی جگہ پر گہرے چیرے اور گڑباز  
اور بہت ہی گہرے گھاؤ گہرے نیلے چھوڑے جو جلنے سے ملیں۔ جلد خشک، پریت دار۔ پھیٹی ہوئی اس  
حصہ پر کافی سوزش۔ یہ گندھک کے غلط استعمال کو ٹھیک بھی کرتی ہے۔

یٹوبکرو لیٹیم۔ بطور عمل انگیز دوائی کے جب ابھی طرح سے منتخب کی ہوئی دوائیاں ناکام ہو جائیں۔  
مریض نا امید اور تنگین۔ بہت جلد نزلہ زکام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگہ کی طرح سرخ جلد،  
دکھن چھین کے ساتھ تمام جسم پر اگر کیا۔ خارش رات کے وقت زیادہ۔ جب پڑے اتار دیا ہو  
تو شدید خارش ہو۔

گن پاؤڈر۔ بہت بڑی اینٹی سورک دوائی ہے اور خون کو صاف کرنے والی بہت ہی اہم  
دوائی ہے۔ یہ جلد کی بہت سی خرابیوں کو دُور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ۳x طاقت میں  
لبے عرصہ تک دی جانی چاہیے۔

## جلد، ہاتھی کی کھال جیسی

ہائیڈروکوٹائل - جب انسانی جلد، ہاتھی کی کھال کی طرح ہو جائے۔ اگر نمایاں کورٹھ  
پٹھنیاں اور دوسری جلدی بیماریاں کے لئے بھی  
سوکھا مسان - لاغری -

کلکیر یا کارب - جلد کی کمزوری پیٹ بڑھا ہوا۔ جلد میں بھریاں پڑ جائیں۔ ہڈیاں مکمل نہ ہو  
پائیں اور بڑھنا چھوڑ دیں۔ دانت نہ نکلیں۔  
ایروٹیم - ٹانگوں سے کمزوری شروع ہو اور آہستہ آہستہ اوپر کو آئے۔  
کلکیر یا فاس - یہ سوکھا مسان کے لئے شاندار دوائی ہے۔ جلد کمزور ہو جاتی ہے۔  
جلد خشک اور بھریاں پڑی ہوئیں۔

یٹو بیکو لنیم - یہ سوکھا مسان کے لئے شاندار دوائی ہے۔ اور بطور عمل انگریز دوا کے  
طور پر ضرور دینی چاہیے۔ اور ہر ماہ ۲۰۰ طاقت میں دہرائی جائے اس دوائی سے تین دن پہلے  
اور تین دن بعد کوئی دوائی نہ دی جائے۔

نیٹرم میور - گردن اور بازوؤں کی کمزوری جو نیچے کی طرف بڑھے۔  
ایوڈیم - جب بچہ چڑھا ہوا اپنے قریب کسی کو بھی نہ آنے دے بہت زیادہ کھائے لیکن  
بچہ بھی کمزور ہی رہے۔

فاسفورس - بے قاعدہ - حیض کے بعد کمزوری۔

ہائیڈراسٹس - چھپک کے بعد کمزوری۔

سیکل کار - لاغر جلد کمزور - غیر متعینہ جلد - مامنی نیلی نیلگوں مائل جب دوران خون خفگی  
طور پر کمزور ہو۔

آرم میور - آتشک کی وجہ سے کمزوری۔

پیلیم - کئی خون کی وجہ سے کمزوری۔

## جلد کی شاد و ناد بیماریاں جیمیں

تھوڑے دباؤ پر جسم پر آبلے پڑ جائیں۔

زنکولس۔ اس علاج مرض کو ٹھیک کرنے کی اکلوتی دوائی ہے۔

پھنسیاں۔ (ایگزیمیا بھی دیکھئے)

کلیر یا کارب۔ چھپاکی یا الرجی ہو تو ٹھوڑی سی بھی تازہ ہوا لگنے پر غائب ہو جائے۔

رٹاکس۔ بالوں والی جگہوں پر چھپاکی یا الرجی۔ ماقصوں کی تھیلیوں پر پھنسیاں جو منہل ہونے کے بعد ایسی جگہ پر نہ نکلیں جب خارش کے علاوہ تپ لرزہ اور گنٹھیاں ہو۔ بڑے بڑے پانی کے پچالے۔ مرد اور عورت کے جنسی اعضاء پر پھنسیاں۔

کلورال۔ بڑے بڑے دانے جس طرح کہ استحقاقی سوزش ہو۔

سار سپرٹیل۔ حیض کے دوران خارش والی پھنسیاں۔ داہنے چڈے میں حیض کے دوران پھنسیاں نکل آئیں۔

لائیکو پوڈیم۔ کھوٹری پر پھنسیاں۔ ہرے پر کانوں کے پیچھے پھنڈوں میں ہوں اور بال گر جائیں۔ پانی جیسا یا زردی نائل مواد ہے۔ نوزائیدہ بچوں کا اگزیمیا۔

نیٹرم کارب۔ انگلیوں کے سروں اور انگلیوں کے جوڑوں پر پنجوں پر بھی پھنسیاں۔ گرٹھ دار پھنسیاں جو پھٹ جائیں اور پھوڑے بنادیں۔

کارڈس میرٹانس۔ پھنسیوں کے قطع یا ٹکڑے جو جوت سینے کے نچلے حصہ کو ڈھانپ لیں۔ جگر اور دل کی خرابیوں کی وجہ سے سینے کا قطع۔

کوڈلیم۔ آتش کی گوشت کھانے والے جن سے بہت بری بو لانا آئے۔ سرخ پھنسیاں جو تلبے کے رنگ میں تبدیل ہو جائیں۔

سورائٹیم۔ پرت دار پھنسیاں جو گرمیوں میں غائب ہو جائیں اور سردی میں دوبارہ آجائیں کہنیں

اور گھٹنوں کے جوڑوں پر پھنسیاں شدید غارش جو بستر کی گرمی اور کھجلا نے پر بڑھے۔ پھنسیاں یا الزحیٰ گرمیوں میں غائب اور سردیوں میں دوبارہ نمودار آئے۔

کالی میوے۔ پھنسیاں۔ بھوڑے سفیدی مائل مواد کے اخراج کے ساتھ اور سفید زبان۔ سیلینیم۔ جلد کی تہوں میں غارش اور جوڑوں کے قریب خاص طور پر پنخنے کے جوڑوں میں۔ تھوہجا۔ تمام جسم پر پھنسیاں۔ گھٹنوں کے قریب پیپ دار بھوڑے۔ غارش والی پھنسیاں جن کو سہلانے سے افادہ ہو۔ رات کو زیادہ تکلیف ہو۔

کاربونیم سلف۔ پھنسیاں۔ پھلکے۔ اگر میا۔ کھوڑی پر غارش۔ مندر پر ت دار بھوڑے۔ دکھیں اور پُر درد ہوں۔ کھوڑی کی پُرسوزش پھنسیاں۔

ایلیمنٹس گلڈنڈولوسا۔ قطعوں میں پھپکا کی آئے۔ آہستہ آہستہ ظاہر ہو۔ جلد جانی نظر آئے۔ اگر کیس ایچم۔ بالوں کی کھوڑی کی غارش خاص طور پر صبح کے وقت۔ غارش کرنے کے بعد، غارش زدہ حصوں پر ریت کی طرح ٹھنڈا پڑ جائے۔

انتھرا کوکالی۔ کھجلی۔ پرانی غارش۔ مزمن داد۔ تھنوں کے چیرے اور بھوڑے جو پورے پائند میں اچھے ہوں۔

سلفر۔ بے چینی یا تکلیف گرمی سے زیادہ اور کپڑے اتارنے اور بستر سے باہر پاؤں ٹکانے پر افاقہ پائسیلا۔ سلفر کی تمام علامات کے ساتھ غارش لیکن مریض جلد رنے والا اور چڑچڑا۔ ہمدردی کو پسند کرتا ہے، معدہ یا پیشاب کے آلات کی سوزش۔

کروٹن ٹگلیم۔ گر بھے دار ابڑی پھنسیاں۔ شدید جلن اور غارش اور کئی جھوٹے جھوٹے قریب ان کے دہنے سے خشک نہ رکنے والی کھانسی ظاہر ہو۔ آنکھوں کے گرد۔ کھوڑی پر خاص طور پر آڑا ناسل خضبیوں کی خضبی اور آڑا ناسل پر پھنسیاں اور غارش۔ غارش کرنا چاہے لیکن سختی سے نہ کھرچے کیونکہ یہ حصے بہت حساس ہوتے ہیں۔

ڈوئیکوس۔ پھنسیوں کے گرد غارش۔ رات کے وقت اور کھرچنے پر غارش میں زیادتی۔ لوبیلیا انفلیٹا۔ انگلیوں کے درمیان غارش اور پھنسیاں۔ ہاتھوں کی پشت پر ہوں۔ بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے آبلوں پر ششمل ہو۔

اولیندر۔ کھوپڑی پر شدید خارش جیسے کہ جوڑوں سے ہو۔ کھرچنے پر چھیننے والے درد۔ بدبودار  
بودالی پھنسیاں۔

روٹا۔ گوشت کھانے پر چھپاکی ہو جائے۔

اینا گلس۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر خارش اور پھنسیاں۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پر ظاہر ہوں  
جہاں سے مندرج ہوئی تھیں۔

کاسٹیکم۔ پھنسیوں کے دپنے سے نابج۔ سر درد اور اعصابی دردیں شروع ہو جائیں۔  
الیومنا۔ پھنسیاں اور خارش۔ جلد کی خارش بغیر پھنسیوں کے بھی کھجلائے حتیٰ اگر خون نکلے  
کھجلائے پر پرت دار نہیں یا پھلکے سے نہیں۔ پہلے پہل کوئی پھنسی نہیں ہوتی اور جب جلد پر  
خارش کی جاتی ہے تو پھلکے یا پرت بن جاتیں۔ ٹھیک ہونے یا زخم مندرج ہونے کے وقت خارش  
زیادہ ہو۔ یہ صوف اس وقت کم ہوتی ہے جب جلد دکھے۔ مندرج ہوا اس سے خون بہے۔ بستر کی  
گرمی سے خارش میں اضافہ ہو۔

ایپس میل۔ جسم پر اچانک چھپاکی ظاہر ہو۔ لمبی زردی مائل سفید پھنسیاں جلد سے اوپر  
کو اٹھیں، ناقابل برداشت خارش کے ہمراہ جلن اور ڈنگ لگنے میں درد۔ پھنسیاں زکام کا نتیجہ  
کے طور پر یا وقفے دار بخار کے دوران ہو سکتی ہیں۔

گرلیفا ٹیس۔ تمام جسم پر خارش پھنسیوں کے بغیر یا پھنسیوں کے ہمراہ رات کے وقت  
گرم بستر میں زیادہ ہو۔ داد اور انگریزیا میں سے لیس دار مواد ہے۔

آر سینکم البم۔ ایپس ہی کی طرح لیکن پھنسیاں ایپس سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جب  
مچھلی کھانے سے یہ مرض ہوتی ہو۔ ٹرینٹینا اور کوہوا استعمال کیجئے۔ جب خاص طور پر پشیل مچھلی  
کے کھانے سے چھپاکی ہوئی ہو۔

ڈوکامارا۔ جسم پر پھنسیاں جو گڑھے بنائیں۔ پھلکے وغیرہ بنائیں۔ مکھن اور خارش کے ہمراہ۔  
کھوپڑی پر پھنسیاں جن میں خارش لیکن خارش کرنے پر آرام نہ ہو۔  
کالی بروم۔ جب اعصابی امراض کے ساتھ چھپاکی ہو۔

ہور لہی۔ خارش ہڈیوں کے اُبھرے ہوئے حصوں پر پھنسیاں۔ ڈاڑھ کی ہڈیوں وغیرہ پر انگلیوں کے سروں پر تپکن۔

مینریم۔ جسم کے بیرونی حصوں کی خارش۔ اعصابی احساس۔ کاٹنے والی جھنساہٹ والی۔ کھرچنے والی خارش ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلے۔ ہرے موٹے چمڑے چمکوں سے برجن کے نیچے گاڑھی سفید پیپ اکٹھی ہو جائے۔ بال آپس میں جڑ جائیں۔

سٹر امونیم۔ بہت ہی گہری سرخ چھپاکی جو سرخ بخار سے مشابہ ہو۔ چمکدار ہر جلد کی سرخی۔ زنگولس لب۔ ہاتھ کی تھیلیوں پر نیلگوں یا سیاہ رنگ کے پھالوں جیسی پھنسیاں۔ میریم سلف۔ کھوڑی کی خارش۔

اینا کارڈیم اور۔ جلد کی خارش شدید ملین اور خارش جو کھجلائے پر پڑھے۔ ایتھورا۔ ناک کی رنگ پر داد کی پھنسیاں۔

سفلینیم۔ تانے کے رنگ کے پھنسیوں کے قطعے۔

لووڈسٹا۔ چھپاکی کے ساتھ اسہال اینٹھن اور نیچے کی طرف دباؤ۔

سیپیا۔ چھپاکی جو کھلی ہوا میں زیادہ ہو۔ ہنٹوں کا کینسر نفعوں اور بیکوں کا کینسر۔

تھائیرائیڈینم۔ جلد بہت سرخ بہت زیادہ خارش ہو۔ جلدی بیماری جس میں چھوٹے چھوٹے پھلکے جلد پر سے اُتریں۔

ریومیکس۔ کھلی ہوا میں زیادتی۔ خاص طور پر کپڑے اتارتے وقت۔

ڈونکا مینر۔ کھوڑی۔ چہرہ اور کانوں کے نیچے پھنسیاں جن سے بدبو آئے۔ یہ ایک پرت بنا دیتی ہے جس کے نیچے گلی سٹری پیپ جمع ہو جاتی ہے۔ بال گر جاتے ہیں اور بھور بال انکی جگہ لگیں۔ سٹر پٹیو کو سین۔ جلدی پھنسیاں اور پھنسیاں جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں۔ گرھے

زردی چمکوں کے ساتھ جلد میں نیچے سے خون بہنے سے سیاہ ہو جائیں۔

پکس لیکو میڈا۔ ہاتھ کی پشت پر پھنسیاں جن پر رات کے وقت ناقابل برداشت خارش ہو اور کھجلائے پر خون ہے۔

بریساکارب - بچوں کی کھوپڑیوں پر خشک پھنسیاں - کھوپڑی پر نمدار پھیلنے - بالوں کا گرنا -  
بچے ذہنی کمزوری کے ساتھ بونے قدرے ہوں -

ایسٹاکس ایل - مزنی قسم کی چھپاکی - سارے جسم پر چھپاکی خارش کے ہمراہ ننگا ہونے پر زیادتی -  
پٹرولیم - پھنسیاں کھیلانے پر زیادہ خارش حتیٰ اگر جلن ہو - خون بہنے پر نافہ ہو - ماتھوں کی جلد  
کھردری، پھٹی ہوئی - انگلیوں کے سرے کھردرے اور ہر موسم سرما میں پھٹ جائیں - مرد اور عورت  
کے اعضائے ناسل پر پھنسیاں -

### بہ مھنسیوں کا دب جانا -

اپیس - پھنسیوں کے دب جانے سے دماغ کی سوزش - چھڑا سانس - استقامت گیس -  
دماغ کے پردوں میں پانی کا آجانا -

کلگیر یا کارب - پھنسیوں کے دب جانے سے مرگی -

سلفر - تپکن دار دانت درد - اسہال - دمر یہ مہ پھنسیوں کے دبنے سے ہو -

کیویرم میٹ - پھنسیوں کے دبنے سے دورے یا تشنخ -

گرفیائیس - سردرد - چکر - کمزوری اور بھوک کا نہ رہنا -

### سرخبادہ

اکونائٹ :- بہت ہی ابتدائی درجہ میں بھیجننا ہٹ اور وطن جب جلد سرخ ہو چمکدار - گرم -  
اور سوجی ہوئی ہو -

پیمپی فلورا انک - یہ سرخبادہ کے لئے مخصوص ہے - مددکنک میں چار یا پانچ قطرے فی روز کئے گئے -

بیلادونا - جلد خشک - ہوا اور تہی ہوئی - ابتدا میں سرخ چمکدار جلد - چہرے اور سر کے

سرخبادے خاص طور پر دائیں طرف کے تیز کاٹنے والی دردین یا متاثرہ حصوں میں تپکن - بخار یا

بعض اوقات ہڈیاں -

ایپس میلیفیکا - گلے کا سرخبادہ کافی سوزش کے ساتھ - جسم کے کسی حصہ کی سوزش یا اپریشن کے بعد سوزش بھولی ہوئی اور استقامتی سوجن شدید درد کے ساتھ جس میں جلندار اور ڈنگ لگنے، جیسے درد ہوں - ٹھنڈی چیزوں کی خواہش یا ٹھنڈی بیٹیوں سے ان حصوں کو آفاقہ ہو کم مقدار میں غلاب اور اکثر الیون والا -

آر سینکلم البم - سرخبادوں کے اچانک حملے کمزوری کے ساتھ بے چینی اور جلن دار درد -  
تھوڑے تھوڑے وقفوں پر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ٹھنڈے پانی کی پیاس - مرض ایک حصہ جسم سے دوسرے حصہ پر چلی جائے - استقامت سے اور اسہال -

بوریکس - چہرے پر سرخبادہ چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس -  
کینتھر - گڑھے کی قسم کا خاص طور پر چہرے کا - ناک سے شروع ہو بے چینی اور جلن اور  
ڈنگ لگنے - جیسے درد - جلد کی شدید سوزش بڑے بڑے پھالے بننے کا رجحان - چھوٹی پھنیاں  
اکٹھی ہو کر بڑا جھالا بنا دیں - شدید بخار -

کروٹیلس ایچ - نیلے نظر آئیں ٹیکے لگنے یا کیڑوں مکوڑوں کے کاٹنے کے بعد کے سرخبادہ کے لئے مفید ہو -

رسٹاکس - ٹائیفائیڈ کی علامات کے ساتھ گڑھے دار سرخبادہ سرخ کی بجائے گہری جلد  
ہموار ہونے کی بجائے کھردری خشک کی بجائے نمدار - شدید جلن اور خارش - کمزور انگلیوں میں  
درد - بالوں والے حصوں کے کنارے اکثر مبتلا ہوتے ہیں - اسہال کے ساتھ - بے چینی پھیوں  
میں شدید درد - بندھنوں اور جوڑوں میں شدید درد -

لیکسس - گہرا نیلا یا جامنی رنگ کی جلد - قوت حیات کا بہت دب جانا - ذہنی کمزوری - چہرہ  
بھولا ہوا اور سرخ جب بیلا ڈونا نام ہو جائے - متاثرہ اعضاء میں گنگرین کا خطرہ ہو - جال کی طرح  
کے نتیجے خاص طور پر ریلوٹ ہوں -

ایکینٹیا - سرخبادہ بہت ہی پُر درد پھوڑوں کے رجحان کے ساتھ - ۲x قطر کی صورت میں  
میں استعمال کیجئے -

ہیپرسلفر - جب پیپ پڑنے کا رجحان ہو تو سلفر دی جائے۔

سیلشیا - جب پھوڑے ٹھیک ہونے میں ناکام ہو جائیں جبکہ پیپ خشک ہو چکی ہو کیلئے شانڈار دوائی ہے۔

سلفر - بطور عمل انگریز دوائی کے مفید ہے۔ تبدیل ہونے والے کیسوں میں اور طول پکڑنے والے کیسوں میں یہ دوائی انتہائی عمل انگیز ثابت ہوتی ہے۔

گریفائیٹس - بار بار ہونے والے مزمن حالتوں میں انتہائی مفید ہے۔

روٹا اینڈر فاسفورک الیڈ - جب زخموں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں یعنی زخموں کے ساتھ ہوں۔

دیکھے۔ بوائیاں - سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں پھینٹا۔ دیکھے تیل والی جلد - گریس والی۔

### سخت جلد

انٹم کروڈ - موٹی سخت - شہد کے رنگ والی جلد - جب بستر میں گرم ہو جائے

ہائیڈرو کوٹائل - جلد ہاتھی کی کھال کی طرح موٹی ہو جائے۔

زنکولوس بلیب - اگر میا میں جلد سخت پڑوں کی صورت میں موٹی ہو۔

### داد

رٹاکس - خارش والی داد کے لئے لازمو کی دوائی ہے۔ جلندار اور بھجھنا ہٹ والی درد

جو اکثر کیسوں کو ٹھیک کر دیتی ہے جس کے ساتھ علاج شروع کیا جائے۔ نائی کے اترے کی لاگ

کی خارش جب جلن اور خارش ہو۔

زنکولوس - جلن کے ساتھ داد - خراشدار اور موٹی لگنے جیسی در دیں۔ جب پھینیاں خشک ہو

جائیں تو بہت زیادہ خارش گڑھے نیلیوں رنگ لکھنی ہوا میں حرکت سے۔ ہندار موسم میں موسم

کی تبدیلی پر اور درجہ حرارت کی تبدیلی پر پھوٹے اور ٹھنڈی ہوا سے حساس ہو۔

آرینیکم الیم - جلندار اور بھالا لگنے جیسے درد کے ساتھ - رات کے وقت خاص طور پر ۱۲ سے

صبح ۴ بجے تک زیادتی - بڑے بڑے اور گہرے پرت جب اتارے جائیں تو خون ہیں۔ وقفے

وقفے پر تھوڑے تھوڑے ٹھنڈے پانی کی پیاس۔

مرکب سال -  
 نائبرٹک الیڈ -  
 نیٹرم سیور -  
 پیڑوں کی داد - نائی کے اُترے کی لاگ سے خارش بیرونی طور  
 پر فاسٹولا لگائی جاسکتی ہے -  
 اشکس ایف - مزمن چھپاکی کے لئے تمام جسم پر چھپاکی خارش کے ہمراہ -  
 مینریریٹم - پسلیوں کے بیچ یا آنکھ کے بالائی اعصاب پر داد - تیز درد بجلی کی طرح بعض اوقات  
 سوراخ کرنے والی درد -

سکونا دائرہ - نائی کے اُترے کی لاگ سے خارش، شیو کی وجہ سے تسکلیف -  
 تھو جہا - ہر جگہ شدید اعصابی دروں کیساتھ - اگر بیا جیسی یا پھوڑوں جیسی -  
 آئرس ور - یاہ قسم کی داد کے دائرے پھنسیوں کے ساتھ اگر بیا جیسی یا پھوڑوں جیسی -  
 ڈلکا مارا - پیپ دار داد ٹھنڈے اور تدار گھروں میں رہنے سے -  
 کینٹھرس - بڑے بڑے چھائے گہرے درد اور جلندار داد - اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر دیکھا جاسکتا  
 یروفس سپائٹوسا - داد جسم کے بائیں طرف استقاء - انگلیوں کی نوکوں یا سروں پر خارش کے  
 ہواہ کی جیسے کہ ٹھنڈے جسم گئی ہوں -

مصولیٹیم - داد کی پھنسیاں خاص طور پر جوڑوں کے خموں پر اور کھوٹوں پر خارش کے ہمراہ -  
 بدبو قوت حیات کی کمزوری - پھنسیاں خشک - پرت دار چھوٹی نوکلر پھنسیاں سرخ کناروں کے  
 ارد گرد - ٹھنڈا اور بستر کی گرمی میں زیادتی -

(دیکھئے پھنسیاں - پھپھائی - پھنسیاں - خارش)  
زخم کے نشان کے پاس ریشہ دار ابھار

سیلیشیا - یہ سب سے پہلے ہر ہفتہ ۲۰ ملاقات میں چھ لہو اس سے زائد وقت تک دی جائے -  
 ایڈ فلور - جب سیلیشیا ناکام ہو جائے تو یہ ۲۰ میں دی جائے دن میں ۳ بار صبح دوپہر شام -  
 ٹیوکرکولینم - جب مندرجہ بالا ادویات سے کوئی فرق نہ پڑے تو بطور عمل اینکتر کے دی جائے -

## کوڑھ۔ جذام

ہائڈروکوٹائل - کوڑھ اور جذام کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔  
 بیسیلینیم - یہ دوائی بطور عمل انجکشن کے ۲۰ x ۱۵ میں ۱۵ روز کے بعد دی جائے۔ اس دوائی سے  
 ایک روز پہلے اور ایک روز بعد کوئی اور دوا ہرگز نہ دی جائے۔  
 آرم میٹ - جب ناک سے بدبودار مواد ہے۔  
 آریٹیکم ایموڈ - جب ناک سے بدبودار مواد ہے۔ سوئی پیچھے جیسا احساس گنہگار دکھائی دے۔  
 انگلیوں اور پنجوں کا سوجانا - غدد بڑھے ہوئے۔  
 ہونگ نان - ہاتھ اور پاؤں کے کُن ہونے کے ساتھ کوڑھ یا جذام۔  
 ہورا براز - کوڑھ یا جذام جب جلد کھال کے ساتھ بندھی ہوئی معلوم دے۔  
 گریفائیس - چہروں سے لیسدار مواد ہے۔  
 انٹیم ٹارٹ - تھکھاندر کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔  
 تھائیرائیڈینیم - آتشکی پھنسیوں کے ساتھ جذام - جلد کی پرانی سوزش - شدید کسختی اور  
 ہانگوں پر پھلکے یا پرت (جلد کا سفید ہوجانا)۔

## بجھلبہری - برص -

ٹیوبرکولینیم - اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے۔ ۲۰ x کی ایک خوراک درج ذیل  
 ادویات کے ہمراہ دی جانی چاہیے۔  
 آرسینک سلف فلیو - بجھلبہری کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ یہ کافی لمبے عرصہ تک تبدیل شدہ طاقت  
 میں دی جانی چاہیے، یعنی تھوٹی طاقتوں سے شروع کر کے بڑی طاقتیں بتدریج استعمال کرائی  
 جائیں۔ پہلے پہل دوا ہر ۳ x دی جائے، پھر اگر تھوٹی طاقت سے افادہ رک جائے تو ۲۰ x دیکھائے۔  
 اور اگر ۳۰ x بھی ۲-۴ ماہ دینے سے بیماری کو افادہ نہ ہو تو پھر ہر ہفتہ ۲۰ x دی جائے۔

آرٹھنکلم الیم۔ خنزیر میں سفید جلد۔  
ایمپس ایم۔ جلد سفید۔ بچہ دانیوں کی سوزش و استفاد کے ساتھ۔ بچے کا الٹ پلٹ ہونا قلعوں  
کے گرد سرخی ہو۔

کالی کارب۔ جب جلد درد دھیا ہو۔  
ہائڈرو کوٹائل۔ اگر آرٹھنک سلف فلیو نا کام ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔ یہ چھوٹی طاقت  
یعنی ۳۳ میں دی جائے یا ۲۰ x میں دن میں ۳ بار لمبے عرصہ تک دی جائے۔

ہوریکس۔ سفید جلد سرخ قلعوں کے ساتھ۔  
سورائیم۔ سفید جلد کے قلعے اور سفید بالوں کے گچھے۔ اس دوائی کے تحت سیاہ قدرتی  
رنگ کے ہو جائیں گے۔

### بہرے پر چھوے یا تانبے کے رنگ کے داغ

لائیکو پوڈیم۔ بھورے داغ خاص طور پر پیٹ کے اوپر۔  
ایمپس ایم۔ جسم پر سفید رنگ کے قلعوں میں یا ٹکڑیوں میں۔  
سیسیا۔ اگر لائیکو پوڈیم نا کام ہو جائے تو یہ دی جائے۔  
پلمسم۔ سن یا س یا کثرت جیفن میں۔  
میزیریم۔ چھاتی اور بازوؤں پر دھبے بہت گہرے رنگ کے۔  
کیورارے۔ زردی مائل بھورے رنگ کے دھبے۔  
(داد اور پھنیاں دیکھئے۔) چھپا گئی

### تیل والی

برائی اونیا۔ بہت ہی چکنا۔ خاص طور پر بال۔ چہرہ نیلا۔ زرد۔ سوجا ہوا۔ استسقاء گرم اور  
پر زرد۔ انتہائی تکلیف دہ۔  
مرک سال۔ متواتر مندرا اور چکنا۔ بہت زیادہ بے رنگ۔ لیسڈار سپین۔ رات کے وقت زیادہ۔

نیرم میور - جلد چکناہٹ والی تیل والی خاص طور پر بالوں والی جگہوں پر۔  
 پلمیم - چہرہ کی چکناہٹ والی اور چمکدار۔  
جلد اترنا -

ہیلی پورس - ناخون اور بالوں کے گرنے کے ساتھ جلد کا اترنا۔  
 انتھر کیسینم - وسیع پیمانے پر جلد کا اترنا۔  
 آئیوڈیم - جلد اترے ڈھیلے پرت دکھائی دیں - چکنے بخارات کا اخراج۔  
 میزیریم - پرت دار جلد کا اترنا۔  
 ایپس ایم - استھائی سوزش کے ساتھ جلد کا اترنا۔  
 ایلیم سیٹائیوا - ہاتھوں کی جلد اتر جائے۔

کھجلی کھجلی کا علاج اس دوائی کی سی ایم طاقت سے شروع کرنا چاہیے

سلفر - اس کے پندرہ روز بعد تک کوئی دوائی نہ دی جائے۔ کھجلی کا علاج اس دوائی کی سی ایم طاقت سے شروع کرنا چاہیے۔  
 کالی بروم - آٹھ کھجلی جلد ٹھنڈی نیلی دھبے دار - جھریاں پڑی - بڑے بڑے بلدار بھوڑے۔  
 تھائی رائیڈیم - ٹھنڈے محسوس کرنے والے اور کئی خون والے مریض میں خارش۔  
 خشک کمزور جلد - ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔

ریڈیم بروم - آرٹھرائس کی کھجلی - چہرے پر مواد نکلنے والی خارش والی پھنسیاں - ہاتھ پر سرخ داغ کے قلعے - تمام جسم پر جلن کا احساس اور خارش۔  
 کوریڈیم بروم - ہتھیلیوں اور تلووں کی خارش - سرخ چھٹے ناسور - مونگے کے رنگ کے دھبے جو گہرے سرخ اور بھر تانبے کے رنگ میں تبدیل ہو جائیں۔

آرسینک بروم - ایک شاندار دوائی ہے جو ۲x میں دی جانی چاہیے۔  
 ایسڈ کرائیو فزیکم - اس کے ۴ سے ۸ گرین، ایک انس ویزلین میں بیرونی طور پر استعمال کریں۔  
 یہ اندرونی طور پر تین طاقت میں دی جائے۔

آر سینک سلف رب۔ جلدی امراض کے لئے خاص طور پر کھجلی اور اگر کیا پھنسیاں اور بچڑے۔  
 سیلینیم۔ ہتھیلیوں پر آنشک کھجلی، ہتھیلیوں کی خارش۔ ہاتھ چھری دار۔ ہاتھوں میں پھارنے والے درد  
 اگر اس سے افاق نہ ہو تو علامات کے لحاظ سے دوائیاں دیجئے۔

ہائیڈرو کوٹائل۔ جلد کے بہت زیادہ مٹنا ہونے اور کھال اوھڑنے کے ساتھ۔  
 میزوریکم۔ ہتھیلیوں کی خارش یا کھجلی جو گرمی سے زیادہ ہو یا ٹھسے۔  
 پیرو لیم۔ ہاتھوں کی کھجلی درازوں کے ساتھ جو ٹھنڈے موسم میں زیادہ ہو۔  
 آر سینک کم البم۔ کھجلی جو ٹھنڈی پیشیاں لگانے پر ادنیٰ سے بڑھے۔ گرمی سے افاق نہ ہو۔ ہر ہفتہ  
 ۲۰ ملاقت میں ایک خوراک دیجئے۔

آر سینک آئیوڈ۔ کھجلی جو ٹھنڈے اور مندار یا ٹھنڈی پیشیاں لگانے سے کم ہو گرمی سے زیادہ  
 ہو۔ بخلی ملاقتیں ۶ یا ۳۰ ترجیاً۔ اگرچہ جب بخلی ملاقتیں ناکام ہو جائیں تو ۲۰ یا ۱۰۰ ملاقتیں  
 نظر انداز نہیں کی جاسکتیں یعنی یہ بڑی ملاقتیں دی جاسکتی ہیں۔  
 میٹنگم۔ حوض کے دوران میں کھجلی ظاہر ہو یا ٹھسے۔ پر درد درازیں یا چہرے۔

## داد

بیسلیٹیم۔ داد کے لئے یہ ایک چوٹی کی دوا ہے۔ ۲۰۰ میں دی جائے۔ ہفتہ میں ایک خوراک دی  
 جائے۔ اگر دو یا تین ہفتوں میں کوئی افاق نہ ہو تو مندرجہ ذیل ادویات دی جائیں۔  
 سیسیا۔ اگر کوئی اور علامات نہ ہوں تو اس کے بعد یہ دوائی دی جائے۔  
 کلکیر یا کارب۔ ٹھنڈے۔ زرد۔ حد سے بڑھے ہوئے خون والے لوگوں کے لئے ہاتھ اور پاؤں مندار۔  
 سلفر۔ جب داد کے ساتھ تیزابیت۔ بدھمی۔ آبکاٹیاں۔ بھوک کی کمی اور بے چینی ہو۔  
 ایپس میل۔ داد۔ خارش اور ملین کے ساتھ ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افاق نہ ہو۔ ۲۰۰ یا ۱۰۰  
 ملاقت کی ایک خوراک دیجئے۔

ٹیلیوریکم۔ داد خاص طور پر چہرے اور جسم پر۔ جسم اور پسینے کی بوگندی اور لمسن جیسی۔

## جلد کھردری

سورائینیم۔ جلد کھردری۔ چیرے۔ خون بہے اور پرت دار۔ دھونے ڈرے۔ میلی یا غلیظ نظر آئے۔ گندی۔ گندی جیسے کہ گرد و غبار سے ڈھانچی ہوئی۔ جلد کی تکالیف ہنسنے سے اور بستر کی گرمی سے برصیں۔

سلفر۔ چروں کے بغیر جلد کی خشکی۔ (دیکھو عارض کا دب جانے سے۔ عارض)

## لال بخار

بیلادونا۔ لال بخار کے لئے پوٹو کی دوائ ہے۔ ہموار سرخ اور چمکدار پھنسیاں۔ گرم خشک اور سرخ چہرہ۔ معدہ پوٹو جان تلی اور تہے ہو۔ دیر حرارت اور بخار۔ بطور حفظ مائع بھی کام کرتی ہے۔ ایلیٹھس گلیٹڈ۔ شدید ملین دار نہ کام جب متوقع چھپا کی باہر زہریلی۔ خطرناک بخار۔ منہ اور منہ سے گندی بو آئے۔ بیہوشی کی حالت جس سے اتنا مشکل ہو۔ قدرتی اخراجات ٹھیک نہ ہوں۔ لال بخار کے دینے کے بعد توجہ مرکوز کرنے کے ناقابل۔ یادداشت نہ رہے۔ بیہوشی۔ ہنسیاں ہو۔

رسٹاکس۔ لال بخار کے علاوہ جب گرے دار پھنسیاں۔ اونگھ بڑھانے والے نہیں کے ساتھ۔ پھنسیاں آہستہ آہستہ نکلیں۔

ایٹیس میل۔ یہ صرف اس وقت فائدہ مند ہوتی جب گردے کی تکلیف کے ساتھ استفادہ جلد صوبوں والی سرخ اور سفید قطعے۔ چہرہ زرد اور پھولا ہوا۔ گلے کی سوجن ڈنگ گئے جیسی درد کے ہمارے پیاس کی کمی اور گرمی سے بڑھنے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

لیکس۔ پہلے خون کا زہر لایا ہوا اور پھر بلغمی جھلیوں کی تکالیف نمایاں۔ گلے کے گئے ترشے ہوئے۔ ماسور۔ ٹانسو میں تکلیف۔

سکالینیم۔ بطور مل ایجنز دوائی کے اور بطور حفظ مائع کے برائے لال بخار کے ۲۰۰ ملاقات میں استعمال کی جائے۔ زخموں کے نشان۔

لیکس۔ پرانے زخموں کے نشانوں سے آسانی سے خون بہے کھل جائیں۔ سرخ زخم۔

کالی آئیوڈ - چھوٹے پھوڑوں کے نشان چہرے گردن - کھوڑی - چھاتی اور کمر پر -

ویریولینیم - چہرے پر چھوٹے چھلکے نشان پر پندرہ روز بعد ویریولینیم ۲۰۰ دیکھئے۔  
 سارنیاپی - { سارنیاپی ۹ دن میں دو دفعہ سوئے اس دن کے جبکہ ویریولینیم دی جائے۔

کاسٹیکم - گہرے نشان زخم دوبارہ دیکھنے شروع ہو جائے۔

لوئیسین - کٹے کے کاٹنے سے زخم کا نشان رہ جائے۔

گرافائٹس - پرانے سخت نشان۔

ایسڈ فلور - پرانے زخموں کے نشان جن کے کنارے سرخ ہو جائیں۔ ان پر یا ان کے قریب غلظت دار پٹھیاں ہوں۔

تھائیوسینیم - زخم کے نشانوں کو گھٹانے کے لئے بڑھے ہوئے غدود - چہرے کا دق - سکوڑے ہوئے زخم - ملے ہوئے زخموں کے نشان۔

فاسٹولا کا - جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں

کر وکس - پرانے منہل شدہ زخم بار بار کھل یا برسے ہو جائیں اور ان سے پیپ نکلے۔

سلیشیا - پھوڑوں اور ناسوروں کے نشان۔

## نوزائیدہ بچوں کی جلد میں سختی۔

لیکس - یہ دوائی ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں ہفتہ یا مہینہ بعد بالترتیب دی جا سکتی ہے۔

دیکھئے داد بھی - داد۔

## دھاریاں

ہائپریم - سرخ لائیں اور دھاریاں جو بازوؤں اور نعل تک جائیں۔ دھاریاں ٹانگوں کے اوپر نیچے۔

دیکھئے ہائپریمیکسیبل - نیلی ٹانگ سرخ دھاریاں جو بازوؤں اور نعلوں تک جائیں۔ دھاریاں ٹانگوں کے اوپر نیچے۔

دیکھئے دھاریاں - دھاریاں - سخت - جلد موٹی۔

## ناسور

سلیشیا۔ ناسور جو جلدی منڈل نہ ہوں۔ نہ درد ہونے والے پھوڑوں کو ٹھیک کر دے۔ گرم چیزوں سے بچی کرنے سے افادہ ہو۔ اندال مشکل ہو یعنی جلد ٹھیک نہ ہو۔ کھڑکائے یا زخم کا انگور۔

ایسٹ فلور۔ ناسور جو ٹھنڈی ادویات یا پٹیاں لگانے سے افادہ محسوس کریں۔

ہیمپ سلفر۔ ناسوروں کو ٹھیک کرنے کے لئے شاندار دوائی۔

گن پاؤڈر۔ شخڑوں سے شروع ہونے والے ناسور جو ٹھنڈوں تک بڑھیں جن سے بدبودار پیپ نکلے۔ سوزش زیادہ نہ ہو سرخ اور چمکدار۔

ارانیادائیڈ۔ گنگرین والے ناسور جب کلکیرا اور سلیشیا سے بڑھیں اور آسینکیم الیم معمولی افادہ دیں۔ ارانیادائیڈ مکمل طور پر آرام دیتا ہے۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرتا ہے اور ایک دن ٹھیک رہتا ہے دوسرے دن وہ تکلیف محسوس کرتا ہے پھر اگلے روز افادہ محسوس کرتا ہے۔

ہائیڈرائس کین۔ گہرے گوشت خور جلد یعنی جھتیوں پر ناسور۔ گارمھی ایسڈ اور زرد پیپ کے ساتھ۔

کوموکیڈ یا ڈینیٹیا۔ سخت کناروں والوں ناسور۔ ہلکے قسم کی چھپیاں، بہت زیادہ سوزش شدید خارش ہو۔

کاربوونک۔ جلد کی بھریوں میں ناسور۔ نہ دکھنے والے ناسور جن سے متواتر خون بہے۔ بلندار خراشدار تپلا مواد ہے۔

سلفر۔ شدید خارش یا کھرچنے کے ساتھ ناسور۔

سٹیفیگیبرا۔ سوکھا سان والے بچوں میں خارش۔

نکس ماسکالٹا۔ ہسٹریائی مریضوں میں خارش۔

نیٹرم کارب۔ چلنے کے بعد اثریوں پر ناسور یا چلنے پر اثریوں پر ناسور ہو جائیں۔

سٹس کیناڈینس۔ بلا درد اور گنگرین والے۔ گہرے گوشت خور ناسور۔ غصے اور نپٹلی پر کافی مقدار

میں خراش در مواد ہے۔ بنانے سے تکلیف ہو۔ کھلی ہوا سے حساس۔ گرمی سے افات۔  
 کالی سلف۔ کئی منہ والا پھوڑا یا ناسور۔ مریض کھلی ہوا میں افات محسوس کرتا ہے۔  
 کروکس۔ پرانے مندمل ہوئے ہوئے زخم جو بار بار کھل جائیں اور پیپ ہے۔  
 فاسفورس۔ زخم جو مندمل ہوئے ہوئے معلوم ہوں لیکن بار بار کھل جائیں اور ان سے خون ہے۔  
 ناسور پتلی سی جلد (سکری) کی طرح تہہ کا بننا۔ جلد میں جلن۔  
 پی اوٹیا۔ جوتے کی وجہ سے زخم یا ناسور کے لئے مفید ہے۔  
 ٹیرنٹولا کیوینٹز۔ مہلک انگریں والے ناسور۔ ناسور اور پھوڑے۔ یہ پیپ کو بار بار بننے سے  
 روکتی ہے جب سلیشیا ناکام ہو جائے۔  
 کنڈور انگو۔ گندی ہوا لے ناسور۔ تپلا مواد سے ضدی اور پرانے ناسور۔ کھر نڈار۔  
 اوپیم۔ ناسور جو مکمل طور پر جل در رہوں، جو ٹھیک ہوں اور نہ ہی پھیلیں۔ زیادہ سوزش میں  
 جلد میں حساسیت کی حس نہ ہو۔  
 سیننی کولا۔ بنجوں میں ناسور۔ (پھنسیاں بھی دیکھئے)  
پھپھیا کی۔ پتی۔

ایپس ایم۔ پھپھیا کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ بستر کی گرمی سے زیادتی۔ خارش اور جلن ہو۔  
 لیکن پیاس نہ ہو۔ دائرے دار سوزش جو سرخ اور زرد ہوشیدہ خارش ہو  $x 9$  یا  $x 7$  میں دیجئے۔  
 اریکالورنٹس۔ یہ اس وقت دی جائے جب ایپس ناکام ہو جائے۔ یہ ایپس جیسی علامات  
 رکھتی ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں پیشاب زیادہ آتا ہے۔  
 پلسٹیل۔ گیس کیوجہ پھپھیا کے لئے بہترین دوائی ہے۔ تھ اور اسہال کے ہلرہ پھپھیا کی۔  
 انیم کروڈ۔ جب گیس نزل یا تیزاب کے استعمال سے ہو۔ گرمی سے زیادتی۔  
 اسٹاکس فلیو۔ جلن اور خارش کے ساتھ پھپھیا کی جو گرمی اور حرارت سے کم ہو۔ پھپھیا کی تمام جسم پر  
 خارش کے ساتھ۔ مزمن۔ پھپھیا کی۔

رشاکس۔ جلن اور خارش کے ساتھ چھپکائی جو گرمی اور حرارت سے کم ہو۔ کپڑے اتارنے سے جلن اٹھ  
خارش زیادہ ہو۔

نیرطرم میور۔ مندی قسم کے کیس قبض اور مٹی کے رنگ جیسا چھو کا رنگ ہو۔  
ریڈیم۔ رات کے وقت تمام جسم پر خارش۔ جلد لاک کی طرح پٹے۔  
ڈلکا مارا۔ تمام جسم پر چھپکائی۔ کھرچنے پر خارش بلند رہو۔ گرمی میں زیادتی، ٹھنڈ میں افادہ جیسے  
پہلے چھپکائی ہو۔

آرٹیکلیم۔ جب بعض قھوڑے قھوڑے وقفہ پر ٹھنڈا پانی پیئے۔ جب پھیل کا گوشت کھانے سے  
چھپکائی ہو تو اس کے لئے مخصوص ہے۔ ابھرے نشانوں پر بہت زیادہ خارش اور جلن ہو سہا حل  
سمندر پر چھپکائی۔ (متفرق کے نیچے بھی دیکھئے)۔

## موکے۔ مئے

تھوجا۔ تل یا مئے۔ اعضائے تناسل پر ایس کے ارد گرد مئے ۲۰۰ طاقت میں دن میں دو  
بار دیجئے، صبح شام دیجئے۔

کاسٹیکم۔ چہرہ۔ ہاتھوں یا آنکھوں پر مئے  
ڈلکا مارا۔ بڑے بڑے پر گوشت اور ہوا را پچھے، وہ انگلیوں۔ چہرہ اور آنکھوں پر ہو سکتے ہیں۔  
سٹیف گیگیا۔ مئے۔ سوزاک کی وجہ سے فرج یا ذکر پر مئے۔ گوبھی کے پھول کی طرح کے اکاؤ۔  
ہر ہفتے ۲۰۰ کی ایک خوراک دیجئے۔

چھوڑے بھی دیکھئے۔ انگلی کی نوک پر پھوڑا۔

## بسہری۔ چندرا

مارٹر سٹیکا۔ بسہری کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ پیپ جلد نکالتی ہے اور پیپ جلد نکالتی ہے۔  
ہیپر سلفر۔ یہ بسہری کے پھٹنے کے بعد دی جاتی ہے۔ یہ زخم کو مندرل کرنے میں مدد دیتی ہے۔  
ناخن میں سے پیپ بہتی ہے۔ ڈھیلا ہوتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔

سلیشیا۔ جب ہر سلفز ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے یا جب مندرل ہونے کا عمل رک جائے۔  
 لیڈم پال۔ سوئوں کے چننے سے لہری ہو جائے۔  
 ڈالسکوریہ۔ یہ بھی لہری میں مدوکار ہے۔  
 الیم سیپا۔ جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائیں۔

## دوسرا حصہ

بال

### دیجھئے گزنا بالوں کا۔ گنجائیں۔ بھوسوی۔ سکری۔

سینیکولا ۲۰۰۔ کھوڑی پر پرت دار سکری۔ بھنوں اور دوسری بالوں والی جگہوں پر ہر ہفتہ  
 بعد ایک خوراک دیجئے۔

فاسفورس ۲۰۰۔ بہت زیادہ۔ بادلوں کی طرح گہرے۔ بال بھنوں کی طرح گریں۔ کھوڑی کی نارش  
 گرغیاٹیس۔ دادوال سکری (وہ سکری جس کے ساتھ اگزیمیا اور دوسری پھنسیاں ہوں)۔ کھوڑی پر تدار  
 اور بے چین کرنے والی نارش۔ تر۔ بالوں کا گزنا۔ چند یا پر چلن۔

کلکریا سلف۔ کھوڑی پر سکری، گار سے زرد قلعوں میں پھنسیاں۔ اگزیمیا۔ سکری وجر سے  
 چھوٹے چھوٹے چھوڑے۔ بالوں کا گزنا۔

تھوجا۔ سفید خشک اور سکری۔ بال خشک گریں۔

سیپیا۔ دائروں میں بھوسوی۔ رنگ درم کی طرح یا دھدری کی طرح۔ مندار کھوڑی۔ بال گریں  
 ماتھے کے بالوں کے نزدیک چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔

کاربوونیم سلف۔ کھوڑی پر سکری۔ پھنسیاں۔ پرت دار۔ اگزیمیا۔ نارش۔ مندار۔ پرتدار۔  
 چھوڑے دکھیں اور پرتدار۔

نیرم میور۔ سفید بھوسوی۔ نزلہ زکام اور بوسونگھنے کی حس کے خاتمہ کے ساتھ۔  
 سورائینم۔ بھوسوی جس سے گندی بوائے۔

سلفز۔ جب ابھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔

آریسکم البم - کمزور مریضوں میں۔ مریض اچھے رنگ والے۔ کھوپڑی پر ناقابل برداشت خارش۔ ننگے  
 قلعوں پر گول دھبے۔ خشک پرت دار۔ رات کے وقت صلیں اور خارش۔  
 ایسڈ فلور۔ خشک مہوسی والی پُرسجیان کھوپڑی بال گرنے کے ہمراہ۔  
 میزمریم۔ بہت زیادہ خارش اور بالوں کے گرنے کے ہمراہ

## بالوں کا گرنا

تھوجا۔ خشک پرت دار مہوسی کی وجہ سے بالوں کا گرنا۔

{ گریفائیٹس  
 انتھرم۔ ڈارمھی اور مہنوں کے بالوں کا گرنا۔

سفنگورس۔ بالوں کا گرنا۔ خاص طور پر دارمھی اور مونچھوں کے بالوں کا گرنا۔

اسٹیلگوایم۔ آتشک کی وجہ سے گنجا پن۔ بال گر جائیں اور دوبارہ نہ اگیں۔

ویزباڈن۔ ویزباڈن سے بال جلدی سے اگیں گے۔ اور گہرے ہو جائیں گے۔

{ فاسفورس  
 بال گچھوں میں گریں۔ ادھر ادھر بالوں کے بغیر قطع ہوں دی گئی ترتیب  
 کلکیر یا فاس۔ میں دی جائیں۔

ایسڈ فاس۔ سر کے بالوں کا گرنا اور مہنوں، پلکوں اور اعضاءے تناسل پر سے بھی بال گریں۔

سیلینیم۔ تمام سر سے بالوں کا گرنا اور سر کی کھوپڑی ہموار اور بغیر بالوں کے رہ جائے۔ مہنوں

اور چہرے پر سے بالوں کا جھڑنا جس کی وجہ سے چہرہ عجیب سا نظر آئے۔

ایومونا۔ کھوپڑی کے بالوں کا مٹری مقدار میں گرنا۔ یا یہ حصے مکمل طور پر ننگے ہو جائیں۔ تمام جسم پر

سے بشمول پلکوں پر بھی بالوں کا گرنا۔

ایسڈ فلور۔ آتشک کی وجہ سے بالوں کا گرنا۔ بال خشک۔ بال اچھے ہوئے ہوں۔ وہ چلیجہ

طلحہ اور لوث جائیں۔ وہ گچھوں میں اچھے جائیں اور بغیر جھکے ہوں گے۔

نیٹرم میور۔ حمل کے دوران بالوں کا گرنا۔ مژمن سردی کے بعد بالوں کا گرنا۔

لیکس۔ حمل کے دوران بالوں کا گر جانا۔  
 بوریس۔ بال کھڑے اور سخت۔ کنگھے سے ہمارے کئے جاسکیں۔ بال سروں پر الجھ جائیں۔  
 اور آپس میں جڑ جائیں۔ اگر یہ کچھ کاٹ دیئے جائیں۔ یہ دوبارہ بن جائیں۔  
 پلسٹیل۔ آنکھوں میں بالوں کا احاس۔  
 ٹائٹرک الیڈ۔ بالوں کا بہت بڑی مقدار میں گرنا خاص طور پر چند یا پینسیوں کے ساتھ۔  
 کی وجہ سے اعصابی سردرد۔ کمزوری اور لاغری۔ کھوپڑی حاس۔  
 ونکا مائینر۔ گنج پنے کے قطعے جن سے طویت سے بال آپس میں الجھ جائیں۔ کھرتے یا خارش کی  
 نہ رکھنے والی خواہش۔

امونیم میور۔ مجبوسی کے ساتھ بالوں کا گرنا۔  
 مانسی نیلا۔ شدید عارضہ امراض کے بعد بالوں کا گرنا۔  
 کالی کارب۔ بھنوں کے بالوں کا گرنا۔  
 ریشاکس۔ پیکوں کے بالوں کا گرنا۔  
 مرکوس۔ آتش کی وجہ سے بالوں کا گرنا۔  
 سلفر۔ بہت ہی بے قاعدہ بال۔ رت جیسے۔ سخت اور غیر جیکدار۔ ہر طرف لگنے والے بال۔  
 میڈونیم۔ کھوپڑی پر خارش کے ساتھ بالوں کا گرنا۔ ساحل سمندر پر لپاقت۔  
 سپیا۔ موقنی حیض اور حمل کے دوران بالوں کا گرنا۔ سردرد کے دوران بالوں کا گرنا۔  
 مہاشرت کی خواہش مند نہ ہو۔

**بالوں کا گرنا**  
 تھوجا۔ بالوں کا ان جگہوں پر بڑی مقدار میں اگنا جہاں ضرورت نہ ہو۔ ہر ماہ ۱۔ ایم طاقت  
 کی ایک خوراک کافی ہوتی ہے۔  
 اولیم جیکو۔ یہ دوائی ۳۲ طاقت میں، گرمیوں میں اور ۳ طاقت میں سردیوں میں دن تین  
 دفعہ۔ ایک ایم تھوجا کے ساتھ دی جائے۔ یہ دوائی تھوجا کے ساتھ دی جائے۔ یہ دوائی تھوجا

دینے سے دودھ پہلے اور دودھ بعد نہ دی جائے۔

نوٹ ۱:- آرمیک کا زرد سفید اور ان بچھا ہوا جونا براہِ مقلد میں لے کر ان کا گرم پانی کے ساتھ پیٹ تیار کیجئے اور چھو پر لگاتے رہئے اور اسے خشک ہونے دیجئے۔ ہفتوں تک بال نہ اگیں گے۔ چند بار دہرانے سے ہمیشہ کیلئے بال اگنا بند ہو جائیں گے۔

## بال قبل از وقت سفید ہوں۔

تھائیرائیڈین۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کیا جائے۔ یہ ایک ماہ تک دن میں تین دفعہ ۲۰ طاقت میں دی جائے اور اس کے بعد ۲۰ طاقت میں ہر ہفتہ ایک ماہ تک دی جائے۔

ایسٹراس۔  
 لائیکو لوڈیم۔  
 وائیسباڈین۔

پائلو کاربیم۔ اگر مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو ۸ طاقت میں دیجئے۔ ہر ماہ ایک فلک ٹیبلٹ۔  
 ٹیرم میور۔ کمزور کر دینے والی تکالیف کی وجہ سے بال سفید ہو جائیں  
 فاسفورس۔ ہر ہفتہ ۲۰ طاقت میں ادل بدل کر دی جائیں۔  
 آرسینک بائیڈ۔ مڑھ حصوں پر برف کی طرح سفید بال۔  
 نکس وامایکا۔ بال سفید ہو جائیں (جسم کی اعلیٰ تکلیف کی وجہ سے)

## ناخن تیسرے حصہ

### ناخنوں کی عام بیماری

تھو جا۔ انگلیوں کے ناخن بیمار بننے نظر آئیں۔ مری ناخن۔

مائرسٹیکا سبیر لیا۔ انگلیوں کے ناخنوں میں تکلیف انگلیوں کی پٹریوں کی سوزش کے ساتھ۔

کلکیر یا کرب - بھڑیلے طے غیر ہزار ناخن - دھبے دار اور بے قاعدہ -  
 سلیشیا - بنجوں کے ناخنوں کا گوشت میں گھسنا۔ مڑے مڑے ہوتے۔ سینے ناخنوں کے اُگنے میں  
 تحریک پیدا کرتی ہے -  
 فلورکلیٹ - ٹوٹی بھوٹی اطراف -  
 گرلیفائٹس - جب ناخن مڑے ہوں۔ سیلک کی طرح اگیں۔  
 ایپس ایم - ناخنوں کے نیچے خون جمع ہو جائے۔  
 کاسٹیک - جب گوشت میں گھسنے والے ناخنوں کے لئے جب سلیشیا نکال ہو جائے۔  
 میگنیٹس کپرس آسٹ - ناخنوں کے اندر کی طرف درد جیسے کریہ گوشت میں گھس گیا ہو۔ بھڑنے پر بہت  
 درد ہو یا بنجوں پر جوتے کے دباؤ سے ناخنوں پر جیسے کو چنڈی یا گتے۔  
 لیکس - اندر کی طرف گھٹے۔ ٹھنڈ۔ جانی اور ڈنگ لگنے والے۔

## ناخن کی جڑ کے قریب پیپ پڑ جانا

فیٹرم میور - انگلیوں کا ناخنوں کے قریب خشک ہونا اور انگلیوں کا پھٹنا۔ سن ہونا اور بھنجا ہٹ  
 بازوں اور گھٹنوں کی کھردری۔ پچھلے ہونٹ کے درمیان میں چیرا۔ چھپاکی -  
 سلفر - خشک پرت دار غیر صحت مند جلد۔ خارش اور جلن۔ کھرجے اور دھونے پر زیادتی -  
 پھنسیاں اور پیپ پڑنا۔ کانپتے ہوئے اور گرم پسینے والے ہاتھ۔  
 کلکیر یا کرب - غیر صحت مند جلد۔ آسانی سے ناسور بن جائیں۔ چھوٹے چھوٹے زخم آہستہ آہستہ  
 مند ہوں۔ مٹے اور بوائیاں۔ ٹھنڈے ہندار پاؤں۔ رات کے وقت ٹھنڈے اور مردہ محسوس کرے۔  
 یہ بھٹنے والے اور دھبے دار ناخن -

انٹم کروڈ - ناخن بھر بھرے۔ بھد اگیں۔ سخت مٹے ہاتھوں اور پاؤں کے نموروں پر پیدا  
 ہوں۔ جلد خشک۔ جب بستر گرم ہو تو خارش ہو۔ بہت پتہ جھلن اور زبان پر گاڑھی لیسڈ اسفید تہہ۔  
 گرمی اور ٹھنڈے پانی میں نہانے سے زیادہ ہو۔

سیلیشیا۔ انگلیوں کے ناخنوں کی بیماریاں اگر ان پر سفید دھبے ہوں۔ خشک ٹھنڈے پاؤں۔

۵۸۵

پینے کے ساتھ۔ بے ڈھنگے ناخن۔

الیومنا۔ بھر بھرے ناخن۔ انگلیوں کے بیچے کاٹنے والا درد خشک جلد۔ آسانی سے ٹوٹیں جب  
بستر میں گرم ہوں تو مارش۔ انگلیوں کی جلد بھر بھری۔ قبض۔

ایسڈ ٹائٹرک۔ ٹھنڈے نیلے ناخن۔ ہاتھوں پر مٹوں جنکو دھونے پر خون ہے۔ شور۔ پھرنے  
اور درد حساس۔

تھو جوا۔ ناخن نرم اور بھر بھرے۔ بے ڈھنگے یا ترے مڑے۔ ہاتھوں اور بازوؤں پر چھوڑے  
داغ۔ چکنا چٹ والی جلد۔ بالوں میں بھوسا یا سکری۔ پسینہ میٹھا اور زبردست۔


گریفٹاٹیس۔ ناخن موٹے ہو جائیں۔ پٹے ہوئے اور بے ڈھنگے۔ مریض نکلین۔ ناامید۔ روتا  
ہے۔ موت کے سوائے کسی چیز کے متعلق نہیں سوچتا۔

ایملی لورس۔ جلد سے چھل جانے یا اُدھڑ جانے سے ناخنوں کا گر جانا۔

الیومنا سیلیکیٹ۔ ناخنوں کا بھر بھرا پن۔ ہاتھ متواتر کٹے پٹھے۔ ہاتھ اور پاؤں ہرٹ کی طرح  
ٹھنڈے۔ ناخنوں کے قریب ناسور۔

ایسڈ فلورک۔ ناخن ترے مڑے یا بے ڈھنگے۔ لبائی کے رخ ناخنوں بھر بھریاں۔ ناخن تیزی  
سے اگیں اور جھد ہوں یعنی وہ بدر وضع آہوں اور بے ڈھنگے بعض جگہوں پر بہت موٹے اور بعض

جگہوں پر بہت پتلے آسانی سے ٹوٹیں اور ٹوٹنے والے۔



حدود صوا  
باب ۱۴

عام مختار  
محکمات

# عام بخار

ایکونائٹ - سخت بخار - بے چینی - شدید پیاس - بہت زیادہ  
مقدار میں پانی پینے کی خواہش - چہرہ پر خون - ٹھنڈی ہوا لگنے سے

یہ صفت ابتدائی حالت میں دی جانی چاہیے۔

پیشینشیا - پیاس اور مجرک کے ساتھ بخار - کھانا کھانے کے بعد تمام جسم بہت گرمی محسوس کرتا ہے۔ بے  
چینی اور تپش اور سر اور ہلے جب بخار تیز ہو تو باتونی ہو۔ گندی بودلے اہمال یا مریض گرمی بہوشی میں ہو۔  
بیلٹا ڈونا - چہرہ پر خون - پچھلا سرخ - زیادہ بخار - پیاس نہ ہو۔ آرام سے لیٹنا چاہے۔ اس دوائی کی  
نمایاں علامات ہے۔ سرور - گردن میں نالیوں میں تپکن - سوزج کی گرمی میں کام کرنے یا چلنے سے بخار۔  
جیلسم - چہرہ پر خون - گلہ - گردن کی گدی سے درد شروع ہو، پیاس نہ ہو۔ آرام سے لیٹنا چاہے۔  
نکسوسوامیکا - مریض دن کے گرم ترین حصے میں بھی ٹھنڈ محسوس کرے۔ اگرچہ ٹھنڈ محسوس کرے  
لیکن کپڑے اتار دے۔ ضدی قبض منہ کا ذائقہ کڑوا۔ دن کے ۱۱ اور ۱۲ بجے بخار زیادہ ہو۔

آر سینکلم البم - بے چینی کے ساتھ بخار تھوڑے تھوڑے دفعہ پر تھوڑی تھوڑی مقدار میں پیاس۔  
کنڈی اور لاغری - بخار کی سردی شدید قسم کی۔ ایسا مسلم ہو کہ جسم میں دوڑتا ہوا خون بنانی پانی ہے۔  
بخار کی حالت میں محسوس کرے کہ ابلتا ہوا پانی خون کی نالیوں میں دوڑ رہا ہے۔

برائی اونیہ - خشک کھانسی کے ساتھ بخار تمام جسم میں دریں ہوں۔ آرام سے لیٹ جانا چاہے کسی  
دن بھی پسند نہ کرے۔ بہت لمبے وقفے پر بڑی مقدار میں زیادہ پانی پئے۔

ٹرائی اوٹیم - گیس یا مائیفائیڈ بخار کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ ہر قسم کے بخاروں کیلئے مخصوص ہے۔  
کیلکڈیم - ہر شام بخار کے دوران سوجھے۔ اور جب بخار اتر جائے تو جاگ جائے۔

نکلیٹنٹھس - حق کے ساتھ صفراوی بخار - معدہ میں جلن - متلی - ٹھنڈ کے ساتھ شدید پیاس - دفعہ  
دار بخار - استغاثی سندس کے ساتھ۔

اگنیشیا - سردی کے دوران بخار اور پیاس - دوسری حالت میں نہ ہو۔ بیرونی گرمی سے سردی میں  
انقرہ ہو۔ بیرونی طور پر پیٹنے سے گرمی بڑھے۔ سردی کے دوران چہرہ سرخ۔

# عام بخار

ایکونائٹ - سخت بخار - بے چینی - شدید پیاس - بہت زیادہ مقدار میں پانی پینے کی خواہش - چہرہ پر خون - ٹھنڈی ہوا لگنے سے یہ صحت ابتدائی حالت میں دی جانی چاہیے۔

پیشینیا - پیاس اور مجرک کے ساتھ بخار - کھانا کھانے کے بعد تمام جسم بہت گرمی محسوس کرتا ہے۔ بے چینی اور تپش اور سر اور ہلے جب بخار تیز ہو تو باتونی ہو۔ گندی بودلے اہمال یا مریض گرمی بہوشی میں ہو۔ بیلٹا ڈونا - چہرہ پر خون - پچھلا سرخ - زیادہ بخار - پیاس نہ ہو۔ آرام سے لیٹنا چاہے۔ اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ سرور - گردن میں نالیوں میں تپکن - سوزج کی گرمی میں کام کرنے یا چلنے سے بخار۔ جیلسم - چہرہ پر خون - گل - گردن کی گدی سے درد شروع ہو، پیاس نہ ہو۔ آرام سے لیٹنا چاہے۔ نکسوسو امیکا - مریض دن کے گرم ترین حصے میں بھی ٹھنڈ محسوس کرے۔ اگرچہ ٹھنڈ محسوس کرے لیکن کپڑے اتار دے۔ ضدی قبض منہ کا ذائقہ کڑوا۔ دن کے ۱۱ اور ۱۲ بجے بخار زیادہ ہو۔

آر سینکلم البم - بے چینی کے ساتھ بخار تھوڑے تھوڑے دفعہ پر تھوڑی تھوڑی مقدار میں پیاس۔ کمزوری اور لاغری - بخار کی سردی شدید قسم کی۔ ایسا مسلم ہو کہ جسم میں دوڑتا ہوا خون بنانی پانی ہے۔ بخار کی حالت میں محسوس کرے کہ ابلتا ہوا پانی خون کی نالیوں میں دوڑ رہا ہے۔

برائی اونیہ - خشک کھانسی کے ساتھ بخار تمام جسم میں دریں ہوں۔ آرام سے لیٹ جانا چاہے کسی دن بھی پسند نہ کرے۔ بہت لمبے وقفے پر بڑی مقدار میں زیادہ پانی پئے۔

ٹرائی اوٹیم - گیس یا مائیفائیڈ بخار کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ ہر قسم کے بخاروں کیلئے مخصوص ہے۔ کیلیڈیم - ہر شام بخار کے دوران سوجائے۔ اور جب بخار اتر جائے تو جاگ جائے۔

نکلیٹنٹھس - حق کے ساتھ صفراوی بخار - معدہ میں جلن - متلی - ٹھنڈ کے ساتھ شدید پیاس - دفعہ دار بخار - استقامتی سندش کے ساتھ۔

اگنیشیا - سردی کے دوران بخار اور پیاس - دوسری حالت میں نہ ہو۔ بیرونی گرمی سے سردی میں انفر ہو۔ بیرونی طور پر پیٹنے سے گرمی بڑھے۔ سردی کے دوران چہرہ سرخ۔

الستونیا۔ اسپہال کے ہزارہ دیمابخار

الستونیا۔ ہلکی قسم کا بخار۔

کڈیمیم۔ { زرد بخار شدید تر ہے اور تلی کے ہزارہ۔  
کروٹیلین ہور۔

الستونیا۔ رات کو پسینے کے ساتھ دیمابخار۔ جلد ہنڈی۔

ایس کین۔ تمام جسم کانپے جیسے کہ خون زفانی ہو پانی میں تبدیل ہو گیا ہو۔ ٹھنڈا کر تک نہ چھو جائے۔

سورائیم۔ بخاروں میں جب گرمی اور پسینہ بہت زیادہ ہو۔ ہلتا ہو پسینہ جیسے کہ بھاپ کی طرح گرم۔

ایس ایم۔ بخار میں خشک گرمی اور پسینہ اول بدل کر آئے۔ کالا زرد بخار جس میں تلی بڑھ جائے پائیں

کے ساتھ یا اس کے بغیر یا پائیں نہ ہو۔

### پانی کی ٹھنسی۔ بخار کے آبلے۔

نیرم میور۔ بخار کے آبلوں کیلئے شاندار دوائی ہے۔ یہ کسی بھی موقع پر دی جا سکتی ہے لیکن اگر یہ

ناکام ہو جائے تو دوسری ادویات دی جا سکتی ہیں۔ وقفہ دار بخار میں۔

الگیشیا۔ وقفہ دار بخار۔ جب نیرم میور ناکام ہو جائے۔

الستونیا۔ پرت دار ٹائیفائیڈ بخار میں۔

لیکٹک الیڈ۔ سرخ بنیادوں والی پھنسیوں سے جڑے ہوئے آبلے۔

میرسیرلفر۔ پھنسیاں دکھیں۔ چھینے والے درد۔ سفید بھوڑے جو اندر سے سرخ ہوں۔

سیلیشیا۔ پرت دار۔ کانوں سے مواد بہے۔

رشاکس۔ بخار کے آبلے۔

پیشیشیا۔ ٹائیفس بخار میں دانتوں پر گندی میل جم جائے۔

### لاکڑا کا کڑا۔

دیر لوسیم۔ یہ دوائی علاج کے شروع میں دی جانی چاہیے۔ ۲۰۰ میں دن ایک خوراک بھجائے۔

اس دوائ کا دایمانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دوائی بیماری کا دورانیہ کم کر دیتی ہے۔  
 انٹیم ٹارٹ - یہ دوائی دیرپا لینے کے ۴۸ گھنٹے بعد دی جائے یہ ہر دو گھنٹے بعد دی جائے حتیٰ کہ  
 بخار اتر جائے۔

برائی اونیا - اگر بخار کے ساتھ خشک کھانسی بھی ہو تو یہ دی جانی چاہیے۔ رلیف جُب چپ  
 لیٹ جانا چاہتا ہے۔

مرک سال - جب بخار اتر جائے تو اس کے متعلق سوچا جائے۔ یعنی یہ دوا دی جائے۔  
 کلکیریا فاس - یہ دوائی بطور ٹانک بھوٹی چھپک۔ لاکڑا کا کڑا اور جھپک کے بعد دی جائے۔  
 ڈینگو بخار - مکروڑ بخار۔

برائی اونیا - تمام جسم میں دردیں۔ لیکن گہری ہڈیوں میں نہ ہو۔ آرام سے لیٹ جانا چاہیے۔  
 زیادہ وقفے پر زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس۔

یوٹیویرم پرف - مکروڑ بخار کے لئے شاندار دوائی ہے۔ دردیں گہری ہڈیوں تک جائیں۔  
 قے اور بے چینی ہو۔

رسٹاکس - مکروڑ بخار کے لئے جب ٹھپوں میں تکلیف ہو تو دی جاتی ہے۔  
 خُناق - (ناک، گلے کے تحت خُناق دیکھئے) سُرخ بادہ - (جلد کے تحت سُرخ بادہ دیکھئے)  
 جسم کا شدید بخار - تیز بخار

بیلادونا - تیز بخار مقابلہ خون میں نہ ہر نہ ہو۔ جلندار۔ جھننے والی بھاپ کی طرح گری۔ ہاتھ  
 پاؤں ہر کی طرح سودا، پیاس نہ ہو۔

دریٹیم ورائیڈ - تیز بخار۔ بہت تبدیلی دالا۔ یعنی کبھی زیادہ شدید بخار اور کبھی کم بخار۔  
 انفلوئنزا۔

آرسینک ایلیم - انفلوئنزا کیلئے بھوٹی کی دوائی ہے۔ اگر یہ بغیر سوچے سمجھے بھی دی جائے تو بھی

دی جائے تو ۹۵ فیصد کیسوں کو درست کر دیتی ہے۔ اس کی علامات درج ذیل ہیں۔ چھوٹے پھوٹے  
دفعوں پر تھوڑی مقدار پانی کی پیاس۔ چھینکیں۔ ناک سے تھلا اور غرا شدہ پانی کا بہنا۔ انفلوئنزا  
کے بعد بھی دی جا سکتی ہے جب کا بلوڈ ٹیج ناکا ہو جائے۔

سلفر۔ یہ ایک عمل انگیز دوائی ہے جو انفلوئنزا میں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر بخار ۳۸ گھنٹے میں نہ  
آئے تو یہ صبح سویرے معہ ۲۰۰ میں دی جائے۔ یہ مکمل طور پر ٹھیک کر دے گی یا دوسری ادویات  
کے لئے علامات کو واضح کر دے گی جب یہ دوائی دی جائے تو دوسری کوئی دوا ۱۲ گھنٹے کے اندر اندر  
ہرگز نہ دی جائے۔

جیلسمیم۔ فلکی ابتدائی مرحلے میں دی جائے۔ اس میں شدید سردی اور چھینکیں کر کے اوپر نیچے جائے۔  
بہرہ مرخ، مہر اسرخ، ناک سے پانی جیسا اخراج جو غرا شدہ ہو۔ پٹھوں میں مستقل درد پیاس نہ ہو۔  
شدید سردی ۲۹ دیکھئے۔

لوپٹھوریم پرف۔ بخار میں سردی اور تھکے کے لئے موزوں ہے۔ کپکاپٹ کر کے پینے پاؤں  
تک پھیلے۔ ہڈیوں میں گہری تکالیف جو حرکت سے کم ہوں۔ پیاس معلوم ہو لیکن پانی کا ذوق نہیں پاتا  
تیل والا معلوم ہو۔ زکام چھینکوں کے ہمراہ گلا میٹھا ہوا۔ اور قابو آنے والی کھانسی ۲ طاقت میں  
دیکھئے۔ جیم شک۔

برائی اوینا۔ جب نلو کے ساتھ نمونیا بھی ملا جلا ہو۔ پٹھوں میں گولی لگنے جیسے درد جو تھوڑی سی  
حرکت سے بھی زیادہ ہو جائیں۔ خشک کھانسی جو پھپھڑوں اور چھاتی میں بہت تکلیف دے جسم کو  
پسینہ آئے۔

کالی بائیکرومیکم۔ بخار کے بعد کھانسی جو پھپھڑوں اور چھاتی میں تکلیف دے۔ جسم کو پسینہ  
آئے خشک کھانسی نہ ہو۔ چپکنے والی بلغم جوتا روں میں کھینچی ہے یعنی تاردار بلغم کمزوری ناک  
کی بلغمی جھلیوں پر پھنسیاں ناک کی جڑ میں خشکی کے ساتھ تکلیف اور سخت مواد کا جماد۔  
نیرٹرم سلف۔ یہ دوائی انفلوئنزا کے لئے مخصوص ہے۔

رٹاکس۔ متواتر سردی لگنے کے ساتھ نلو جیسے کہ جسم پر ٹھنڈا پانی گرایا جا رہا ہے کہ دریدوں میں

ٹھنڈا خون گردش کر رہا ہو۔ بازوؤں میں دردوں کے ساتھ بے چینی رلیض ادھر ادھر حرکت کرتا ہے۔ جس سے اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ ٹکونے سے سرے کے ساتھ زبان خشک۔ سر اسٹڈ والی تخت کھاتی ڈلکا مارا۔ حالت حاد میں ایک بہترین دوائی ہے۔ آنکھیں چڑھی ہوئی۔ گلا کھردرا۔ چھوٹی دھکن سے کھانسی تکلیف دہ ہوئی کی وجہ سے ہوا گرم موسم ٹھنڈے موسم میں تبدیل ہو جائے۔

کاسٹیکم۔ تیز بخار۔ سرخ چہرہ۔ سردی لگے۔ شدید کمزوری۔ بستر پر سے بے شکل اٹھ سکے۔ ناک بند۔ ناک بند۔ ناک مہر پر۔ پانی دالا۔ گلا بیٹھا ہوا۔ خشک متواتر کھانسی ایک لمبائی میں نورک دیجئے۔

کارڈس میربالنس۔ جب جگر متاثر ہو چکا ہو تو نلو کے لئے مفید ہے۔

انفلوئنزا نیم۔ یہ ایک نوموڈ ہے (بیماری کے مواد سے تیار کردہ دوائی ہے) یہ بطور عمل انگریز دوائی کے دی جاتی ہے جب ابھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔ یہ دوائی نلو میں بطور حفظ ماتقدم کے دی جاتی ہے۔ یہ آرام بھی دیتی ہے اس دوائی سے علاج شروع کیا جائے۔

کاربوووج۔ یہ دوا انفلوئنزا کے بعد کے اثرات یا علامات جیسے کمزوری۔ طاقت کی کمی۔ برائے نکاشٹس کی باقی ماندہ تکلیف۔ تلوؤں میں جلن جیسے کہ سرخ مریج سے ہو رہی ہے کیے مفید ہے۔ دن میں ۲۰۰ طاقت دو دن دیجئے۔

امونیم کارب۔ انفلوئنزا کے بعد کھانسی جب برائی آویا اور دوسری ادویات ناکام ہو جائیں ایسی کھانسی کے لئے پہلے امونیم کارب دی جائے۔ ۲۰۰ x میں دیجئے۔

بیٹیشیا۔ دوائی انفلوئنزا اور بوش چہرہ کے ساتھ۔ چند ہی آنکھوں۔ سر میں درد۔ گلا دکھے۔ تمام جسم میں دھکن اور دردیں شدید کمزوری۔ مدہوشی کے ساتھ۔ احمق دکھائی دے اور مدہوشی سے بے شکل جاگے۔

لائیکو پوڈیم۔ جب دوائی نلو کے بعد اپنے آپ کو کام کرنے کے اہل نہ پائیں۔ یہ دوائی انکو ٹھیک کر لگی۔

ملیریا۔

چائنا۔ ملیریا کے لئے چوٹی کی دوائی ہے اس میں رلیض ٹھنڈک محسوس کرتا ہے بغیر پیاس کے پہلی دو ابتدائی بیٹیل میں یعنی ٹھنڈک اور گرمی میں۔ دوسری بیٹیل کے آخر پر پیاس لگتی ہے۔

جب بخار شروع ہو جائے۔ پیاس پسینے کی شیش میں نمایاں ہوتی ہے۔ دوسرے میں سردی سے پہلے اور بعد میں پیاس ہوتی ہے۔ ہر تیسرے روز علامات زیادہ ہوتی ہیں۔ حملوں سے پہلے متلی۔ ہیجان۔ دل کی دھڑکن سرد درد اور بھوک کا احساس ہو۔ حاد کیسوں میں ۱۰ تا ۱۵ خفایاں دیں۔ مزمن کیسوں میں ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں دیں۔

**جینیم سلف**۔ اس دوائی میں مرض کا دورہ ۱۰ یا ۱۱ بجے صبح یا ۲ اور ۱۰ بجے رات سخت۔ ہلا دینے والی سردی۔ پیاس کے ساتھ۔ گرمی کی حالت بہت شدید ہوتی ہے اور اکثر اوقات اس کے ہزارہ جٹایاں اور جھپکیں ہوتی ہیں۔ اس شیش میں پیاس بھی ہوتی ہے۔ پسینے کی شیش کے ساتھ بھی۔ پسینہ کمزور کر دینے والا اور دیر تک رہنے والا ہوتا ہے۔

**آر سی کم البم**۔ شدید کمزوری۔ پریشانی۔ بے چینی۔ شدید جلندار پیاس معدہ کے ہیجان کیساتھ منہ کا ذائقہ کڑوا۔ یہ مزمن کیسوں میں دی جائے۔ ٹھنڈا عام طور پر رات کے بے چینی سے پہلی ہوتی ہے۔ سردی اور گرمی اول بدل کر۔ شدید ہلا دینے والی سردی جو سارا دن ہی رہے، تھوڑے تھوڑے پانی کی تھوڑے وقفوں پر پیاس، سردی کی شیش میں دھمکس کرتا ہے کہ خون کی نالیاں برف کی طرح ٹھنڈی ہیں اور پیاس نہ ہو۔ گرمی کی شیش میں محسوس کرے کہ اس کی نالیوں میں ابٹا ہوا پانی بہ رہا ہے تھوڑے وقفے پر تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس۔ پسینے کی شیش میں زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس۔ کونین کے غلط استعمال کے لئے جب بخار کی تینوں شیمین صاف نہ ہوں تو یہ دوائی مفید ہے۔

**لوئیٹورم پورٹ**۔ بھڑوں میں دریں جیسے کہ ٹوٹی ہوئی ہوں متلی اور تھے جب ٹھنڈا گزر جاتا ہے۔ مگر سے ٹھنڈا شروع اور تمام حصوں کی طرف جاتے۔ ٹھنڈا جو بھڑی مگر سے شروع ہو جو حرکت کرنے پر پانی پینے اور کپڑے اتارنے پر زیادہ ہو۔ ٹھنڈا بند ہونے پر متلی زیادہ ہو اور مریض کڑوا پانی والا مواد خارج کرتا ہے۔ گرمی کے دوران شدید پیاس۔ اکثر کیسوں میں پسینہ آتا ہے۔ کڑوے ذائقے کے ساتھ زبان پر گارھی۔ کھڑپی پر داڑ۔

**نیٹرم میور**۔ لیکن دار۔ تھوڑے لگنے جیسا سرد درد اور شدید پیاس۔ جو مریض کو دوبارہ دورہ ہونے کی خبر دیتا ہے۔ لمبے۔ شدید سخت کپکپانے والی سردی جس کے ساتھ پیاس جو مریض ڈرتا ہے بے خبر ہوتی

مواد کی تہ سردی کے دوران اور سردی میں۔ ہر بخار بہت زیادہ پسینہ کے ساتھ ختم ہو۔ ۱۱۰ اور ۱۱۱ بجے صبح دُور ہو۔ اس دوائی کی یہ نمایاں اور مرغی سے لگتی جانے والی ہے۔ سردی انگلیوں۔ پنجوں اور کمر سے شروع ہو کر گھٹنوں رہے۔ انگلیوں کے سرے اور ہونٹ نیلے ہوں۔ گرمی کافی دیر تک رہے اور سردی کے ساتھ بڑھے جو ناقابل برداشت ہو جائے۔ اور اکثر بد بوٹی یا بد بوٹی جی ہو سکتی ہے۔ چہرہ زردی یا رمل مجبوراً تلی اور جگر بڑھے۔ ہونٹوں پر پھالے۔

پلسٹیللا۔ معدہ کی تھوڑی سی گر گر بڑھے بخار کا حملہ ہو جائے کڑوا، ذائقہ یا کھٹی بلغم کی تہ یا مغزوی تہ حملہ کے دوران پیاس نہ ہو یا گرمی مرت بخار کی گرم بیج پر ہو۔ شام کے وقت حملے ہوں۔

برائی، ویسا۔ جب معدہ خراب ہو یا معدہ کی خرابیاں۔ ڈکار۔ منہ کا ذائقہ کڑوا۔ زبان پر فخر قبض یا اہمال۔ جمائیاں لے۔ بخار کے دوران پہلوؤں میں سونیاں چھتی ہوئی محسوس ہوں۔ پیاس بہت زیادہ یا سردی سے پہلے گرمی محسوس ہو ٹھنڈی حالت میں سرخ رخسار۔

جیسا سیم۔ جب سردی ریڑھ کی ہڈی تک جائے یا پاؤں سے شروع ہو۔ گردن کی گڈی میں سردی دن کے دوپہر کے وقت سردی لگے۔ اونگھ۔ لاپرواہی اور چکر۔ پیاس نہ ہو۔ پنجوں کیلے خاص طور پر مفید ہے۔

وتھیا۔ ۱۱۱ بجے صبح سردی سردی کے دوران ٹھنڈے برت جیسے پانی کی پیاس۔ بخار کے ساتھ پیاس نہ ہو۔ تمام رات شدید پسینہ۔ پسینہ کے دوران شدید سردی۔

رسٹاکس۔ ٹھنڈی بیج میں ٹھنڈا احساس اور بخار کی بیج میں گرمی کا احساس جو خون کی نالیوں میں چھید کرتی معلوم ہو۔ خشک زبان۔ سردی سے پہلے خشک کھانسی۔ ماتھے اور آنکھوں میں جلن منہ زردار۔ بے چینی جس کو حرکت سے افادہ ہو۔ پانی جیسے زرد پاخانے۔ زبان کی نوک نکونی۔ سردی پہلو میں سے یا کندھوں کے درمیان میں سے شروع ہو۔

ایپس میل۔ اچانک اور شدید تہ، سردی کے ہمراہ بخار شام کے وقت ۱۶ اور ۷ بجے کے درمیان۔ ٹھنڈھاتی اور بیٹ سے شروع ہو۔ چھاتی پر وزن کا احساس۔ جلد خشک اور گرم۔ جلن اور چھاتی پر دباؤ۔ نمایاں علامات ہیں۔ اور گلی تنفس خطرناک ہے

سیدرن - گھڑی کی طرح مقررہ وقت پر بخار لوٹ آئے۔

مینا تھیں۔ بخار جس میں دیر تک سردی محسوس ہوتا، ہاتھ اور پاؤں ہونے کی طرح ٹھنڈے  
۲۰۰ یا ۱۰۰ طاقت میں دیکھئے۔

فیرم آرینیکم - لیبریا، تلی اور جگر کے بڑھنے کے ساتھ۔ یہ مریض کیس کو ٹھیک کرتی ہے ۶ میں دیکھئے  
مکسوامیکا - انگلیوں اور جگر کا ٹھنڈے کے ساتھ شدید۔ دیر تک کا پینا۔ خاص طور پر ہڈیوں اور  
انگوٹھوں کے سردی کا ٹھنڈے لپکپانا۔ لپکپا ہٹ کے دوران میں پیاس نہ ہو اور بخار کی حالت میں شدید  
پیاس۔ سر چکرائے جیسے کہ شراب پی لکھی ہو۔ پیٹ اور نینالیوں کے ٹپھوں میں امنین۔

دریرم ایلیئم - صبح کے وقت شدید ٹھنڈک اور بہت زیادہ پسینے کے ساتھ بخار آئے جو بریض  
کو کمزور کر دے اور لاعلمی کر دے۔ بازو بہت ٹھنڈے ہوں یعنی مردوں کی طرح ٹھنڈے بازو۔  
ملیریا آف - یہ ایک نوسوڑ ہے۔ مریض کیسوں میں یہ ادنیٰ طاقت میں دی جانی چاہئے یا جب  
اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔ یہ علاج کو مکمل بھی کرتی ہے مستقل دروں جو بخار  
کے اترنے کے باوجود قائم رہتی ہیں اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

کیلیدیم - ہمیشہ بخار کے دورے کے دوران سوجاتا ہے اور بخار کے اترنے کے باوجود قائم رہتی  
ہیں اور بخار اترنے پر جاگ جاتا ہے۔

نیکسیٹھس - ملیریا بخار صغریٰ تھے۔ قبض۔ معدہ میں جلن۔ متلی شدید پیاس۔ سردی استغائی  
سوجن کے ساتھ ہو۔

سائیکس - ٹھنڈے پہلے پیاس۔ سردی دوران جوڑوں میں درد، کھینچاؤ جیسے کہ بندھنی ٹٹے  
شدید طور پر سکڑ گئے ہوں۔ ٹانگیں پھیلائی نہ جا سکیں۔ پانی پینے سے کھانسی یا سردی میں اضافہ  
ہوتا ہے یا دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

## چیچک

برائی اونیا۔ چیچک کے لئے شاندار دوائی ہے یہ ۲ طاقت میں دی جائے۔  
یہ مرض کو ختم کر دیتی ہے اور یقیناً مرض کا دوران کم کر دیتی ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی تکلیف کو روکتی ہے  
جو کہ عام تکلیف ہو جاتی ہے۔

سلیشیا۔ چیچک کے بعد کھانسی کے لئے یہ دوائی دی جاتی ہے۔  
 پلیسٹیللا۔ یہ دوائی مرض کی ابتدائی شیع کے لئے مفید ہے۔ نکام اور بہت زیادہ آنسو نہیں۔  
 جیلسمیم۔ جب بعض ادنگے اور لاپرواہ ہو۔ چہرہ سوجا ہوا اور سرخ پیاس نہ ہو۔ بعض بھلے لوگ لیکن  
 نرم اور دھیمی ہو۔

ڈرومیلر۔ چیچک کے دوران اور بعد تھکنی کھانسی۔  
 ایپیس۔ چیچک کے دوران یا چیچک کے دب جانے کی وجہ سے دم دماغ۔ مریض تکلیف دہانی کی وجہ سے  
 اچانک چھینٹ مارے۔

کالی بائی۔ پلیسٹیللا میں سادہ نزلہ کی بجائے قرنیہ پر سپ دار پھنسیاں بن جائیں۔ تکلیف کی وجہ سے  
 گلا سوجا ہوا گلے سے لے کر کان تک نکام کی وجہ سے بہوین۔

میلنڈریم۔ چیچک کے لئے حفظ القدم کے طور پر ۲x میں ہر منہ میں ایک غوراک دیکھے۔  
 یوفرنیزیا۔ آنکھوں اور ناک کی لمبی جھلیوں کی سوزش۔ ناک سے سادہ پانی بہنے کے ساتھ جھینکیں۔  
 اور آنکھوں سے غرا شذر پانی ہے۔ یہ چیچک کو سادہ قسم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جھینسیوں کو باہر نکال  
 دیتی ہے۔ بخار کو کٹر دل کرتی ہے اور کھانسی سے نجات دلاتی ہے۔

آرسینکیم الیم۔ جب بہت زیادہ کمزوری ہو، تھوڑی تھوڑی مقدار میں تھوڑے وقفہ پر پانی کی پیاس۔  
 بے چینی۔ سبز اسپہال جو اومی رات کو زیادہ ہوں۔

ایلیمنٹھنس۔ چیچک کو دبانے کی شاندار دوائی ہے۔ یہ چیچک کو بننے پر دم دماغ کے لئے مفید ہے۔  
 مواد کے اخراج کی وجہ سے بیہوشی دم دہوشی۔ گرمی دانے اچانک غائب ہو جائیں یا ظاہر ہوں۔

## کینٹھرے۔

بیسلاڈونا۔ کینٹھرے کیلئے شاندار دوائی ہے۔ یہ مرکب آئیڈو آئیڈ ۲۰x کے ساتھ اول بدل  
 کر دی جاسکتی ہے۔ دونوں ادویات ہر نصف گھنٹہ بعد اول بدل کر دی جائیں۔  
 فائبرولاکا۔ اگر مندرجہ ذیل ادویات نکام ہو جائیں تو یہ دی جائے اور جب گوشت اور میلد زرد ہو۔

پلسٹیلٹا۔ جب کان ملوث ہو اور درد بہت شدید ہو۔ درد کو گری سے افادہ ہو۔ جب کپٹیرے  
حصیوں اور پستانوں کو متاثر کریں اور سوزش نذرہ ہوں۔

ایرومینٹ۔ جب کپٹیرے خستے اور پستانوں کو متاثر کریں اور پلسٹیلٹا ناکام ہو جائے۔  
پروٹیمینٹیم۔ یہ ایک نو سوڈ ہے اور کپٹیرے کیلئے حفظ ماتقدم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے  
یہ ۲۰۰ ملٹات میں دی جاتی ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ دو یا تین ہفتے دی جاتی ہے بطور حفظ ماتقدم  
یہ بطور ٹھیک کرنے والی دوائی کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسری ادویات کے ہمراہ دی جانی چاہیے  
ایسی حالت میں اسکی ایک خوراک دی جائے باقی تمام ادویات کو روک کر۔

پائیلوکارپٹیم۔ بطور حفظ ماتقدم کے شاندار دوائی ہے۔ یہ دن میں دو دفعہ ایک ہفتہ تک دی جائے۔  
طاعون۔ پیلگ۔

اگنیشیا۔ بطور حفظ ماتقدم اور علاج کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ نیکوچرمی دی جائے ایک  
طرہ فی خوراک۔ دی جائے۔ اچھے نتائج دکھاتی ہے۔

اوپر کیولینا۔ جب حمل کے خدود بڑھ جائیں اور سخت ہو جائیں پھر سے اور پھیلاں بخار  
کے ساتھ ہے جینی۔ زیادہ لیون اور نڈیان بکنا۔

ٹیرنٹولا کیو بیٹیر۔ متعفن اور نرم ملی حالتوں میں بچھڑے بہت زیادہ نوشی اور درد کیساتھ  
آرمینک۔ اسہال کے ہمراہ شدید کمزوری۔

کروٹیلس آپریج۔ دائیں طرف تکلیف ہوں۔ خون بہنے کا رجحان۔ مریض ان علامت کیساتھ سوتا ہے۔  
پائیر و جینم۔ شدید جینی کے ہمراہ متعفن مالت۔ بہت ہی بلو دار۔ انخراجات خلاء اسہال  
ہوں۔ تے۔ پسینہ یا سانس۔ متاثرہ جگہوں پر شدید درد اور جلن ہو۔

رٹاکس۔ ٹائیفاؤد بخار کے ساتھ۔ نڈیان اور زبردے ہو جانے کا احساس اور خوف ہو۔  
بیٹیسینم (پلیگنیم) بیماری کے دوران بطور مل ایجنز دوائی کے دی جائے۔

سیلاڈونا۔ مرض کے ابتدائی دور میں جب حاد نڈیان خشک حملی اور گولی لگے جیسی درد کے ساتھ  
بخار۔ چہرہ اور آنکھیں چمکدار۔

لیکس۔ شدید بے چینی اور کمزوری۔ تمام جسم پڑکھن۔ آنکھیں زرد۔  
 نا جا۔ ہندوستان اور پاکستان میں ہلیک کے لئے مفید دوائی بتائی جاتی ہے۔ اور لیکس کی جگہ دی جاتی ہے۔  
 فاسفورس۔ جب غریبہ کے ہمراہ ہلیک ہو۔

ہائیدروکسیٹک۔ حالتِ نرس میں مفید ہے۔  
 تھو جا۔ دردِ حیا۔ دردِ والے۔ بدبودار بھڑے یا پھنسیاں۔ گہری سوجی ہوئی جگر پر خاص طور پر ہائیدروکسیٹک  
 مریضوں کے لئے بہت مفید ہے۔

ساراسینیا۔ چیچک کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ کسی بھی بیج میں دی جاسکتی ہے۔ یہ مرنے کے بغیر  
 دوا لینے ہی کو ٹھیک نہیں کرتی۔ بلکہ گڑھے پڑنے کو بھی روک دیتی ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بطور  
 حفظہ مقدم اور شفا دینے والی کالامیا ہے۔ دوائی ہے۔

دریٹم ورائیڈ۔ نفخ بھری ہوئی اور تیز سر درد۔ سر کے پھلی طرف زیادہ پسینے کے ساتھ بخار۔  
 سرگرم اور اٹھ پاؤں ٹھنڈے۔

میلنڈریٹم۔ نفخ بھری ہوئی اور تیز سر درد۔ یہ دوائی چیچک کے ایک اور حفظہ مقدم کے طور پر  
 استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ ٹیکوں کے اثرات بد۔ اگر ٹیکوں کے ساتھ دی جائے تو ٹیکے اثر  
 نہ کریں۔

مرکیورس۔ یہ اس وقت دی جاتی ہے جب خدود خاص طور پر کان کے نیچے کے خدود ملوث ہوں۔  
 بہت زیادہ بخشک اور بزر بلغم والے۔ پانخانے والی نمایاں علامات ہوں۔ یہ گڑھے بننے کو روک دیتی ہے  
 کیویریم الیکیم۔ چیچک تیز نفخ کے ساتھ۔ چھاتی میں اینٹھن وار درد۔ مشکل سے ناس لے  
 کمزوری۔ بھوک نہ ہونا۔ چہرہ سرخ اور سوجا ہوا۔ بدحواس۔ پندلیوں میں اینٹھن۔ مختلف جہامات  
 کے چھوڑے چھنسیاں۔

بیلادونا۔ ٹیکن دار سر درد۔ بنگنی رنگ کا چہرہ۔ خشک گلا۔ اچھلتی ہوئی پھر اور نفخ۔ بچہ جاتا  
 ہے کہ اس کا سر کپڑا جائے۔ اور کپڑے کے ساتھ سختی سے باندھ دیا جائے۔

فاسفورس۔ جب غریبہ کے بگاڑ یا خون بہنے کی علامات کے ساتھ یا دونوں حالتوں میں بھی پھر

سے چمکدار خون جو اتنا زیادہ ہو کہ غشی اور شدید کمزوری ہو۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں یا علاحدہ علاحدہ جھپک کے زخموں سے خون ہے۔

ہیما میلنس۔ خون بہنے والی جھپک بگڑا ہوا درے۔ سورھوں۔ ٹکن۔ اس کے مستقیم اور اعضا حاصل سے خون ہے۔

ایسڈ ٹائٹرک۔ انٹروں سے خون ہے۔ ٹنک سے بہت زیادہ خون ہے۔ خون چمکدار اور گرم ہوتا ہے۔

میوٹریک ایسڈ۔ جھپک کی آخری سیج جہاں پسینہ بکثرت ہے اور مریض دل دھبے کی حالت میں ہو۔ بہت کمزور اور حالت نزع میں ہو۔ خون کا نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے مریض اپنے افعال پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔

لیکسس  
کروٹیلنس  
ایسپر سلفر

مرض کی گلی مٹری ہوئی حالت عام کمزوری کے ساتھ۔ مدہوشی اور غرقی نظام کا درہم برہم ہو جانا۔ یہ دوائی بیمار غمور دار اور چھوڑوں میں پیپ بننے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔

اہم علامات ہے جو اکثر ٹائیفائیڈ کے کیس میں ہوتا ہے۔


لیکسس۔ یہ پیشینیا جیسی علامات رکھتی ہے سوائے اس سے کہ مریض کی حالت تیز کے

بعد زیادہ بری ہو جاتی ہے اور بگڑے رنگ کے خون بہنے کا حجاب ہوتا ہے۔ وہ پھوٹے جانے سے حساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر گردن اور کمر پر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ دماغ کے فالج کے نشانات جیسے کہ پچھلے جڑے کا گر جانا۔ بدبودار اخراجات۔ دھیمے انداز میں بڑانے کا ہڈیاں خشک کپنے والی زبان۔

ایسڈ میوٹریک۔ یہ دوائی آنت سے خون بہنے کے لئے ہوتی ہے۔ بدبودار سانس۔ گندی یا گلی مٹری بو شدید کمزوری۔ پانسانے متوازن بیہوشی میں آئیں۔ جڑا نیچے ٹک جائے حقیقت میں مریض قبر کے کنارے ہو یعنی قریب المرگ ہو۔ زبان خشک منہ میں کھڑکھڑاتی ہے۔ نبض وقفہ دار۔

سفلیٹنم۔ ٹائیفائیڈ بخار کے بعد جب مریض آتشک کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہو۔ سفلیٹنم اونچی طاقت میں یعنی ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ میں دیجئے۔

ابنتیجیم - ٹائیفاؤڈ میں بے خوابی - دماغ کی جڑیں اجتماع خون -  
 اوپیم - ناجی حالت، گہرا سرخ چہرہ اور خراٹے دار سانس -  
 کلکیر یا کلاب - آنکھیں بند کرنے پر چیزیں اور انسان دیکھتا ہے - آنکھیں کھولنے  
 سیراڈونا - اپر وہ غائب ہو جاتیں -  
 الیڈ فاس - ٹائیفاؤڈ بخار کے بعد کمزوری اور لائمری -  
 کیسٹوریم - ٹائیفاؤڈ بخار کے بعد کمزوری کیساتھ جڑیں میں کمزور کرنا لایسینہ خاص طور پر بھرتوں میں -  
 کیو پرم پیٹ - بہوشی کے ساتھ ٹائیفاؤڈ بخار - بعض معلوم نہ دے - پشیا کا گھٹ جانا یا دب  
 جانا - پیٹ دھول کی طرح پھولا ہوا یا تنہا ہوا - بے چینی - فرش پر کی روز اور دھڑلے شدید کمزوری  
 اور اعصابی برائحتگی - ہر ۱۲ گھنٹے کے ۲۰ طاقت میں رتبے حتیٰ کہ افاتہ شروع ہو جائے -  
 سٹرامونیم - منہ سے خون سیاہ بہنے کے ساتھ ٹائیفاؤڈ بخار - زبان خشک - اتنی سوچی ہوئی  
 کہ نہ بھر جائے - نقشے دار سرخ جیسے گروٹ کا کڑا -  
 ٹیپوٹھنا - ہمار چکدار سرخ زبان شدید بوجھ کے ہمراہ -  
 کروٹن ٹیکسیم - اسہال کے ساتھ درد قریح کی خرابیوں کے ہمراہ  
 کالی فاس - خشک بھوری زبان - دانتوں پر خشک پرت - ذہنی دباؤ - زبان گندے بدبودار جاتا -  
 ویکسینیم یا ٹیر ٹیلیس - زرد پتلے پانانے بہت زیادہ پیاس اور ٹھنڈ محسوس ہو -



پندرہواں  
۱۵

باب



## بیشی مرض

انہم کرود۔ شام کے وقت تیز لہلوں سے۔ گرمی سے شراب سے۔ پانی سے دھوئے اور نہانے سے مرض میں زیادتی ہو۔

سیسما۔ دوپہر سے پہلے اور شام۔ دھونے سے نمی سے۔ بائیں جانب۔ پسینے کے بعد ٹھنڈی ہوا اور طوفان سے پہلے۔ ہمدردی ظاہر کرنے پر آنکھیں بند کرنے پر مرض میں زیادتی ہو۔

نکسومیکا۔ صبح کے وقت۔ ذہنی اکسہٹ زیادہ۔ ذہنی کام۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹے پر شور سے۔ گرم مصالحوں۔ ہیجان خیز۔ مسکن۔ خشک موسم۔ کھلی ہوا۔ ٹھنڈا گیلی جگہ پر بیٹھنے سے۔ تباہ کنوشی سے۔ بستر میں مڑنے پر۔ ٹینٹ اور دوسری دوائیوں سے۔ خوشبودار۔

کرودی بناتی گولیوں سے۔ بیٹھنے رہنے کی عادت سے مرض میں زیادتی ہو۔ آریسنگلم الیم۔ نمدار موسم۔ شام کو۔ آدھی رات کو یا اس کے بعد۔ ٹھنڈے مشروبات یا ٹھنڈی غذا سے۔ ساحل سندھ۔ اندھیرے۔ پھلوں کے کھانے سے ہیپیکس آئیں۔

برائی اوتیا۔ حرکت سے۔ گرمی سے۔ صبح کے وقت۔ کھانا کھانے سے۔ گرم موسم میں۔ زیادہ کام کرنے۔ چھوٹے۔ ناگوار اور کڑھٹ آواز سے۔ بغیر تکلیف والی طرف لیٹنے سے مرض میں زیادتی ہو۔ چامائسنہ۔ تھوڑا سے چھوٹے سے۔ ہوا کے بھونکوں سے۔ ہر دوسرے دن رطوبات زندگی بخش رطوبات، مثلاً خون وغیرہ بہنے سے یا خارج ہو جانا۔ اسہال وغیرہ۔ رات کو بھل کھانے سے مرض میں زیادتی۔

کیومیلا۔ حرارت یا گرمی۔ کھلی ہوا۔ ہوا سے۔ رات کے وقت۔ بغیر درد والی طرف لیٹنے سے مرض میں زیادہ ہو۔

سٹس کینا ڈینس۔ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا لگنے سے۔ دماغی مشقت سے۔ جوش سے مرض میں زیادتی ہو۔

مرک سال۔ رات کے وقت یا آدھی رات کے وقت۔ گیلے۔ نمدار موسم میں دائیں جانب لیٹنے

سے۔ پسینہ آنے پر گرم کمرے میں اور گرم بستر مرض میں زیادہ ہو۔ درجہ حرارت کی شدت سے زیادتی مرض۔ گرم اور ٹھنڈے موسم میں زیادتی ہو۔

کاسٹیکم۔ ٹھنڈی ہواؤں سے خشک۔ صاف موسم میں ٹھنڈی ہوا سے۔ گاڑی کی حرکت سے زیادتی مرض ہو۔

کالی کارب۔ جماعت کے بعد ٹھنڈے موسم میں۔ شوربے اور کافی سے صبح کے تین بجے کے قریب بائیں اور لیٹنے سے پرورد۔

سورائیم۔ کافی سے زیادتی ہوتی ہے۔ یہ دوائی لیتے وقت کافی نہیں لینی چاہیے موسم کی تبدیلی سے۔ گرم سورج کی دھوپ میں۔ ٹھنڈے۔ بہت معمولی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے درمیان میں زیادتی ہو جاتی ہو۔

سیلیشیا۔ نئے اور پرے چار چاند۔ صبح کے وقت۔ دھونے سے جھینس کے دوران۔ کپڑے اتارنے پر لیٹنے سے۔ نمی سے بائیں جانب لیٹنے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ ہمدردی ظاہر کرنے سے امراض میں زیادتی ہوتی ہو۔

زئکم میٹ۔ شراب پینے سے تمام قسم کی سکالیفٹ بڑھیں جو مریض کو مدہوش کر دے خواہ قحطی سی مقدار میں پی جائے۔

ایسڈ فاس۔ مشقت سے۔ اس کے ساتھ بولے جانے پر۔ رطوبات جسمانیہ کے اخراج سے غشی افعال کی زیادتی۔

فاسفورس۔ چھونے پر جسمانی یا ذہنی مشقت۔ بہت زیادہ روشنی۔ گرم کھانا یا گرم کھانا مشروبات موسم کی تبدیلی سے گرم میں موسم میں بھیگ جانے پر۔ شام کے وقت۔ بائیں جانب یا در دوالی طرف جانب لیٹنے سے۔ طوفان کے دوران۔ بیڑھیاں چڑھنے سے۔

لائسیمین۔ چلتے پانی کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے پر یا پانی اندر لیٹنے یا صحت بائعات کے متعلق سوچنے سے چندھیمانے والی یا منعکس شدہ روشنی۔ سورج کی گرمی۔ بیڑھا کھڑے ہونے سے یا ٹیک لگا کر کھڑا ہونے پر مرض میں زیادتی ہو۔

سٹر امونیم۔ اندھیرے کمرے۔ مایچی دگی میں چمکدار اور روشن اشیاء دیکھنے پر نیند کے بعد۔  
 ننگے پر مرض میں زیادتی ہو۔

کونیم۔ لیٹے پر بستر میں۔ پہلو بدلنے پر۔ بخرو کی زندگی (غیر شادی کے زندگی گزارنے پر) حیض سے  
 پہلے اور اس کے دوران زکام لگنے پر۔ جسمانی اور ذہنی مشقت پر۔ مرض میں زیادتی ہو۔  
 سلفر۔ آرام کرنے پر اور جب کھڑا ہو۔ بستر کی گرمی۔ دھونے پر۔ ہانے پر۔ صبح کے وقت الٹے  
 قبل از دوپہر۔

نیٹرم مہیور۔ شور سے۔ گانے سے۔ گرم کمرے میں۔ لیٹنے سے۔ ابھی قبل از دوپہر۔ سائل کنڈر  
 پر۔ ذہنی مشقت۔ مجددی ظاہر کرنے پر۔ گرمی اور بولنے پر مرض میں زیادتی ہو۔

لیکسس۔ نیند کے بعد یا سونے کے بعد۔ مریض کے سوتے وقت زیادتی مرض ہو۔ تکالیف جو  
 نیند کے دوران آئیں۔ پہلے بائیں جانب اور پھر دائیں جانب۔ موسم بہار میں۔ گرم پانی سے نہانے پر  
 گرم مشروبات۔ آنکھیں بند کرنے پر۔ تنگ کپڑوں سے حیض کے بند ہونے پر تکالیف میں زیادتی ہو۔  
 ڈکالار۔ رات کے وقت۔ مام طور پھینڈے۔ نندار موسم برسات میں تکالیف میں زیادتی ہو۔  
 ایرانیاد آئیڈ۔ نندار موسم میں زیادتی۔ سر پہ کے بعد اور ادھی کے وقت مرض میں زیادتی ہو۔  
 نیٹرم سلف۔ گانے جو عورت کو غلگین کر دیں۔ بائیں جانب لیٹنے سے۔ نندار موسم یا نندار جگہ  
 پر رہائش۔ طوفان سے زیادتی ہو۔

پلسٹیللا۔ گرمی سے۔ چھیلی خوراک سے جیسے کر پیٹری۔ کھانا کھانے کے بعد شام کے قریب۔  
 گرم کمرہ۔ بائیں جانب لیٹنے سے یا بغیر تکلیف والی طرف لیٹنے سے۔ جب پاؤں نیچے لٹکائے۔ تلوون  
 مزاج (گھڑی میں توڑ گھڑی میں ماشہ) جگہ تبدیل دالی تکالیف۔ حیض سے پہلے اور حیض کے دوران۔  
 لیڈم پال۔ بچنے کی طرف حرکت کرنے سے زیادتی ہو۔

سینی کوللا۔ رات کے وقت اور بستر کی گرمی اور بستر کی طرف حرکت کرنے پر زیادتی ہو۔  
 امبر گریسا۔ دوسرے لوگوں کی موجودگی اور مکالمات یا بول چال سے علامات بڑھتی ہیں۔ گمانسنے  
 سے مرض بڑھتا ہے۔

نیٹرم آرمینیکم - ٹھنڈے مشروبات - ٹھنڈی خوراک - چربی پھل - دودھ - سوکھا گوشت - بکرے یا بقیہ لایکوپورڈیم - دائیں طرف - دائیں طرف سے - اوپر نیچے - ۴ بجے سے ۸ بجے تک شام یا بعد دہر - گرم چرس لگانے سے سوائے گھلے اور معدہ کے جو گرم مشروبات سے افاتہ پذیر ہوتے ہیں - احساس جرم کی وجہ سے ناپائشی مرض ہوتی ہے ۔

الیومنا۔ ایک شراب برکہ مرچ اور شراب والے مشروبات۔ دقاً فوقاً۔ سہ پہر۔ آلودوں سے صبح کے وقت جاتے پر۔ گرم کرے میں زیادتی ہو۔

ایک کینم - صبح کے وقت - ایک دن میں اور دوسرے دن شام کے وقت زیادتی - جلد جلد بولنے والی  
 (گھڑی میں تو رگڑی میں ماشہ) متواتر تبدیل ہونے والی تکلیف کی زیادتی  
 کر کر کس شایعہ!۔ لیٹنے سے زیادتی - گرم موسم - گرم کمرے - جمع کے وقت - روزہ رکھنے سے - صبح کے  
 اٹنے سے پہلے کسی چیز کو جہ کر دینے -

سیلا ڈونگا۔ جھونے پر شور یا کڑت آواز۔ سخت جھونکا۔ شام کے وقت لیٹنے سے بال کٹوانے پر پٹیاں جو اس پر پلے۔ ٹھنڈی خشک ہواؤں سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ تھوڑے سے جھونکے سے۔ پارے سے جھونکا۔ درد والی جگہ پر لیٹنے سے زیادتی۔

سٹیفنگیر یا - غصے سے زیادتی۔ برہم ہونے پر علم سے جذبات کے مجروح ہونے پر۔ رطوبات زندگی کی کمی سے۔ سلق۔ جنسی بے اعتدالیوں سے۔ تباہ کنوشی۔ متاثرہ حصہ کو ذرا سا بچھونے پر۔ دوسروں کے غلط کاموں کی وجہ سے زیادتی۔

کاروبار و تاج - شام کے وقت رات کو کھلی ہوا میں ٹھنڈ میں چربی خوراک سے - مکھن - میٹیری - کافی -  
دودھ - گرم بنڈار موسم اور پیشاب سے زیادتی -

کالو سنکھ - غصے اور برہم ہونے پر - زیادتی مرض -

لورکس۔ بچے کی طرف حرکت۔ شور۔ تباہ کنوشی۔ گرم موسم حیض کے بعد۔

آگیشیا۔ بُری خبر سنکر۔ مجمع کے وقت کھلی ہوا میں۔ کھانا کھانے کے بعد۔ کان۔ تباکو نوشی۔ مائع  
یہ دنی گری اور شور ہے۔

کالچیکم - سورج غروب ہونے سے سورج نکلے تک - حرکت سے - نیند نہ آنے خوراک کی بوسے  
شام کے وقت ذہنی اور شور۔

کاکولس - کھانا کھانے کے بعد - نیند نہ آنے سے - گھلی ہوا میں - تباہ کنوشی سے - ساری کرنے سے  
تبرکی سے چھوٹنے سے - شور سے - حرکت آواز سے - شام کے وقت جیض کے دوران - جذبات کے  
درہم برہم ہونے پر۔

کارلو ایمیلیس - شیو کرنے کے بعد حیوانی رطوبات کے منافع ہونے پر  
رستاکس - رات کے وقت - نیند کے دوران میں - مندر بارش کا موسم اور بارش کے بعد - آرام کے  
دوران - جب کمر کے بل یا دائیں طرف لیٹے -  
ریوڈونڈرون - طوفان سے پہلے - کھردرے موسم میں تمام علامات واپس لوٹ آئیں - رات کو صبح  
کے قریب زیادہ ہوں -

کوکا - بلندی سے پہنچے اترنے پر۔  
کلکیر یا فاس - مندر ٹھنڈا موسم لگنے پر برت پگھلنے پر۔  
فیرم میٹ - آرام کے دوران تکالیف کی زیادتی ہو - تنگی تنفس اور کمزوری بھی آرام کے  
وقت زیادہ ہو - آہستہ روی سے اتفاق لیکن کوئی بھی مشقت مرض کو زیادہ ہو جائے۔  
میگنیشیا پور - سونے کیلئے آنکھیں بند کرنے پر زیادہ - آنکھیں بند کرنے پر آئندہ پریشان  
ہو جائے - بے چینی جھلپلا پن کردہ اور پرکے کپڑوں کو درمیانیک دے - لباس سے یا کوئی اور  
کام کرے - نمکین چیزوں اور سمندری ہوا میں سانس لینے سے زیادتی -  
میگنیشیا فاس - دائیں طرف ٹھنڈے یا رات کو چھوٹنے سے زیادتی -  
جیلیمیم - مندر موسم میں زیادتی - دھند - طوفان سے پہلے - جذبات - جوش - بری خبر -  
تباہ کنوشی - جب اپنی تکالیف کے متعلق سوچے تو زیادہ ہو -  
ڈالسکوریلا - شام اور رات کو لیٹنے پر اور دہلے ہونے پر مرض میں زیادتی ہو -  
برومیمیم - شام سے آدھی رات تک کو - جب گرم کمرے میں بیٹھا ہو - گرم مندر موسم جب آرام کرے  
اور بائیں جانب لیٹے -

سناٹا کھین۔ کھلی ہوا میں۔ شام کو بیٹھے ہوئے۔ کھڑے ہونے پر۔ ٹھنڈے پانی میں زیادتی ہو۔  
 اینا کارڈیم۔ گرم پانی لگانے پر زیادتی۔

کیو پریم میٹ۔ حیض سے پہلے۔ قے کرنے پر اور پھوٹنے پر زیادتی ہو۔  
 ایپس میل۔ گرمی کسی بھی حالت میں ہوا سے زیادتی۔ جھونے پر۔ دباؤ۔ سر پہرے کے بعد۔ سونے  
 کے بعد۔ بند اور گرم کمرے میں زیادتی ہو۔

آر جنٹم نائیر طحیم۔ گرمی خواہ کسی بھی حالت میں اس سے زیادتی۔ رات کے وقت ٹھنڈی خوراک  
 سے مٹھائیوں سے کھانا کھانے کے بعد۔ حیض کے دوران۔ جذبات سے بائیں جانب۔

## الرجی

دیکھئے سمندری سفر میں جی کا مسئلہ۔ ہوائی سفر میں جی کا مسئلہ۔  
 الرجی کسی چیز سے غیر معمولی اور بالغ آئینہ حد تک مخصوص طور پر اثر ہونے کی ایک کیفیت ہے  
 جو اکثریت کے لئے اسی مقدار اور انہی حالات میں بے ضرر ہو جاتا ہے۔ پھلی۔ بیریز۔ انڈھے۔ سفید روٹی  
 دیگر اشیائے خوردنی سے جو علامات مثلاً چھپاکی۔ متلی۔ قے۔ دردیں۔ جلاب۔ آدھے سر  
 کا درد۔ درد اور دوسری قسم کی بہت سی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ جو دوسرے بہت سے لوگوں  
 کے لئے موافق ہوں۔ الرجی کی علامات یا زہریلے اثرات پیدا کر دے۔ یہ لوگ اس خاص قسم  
 کی خوراک یا دوائی کے لئے حساسیت رکھتے ہوں۔

یہ دودھ۔ دودھ کی مصنوعات انڈوں۔ سارڈائن پھلی۔ جانوروں  
 کی پکائی ہوئی خوراک بالوں کو رنگنے والے رنگوں وغیرہ سے الرجی کے لئے  
 جوڑی کی دوائی ہے۔ میوہ کوکونیم سب سے ۲۰۰ طاقت میں دی جائے اگر خوراک ۲ سے جوہر نسبتہ ایک  
 خوراک دینے پر کوئی اتفاق نہ ہو تو سلفر ۲۰۰ ہر نسبتہ ایک خوراک دیجئے۔ اگر یہ طاقت بھی مطلوبہ کام نہ کرے  
 تو ۱۰۰ طاقت کی ایک خوراک دینے پر یا دودھ خوراک ہر نسبتہ روز بعد دیجئے۔ سلفر کے لئے نیچے دی گئی  
 علامات بھی دیکھئے۔

تھامرو دین۔ یہ ناک کی الرجک سوزش کے لئے شاندار دوائی ہے۔ جس میں شدید چھپکیں  
 بلغھی جھلیوں کی سوزش اور استسقاء ظاہری سبب کے بغیر تنگی تنفس یا غیر واضح علامات کی وجہ سے  
 تنگی تنفس۔ الرجک دہر شدید تنگی تنفس کے ساتھ۔ چھپکی۔ اگزیمیا۔ پکر۔ سر درد۔ جی ستلانے  
 اعصابی دردیں وغیرہ جب الرجی کی وجہ سے ہوں۔

صور اینٹیم۔ گندم کے لئے الرجی جو اگزیمیا کا سبب بنے۔ یہ یوریکولینیم کے لئے مضر ہے جہاں  
 یوریکولینیم ناکام ہو جائے یا جزوی طور پر ناکام دے جب سلفر ناکام ہو جائے تو یہ دوائی ناکام  
 ہو جائے تو یہ دوائی استعمال کرائی جائے۔

ایچیم گریو۔ ایک قسم کی اجوائن کھانے سے الرجی جس کی وجہ سے خارش پیدا ہو جائے۔ ۲۰۰  
 ۱۰۰۰ ہفتہ یا پندرہ ہفتہ کے بعد دیں۔

فرنگیہ وادیکا۔ سٹراپیریز سے الرجی جو چھپاکی پیدا کرے۔ بعض اوقات سانس لینے میں قوت  
 ہو جیسے کہ جھاتی پر وزن ہو۔

پلسٹیللا۔ کاڈمچلی کے جگر کے تیل سے الرجی۔ چربی سے سنگترے کے رس سے۔  
 پروٹین یا لحمیات والی خوراک سے حساس۔ تیلوں۔ چربیوں سے صفراوی دی ہو جائے۔ زکام  
 لگنے کا رجحان اور آسانی سے ٹھک جانا۔

تھوجا۔ پیاز سے الرجی جو اس کے لئے زہریلی طرح ہوں۔  
 لائیکوپوڈیم۔ کستورہ مچھلی سے الرجی۔ اس کے لئے کستورہ مچھلی کا استعمال زہریلی طرح ہو۔  
 میکرم آف۔ کھانڈیا گنے سے الرجی۔

ارٹیکا لیورینس۔ دودھ سے الرجی جو چھپاکی پیدا کر دے۔  
 نیٹرم میور۔ انڈوں۔ نشاستے۔ دودھ۔ شہد۔ ریگ۔ میٹھے زرد دانوں۔ پیاز۔  
 گندم۔ جانوروں کی خوراک وغیرہ سے الرجی۔

فیرم میٹ۔ انڈوں سے الرجی  
 سلفر۔ بڑوں اور چاکلیٹ سے الرجی۔ ایسے مریض کے بنار کا بی کا علاج جو کپڑوں والا

سرمائے استعمال کرتا ہے۔ بالوں کو رنگنے والے رنگ سے حساس جو اگر بیا پیدا۔ چکی ہوئی حیوانی خوراک سے الرجی۔ جب بالوں کو رنگنے سے رنگ کی الرجی سلفرے ٹھیک نہ ہو تو ٹیوبرکولینم ۲۰۰ x دیتے۔ آرنجنٹم ٹائیٹرکیم۔ تمام قسم کی الرجی کی سیاریاں جو جلد کے لئے بہت الفت یا جھٹ رکتی ہوں ٹانگی جھیلیاں۔ دوسرے حصے اور اعضاء خاص طور پر پچھڑے زیادہ جھٹ رکتے ہوں۔

## کمی مرض۔ مرض میں افاقہ

ٹمکس و امیکا۔ ہلکی نیند یا قیلولہ سے آفاقہ اگر ریوری کر لینے دی جائے۔ شام کے وقت سونے پر۔ آرام کرنے پر ہندار تر موسم میں شدید دباؤ سے۔ آرسینکیم البم۔ گرمی سے۔ سراور اٹھانے سے۔ گرم مشروبات۔ پسینہ۔ کندھے اور ہاتھاکر مکر کے بل لینے سے۔ دباؤ۔ آرام۔ ٹھنڈی چیزوں سے آفاقہ ہو۔ چائنا۔ آگے کی طرف جھکنے سے۔ سخت دباؤ۔ کھلی ہوا۔ گرمی سے آفاقہ ہو۔ برائی اونیا۔ تکلیف والی طرف لینے سے۔ دباؤ۔ آرام ٹھنڈی چیزوں سے آفاقہ ہو۔ کیومبلا۔ اٹھائے جانے پر (بچوں کو گود میں اٹھائے جانے پر) گرم تر موسم۔ پسینے کے آنے پر آفاقہ ہو۔

سٹس کیناڈینس۔ کھانا کھانے کے بعد آفاقہ۔ کاسٹیکم۔ ہندار۔ تر موسم۔ گرمی۔ بستر کی گرمی اور نہانے سے آفاقہ۔ کالی کارب۔ گرم موسم میں آفاقہ اگر چہ ہندار ہو۔ دن کے وقت ادھادھر حرکت کرنے پر بستر میں بیٹھنے پر آفاقہ ہو۔

سورائینم۔ گرمی سے آفاقہ۔ گرم کپڑوں سے آفاقہ گرم موسم میں بھی۔ سیلشیا۔ گرمی۔ سر کو پینے سے۔ گرمیوں کے موسم۔ تر یا ہندار موسم۔ ہندار گرم موسم میں۔ ایسڈ فاس۔ گرم رکھنے پر آفاقہ۔ پیشاب خراج کرنے پر آفاقہ۔ فاسفورس۔ اندھیرے میں۔ دائیں طرف لینے سے ٹھنڈی خوراک سے۔ ٹھنڈی کھلی ہوا۔

ٹھنڈے پانی سے دھونے سے۔ نیند سے افاقہ۔

سٹر امونیم۔ چمکدار روشنی سے۔ لوگوں کی موجودگی میں یعنی مجلس میں۔ گرمی سے افاقہ۔

کونیم۔ دھڑے رکھنے پر افاقہ۔ اندھیرے میں۔ بازوؤں کو پٹپٹکتے رہنے پر۔ حرکت اور دباؤ پاؤں  
گرمی پر رکھنے پر افاقہ۔

سلفر۔ خشک گرم موسم میں افاقہ۔ اندھیرے میں دائیں جانب لیٹنے سے متاثرہ بازوؤں کو اوپر  
اٹھانے پر افاقہ ہو۔

نیٹرم میور۔ کھلی ہوئی افاقہ۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے۔ کھانا باقاعدگی سے نہ کھانے  
پر۔ دائیں طرف لیٹنے پر۔ کمر دباؤ ڈالنے پر۔ تنگ کپڑے پہننے پر۔ ہمدردی کے اظہار پر افاقہ ہو۔

لیکس۔ اخراجات کے جاری ہونے پر مثلاً محض کے دوران۔ ٹھنڈی ہوا۔ ٹھکڑیوں کو کھول  
کر رکھنا پڑے۔ دغیرہ دغیرہ۔

ڈکامارا۔ ادھر ادھر حرکت کرنے یا ہٹنے پر۔ بیرونی گرمی پر افاقہ۔

ارانیڈائیڈ۔ بنا کو نوشی سے افاقہ ہو۔

پلسٹیللا۔ کھلی ہوئی افاقہ۔ کھڑکیاں کھلی رکھے۔ حرکت۔ ٹھنڈی چیزیں لگائے یا ٹھنڈے  
پانی سے دھونے پر نہانے پر۔ ٹھنڈی خوراک اور ٹھنڈے مشروبات پینے سے اگرچہ پیاس نہ ہو۔

آدھی رات سے سستی کر دوپہر ہو جائے۔ سر کو اونچا کر کے لیٹنے سے۔

لیڈم پال۔ ٹھنڈے پاؤں کو برف کی طرح ٹھنڈے پانی میں رکھنے پر افاقہ ہو۔

لایکوبوڈیم۔ حرکت سے افاقہ۔ آدھی رات کے بعد گرم خوراک اور گرم مشروبات۔ ٹھنڈا ہونے  
پر۔ کپڑے اتارنے پر۔

اگر کیس۔ نیند سے افاقہ ہو۔

کاربووکیج۔ ڈکاروں سے افاقہ۔ پکھل کرنے۔ ٹھنڈے افاقہ ہو۔

کالو شنتھس۔ ڈکاروں۔ آگے کی طرف جھکنے۔ سخت دباؤ۔ گرمی۔ سر کو آگے کی طرف جھکا کر لیٹنے سے۔

سیکل کار۔ ٹھنڈے۔ کپڑے اتارنے یا ہٹانے۔ ملنے۔ بازوؤں کو پھیلانے پر افاقہ ہو۔

ایو منا۔ کھلی ہوا میں افاتہ۔ ٹھنڈے پانی سے دھونے سے۔ شام کے وقت۔ ایک دن چھوڑ کر یعنی تیسرے دن۔ مندر موسم میں افاتہ ہو۔

انگیشیا۔ کھانا کھاتے وقت افاتہ۔ حالت بدلنے پر۔ ٹھوس چیز نگلنے پر۔ سخت دباؤ سے افاتہ۔  
رٹاکس۔ گرم خشک موسم میں بہتر۔ حرکت۔ چلنے پر۔ حالت کو بدلنے پر۔ مٹلے پر۔ گرم چیزیں لگانے پر۔ بازوؤں کو پھیلاتے پر درد کی وجہ سے بے چینی پر افاتہ ہو۔

آرٹیکا ایم۔ بے چینی یا پریشانی جس کو متواتر حرکت سے افاتہ ہو یا حالت تبدیل کرنے پر جو درد کی وجہ سے نہ بلکہ دکھن کی وجہ سے ہو۔

رہوڑو ڈنڈران۔ جب طوفان تعم جائے تو افاتہ ہو۔ گرمی اور کھانا کھانے سے افاتہ ہو۔

کوکا۔ شراب سے۔ سواری کرنے پر کھلی ہوا میں تیز حرکت کرنے پر افاتہ۔

گلگیر یا فاس۔ گرم خشک موسم میں۔ گرمیوں میں۔ خشک ماحول میں افاتہ۔

میگنیشیا فاس۔ گرمی سے افاتہ۔ آگے کی طرف بھگنے۔ دباؤ۔ گرڑنے سے ملنے سے افاتہ۔

جیلسیم۔ کثرت سے پیشاب آنے۔ آگے کی طرف بھگنے۔ کھلی ہوا میں۔ لگاتار حرکت۔ محکرات سے افاتہ ہو۔

کالچیکم۔ ٹیک لگا کر کھڑے ہونے پر افاتہ۔

ڈالسکوریہ۔ سید کھڑے ہونے پر۔ کھلی ہوا میں حرکت پر۔ دباؤ۔

برومیم۔ کسی بھی جرات سے افاتہ۔ درزش اور ساحل سمندر پر افاتہ ہو۔

جنگنس سنیرا۔ گرم ہونے پر افاتہ۔ درزش۔ کھرچنے۔ صبح سویرا اٹھنے پر افاتہ ہو۔

یوفوبیا لیتھہ۔ پسینے سے افاتہ۔ تیل لگانے اور بند کرے میں افاتہ ہو۔

ہیملو نیاس۔ کچھ نہ کچھ کرنے پر افاتہ (یعنی معروف اپنے پر افاتہ) ذہن کو دوسری طرف منحرف کرنا۔

سپائیجیلیا۔ سراو نچا کر کے دائیں طرف لیٹنے سے۔ سانس اندر لیجاتے وقت۔

سایکلمین۔ حیض کے دوران۔ ادھر ادھر حرکت کرنے پر۔ حصوں کو ملنے پر یا مالش کرنے پر۔

گرم کرہ اور لیموں کے پانی سے افاتہ ہو۔

اینا کارڈیم - کھانا کھانے سے - پہلوؤں پر لیٹنے سے ماش کرنے یا ملنے پر افاقہ -  
 کیو پر میٹ - پسینے کے دوران افاقہ - ٹھنڈا پانی پینے سے - نیند سے افاقہ ہو -  
 ایس ایم - کھلے ہوا میں آفاقہ - کپڑے اتارنے پر - ٹھنڈے پانی سے نہانے سے -  
 آر جینم ٹائیریکم - ڈکاروں سے افاقہ - تازہ ہوا - ٹھنڈے - دباؤ سے -  
 ہیپر سلفر - ندر موسم میں افاقہ - سر کو اوپر سے لیٹنے سے - گرمی سے - کھانا کھانے کے بعد -  
**خون کی قلت - اینمیا -**

فیرم ایسٹیٹ - سخت قسم کا قلت خون - یہ دوائی لوہے کے دوسرے مرکبات کی نسبت قلت خون کے لئے مخصوص ہے، ترجیحاً اسے استعمال کیا جائے۔ ۱- ایم یسی ایم طاقتوں میں دیکھائے۔  
 فیرم میٹ - وقفہ دار بخاروں کے بعد قلت خون میں - دماغ کی قلت خون یہ خوش ہونے والی طبیعت کے ساتھ - ان مریضوں میں قلت خون جو کسی وقت پُر خون تھے - اب زرد پاتھ پاؤں چھوٹے ہوئے ہوں - شدید زردی کے ساتھ قلت خون چہرہ پر اچانک آگ جیسے خون آئے - مریض چھوٹا ہوا اور استفادہ میں مبتلا - جلد زرد اور اس میں گڑھے پڑیں -  
 آر سنگم البم - شدید کمزوری اور پریشانی - استفادہ دل کی شدید و معرکہ کن - شدید پیاس اور معدہ میں سیمان کے ساتھ - دماغی قلت خون، ایلیریا کیوجہ یا کوئین کے زیادہ استعمال کیوجہ سے -  
 نزکم میٹ - مزمن دماغی قلت خون - فالجی حالت کے ساتھ -  
 فیرم فاس - سر میں شدید تکین دار دلا کھوٹری بہت حساس - دماغ خون سے پُر لیکن یہ پانی والا خون ہوتا ہے -

چینیم آر سینکم - نیند کے دوران کثرت سے پسینہ آئے اور کمزور کرنے والا ہو -  
 چائٹن - جب خون کے بہنے یا دیگر رطوبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے قلت ہو - دماغ میں قلت خون - سر درد کے ہمراہ اور کانوں میں گرج ہو -  
 فاسفورس - بہت زیادہ لمبی انفر دفی کی وجہ سے قلت خون - بھاتی کی تنگی اور دکھن کیساتھ

دل کی دھڑکن۔ دماغی قلتِ خون دماغ پر باد کی وجہ سے۔

نیٹرم میور۔ کم اور دیر سے بیض آنے کی وجہ سے قلتِ خون مزمن نکام۔ جب خون اور رطوبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے قلتِ خون ہو۔

پیکر کرالید۔ بڑھنے والا مملکت قلتِ خون۔

ایسٹیک لید۔ کمزوری کے ساتھ۔ لاغری۔ بھوک نہ رہنے۔ موردی دق۔ جلندار پائیں اور کثرت سے زرد و شیب کے ساتھ قلتِ خون۔

مینگنم۔ بہت ہی بگڑی ہوئی صحت۔ خون کا باسکل نہ ہونا۔ موی اور مر لیٹنا چہرہ جب وہ خون یا دوسری رطوبات کا بہنا نہ ہو۔

لیسی تھین۔ یہ خون میں سرخ جسموں کی تعداد بڑھاتا ہے اور میوگلوپین کی مقدار بڑھاتا ہے۔ ایوونا سلیکیٹ۔ نمایاں کمزوری اور قلتِ خون بہت زیادہ کمزوری مریض ہر وقت بستر میں لیٹے رہنا چاہتا ہے گوشت کم ہوتا ہو۔

ٹرائی ٹائیرو مالوین۔ اسکو کی ٹیکٹری میں کام۔ ٹی این۔ ٹی کو استعمال کرنے والے کا ریگنٹرناک قسم کا قلتِ خون اور یرقان۔ سانس پھولی ہوئی۔ سرگرائی۔ سر درد۔ بیہوشی۔ دل کی دھڑکن اور نڈر تان۔ السٹرس فیبرئوسا۔ سبز یرقان۔ جسم اور ذہن کی تھکاوٹ بیماری کی وجہ سے سبز عیس والی لڑکیوں اور حاملہ عورتوں کے لئے موزوں ہوتی ہے۔ اسقاط کی عادی عورتوں کے لئے انتہائی مفید ہے۔ کلکیریا کارب۔ قلتِ خون بہت پیچھے۔ بچپن سے خاص طور پر سفید بلغمی مزاج والوں کے لئے نرم جسم۔ موٹا ہونے کے رجحان کے ساتھ۔ حرکت اور دانت ٹکانے میں سست ہونا قابلِ مضم اشار کی شدید خواہش۔

تھائیرائید نیگم۔ گھٹا دے مریضوں میں قلتِ خون جو اعضائی لرزہ۔ چہرہ اور بازوؤں کا لرزہ دل کی دھڑکن اور سردی۔ لاغری۔ اعصابی کمزوری پسینہ اور بھنجھنا ہٹ کے احساس والے مریضوں کے لئے مفید ہے۔

## تریاق

لیڈم پال - کیڑوں - مکوڑوں اور جانوروں کے ڈنگ کے لئے تریاق -

تھو جبا - چائے کے زہر اور ٹیکے کے زہر کے لئے تریاق -

الیومن - سیسے کی زہر کے لئے تریاق - چھاپہ خانہ میں کام کرنے والوں میں یہ سیسے کے

الیومن - رجمان کو دُور کرتا ہے -

فاسفورس - کلوروفام کو فوراً بے اثر کر دیتا ہے اور قے کو روک دیتا ہے -

## سانس رک جانا

انٹم ٹارٹ - زرد چہرے یا گہرے سرخ چہرے اور نیلے ہونٹوں - اعصابی تشنج کے ساتھ غشی

چھوٹے بچوں میں کھڑکھڑاہٹ والی گٹھ اور چھاتی کی آواز - اونگھ کے ساتھ سانس رک جائے -

افیم - کاربانک ایسڈ گیس میں سانس لینے پر - نوزائیدہ بچوں میں جب انٹم ٹارٹ ناکام ہو جائے

نفخ ناقابل محسوس چہرہ بینگنی رنگ کا -

لووسٹا - کوئلے کی گیس (کاربن مانو آکسائیڈ) کی وجہ سے سانس رک جانا -

کاربونیم سلف - جب کول گیس سونگھنے یا شراب سونگھنے سے سانس رک جائے -

کوکلیریا - ظاہری مرگی والے کی موت - بھیچڑوں اور ناک سے خون بہنے کے بعد - بچوں میں

کالی کھانسی -

چائٹا - والدہ کا بہت زیادہ خون بہنے کے بعد نوزائیدہ بچوں میں یا بچہ بہت زرد ہو -

کیغفر - ظاہری موت جب وجہ معلوم نہ ہو -

## بے ڈھنگا

اگر کیس میکرس - جسم کے ٹپوں کی حرکت میں مطابقت میں مشکل

ہو - وارغ اور حرام مغز میں مطابقت میں دقت - چیزوں کو استعمال کرتے وقت یا اٹھاتے وقت

ہاتھوں سے گرا دیتی ہے۔ بیٹھیں ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ مریض گرمی سے آگ کے قریب بیٹھنے پر نافذ عکس کرتا ہے۔

ایمپس ایم۔ اگر کیس والی علامات سوائے اس کے کہ ایس کا مریض ٹھنڈ میں نافذ عکس کرتا ہے اور کمپن اور بار چرخی خانہ کی گرمی سے درد مانا جاتا ہے ہوا آگ کی حرارت سے بچ جائے۔ کیپسیکیم۔ بچے بے دھب اور تھک وہ گھر کو یاد کریں اور سکول سے گھر جانا چاہیں۔ گول ٹول اور گول جن میں قوت برداشت نہ ہو۔

ضعیف العقل، بے وقوف، معمول کے مطابق نہ بڑھنے والے بچے

برٹیا کارب۔ فہم کی کمی۔ دماغی الجھاؤ۔ ضعیف العقل کی حالت۔ آہستہ آہستہ سمجھیں۔ آہستہ حرکت کریں۔ ہر کسی سے ڈرے۔ اجنبیوں سے زیادہ ڈرے۔ بات تو جسے نہ سنے اور غیر مستقل۔ بچہ اپنے والدین اور ساتھیوں کے لئے سخت دل ہو۔ اور کسی کی تکلیف متاثر نہ ہو۔ سوچنے اور عمل کرنے میں مطابقت نہ ہو۔

سٹرامونیم۔ تشدد اور اھمالی۔ پرہیزجان۔ ناراض۔ چلائے۔ اونچی آواز سے بولے بولے کاٹے اور دوڑتا چاہے۔ آسانی سے ڈر جائے اور نیند میں اچانک ڈر جائے وحشیانہ انداز میں علیحدہ باہکل نہ رہ سکے، لوگوں میں رہنا چاہے۔ اندھیرے سے ڈرے اور روشنی کو پسند کرے۔ کلکیر یا کارب۔ کمزور بے ہمت۔ آہستہ رو اور سرد مہر، بے حس۔ بات سمجھے میں اور اس پر عمل کرنے میں آہستہ تمام ذہنی کام اسے تھکا دیں۔ چہرہ اور ہاتھ پر کثرت سے پسینہ۔ سر اور پیٹ بڑا۔ پیٹ میں تیزابیت۔ جب قبض ہو تو بہتر عکس کرے۔ جلد زرد، سفید یا چاک جیسی۔ دیر سے چلنا سکھے۔

سفلینم۔ یہ ضروری ہے کہ یہ دوائی برٹیا کارب اور سٹرامونیم کے ساتھ بطور عمل ایگز دوائی کے دی جائے۔ طبیعت بہت بدلے پھٹ جانے والے قہقہے کے بعد شدید غمی۔ ٹیوبرکولنیم۔ یہ ایک اور دوائی ہے جو بطور عمل ایگز دوائی کے دی جاسکتی ہے۔ دوسری

مطلوبہ ادویات جو ادیروی گئی ہیں۔ اس دوائی سے علاج شروع کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہو کر رہا ہے۔  
ذہنی اور جسمانی بڑھوتری رکھی ہوئی اور دانت نہ نکلیں۔

آرم میٹ۔ کم حوصلہ بے جان یادداشت نہ ہو۔ طفلانہ عادات نہ ہوں۔

سیلشیا۔ زرد۔ بیمار بچے جو چڑھے چڑھے ہوں کچھ نہ سیکھیں اور کھیلیں بھی نہ۔ معمولی کھانسی  
داری سے دور رہیں یا فگرت کریں۔ خود اعتمادی بالکل نہ ہو اور اپنے آپ سے کام نہ لیں۔  
اگر کیس ٹیم۔ بچے جو بولنا اور چلنا دیر سے سیکھیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا دماغ۔ بچے جو یاد  
نہ رکھ سکیں غلطیاں کریں اور آہستہ آہستہ سیکھیں۔

نیٹرم میور۔ بولنا دیر سے سیکھیں۔

نیوفو۔ فہم کی بڑھوتری کی کمی۔ جسم بڑھ جائے لیکن۔ فیوقانہ حالت قائم رہے۔ ڈر اور مادہ پن۔  
تھو جانا۔ دماغی طور پر پیچھے بچے۔ بہت گندے۔ پیشاب اور پاخانہ رات کے وقت بلا ارادہ  
خارج ہو جائے۔ کتے کا پاخانہ کھا جائے۔ یہ کمی زیادہ ٹیکے لگانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

## ٹیکوں کے بُرے اثرات

کیلنڈر والا۔ دماغ میں کمزور بچوں کے لئے شاندار دوائی ہے۔

نوٹ۔ مندرجہ بالا ادویات ۲۰۰ طاقت میں آدل بدل کر دی جائیں۔ تین چار ماہ کے کورس میں دو  
دوائیوں سے زیادہ نہ دی جائیں۔ نیو برکولینم اور سفلیئم جو ایک ایک ماہ کے موقع سے دوسری  
دو دوائیوں کے ساتھ دی جائیں۔ ۲۰۰ سے زیادہ طاقت استعمال کی جائے جب کوئی مصلح  
نظر نہ آئے یا ناتوان ہونا رک جائے۔

دارمی۔ (بال بھی دیکھیے)

انتھرم۔ دارمی کے بالوں کا گر جانا۔

سفنگورس۔ بالوں کا گر جانا۔ خاص طور پر دارمی اور مونچھوں کے بالوں کا گر جانا۔

بستر کے زخم ایکس۔ نیلے کناروں والے زخم (ٹائیفائیڈ بخاریں)

سلفر۔ گنگرین میں تبدیل ہو جائیں۔ کاٹنے والی درد۔

کروڈیلس۔ خون کی بری حالت کی وجہ سے۔

آر جینٹم ٹائیڈیکم۔ زخم کا درمیانی حصہ خشک خون کے پردوں سے ڈھانپا ہوا ہو۔

آر زیکا مانٹ۔ خاص طور پر چوڑیوں اور پیٹھ کے حصہ میں۔

نوٹ۔ بیرونی طور پر زخموں پر کیلینڈر لا کر ٹیکہ لگائی جائے۔ عام حالت میں ابلا کر کے۔

کاٹنے کے زخم

لایپریکیم۔ یخوں سکڑوں کے کاٹنے پر کئے گئے کاٹنے پر یا دوسرے زخم مندمل نہ ہوں۔ جب جلن اور ڈنگ لگے جیسی درد ہوا اور مرنے لگے چلتے ہوں۔

ایسٹک الیڈ۔ بنی کے کاٹنے پر (خواہ پاگل ہو یا نہ ہو) چیرا بھڑا ہوا زخم۔ ٹانگ کا اوپر کا اور پچھلا حصہ ہوا ہو۔ بیرونی طور پر بھی لگائیے۔

لایسین۔ گتوں کا کاٹنا۔ جلن گرم بھاپ سے افاقہ کئے گئے کاٹنے پر سرد درد۔ چوڑیوں میں یا قریبی حصوں میں ایک خاص قسم کا احساس۔ سوئی چھبنے کا احساس۔ سوراخ کرنے والا درد اور جلن زخم سے باہر کر جائے۔

لیکس۔ جوڑکوں کے کاٹنے پر گنگرین والی جگہ۔ یہ کئے گئے کاٹنے کے لئے مخصوص ہے۔ گولونڈر نیا۔ سانپ کی زہر کے لئے تریاق۔ یہ سانپ کے زہریلے اثرات کے خلاف قوت مند پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک حفظہ مقدم کے طور پر استعمال ہونے والی دوائی ہے۔

لیڈم پال۔ چوہوں اور بچھڑوں اور بچھڑوں کے کاٹنے کے لئے لیڈم پال بیرونی طور پر استعمال کیے گئے۔ بچھڑوں، مکھیوں کے ڈنگ وغیرہ کے لئے فوراً افاقہ کرتا ہے۔ مشعل شدہ یا نازخ جانوروں کے کاٹنے کے لئے۔

سٹیکس کینا پاکل جانوروں اور زہریلے زخموں کے لئے۔

امریکا یونینس۔ مکھیوں کے ڈنگ کیلئے شاندار دوائی ہے۔ بیرونی طور پر مدرنیکر لگانے کے لئے استعمال کرنے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ بھڑکے ڈنگ میں یہ آئرکیمانٹ کی طرح کام کرتا ہے کینتھرس ۲۰۰x بھی اندرونی طور پر دیکھئے۔

ہونگ نان۔ سانپ کاٹنے کے لئے بڑی مفید ہے۔

میدرن۔ ناگ کے کاٹے کیلئے یا دوسرے بہت ہی زہریلے سانپوں کے لئے ایک ہے۔

آئرکیمانٹ۔ بھڑکے کاٹے کیلئے آئرکیمانٹ مدرنیکر بیرونی طور پر لگائیے اور کینتھرس ۲۰۰ اندرونی طور پر استعمال کرائیے۔ انتہائی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔

ایپس ایم۔ مکھیوں کے ڈنگ کے لئے جن کی وجہ سے سوجن اور استفادہ ہو۔ یہ مکھیاں پالنے والوں کو مکھیوں کے ڈنگ سے محفوظ کرتی ہے۔ اگر کچھ عرصہ کے لئے ۹ یا ۶ طاقت میں استعمال کی جائے۔

اگیشیا۔ خساروں کے اندر کی طرف کاٹنا جب گھنگو کہے یا چبائے۔ جب کھائے تو زبان کو کاٹ لے۔

آرم ٹرائفلم۔ ناخنوں کو کاٹے حتیٰ اگر خون نکل آئے۔

ایسٹ فاس۔ نیند کے دوران زبان کو بلا ارادہ کاٹ لینا۔

سینیکا۔ مشتعل جانوروں کے کاٹے کے لئے۔

کاسٹیکم۔ چلتے وقت زبان اور خسار کاٹ لے۔

اولیم انیمیل۔ کھاتے وقت زبان کاٹ لے۔

پی او نیا۔ جوتوں کے ننگ ہونے کی وجہ سے ناسور۔ عام ناسور۔

بنزواک ایسٹ۔ کھانا کھانے کے دوران ہونٹوں کو بلا ارادہ کاٹنا۔

یوفوریا پروسٹیٹا۔ زہریلے کڑیوں اور سانپوں کے لیے حتمی دوائی خاص طور پر پریل سانپ کیلئے۔

فاسٹولا کا۔ دانتوں اور مسوڑھوں کے کاٹنے کی زمرے والی خواہش۔

**خون بہنا۔** (دیکھیے ناک کے تحت اور امعاء مستقیم، پانخانے اور آنکھوں سے خون بہنا۔)  
 ایکس۔ کسی بھی سوراخ۔ مسوڑھوں۔ منہ۔ آنٹریوں سے خون بہنا۔ ہر غشاء یا پتھر اساکٹ جانے  
 سے زخم سے خون جاری رہے۔

کروٹیلیس ہور۔ خون بہنے کے رجحان والی طبیعت یا مزاج۔ آنکھوں کانوں۔ ناک اور  
 بشمول رحم جسم کے ہر سوراخ سے خون بہے۔ سیاہ بدبو دار شہتے والا خون رے۔ بخون والا پسینہ۔  
 کیوڑوٹ۔ گردوں۔ آنکھوں۔ ناک اور رحم وغیرہ سے خون بہے۔ ان سے بہت دیر تک خون  
 بہے۔ انگلی میں سوئی دھکنے ہی سے خون بہے مرن ایک قطرہ خون بہنے کی بجائے۔ جب آنکھیں سوراخ  
 اور سوجی ہوئی اور ان سے آسانی سے خون بہے۔

ملی فو لیم۔ خون کی نالیوں کی ناطاقتی۔ کسی بھی حصہ جسم سے خون بہنا زخموں سے۔ ناسور سے  
 پھیپھڑوں سے۔ معدہ سے۔ ریکٹم سے۔ ناک سے۔ دانت نکلنے کے بعد خون بہنے۔ خون  
 عموماً چکدار یا سرخ ہوتا ہے۔

فاصفورس۔ معمولی سے زخم سے بھی بہت سا خون بہے۔  
 سیکل کار۔ معمولی سے زخم سے ہفتوں تک بہنے۔ بازوؤں میں پھنسا ہٹ۔  
 کاربوووج۔ سوزش زدہ جگہوں میں خون رے۔ ناسوروں سے سیاہ خون کا بہنا۔ کسی بھی سوراخ  
 سے۔ پھیپھڑوں سے۔ رحم سے۔ شام سے خون بہے۔ یہ تمام نازک۔ کمزور دوران خون کی وجہ سے  
 ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ خون بہے۔ تیز نہ ہو۔

فیرم میٹ۔ خون بہنے والا مزاج۔ خون چکدار یا سرخ بدبو دار ہوتا ہے۔  
 سنمونم۔ ناک۔ آنٹریوں۔ پھیپھڑوں یا معدہ سے خون بہے۔ کسی بھی سوراخ سے خون بہنے  
 کے لیے یہ شاندار دوائی ہے۔

سانس لینا۔ جلن۔ گرم دودھ یا بھاپ سے جل جانا۔  
 دیکھیے تنگی تنفس۔ تیز یا مشکل سے سانس لے۔ گرمی۔  
 کینتھرس۔ ہر قسم کی ہلن وغیرہ کے لیے شاندار دوائی ہے۔ یہ پھلے پڑنے سے روکتی ہے۔ گردوں کے

خواب ہونے اور رنگی متغیر پیشاب خارج کرتے وقت درد شانہ سے خون ہے۔ زخمی حصوں کو مدد پر  
کے چند قطرے پانی میں ملا کر دھونے سے، ڈوبنے سے افادہ ہو جاتا ہے۔

آرنیکم الیم۔ جب گنگرین کا ڈر ہو یعنی جب گنگرین ہو جانے کا احتمال ہو۔

کاسٹیک۔ جب تیسری سیج میں زخم داخل ہو جائیں اور یہ مزین حالت اختیار کریں اور ناسور ٹھیک  
ہونے میں آئیں ۶ ملاقت میں استعمال کیجئے جو درد کو فوراً دور کر دے گی۔ بیرونی طور پر ہائپرکیم کوشن  
۱۔ اور ۸ کی نسبت سے ملا کر استعمال کریں۔

اٹریکالیورنس۔ حاد۔ تکلیف دینے والی درد چھپاکی کی طرح کا احساس بیرونی طور پر اور ۱۵  
کی نسبت سے مدد پر کوشن استعمال کریں۔

پیرولیم۔ جب جلد میں دکھن اور درد کے ساتھ جلد کے مچھٹ جانے کا رجحان ہو۔

سٹرلوم۔ جب جلن میں دی جاتی ہے جب ڈیوڈیم میں ناسور ہو اور اعصابی مریضوں کی جاتی ہے۔

کیڈیم سلف { کینسر کی صورت میں ریڈیم سے کینسر کے علاج کے دوران جل جانے کے لئے  
فاہفورس } تریاق ۱۱ ایم ملاقت میں استعمال کیجئے۔

ہائپرکیم۔ جلے ہوئے حصے ٹھنڈی چیزوں کے لگانے یا ٹھنڈی ہوا میں افادہ پذیر ہوں۔ اعصابی  
مریضوں کا بیتی ہوئی آواز کے ساتھ۔ شدید چڑچڑاہٹ، ذہنی پرگندہ یا الجھان کے درد۔ ۱۔ ایم ملاقت میں دیجئے۔

نوٹ:۔ بیرونی طور پر لگانے کے لئے پانچ فیصد ٹینک لائیڈ یا کینسرس مدد پر استعمال کیجئے جو درد کو

ایک ڈرام ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملائیے۔ جلے ہوئے حصہ کو جھالوں سے محفوظ رکھنے کیلئے

ترکیہیے۔ یہ اکیلے ہی مریض کے جلے ہوئے حصوں کو ٹھیک کر دیگی۔ اگر ایک گھنٹہ یا اس سے زائد

وقت تک لگائی جائے۔ پولین آئیل سے بھی مفید ہوتی ہے۔ جلے ہوئے کس میں۔

جوڑوں کی جھیلیوں سے برآمد ہونے والی چکنائی

آرنیکا۔ جب زخم کی وجہ سے۔

سکٹیل۔ سادہ یا ملا جلا۔

سیلشیا - پیپ کا ڈر ہو یا پیٹ پرنے کا احتمال ہو۔  
ایسٹوڈیم - تھیلی - کیفنسر

کینسر کا علاج کرتے وقت کینسر کی مزاحی کیفیت کا تریاق کیا جائے۔  $x200$  یا  $1000$  طاقت کو نیم خالی معدہ دیں۔ کم از کم اس کے  $22$  گھنٹہ بعد یا قاعدہ علاج شروع کیا جائے۔ دوسری عمل انگیز ادویات سوراٹینیم  $200$  اور میڈرونیٹیم  $x200$  استعمال کی جائیں۔ یہ دونوں دوائیاں بالترتیب انٹی سورک اور انٹی سائیکوٹک ہیں۔ سورا اور سائیکوٹک دو غلیظ یا میازم ہیں جو کینسر کو پیدا کرتے ہیں اگر خاندان میں ٹی بی کی ہٹری بھی ہو تو بورکولینیم  $x200$  بھی بطور عمل انگیز کے دی جائے۔

فاسفورس - مائٹھے کا کینسر کھلنے زخم کے ساتھ جو ہڈی سے شروع ہو۔ جس کی سطح بھر یاں زرد ہو یا کھر دری ہو۔ خون اور پیپ پڑتی ہو۔ متاثرہ حصہ میں پھارنے والا درد اور جلن دار در دیں ہوں۔  $x200$  میں ہر ہفتہ دہرائیے۔ زبان کا کینسر جیسے کہ در میان میں ایک سوراخ کھود دیا گیا۔ زبان سوچی ہوئی اکڑے سخت اور اوپر کو اٹھ ہوئے۔ مریض گھٹنوں اور کہنیوں کے بل سوئے۔

آرینیکلیم الیم - معدہ کا کینسر جلن دار گرمی اور جلد خشک۔ پیاس سبے چینی اور اندیشے ہوں  $x200$  طاقت ہر ہفتہ دہرائیے۔

نائیٹرک الیڈ - سوتی چھنے جیسی درد کاٹنے کے ہمارہ۔ معدہ کا کینسر جلن دار درد کے ہمارہ پیاس پانی ناقابل بیان تسلی کی کیفیت پیدا کر دے۔ خوراک کو معدہ اپنے اندر نہ رکھ سکے جو تھوڑی سی ہضم کرنے کے بعد واپس ٹو مادی جاتی ہے۔ لیڈار مادے اور خون کی تھے۔ غنی اجابت۔ چہرہ زرد۔

کاسٹیکم - سوتی چھنے جیسی درد کے لئے۔

الیومن - چھالے کے کینسر کے لئے۔

ایپس ایٹم - کجب ڈنگ لگنے جیسی درد ہو، درد کے ساتھ خارش بھی ہو۔

کلیٹمس - ہونٹ کا کینسر اگر اسکے علاوہ مٹے اگے ہوئے ہوں۔ ڈنگا مار بھی اول بدل کر دی جاسکتی ہے۔

سیپیا۔ کینسر کی وجہ سے سختی۔ ہونٹوں کا کینسر۔  
 سیلشیا۔ بلا درد کینسر جو ادھری سطح پر چٹے ہوں۔ اُتھلے یا کم گہرے۔ نیلگوں مائل سفید  
 بنیاد نمایاں نہ کرے۔ چکر۔ یہی ایم طاقت میں دی جائے۔

پچھلے ڈنیم۔ معدہ میں کئی قسم کی در دیں جو گرم چیزیں نکلنے اور آگے کی طرف جھکنے سے اناقہ پذیر  
 ہوں۔ معدہ میں درد شروع ہوتی ہے اور پچھاتیوں تک بڑھتی ہے اور دائیں کندھے کے نیچے کچھ یا  
 نکلونی حصہ تک بڑھے گرم پانی کے ساتھ سی ایم طاقت میں دیکھئے۔ کئی ماہ تک دہرائے حتیٰ کہ درد  
 قویٰ غائب ہو جائے۔ یا کم ہو جائے۔ اس دوائی کے بعد آر سینکیم الیم دی جائے تاکہ علاج مکمل ہو جائے۔  
 یوفورڈیم۔ شدید جلن دار درد جن کو ٹھنڈی چیزیں لگانے سے اناقہ ہو۔ بجلی کے شاٹ جیسا درد۔  
 ہوجس سے مریض بستر پر سے چھلانگ ہی لگا دے یا بستر پر سے کود جائے۔ پیٹو کی ہڈی کے  
 کینسر کو اس دوائی کے بار بار دینے سے اناقہ ہوتا ہے۔

سلفر۔ معدہ کا کینسر معدہ کے گوشے میں ڈوبنے کا احساس جیسے کہ جھوک لگی ہوئی ہو۔ سخت  
 تیز ادویات کے استعمال کرنے سے مرض کا دب جانا۔ بیرونی بواسیر جس پر غارش ہو لیکن خون نہ بہے  
 امعائے مستقیم یا ریگیم کا خروج یہ سی ایم طاقت میں بطور عمل انگیز دوائی دی جانی چاہئے۔ جب  
 اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔

کمر لوزوٹ۔ رحم کا کینسر، رحم سے خون بہے۔ چند ماہ کے لئے حیض رک جائیں اور پھر گہرے  
 گہرے خون اور بدبودار خراشدار خون۔ پتلے مواد۔ کھٹنے والے۔ رحم میں نیچے کی طرف دباؤ اور ذرن  
 کے احساس کے ساتھ رحم میں غارش ہو۔ سرورکس کا کینسر جس سے بہت ہی بدبودار رطوبت رے۔  
 فاسٹولا کا۔ پستانوں کا کینسر سخت سبے قاعدہ رسولیاں۔ اندر کو دھنسنے ہوئے نیل کے ساتھ۔  
 بازو تک دکھن۔ نیل میں درد جس کی چوٹی میں درد۔

کوئیم۔ یہ ہونٹوں کے کینسر سے کے لئے بہت ہی نمایاں دوائی ہے۔ پتھر کی طرح سخت گلیٹیاں  
 تیز درد والی ہوں۔

کیلنڈرولا۔ یہ دوائی جرمی میں کینسر کے لئے آزمائی جا چکی ہے۔ یہ کینسر کی کسی بھی سطح میں دیا جاسکتا ہے

یہ دردوں کو روکتی ہے اور مریضوں کو بہت آرام پہنچاتی ہے۔ 543  
کنڈر انگو۔ یہ ہونٹوں کے کینسر کو حقیقی طور پر ٹھیک کر دیتی ہے اور معدہ کے کینسر جب مریض  
کے منہ کے کونوں میں پردہ پیرے ہوں۔

کالی فاس۔ کینسر کو دور کرنے کے بعد جب منہ دل کرنے والا عمل جلد کو سختی سے زخم پہنچانے  
ہو، انگ نان۔ غددوں کا کینسر اور ناگ کے کاٹنے کے لئے۔  
ٹیوکر کولینٹم۔ بطور عمل انگیز دوائی کے دی جاتی ہے۔ اگر خاندانی ٹی بی مہلری پائی جاتی ہے۔  
آرم آئیوڈ۔ کینسر اور گتھی مشرقی مٹیوں کیلئے۔ غددوں اور اعضا میں اجتماع خون۔ ٹھنڈ  
میں افتادہ گرمی سے زیادتی میں۔

نیٹرم میور۔ ناک اور جلد کے کینسر جو رخساروں اور کانوں تک بڑھ جائے۔ یلیا میں زیادہ مقدار  
میں خون کو نمین کے استعمال۔ یلیا کے دب جانے کی وجہ سے۔ نمک کی زبردست خواہش۔  
دوسروں کی موجودگی میں پیشاب نہ کر سکے۔

ہائیڈراسٹس۔ خجاری اور کینسر کی طرح کی خرابی۔ ہونٹوں اور پستانوں کا کینسر۔ کینسر  
سخت۔ پکڑنے والا۔ چاقو سے کاٹنے والی دردوں کی طرح دردیں۔ اس دوائی کا مدد ٹھیک  
بیرونی طور پر ہونٹوں کے کینسر میں لگایا جائے۔

آرم آرسینک۔ چہرہ اور ہونٹوں کا کینسر۔ ہونٹ لپٹے ہوئے۔ پھنسیاں۔ چہرے کی جلد کا دق  
بے رنگ ہو جانا۔ نیگلوں یا نیگلوں کی طرح کا۔ مٹی کی طرح کا زرد۔

اسباب۔

کیمفر۔ ٹھنڈی ہوا سے۔

کیدیٹیم سلف۔ { ٹھنڈی ہوا کے جھوکوں سے۔  
لیکس۔

مرکوریس پروٹو۔ پسینے آئے ہوئے جسم پر ٹھنڈی ہوا کے جھوکے سے۔  
کاربوووج۔ آگ سے گرم ہوا کو بھیچر دہلی لے جانے پر۔ گرم ہوا میں سانس لینے سے۔

کوئیم { سیپیا } برف جیسی ٹھنڈی ہوا سے۔  
 سلفیورک ایسڈ - بازو اوپر اٹھانے سے۔  
 رسٹاکس - بازو اوپر اٹھانے سے چیزیں اوپر اٹھانے کے لئے۔ تازہ پانی یا ٹیکس پانی  
 میں نہانے سے۔  
 کاربوونج - گندے انڈے گندی مشروبات اور گلی ٹری چربی۔ اور مکھن کھانے سے سرد گرم دم۔ بد ذوقی۔  
 پلاٹینا - غم زدگی۔  
 پی او نیا - تنگ بوٹ اور جوتے۔ بستر پر پے رہنے سے دباؤ کی وجہ سے زخم۔  
 پیٹرولیم - گوبھی سے۔  
 روٹا - زیادہ وزن اٹھانے سے یا طاقت سے زیادہ وزن اٹھانے سے۔  
 نیٹرم میور - نامیاتی نیسیجوں کی جلن اور تباہی چاندکی وجہ سے۔  
 اوپیم - کوئلے کے بخارات - شرم کی وجہ سے۔  
 آر میٹک البم - پہاڑوں پر چڑھنے۔  
 کالی سلف - جب جسم بہت گرم ہو، ٹھنڈی ہوا لگ جائے۔  
 میگنیشیا فاس - ٹھنڈی مٹی کے ساتھ کام کرنے پر۔ پانی میں کھڑے ہونے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے  
 سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔  
 کاربو انیمیلیس - گلی ٹری بڑیاں کھانے۔ خراب شدہ مچھلی۔  
 پائرو جینم - زخموں کو چیرنے پھاڑنے سے۔ خون کا زہر لایا ہونا۔ جانوروں کے گلے سڑنے  
 سے پیدائشہ عفوت۔ گندے نالے کی لگیں۔  
 ڈائسکوریہ - خوراک کی خرابی - روزہ رکھنے۔  
 اکیٹارسی - کاروبار ناکام ہونے پر۔  
 رمیوم - کچھ پھل - خشک آلود خمار کھانے سے۔

فاسفورس - گیس - بال ٹھونے - کپڑے دھونے - لانڈری کا کام کرنے والے - سخت بدبو میں - بارش میں بھیگتے -

نیشٹرم کارب - گیس کی روشنی -

آرجنٹم ٹائیٹریم - بے اعتدالیوں سے -

ورسٹم البم - عزت نفس کے مجروح ہونے یا فخر یا غرور -

سیلینیم - لیموں کے پانی -

کالچیکم - دوسرے لوگوں کے ناشائستہ حرکات -

کروٹیلینس بڑی بو اور سوراگیں -

تھوجا - پیاز

کونیم - جنسی اعمال سے اجتناب

سول - سوز کی گرمی یا سن سڑک -

آرجنٹم ٹائیٹریم - کھانڈ -

کانیا - لہجہ سفر -

میگنیشیا فاس - کیتھٹر کے استعمال سے -

## سبیر قان

مینگنم - تھکی ماندی اور کمزور حیض کا خون کم مقدار میں ایک یا دو روز بھیے اور جلدی آئے

حیض زرد رطوبت یا تھوڑا ایکو ریا - خنجر دکھے - گلا بیٹھا ہوا - آواز نہ نکلے -

امونیا کارب - تلت خون والا چہرہ - چکروں کے ہمراہ شدید سر درد - اکثر قے زبان پر تہہ جھی

ہوئی - پیاس نہ جھوک - حیض - چھوٹے مائیس - ہر حرکت پر دل کی دھڑکن - نبض کمزور اور مست

انٹم کروڈ - اکثر سر درد لاحق ہو - خبطی اور غصہ سے بھری ہوئی طبیعت - جھوک کی کمی - بہت

بہت زیادہ سستی ہو - اسے دن کے وقت سونے پر مجبور کر دے - حیض جو پہلے باقاعدہ طور پر آتے

ہوں رک جائیں - جلد زرد - ہونٹ اور زبان اپنا قدرتی رنگ کھو بیٹھیں -

آرٹیکلیم۔ سبزیقان کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ ریشہ۔ اکثر غشی کے دور سے شدید چھانی  
تھکاوٹ۔

کاکولس۔ کافی یا دوسری مسکن یا خواب آور ادویات کے غلط استعمال کی وجہ سے سبزیقان خون  
حیض دبا ہوا یا کم مقدار میں۔ لیکوریا۔ تنگی نفس۔ چھاتی میں اینٹھن یا تشنج۔ افسردگی۔ بے چینی کھلی  
ہوا سے حساس۔

کلکیریا کارب۔ سبزیقان کے لئے مخصوص دوائی ہے۔ کم مقدار میں حیض اور دل کی دھڑکن ٹپک  
دل کی دھڑکن۔ تمام چھاتی میں سن کے۔ کپٹی کی شریانوں کی شدید تکین۔ معدہ میں دبانے والا درد  
ٹانگیں آسانی سے تھک جائیں۔ ٹانگوں کی استقامتی سوجن پہلوؤں تک جانے۔ چند قدم چلنے پر تنگی  
زرد موی۔ بیمار۔ زرد ہونٹ۔ زرد کان۔ انگلیوں کے سرے زرد۔ اس دوائی کی طرف رہنمائی کرتے  
ہیں۔ خاص طور پر قلت خون والی لڑکیوں میں

لائیکوپوڈیم۔ کلکیریا کارب کے پُر اثر عمل کے بعد لائیکوپوڈیم دی جائے یا جب حیض مکمل طور  
پر دب جائے۔ تھکاوٹ۔ بازوؤں کی کیکاپاٹ اور سن ہونے۔ اونگھ۔ افسردگی۔ لوگوں سے نفرت  
یا مجلس سے نفرت۔ بال گرنا اور مٹھائی کی خواہش۔

کاربوویج۔ لیکوریا۔ ترخارش کے ساتھ۔ مسوڑھوں میں سکوی۔ دانت ڈھیلے۔  
چائنا آف۔ ٹانگوں اور بازوؤں کے استقاء کے ساتھ سبزیقان خاص طور پر پاؤں  
کے تلوؤں کا۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔ پیٹ ابھرا ہوا۔ بیٹ میں درد کے ساتھ قبض۔ نظام  
انہضام درم برہم۔ کھٹے دکار۔ ناقابل فہم چیزوں کی زبردست خواہش۔

فیرم میٹ۔ جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں تو سبزیقان کے لئے چوٹی کی دوائی ہے سبزیقان  
لوا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے مرکبات فیرم اور فیرم کلاب بھی مفید ہوتے ہیں۔ فیرم کے مریض ہلکا  
بھولا ہوا چہرہ۔ ٹھنڈی جلد۔ جلد پر دباؤ گہرا کرٹھا جھوڑا ہے۔ نشانات خاص طور پر ٹخنوں کے  
قریب۔ شدید تھکاوٹ۔ تھکاوٹ کا احساس۔ آسانی سے رو دے۔ بھوک نہ ہو۔ خوراک سے نفرت  
معدہ میں تیزابیت حیض کم مقدار یا دیر سے ہونے۔

**فاسفورس**۔ بزرگیان حیض کے دب جانے سے۔ شکل سے سانس لے بھوک نہ ہو۔ اکثر ہر روز تھوہ ہو بزرگی کے ساتھ۔ جب فیرم ناکام ہو مکی ہو تو یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔

**سیدیا**۔ اس کا سبب ہمیشہ جنسی نظام میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ جنسی اعضاء میں مختلف اقسام کا ہیجان، پیڑ میں بیجے کی طرف تکلیف دہ دباؤ جیسے کہ رحم کی ہر چیز اندام نہانی سے باہر نکل جائیگی۔ اندام نہانی میں تشنگ یا اینٹھن اور سوئیاں جھنجھے جیسا درد اور پر کی طرف، خون کے ایک قطرہ کے اخراج کے ساتھ بھی پیڑ کے حصے میں سوزش بلند اور رطوبات کے اخراج کے ساتھ۔ زرد پھو۔ موم کی طرح بے رغبتی کا اظہار۔ مریض ہمیشہ ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ سر میں تپکن دار جھنجھناہٹ۔ تھوڑی سی شفقت سے دل کی شدید دھڑکن شروع ہو جائے۔

**سلفر**۔ بطور عمل انگیز دوائی اس دوائی سے علاج شروع کیا جاسکتا ہے۔

**پلسٹیل**۔ لوہے کے غلط استعمال۔ کانوں میں بلن۔ ٹانگوں میں بھاری پن۔ نگلی نغز گیس مصالحہ دار اشیاء کی نمایاں خواہش ڈرپوک یا شریف طبیعت۔  
**نکس و امیکا**۔ بیٹھے رہنے کی عادت کی وجہ سے بزرگیان۔  
**نیٹرم میور**۔ سانس دب جائے یا گر جائے۔ کافی دیر سے  
**اگنیشیا**۔ دماغی جذبات کی براہ نگینگی۔ غم۔ ڈر اور محبت میں ناکامی کی وجہ سے بزرگیان۔

**ہیضہ۔ انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا۔ بھدا۔ ٹھنڈ۔**

دیکھئے اعنائے مستقیم اور پاخانہ کے نیچے۔ بھدا

**لارومیرکوس**۔ بزرگیان میں۔ دق میں۔ انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا۔ اس دوائی کی عام سی علامت ہے۔  
**کیوپرم آرسینک**۔ جسم کا ٹھنڈا پن۔ اینٹھن دار خدی قسم کی بیماری کے ساتھ۔ کثرت سے تھوہ جلاب اور ٹھنڈے پسینے۔

**ایلوڈرما**۔ تمام جسم کا ٹھنڈا پن۔ تمام اندرونی اعضاء جیسے کہ دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے۔ وغیرہ سانس بھی ٹھنڈا آنے فالج اور کپکپاہٹ کے ساتھ جسم کی ٹھنڈک جیسے کہ جھجھکا ہو۔

سست اور ڈوبنے والی نبض ۲۰۰ طاقت میں دیجئے۔

سیسٹا۔ ڈریکس میں ٹھنڈک کا احساس۔

درتیز گرم البم۔ تمام جسم میں سردی رہیگی۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے اور نیلے۔ نیلے ناخنوں کے ساتھ جبکہ پاؤں ٹھنڈے یا اس کے الٹ یعنی پاؤں ٹھنڈے۔ ہاتھ گرم۔ کثرت سے انحرافات۔ دھکیا۔ سردی ۱۱ بجے صبح۔ سردی کے دوران برف جیسے ٹھنڈے پانی کی پیاس گرمی کے ساتھ پیاس نہ ہو۔ تمام رات پسینہ کثرت سے ہو۔ پسینے کے دوران شدید سردی۔

پیشہ ولیم۔ ٹھکریوں یا قطعوں پر ٹھنڈک۔ اس دوا کی نمایاں علامت ہے۔ معدہ میں ٹھنڈک جسم میں۔ پیٹ میں۔ کندھے کے جوڑے۔ احساس جیسے کہ دل ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ سیکل کار۔ چھوٹے پر ٹھنڈک لیکن ڈھانچا جانا پسند نہ کرے۔

روٹا۔ ریڑھ کی ہڈی سے نیچے کی طرف ٹھنڈک۔

تھو جا۔ ساری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ معدہ

کلکیر یا کلاب۔ ٹھنڈا پسینہ۔ قطعوں میں ٹھنڈک۔ ٹھنڈی منار جو اسے حساس۔ پسینہ قطعوں میں آئے۔ جسم برف کی طرح ٹھنڈا اور ٹھنڈے پسینوں کے ساتھ۔

لیکس۔ رات کے وقت۔ چہرہ پر ٹھنڈی کی سرخ لہر کے دورے اور دن کے وقت گرم سرخی کی لہر کے دورے۔

کیمفر۔ باہر کی طرف سے سردی اور اندر کی طرف گرمی۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے۔ نمایاں تھکاوٹ۔

ولیمیر مائنہ۔ سر میں سردی کا احساس۔

لارومیر کوسس۔ عام شدید ٹھنڈک۔ اگر بعض گرم کہے میں جلتے تو ٹھنڈک سے انادہ ہو۔

توجی بہت تھکاتا ہے اور ہاتھ پر پسینہ بھڑٹا رہتا ہے جو اسے دوبارہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ صرف کھلی ہوا میں ہی گرم کیا جاسکتا ہے۔

امونیا میور۔ کندھوں کے جوڑے کے درمیان برف جیسی ٹھنڈک جو گرم کپڑوں کے پٹینے سے بھی ٹھیک نہ ہو۔ منڈھوں کے اندر برف جیسی سردی۔

سیکرم - ٹھنڈک اور گرمی کا احساس - برف کی طرح در دیں ہر طرف کو جائیں -  
 نیٹرم فاس - ہاتھ پاؤں اور ٹانگیں ٹھنڈی - دن کے وقت پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے اور رات کو  
 لائیکو لوڈیم - آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک، بھجائی وغیرہ میں بھی خاص طور پر ۴ سے ۸ بجے  
 شام تک شدید زیادتی ہو -

## حالت نزع یا غشی -

کیمففر - حالت نزع - تمام جسم کی حالت برف جیسی ٹھنڈی لیکن دھعانا جانا پسند نہ کرے -  
 طاق کا اچانک ڈور بنا - نبض پھوٹا اور کمزور -  
 کاربو و تھج - رطوبت زندگی کے بہ جانے کی وجہ سے قوت حیات کم ہونے کی وجہ سے حالت  
 نزع - بڑھے لوگوں میں کافی ایو پھیکا ادویات کے استعمال کی وجہ سے - مریض زندگی کے بغیر معلوم ہو -  
 سرگرم جسم اور سانس سرد - پیکھا پھلانا پسند نہ کرے اور کھڑکیاں کھول دینا چاہیے -  
 وریٹرم ایٹیم - حالت نزع کی مکمل تصویر - کمزوری - نیلا ہٹ - اپٹین کے بعد صدمہ - ماتھے پر  
 ٹھنڈا پسینہ - زرد چہرہ - اور تیز نرم نبض -  
 ہائیڈرو سائٹک ریڈر - پھیپھڑوں کی حالت کی وجہ سے حالت نزع جیسی - دل کی وجہ سے نہ ہو -  
 ٹھنڈک - اینٹھن - تشنج یا اسی طرح کی تکالیف -  
انگیوں کا ہتھیلی کی طرف کھینچ کر سکڑ جانا -

سلفر - اچھے نتائج حاصل کرنے کے لئے کافی لمبے عرصے تک دی جانی چاہیے -  
 لیکسس - جب درمائی عصب کے درد کی وجہ سے ہو -

## قبل از وقت موت

الفلقادی - بچے یا بڑے لڑکے جو اگرچہ مضبوط ہوں ۱۸ سال کی عمر میں کھل کھل کر رہ جائیں - مدد کو  
 ۲۷ تقریباً فی خوراک کے حساب چھ لکھ دیں -

سلفر۔ اگر بچے پچھن میں مری تو والدہ حمل کے دوران x۶ سلفر اور x۶ طاقت  
 کلکیر یا فاس۔ { کلکیر یا اول بل کر دیں ہر روز ایک خوراک دیں۔  
 وائبرنم پرنس۔ جب بچے آٹھویں ماہ پیدا ہوں اور پیدائش کے فوراً بعد مرنے والے بچوں کے  
 لئے بہترین دوائی ہے۔ یہ آٹھویں ماہ حمل کے گرجانے کو روکتی ہے۔ x۹ طاقت میں والدہ کو متوقع  
 پیدائش سے ۲ ماہ پہلے ۲ بار دن میں دیں۔

## کمزوری (تھکن بھی دیکھئے)

اندول۔ شدید اونگھ کام کرتے وقت سوجائے۔ اونگھ کے ساتھ سرد دیا اونگھ کے ساتھ دہی مکین۔  
 بلیس پرنس۔ تھکاؤ کا احساس لیٹ جانا چاہیے۔ گنٹھے یا جھڑوں کے درد کے حملہ بعد ٹھکانا۔  
 کارلسباد۔ کمزوری۔ لاغری۔ کپکپاہٹ تھکے ہوئے اور افسردہ خیالات۔  
 کیورارے۔ رطوبات کے ضائع ہونے سے اور بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری۔  
 فارمیکا۔ پختی ٹانگوں کی کمزوری۔  
 مرک ڈلس۔ مرہ جیسا زرد چہرہ ڈھیلا۔ ڈھالا ابھرا ہوا۔ زرد رنگے سرویکل اور دوسرے  
 غدد دھوئے ہوئے۔

نکس ماسکانا۔ ٹھنڈک کے ساتھ اونگھ لیکن پیاس نہ ہو۔  
 ٹیرنٹولا۔ کمزوری سن ہو جانا۔ بازوؤں میں بے چینی۔ بازوؤں میں درد۔ فالج۔ کانپنا جھٹکوں  
 والی اینٹھن۔ جلد پر آہستہ آہستہ چلنے اور ریگنے کا احساس۔  
 سیلینیم۔ تھوڑی سی حرکت سے بھی شدید تھکن اور کمزوری پیدا کر دے خاص طور پر گرمی کے  
 موسم میں بیماری کے بعد اور جنسی بے اعتدالیوں کے بے اعتدالیوں کے بعد بھی۔  
 گریشی والا۔ اعصابی کمزوری نمایاں سستی ذہن اور جسمانی کمزوری کے ساتھ۔  
 سیکل کار۔ کمزور گھٹا ہوا۔ تھیلوں والا جلد کا غیر تندرست نظر آنا۔ اندر دنی طور پر سارے جسم  
 میں جلن لیکن جب حصوں کو ہاتھ لگا یا جائے تو وہ ٹھنڈے محسوس ہوں۔ گلے۔ پیچھے۔ منہ اور

اعصاب سے متعین ہوں کار سنا جبکہ کوئی سوزش نہ ہو۔ ڈھانپا جانا پسند نہ کرے۔  
 سار سپر ملا۔ کمزور۔ گھٹا ہوا۔ شراب اور حورث کی دہر سے کمزور ہوا ہوا۔ بچے کمزور۔ چہرہ بڑھے۔  
 آدمی کی طرح دکھائی دے۔ بڑا ہیٹ۔ خاندانی آشک کی وجہ سے۔  
 پکڑ کر لپیٹ۔ جسمانی اور دماغی کمزوری۔ جسمانی کام سر میں درد اور بازوؤں میں درد پیدا  
 کر دے۔

نابجا۔ شدید ناتوانی اور تھکاوٹ۔ تھکا ہوا محسوس کرے۔ دماغی اور جسمانی طاقت میں کمی  
 کھلی ہوئی چلنے سے انفاق۔ ٹھنڈی ہوا سے حساس۔ بستر میں کئی راتیں اور کئی راتیں لیٹا  
 رہنا چاہے کیونکہ ایک دن رات کا آرام اسے سکون دینے میں ناکام رہے۔ طاقت کی کمزوری خالص  
 طور پر ناگہانوں کی۔ پتلے وقت لڑکھڑائے۔

سفر کو لیا۔ کافی دیر تک جسمانی مشقت کو برداشت کرنے کی طاقت دے دے بغیر کھائے پیے  
 اور کمزوری کے احساس کے۔ ۱۰ سے ۲۰ مشقت ایک بار فی خوراک دیجئے۔

کار بورد کچ۔ بچے کو دودھ پلانے سے کمزوری۔ عادی بیماری اسہال۔ انفلوئنزا کی کمزوری کو  
 کو ٹھیک کرنے کیلئے شاندار دوائی ہے۔ ۲۰ میں ہر چار گھنٹے بعد یعنی دن میں ۳ بار دوا تک  
 دیجئے۔ تب ایک ایم طاقت میں لگے دو ماہ ہر روز دوا تک دیجئے۔

کوکا۔ یہ طاقت بخش اور طاقت دینے کا اثر رکھتا ہے وہ گرمیوں کی گرمی برداشت کرنے کے  
 اہل ہو جاتا ہے بنسبت سردیوں کی سردی کے۔

ایبومنا۔ سارے جسم کی شدید کستی۔ سست۔ لڑکھڑائی چال۔ شدید تھکاوٹ۔ خاص طور پر بولنے  
 وقت شدید غنودگی۔ اور تھکاوٹ۔

کیمفور۔ شدید طور پر سست نبض محسوس نہ کی جاسکے۔ گنتی نہ کی جاسکے۔ بہت تیز تمام جسم پر  
 ہر جیسے ٹھنڈک چہرے پر سردی جیسی زردی۔ ٹھنڈا۔ کمزور کر دینے والا پسینہ۔ چہرہ زرد یا  
 نیلا ہونٹ، ہرے نیلے۔

ایسڈ فاس۔ اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری کے بعد دماغی کمزوری (پہلے دماغ تھک جائے۔

یہ بھول جائے اور تب جسمانی کمزوری ہو۔ نادانستہ وجوہات کی وجہ سے کمزوری۔  
میوٹرک الیڈ۔ یہ ایڈرناس کا آلٹ ہے۔ اس میں جسمانی کمزوری پہلے آتی ہے۔ تب اس کے بعد دماغی کمزوری۔

الیومن۔ اعصاب کی ناخالص کمزوری۔ مطالعت کی کمی۔ ٹانگیں اور بازو کمزور۔  
نیٹرم میور۔ کمزوری لاغری اور اعصابی کمزوری اور مرض کا پتہ پڑا ہوا۔ چمکدار جلد کے ساتھ زرد رومی، رنگت جیسے کہ گریس لگائی ہوئی ہو۔  
شائم میٹ۔ بڑھتی ہوئی کمزوری۔ جسمانی خلل۔ نزلہ وی حالت۔ اعصابی کمزوری کافی مالوں سے لگے کا بیٹھ جانا۔ کمزوری کی وجہ سے آواز کا جلتے رہنا یا آلات صوت کی ناخالص کمزوری۔  
الغلقا۔ جری پیدا کرتا ہے اور فیجوں کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ اعصابی کمزوری۔ پیشاب میں کھار آنا۔  
اعصابی بدھمی۔ اعصابی کمزوری۔ ٹی بی یا ذیابیطس کی وجہ سے کمزوری۔ مدد کچھ کرنا۔ تاہم اطرے لہذا دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

کاروینیم سلفٹ۔ نمایاں شدید کسٹی۔ اور لگاتار پڑے رہنے کی خواہش جب کمزوری شراب جیسے محرکات کی وجہ سے ہو۔ ٹیڑھیاں پر ٹھنسنے سے دم گھٹتا ہے اور کمزوری کھلی ہوئی افادہ نیک تیز بھونکوں میں زیادہ مرض۔

آئیوڈیم۔ پٹنے سے شدید کمزوری اور تھوڑی سی شقت سے بکثرت پسینہ (کالی آئیوڈ کا کا مرض بغیر تھکاوٹ کے کافی چل سکتا ہے)

کوکولس انڈیکا۔ درد دھڑلنے کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری۔ پریشانی سے گجھراہٹ۔ اور فینڈ کی کمی کی وجہ سے کمزور لوگ۔ جسمانی کمزوری کے نتیجے میں نالغ ہو جائے جسمانی یا ذہنی۔  
مشقت یا رباؤ۔ جھیلنے کے نااہل پیوہب کام بعد از وقت کرے۔

ایسٹیک الیڈ۔ کئی برسوں کی کمزوری۔ قلب خون۔ کمزوری۔ بھوک کی کمی۔ درشتی دق جلد دار پیاس۔ زرد پیشاب بکثرت۔

سنا۔ جب نائیز جن کے مرکبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے تمام صوت براد ہو چکی ہو تھکاوٹ

کھانا کھانے کے بعد دل ڈوبنے کا احساس۔

کالی فاس۔ دماغی دباؤ کی وجہ سے کمزوری۔

چائنا فاس۔ رطوبات زندگی بہہ جلنے اور خون کے ضائع ہونے سے کمزوری۔ نلو کے حمل کے بعد۔ اسپہال اور دیگر تکالیف یا رطوبات کے ضائع ہونے جیسے کہ خون۔ مادہ منویہ کے اخراج اور اسپہال کے بعد زرد محسوس کرے۔ مہجایا ہوا بہہ۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں اور نیلے حلقوں سے گہری ہوئیں۔

الٹرس فی ری نو سام { رحم کے خروج کی وجہ سے کمزوری۔ یا  
ہیلو نیاس { رحم کے باہر نکلنے کی وجہ سے کمزوری۔

نکسوامیکا۔ ایلو پیٹھک ادویات کے استعمال کی وجہ سے کمزوری۔

امونیا کارب۔ کمزوری۔ طاقت کی کمی۔ قوت۔ زور کی کمی۔ کمزور۔ تھکا ہوا۔ دماغ اور جسم کا تھکا کر چور ہو جانا۔ حرکت پر دل کی دھڑکن اور مشکل سے سانس لینا۔

چیلیڈونیم۔ جمائوں کے بغیر شدید سستی اور اونگھ سستی۔ تھکا ماندہ۔ سست طبیعت۔ یہ نہ جانتے ہوئے کراہیں کیا خرابی ہے اچھا محسوس نہ کرے۔ کمزوری اور سستی۔

آرنیکا مانٹ۔ زیادہ شقت اور ٹھپوں کی تھکاوٹ کی وجہ سے کمزوری جو زخموں کی وجہ سے ہو۔  
فیرم میٹ۔ قلت خون کی وجہ سے کمزوری۔

ایومنا ملیسکیٹ۔ ذہنی اکساہٹ کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ غصہ سے اور زیادہ شقت کے کام سے غیر حاضر دماغ۔ بازوؤں کی کمزوری۔ سیرم جیوں پر نہ چڑھ سکے جیسے کہ جسم بہت زیادہ دزنی ہو۔

سورائینیم۔ حاد امراض کے بعد کمزوری۔ انسر دگی۔ ناامیدی۔ رات کے پسینے تمام اخراجات کانوں سے۔ انٹرلوین سے لیکوریا۔ پسینہ۔ تھوک وغیرہ بدبودار۔

## دانت

یکمو میلا۔ دانت نکلنے کی تکالیف کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ بچہ چڑچڑا اور بڑبڑائے بزر

اھربہ بودار اسہال کے ہمراہ، مسوڑھے سرخ اور دکھتے ہوں۔ درد سے چیخے اور جب کھانے کو دیا جائے، پیٹنے کو دیا جائے یا کھلونے دیئے جائیں تو وہ لینے سے انکار کر دے۔ ڈھانپا جانا پسند کرے۔ کلکیر یا کارب۔ دانت آہستہ آہستہ برہمیں یا دانت دیر سے نکلیں جب مسوڑھے زرد اور چمکدار ہوں۔ ماتھے پر پسینہ اس کی نمایاں علامت ہے۔

کلکیر یا فاس۔ کمزور بچوں، کھلے تالو والے بچوں جن کے دانت آہستہ آہستہ نکلیں اور ان کے دانت، ہڈی بنانے والے مواد کی کمی کی وجہ سے تیزی سے گل مڑ جائیں۔ دانت نکلنے کے دوران اسہال۔

کالو منٹھ۔ جب کوئی بچہ اپنی خوراک بغیر چبائے جلدی جلدی کھاتا ہے۔ یا اسے پسند نہیں کرتا۔ گیس کی وجہ سے پیٹ کی تکالیف۔

پلسٹیللا۔ جب بچہ خیرین۔ اچھی قسم۔ ڈرپوک اور صحت تھبتھپانے پر مطمئن ہو جائے۔ ٹیوبو کو لیٹم۔ کمزور بچے جن میں۔ ذہنی اور جسمانی بڑھوتری رکی ہوئی ہو کمزوری کی وجہ سے دانت دانت نہ نکل رہے ہوں۔

فائٹولا کا۔ جب بچہ دانتوں اور ہونٹوں کو کاٹے۔

کریونزوٹ۔ جہاں دانت درد اور تکلیف سے نکلیں۔ مسوڑھے سفیج کی طرح ہوں اور درد کریں۔ جب دانت باہر نکلیں تو گلنے مرنے کے عمل کا اظہار ہو چکا ہو۔ بے چینی اور ادھر ادھر نکلنے کے لئے۔ ادھر ادھر کر دین میں بے قبض اور غیر مضبوط خوراک کے اسہال۔

زیمک میٹ۔ مسوڑھوں کو آپس میں دبانے کا رجحان۔ تکلیف دہ دانت نکلنے کے دوران دانت پسینا۔ دانتوں کا ڈھیلے ہونا یا ہلنا اور مسوڑھوں سے خون کا بہنا۔

## ذیابیطس۔

ایٹیک لیڈ۔ ذیابیطس جس میں بکثرت پانی جیسا چشماں شوگر کے ساتھ یا شوگر کے بغیر تیز پیاس۔ کمزوری۔ زرد اور گوشت کی کمی ہو۔ یعنی مریض دُبلتا پتلا ہوتا چلا جائے۔

لیک دیک ڈیفلو۔ پیشاب بکثرت پانی جیسا شدید پائس۔ اور گاڑھا پیشاب بکثرت۔ کمزوری۔ قلت خون۔

آرٹھریٹک بریٹیم۔ قبض اور پائس کے ساتھ ذیابیطس کے لئے شاندار دوائی ہے ۸۹ میں ۲ قطرے فی خوراک ۲ بار ہر روز استعمال کرائیے۔

تھائیرائیڈین۔ ذیابیطس کے لئے شاندار دوائی ہے جس میں گال سوجے ہوئے ہوں۔ بہت تیزی سے علامات ظاہر ہوں شدید کمزوری ہو۔

ایسڈ فاس۔ اعصابی مریضوں میں ذیابیطس۔ پیشاب بہت زیادہ آئے۔ یہ دودھیا رنگ کا اور ایس بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے۔ شدید کمزوری اور پھٹوں میں شدید دھکن غم پریشانی اور پیشانی کی دہرے ذیابیطس۔ ابتدائی سیج میں ذیابیطس کا یقینی علاج چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ سائیکوجیم۔ ذیابیطس اور بلڈ شوگر میں اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت کارآمد دوائی ہے۔ شدید پائس اور پیشاب بہت زیادہ۔ ذیابیطس کے لئے یہ ایک مخصوص دوائی ہے۔ ۵ تا ۱۰ قطرے ہر روز ہر ۳ گھنٹہ بعد دن میں چار بار۔

یورینیم ٹائٹرکیم۔ قوتِ جاذبہ کی وجہ سے کمزوری اور اس کی وجہ سے ذیابیطس۔ نظامِ ہضم کمزور۔ سستی اور پیشاب میں کافی شوگر۔ کافی بھوک اور پائس۔ ضعفِ معدہ میں ذیابیطس میں اس کی کافی تعریف کی جاتی ہے۔ شدید پائس۔ کثرتِ پیشاب۔ زبان خشک۔ شدید بھوک اگرچہ جب سے خوراک سے بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔

آرٹھریٹک میٹ۔ سوجے ہوئے ٹخنوں کے ساتھ ذیابیطس۔

آرٹھریٹک ٹائٹرکیم۔ پیشاب میں شوگر کے ساتھ شدید پیشاب۔

نیرٹرم میور۔ گھٹیا دوی نوگوں میں ذیابیطس جلد کی خشکی کے ہلہ۔ تمام جسم پر خارش۔ بے جٹیاں اور افرنگی ہر گھنٹے بعد پیشاب آئے۔

لیکٹک ایڈ۔ گھٹیا کے ساتھ ذیابیطس۔

تھوجا۔ سوزاک کے مریضوں میں ذیابیطس۔ اعصابیت۔ بے خوابی قبض۔ بعض اوقات دل کی دھڑکن۔ پیشاب میں شوگر۔

گلسٹرین۔ کمزوری کے ساتھ ذیابیطس۔ سر درد۔ تنگی تنفس ایسٹون کے ہمراہ پیشاب میں شوگر۔  
 البیون کے ساتھ یا اس کے بغیر یا جھنڈیاں۔ گنٹھیا کے ہمراہ یا اس کے بغیر۔  
 پیکرک ایسٹ۔ شدید پیاس کے ساتھ شوگر اور رات کے وقت پیشاب بکثرت۔  
 ماسکس۔ شوگر جس کے ہمراہ نامردی ہو۔

ٹارکیسیکم۔ پیشاب کی خواہش کے ہمراہ ذیابیطس۔ پیشاب بکثرت آئے۔  
 ایونٹن۔ خدی قسم کی قبض کے ہمراہ ذیابیطس۔ پاخانہ تھلا اور چپٹا۔ پاخانہ خارج کرتے وقت بہت  
 وقت لگے۔

جیمو نٹھس ویر۔ قبل از وقت ذیابیطس کی حالت اور مگر کے مریض بو ذیابیطس میں مبتلا ہوں۔  
 شدید پیاس۔ بہت زیادہ مقدار میں گہرا پیشاب صغریٰ رنگوں اور گلوکوز کے ساتھ۔ انسولین کی ضرورت ہے۔  
 ایوینٹن میٹ۔ ذیابیطس میں غشی۔ لوگوں کو پہچان نہ کر سکے یا سوالات کے جواب نہ دے سکے۔  
 قبض لیکن اکثر بلا ارادہ پیشاب خارج کر دے۔ ۲۰۰ ملات میں دیکھئے۔

کارلوائیمیلس۔ موٹے آدمیوں میں ذیابیطس اور کئی دفعہ پیشاب خارج کریں۔ گیس اور قبض ہو۔  
 آرمیکم البم۔ ایک شاذ اردوائی ہے لیکن ڈاکٹروں نے اسے بہت زیادہ نظر انداز کیا ہے۔  
 ذیابیطس کے علاج میں ایس خشک ٹوٹے والی جلد۔ منہ کی خشکی۔ زبان اور ہوا کی نالی میں نہ بھنے  
 والی پیاس۔ بھوک نہ ہو اور قبض ہو۔ پیٹ میں جلن کا احساس جو منہ تک نہ ہو۔ مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ  
 بن جائے۔ وہ اپنی طاقت کھودیتا ہے اور بعض اوقات دانت بھی گر جاتے ہیں۔ مریض خوش فطرت  
 ہوتا ہے۔ صاف ستھرے کپڑے اور ہر چیز سلیقے سے رکھنا چاہتا ہے۔

کینتھرس۔ پیشاب میں البیون کے ساتھ ذیابیطس  
 کارلوائیج۔ صبح کے وقت منہ میں بہت زیادہ خشکی۔ شدید بھوک۔ مگر میں درد جیسے کڑخی ہو۔  
 اچانک کمزوری اور غشی جسمانی سستی اور افسردگی۔

آرنیکا مانٹ۔ جگر چوٹ یا ٹھک گئے۔  
 نکس وایسکا۔ ذیابیطس، بیہوشی اور چکروں کے ہمراہ۔ کانوں میں صنبھناہٹ۔ بے خوابی۔

سب دماغ اور حرام مغز کی خرابیوں کی وجہ سے ہو۔  
 گر لیفائٹس - تباہ شدہ معمت - گنٹھیادی مزاج، لاغری اور عمومی کمزوری - بازوؤں میں انٹس اور  
 جوڑوں کی ناجانی کمزوری - راتوں کی بے خوابی کے ساتھ بے چینی - 556  
 بلیمیم - رخسار سوج ہوئے قبض کے ہمراہ ذیابیطس پیشاب میں البیومن اور پھیلاؤ -  
 فاسفورس - ذیابیطس یا پیکریاز کی امراض خاص طور پر پی بی یا گنٹھیادی مزاج لوگوں میں  
 بے چینی اور نیند خشی ۲۴ گھنٹے میں ۴ یا ۵ پنٹ پیشاب - ٹھنڈے پانی کی پیاس -  
 رٹھنہیا - ذیابیطس میں کم پیشاب -

## ناراض پتے یا پیچیدہ مزاج پتے

کیموسٹیل - پریہجان - بے چینی بے صبرے لیکن جب اٹھایا جائے تو مطمئن اور چپ - ایک چیز  
 کی خواہش کرے لیکن جب پیش کی جائے تو دیر میں دے اور کوئی دوسری چیز مانگے - نوجوان لڑکیوں  
 کی چھاتیوں میں ناقابل برداشت درد اور حساسیت نمایاں خصوصیات ہیں -  
 اگنیشتیا - اعصابی - شدید جذباتی - افسردہ - اور ٹمگن - چکے چکے غم میں گھٹنے کا رجحان - پریشان  
 بلا ارادہ آہیں - متواتر جہانیاں اور معمولی معمولی چیزوں پر رودے - ذہنی طور پر افسردہ -  
 پلسٹیل - غیر متوازن و تبدیل ہونے والی طبیعت - ڈر لوک اور جذباتی - معمولی معمولی باتوں پر  
 رودے - ہنسنے پر آنسو بہیں - ذہنی تھکاوٹ - غیر حاضر دماغ - ارادے کا کچا - پریشان - ناشکرا -  
 یا احسان فراموش - صنعت مخالف سے ڈرے - بے خوابی - پیاس یا سکل نہ ہو - چھنیاں -  
 یسپیا - کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لے - ہر چیز سے لاپرواہ چاہے کھیل ہو یا نہ ہو - انعام نمایاں  
 پوزیشن وغیرہ کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لے اور کوئی بھی چیز اس کو خوش نہ کر سکے - کم حوصلہ اور تھکاوٹ  
 غموں سے - کونے میں چھپ کر آہستہ آہستہ روئے - بہت ہی جذباتی - ناکہ برز و دردمند - سر کر  
 کی خواہش - گوشت سے نفرت، دودھ ہضم نہ کر سکے -

آیوڈم۔ لالچی، پھیمان، آرام سے نہ بیٹھ سکے۔ ہمیشہ بھوکا کبھی بھی کھانے سے تسلی نہ ہو۔  
 اچھا بھلا کھانے کے باوجود تیزی سے ڈبلا ہو۔ غدد کی رطوبات کی غلط افزائش شلّا خائیں، اینڈ  
 بغل کے غدد۔ ماسا رقی غدد۔ چڑے کے غدد وغیرہ وغیرہ۔  
 ہمیشہ سلف۔ ظالم۔ غلط کام کرنے کی تحریک یا خواہش مارنے کی آگ لگانے کی کبھی مصلحت  
 نہ ہو۔ ہمیشہ جگہ تبدیل کرے۔ غیر متعہد جلد۔ خراشدار بکثرت پسینہ۔

اینا کارڈیم۔ محرک۔ جن سے محبت کرتا ہے انہی سے اختلاف کرے جانتے ہوئے ایسا کرے  
 لیکن مجبوراً کرے یا اس کے بغیر نہ رہ سکے۔ بخیرہ موقوفوں پر ہنسے لیکن معمولی چیزوں پر باتوں پر  
 بخیرہ ہو۔ پریشان۔ جڑ چڑا۔ ظالم۔ تیس کھائے اور لعنتیں بھیجے کھانا کھانے کے بعد اچھا ہو۔  
 لائیکو پوڈیم۔ ناراض۔ شدید جڑ چڑا۔ شدید الفاظ میں اظہار کرے۔ اچانک چوک پڑے پانے  
 اور پر کوئی کنٹرول نہ کر سکے خود اعتمادی کا فقدان۔ ذمہ داریوں سے کئی کترائے یعنی ذمہ داریاں قبول  
 نہ کرے۔ جب جاگتا ہو تو بد مزاج یا دوا داشت جاتی رہے۔ لکھتے وقت الفاظ بھول جائے۔ اپنا  
 مافی الضمیر ادا کرنے کے لئے مناسب الفاظ نہ پائے یعنی اپنے خیالات کے اظہار کیلئے غزروں الفاظ میں  
 کلاشیکم۔ ڈرپورک۔ نہ بٹھا ہوا بچہ بولنے اور چلنے کے عمل میں دیر کرے۔ شام کے بھینسے میں پریشانی  
 اور جڑ چڑا پن بچہ بستر میں نہ جائے۔

سینی کو لا۔ خدی۔ خود مر۔ بچہ جو روز بروز لاغر ہوتا ہو۔ بچہ گندہ نظر آئے۔ بڑھا۔ گریس لگا  
 ہوا معلوم دے۔ گردن کے قریب جلد بھریوں والی اور نیچے کلے۔

آرٹھرم ٹائیکیم۔ بچہ سکول جانا پسند نہ کرے۔ اس کی ۴۰ دن میں ۴ بار دینے سے سکول  
 جانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔

سلفر۔ مخمور۔ دھرم میں متواتر مبتلاء۔ آگزیما۔ صبح کے وقت اسہال۔ بے خوابی۔ کمزوری۔ شدید  
 کمزوری۔ شدید کمر درد۔ کھراہہ سکے۔ ورزش سے نفرت۔ ہانسنے اور صومنے سے نفرت۔ جلن۔  
 خواب۔ (دیکھئے بھیانک خواب)

نکسو امیکا۔ عادات کے خواب نیند سے جگا دیں۔ ہر تیرے چوتھے روز جنسی خواب اتمام کے ساتھ۔

علیحدہ کرنے میں بیٹھ کر کر دے۔ کافی یا شراب پیئے کا خواب۔  
 پلسٹیللا۔ سیاہ درندوں کے خواب۔ بائیں طرف لیٹے پر دل اور پھلتی میں اجتماع خون۔  
 مرکب کورس۔ جانوروں کے خواب۔  
 میگنیشیا میور۔ جب نیند کے دوران بولے اور چلائے۔ پریشان کن خواب  
 رسٹاکس۔ ٹائیفائیڈ میں کاروبار کے متعلق خواب۔ ہوا میں اڑنے کے خواب۔  
 ڈفنے۔ سیاہ پتوں کے خواب۔  
 جیلیڈونیم۔ جنازوں کے خواب۔  
 آرنیکا۔ قبروں کے خواب۔  
 تھو جا۔ مردہ لوگوں کے خواب۔ خوابوں کی وجہ سے غیر محنت نیند۔ بلندی پر سے نیچے گرنے لڑائی  
 کے خواب یہ سب زیادہ ٹیکہ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اہم طاقت میں دیکھئے۔  
 سلفر۔ خواب کہ اس کو کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ خواب میں پیشاب کرنے والے برتن کے اوپر  
 بیٹھتی ہے لیکن اپنے بستر کو گیلیا کر لیتی ہے۔  
 بیلاڈونا۔ آگ کے خواب۔  
 کالی کارب۔ جموٹوں کے خواب۔ تصوراتی۔ بد قسمتی کے خواب۔  
 کیمفر۔ روعوں کے خواب۔  
 سلیشیا۔ قتل کے ڈراؤنے خواب۔ لاشوں اور مردہ لوگوں کے۔ زہریلے جانے کے خواب  
 دہ گھٹنے کے خواب۔ گھر میں چوروں کے داخلے کے خواب میں نیند میں خلل پڑ جائے۔ اہم طاقت میں دیکھئے۔  
 کریوزوٹ۔ خواب میں ابھی طرح سے پیشاب کرے اور رات کے وقت بستر کو گیلیا کر دے۔  
 گلوناٹن۔ آنسوؤں کے ساتھ خواب میں روئے۔ ڈراؤنے خواب۔  
 برائی اونیٹا۔ تمام راستے کا دوبارہ پریشان کن تجربہ گھر میں مسائل تمام راستے ابھارے۔  
 لیک کنیم۔ سانپوں کے خواب۔ پیشاب کرنے کے خواب۔ حادثے کو روکنے کیلئے جاگ جائے۔  
 چائنا آف۔ زندہ کڑے قے کے ذریعے نازک کرنے کے خواب۔

پیکرک السیڈ۔ خواب دیکھ کر وہ حاملہ ہے یا اپنے حاملہ ہونے کے خواب۔  
 آرٹیکامانٹ۔ ڈراؤنے خوابوں سے پُر۔ بمیانک خواب۔ کچڑ والے پانی کے خواب۔ ڈاکوؤں کے  
 خواب۔ رات کے وقت خون۔

جولڈنڈی۔ حادثات اور لڑائیوں کے خواب۔  
 ایرکھٹائٹس۔ نگاہ ہونے اور شرمندگی کے خواب۔  
 میگنیشیا کارب۔ آگ کے خواب۔ سببلا۔ ڈاکوؤں۔ لڑائیوں۔ روپوؤں۔ خوشیوں۔ ہمتیوں  
 مرے ہوئے لوگوں کے خواب۔

کوکولس۔ پوشیدہ چیزوں کے ڈراؤنے خواب جب آنکھیں بند کرے اس پر ظاہر ہوں۔  
 اگنیشیا۔ تمام رات ایک ہی قسم کے خواب۔  
 نیٹرم سیور۔ لیٹروں کے ڈراؤنے خواب۔ قاتلوں۔ چوروں اور آگ کے خواب۔ جلیں دار سپاہی کے خواب۔  
 ایلو۔ پاخانہ خارج کرنے کے خواب۔

کروٹیس۔ قتل کے خوفناک خواب۔ موت کے مژدہ لوگوں کے۔ مردہ جسموں کے۔ مردوں اور لاشوں کے  
 ساتھ ٹھہرنے قبرستان میں ہونے کے خواب۔ نعلش کے خواب بھی آئیں۔ ڈر کر قید سے بیدار ہو جائیں  
 لیکس۔ خوفناک خواب نیند کو درہم برہم کر دے۔ دکھنے کے خواب۔ کافی دیر تک سونے کے بعد۔  
 نیٹرم سلف۔ لڑائیوں کے خواب

نیٹرم فاس۔ بہت زیادہ خواب آئیں۔ خواب پریشان کن عسقیہ خواب۔ مرے ہوئے لوگوں کے۔  
 پریشان کن گز سے ہوئے واقعات کے خواب آگ کے۔ خوفناک و خوشگوار پریشان اور زردار خواب۔  
 فیرم ایٹوڈ۔ چوروں کے خواب

**لوناپن۔** (ذہنی اور جسمانی طور پر پچھلے بھی دیکھئے)

ٹیوکرکولنیم۔ یہ اپنی طاقت میں دی جائے ۲۰۰ سے کم طاقت میں نہ دی جائے۔ اسے بار بار نہ  
 دہرایا جائے۔ اس دوائی سے علاج شروع کیجئے۔

سفلیئم۔ ٹیوبرکولینم سے اول بدل کر دی جائے ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں ٹیوبرکولینم اور سفلیئم کی ہر ہفتہ یا پندرہ روز کے بعد دوائی کی طاقت کے مطابق دہا جانے سے یہ بونیاں کو ٹھیک کر دے گی۔  
برٹیا میور۔ جسمانی اور ذہنی طور پر بڑھنے والے بچوں کو ۲۰۰ طاقت میں دیں۔ ٹیوبرکولینم کے ایک ہفتہ کے بعد دی جائے۔

آرجنٹم نائٹرکیم۔ زردی نائل بننا سہل کیساتھ سوکھا مسان ۲۰۰ طاقت میں دیکھئے۔  
سلفر { اگر بچے بچپن میں سر جائیں۔ والدہ کو حمل کے دوران دیں۔ سلفر ۶ طاقت کلکیہ یا فاس } اور کلکیہ یا فاس ۶ طاقت میں ہر روز ایک خوراک اول بدل کر دیں۔  
زیرو فاسیلیم۔ کند ذہن۔ پڑھائیں لیکن پڑھائی پر توجہ مرکوز نہ کر سکے۔ نام بھول جائے۔ الفاظ کا آخری لفظ پہلے لکھ دے۔ عام الفاظ کے غلط جوڑ کرے۔

برٹیا کارب۔ جسم اور ذہن کا بونیاں۔ دماغی بونیاں یا اعضاء کا بونیاں۔ بچے دیر سے چلنا سیکھیں اگرچہ ان کی ٹانگیں کافی مضبوط ہوں۔ بولنے اور سمجھنے میں سست ہوں۔ ایک خاص عضو بڑھنا چھوڑ دے جبکہ دوسرے اعضاء مکمل طور پر یا اصل سے زیادہ بڑھ جائیں۔ بچہ ڈرپوک اور اجنبیوں سے شرماتا ہے جو بچی کسی اجنبی کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو اس سے چھپاتا ہے۔ چہرے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اور انگلیوں کے درمیان میں سے شرمیلے پن سے دیکھتا ہے۔ لڑکیاں بوجھت کے دیر میں بھی بچوں کی طرح کے اعمال کا اظہار کریں اور گرڈیوں سے کھیلیں۔  
ٹیٹرم میور۔ بچے دیر سے بولنا سیکھیں۔

کلکیہ یا کارب۔ ٹانگوں کی کمزوری کی وجہ سے بچے دیر سے چلنا سیکھیں۔ دیر سے دانت نکلیں۔ تالو کی ہڈیاں آہستہ آہستہ ملیں۔ سوکھا مسان اور ہڈیوں کا گلنا سٹرنا۔ اگر کیس میکیس۔ بچے بولنا اور چلنا دیر سے سیکھیں۔

الفلفا۔ بچے یا بڑے لڑکے اٹھارہ برس کی عمر میں کافی مضبوط ہونے کے باوجود مر جائیں۔ مدہ منجھ کے دو قطروں کو بطور فی خوراک چھ ماہ تک دیں۔

کلکیہ یا فاس۔ بولنے بچوں کے لئے جو چھوٹے کمزور۔ زرد۔ سر بہت بڑا۔ تالو بڑا اور کھلا

ہوا اور ابھرا ہوا۔ کھوپڑی کی ہڈیاں تیلی اور دباؤ کے تحت پتلے کاغذ کی طرح آواز دیں۔  
 میکل کار۔ حرام مغز کی بناوٹ میں تبدیلی کی وجہ سے جسم کی غلط بناوٹ۔ ہاتھ اور ٹانگیں  
 نہ بڑھیں۔ وہ بڑھاپے کی نگہین کی طرح گر جائیں۔

## تنگی تنفس - (دیکھئے، دم۔ دل اور کالی کھانسی)

ناجا۔ دم گھٹنے اور دم رکھنے کی وجہ سے چھاتی پر دباؤ۔  
 کلورلیم۔ شدید تنگی تنفس۔ چھاتی پر وزن اور تنگی کا احساس۔ بے خوابی کیساتھ دم۔  
 نکس و امیکا۔ پیٹ میں گیس بھرنے کی وجہ سے تنگی تنفس۔  
 نیٹرم میور۔ ٹھنڈے ساتھ سانس کا نہ آنا۔ کھلی ہوا میں آفاقہ اور اس کی خواہش رکھے۔  
 شقت کرنے پر تنگی تنفس۔

کاربووکیج۔ سانس لینے میں شدید تکلیف میں پکھا اٹھنا چاہتا ہے۔

سیڈرن۔ مجامعت اور جنسی عمل کے دوران تنگی تنفس۔

سٹیفگیٹا۔ مجامعت کے آخر پر تنگی تنفس۔

آرنک البم۔ پیشاب میں البیومن کے ساتھ تنگی تنفس۔

ایپس میل۔ دماغی بھیلیوں میں پانی پٹنے پر تنگی تنفس۔

پٹرولیم۔ تمام دن تنگی تنفس۔

گلوٹامائن۔ سن ٹروک (لوگنہ پراپر) پیشاب میں البیومن بھی ہو سکتی ہے۔

لیکسیس۔ نیند کے دوران دم گھٹے جاگنے پر سانس لینے کیلئے ذمہ دار پینے کے  
 بعد تنگی تنفس۔

فاسفورس۔ معمولی سی خوراک کھانے پر تنگی تنفس۔

امونیا کارب۔ تنگی تنفس دل کی دھڑکن، تھکاوٹ اور دل کی کمزوری کی وجہ سے لیکن کسی نعل

یا نامیاتی نقص اور دم کے بغیر۔ تصویر سی حرکت پر بھی تنگی تنفس۔ گرم کرہ میں زیادتی ٹھنڈی کھلی ہوا  
 میں آفاقہ ہو۔

کاروبار نیم سلف تیز سانس یا سانس مشکل سے آئے۔ شراب یا کولہ گیس کی وجہ سے دم گھٹے۔ شام کے وقت یا میٹھییاں چڑھتے وقت۔ بند کرے۔ کھانا کھانے کے بعد کھانسی، صفوری یا شفت پر بھی زاتی گریفا ٹپس۔ جب سوجائے تو دم گھٹے اور اکثر رات کو سانس لینے کیلئے اٹھ کھڑے۔ دوا ۵ ایسپیڈ دوسرا۔ دل کی تکلیف کی وجہ سے تنگی تنفس۔ پھیپھڑے کی آرٹری میں خون کے جم جانے پر۔ چیشاب کی وجہ سے تنگی تنفس۔ یہ دوائی خون میں آکسیجن کی مقدار کو زیادہ کرتی ہے۔ سیلشیا۔ ٹیک لگانے پر تنگی تنفس۔

فیرم میٹ۔ آرام کے دوران تنگی تنفس میں زیادتی۔ آہستہ آہستہ غامضی سے چلنے پر آفاقہ تیز چلنے پر زیادتی۔ سوراخیم۔ بیٹھے پر تنگی تنفس، بازو جسم سے دور رکھ کر لیٹے پر آفاقہ۔ جب بازو جسم کے قریب لائے جائیں تو مرض میں زیادتی ہو۔

میڈو ریم۔ سانس کی نالی کا منہ کا تشنج۔ ہوا تکلیف سے غارت ہو۔ لیکن آسانی سے اندر آکے۔ منہ کے بل لیٹنے پر آفاقہ ہو۔

اکونٹیم فیروکس۔ تنگی تنفس اس حد تک شدید ہو کہ مریض نصف بیٹھا ہوا ہو اور اپنے سر کو ہاتھ کی پتھیلیوں پر لکائے ہوئے ہو۔

## • بجلی کے جھٹکے

ایلینٹھس۔ سر سے بازوؤں میں بجلی کی زد پہننے کا احساس۔

یو فور بییم۔ بجلی کے جھٹکوں جیسی دردیں جو مریض کو بستر سے کودنے پر مجبور کر دیے۔ سٹرکینم۔ کسی شخص میں بجلی کے جھٹکے لیکن جب اسے چھوا جائے۔ جب بستر میں لیٹا ہو اور۔ جب موٹر کار میں بیٹھ ہوئے شخص کو چھوا جائے تو بجلی کے جھٹکے لگیں۔

بیریم سلف۔ سر میں بجلی کے جھٹکے اور کنپٹیوں میں تکیں دار نبض۔

نوٹ:۔ اگر بجلی کا جھٹکا لگ جائے تو ملک شوگر میں بجلی کی زد گزار کر مریض کو دی جائے جس سے مریض فوری طور پر بحال ہو جائے گا۔

# لاغری، شریانوں میں خون کے لوتھڑے بننا

(بھڑیاں، سوکھا ستان - بھی دیکھئے)

کیلنگٹس جی - جب لوتھڑا دل سے آئے تو اس کے بار بار آنے کو روکتی ہے۔ مریض جذباتی اور اعصابی ہوتا ہے۔ تیز جھال لگتے جیسی اور دم گھٹنے والی بغض چلنے اور بائیں طرف لیٹنے پر زیادہ دل کو ایسے بیکٹھنے جیسے کہ لوہے کی پٹی سے بھیچنا جا رہا ہے۔

زکیم فاس - زیادہ خون کے بہنے کی وجہ سے دماغ کا اتیر ہونا یا بگڑنا۔ مرگی کے دوروں کے تشخی اثر کی خرابی اور برو مائیڈ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔

آر جنٹم نائٹرکیم - جب دماغ کی اتیری شراب اور تمباکو نوشی کی وجہ سے ہو۔  
کالچیکم - دماغ کا نرم پڑ جانا۔ تمام جسم میں دردوں کے ہمراہ قوتِ شامہ کی شدت ہو۔

**تھکاوٹ** (کنزروی بھی دیکھئے)

جفنگ - تھکاوٹ کے احساس کو دور کرتی ہے۔ طاقت کی خوش کن ہر دورا دیتی ہے اور بازوؤں میں پچک پیدا کرتی ہے اور ذہن میں صفائی پیدا کرتی ہے۔

آرنیکا مانٹ - زیادہ مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ۔ سخت کھیل کھیلنے سے۔ تیزی سے چلنے سے زیادہ وزن اٹھانے پر تھکاوٹ۔

چیلیڈونیم - تھوڑی سی مشقت سے بھی تھک جائے۔ ہلنے یا چلنے سے نفرت۔  
آر جنٹم میٹ - ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ۔ قوتِ یادداشت۔ دلیل دینے کی قوت کا درجہ برہم ہونا یہ کاروباری حضرات۔ طلباء۔ مطالعہ کرنے والے۔ زیادہ سوچنے والوں کے لئے مفید ہے۔  
چلنے کے بعد تھکاوٹ۔

کاربوووج - تھوڑی دور چلنے پر تھکاوٹ  
سیپیا - تھوڑی دور چلنے یا معمولی مشقت کرنے پر تھک جانا۔

پکڑ کر ایسڈ۔ معمولی شقت سے تھک جائے۔  
سٹر کو لیا۔ کسی بھی وجہ سے تھکاوٹ۔ کھانا کھانے کے نصف گھنٹہ بعد درنگ کے ہاتھ سے  
دن میں دوسرے دن میں۔

## انجلیوں کا سن ہونا۔

نیزم میور۔ اعصابی کمزوری کی وجہ چیزیں گرا دیں۔  
میزبریم۔ ہاتھ ناطق ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکیں۔  
کافی بروم۔ پکڑ کر تھام نہیں سکیں۔ چیزوں کو جلدی سے نیچے رکھ دیں یا ان کو گرنے دیں۔

## بڈیوں کا ٹوٹ جانا

آزیکا۔ بڈی کے ٹوٹ جانے کے فوراً بعد یہ دوائی دی جائے۔ لیکن فوری طور پر کسی سرخن کے  
پایں مرلین کو لجا یا جائے تاکہ بڈی کو ابھی سے سیٹ کر دے۔ پہلے ۱۲ گھنٹوں کے لئے... طاقت  
ہر ۲ گھنٹے بعد دی جائے۔ اس کے بعد درج ذیل ادویات دی جائیں۔ تاکہ جلدی سے بڈیوں کے  
جڑنے کا عمل تیز ہو سکے۔

کلکیر یا فاس۔ یہ دوائی  $x4$  طاقت میں ہر دو گھنٹے بعد دن میں ۶ بار ایک ہفتہ تک دیں۔  
سمفاٹیم۔ یہ دوائی کلکیر یا  $x4$  کے اول بدل کر دیکھائی یعنی ایک ہفتہ کلکیر یا فاس دوسرے ہفتے  
سمفاٹیم  $x3$  طاقت دی جائے۔ بہت زیادہ اثر پذیر ثابت ہوں گی۔

روٹا۔ بڈی جڑنے کے بعد یہ دوائی بڈی کو سخت کرنے اور ٹکڑے پن کو ختم کرتی ہے اس  
سلسلے میں یہ نہایت کارآمد دوائی ہے۔ بہت قیمتی دوا ہے۔ یہ  $x9$  طاقت میں دی جائے اور  
ہر ایک دوائی ایک ایک ہفتہ اول بدل کر دیکھائی۔

آلینشیا۔ زخموں کا اہم۔ افسردگی۔ کانپنا۔ انٹنشن۔ آواز کا برداشت نہ کر سکتا۔ نیند کم اور بے چینی  
کی نیند۔ درودوں کے لئے بہت زیادہ حساس۔

رٹناکس۔ جب بندھنی ٹٹھے چٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں اور رلیض گنٹھیاوی طبیعت کا ہو جائے۔  
 لیکس۔ شدید پریشانی۔ باتونی۔ چلبلا اور ڈرنے والا۔ بے خوابی۔ پریشانی۔ بے چینی کیساتھ  
 جب کلیر یا ناس اور آرنیکا نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹھیک کر دیا ہو تو مندرجہ بالا علامات کیلئے یہ دوائی ہے  
 کلیر یا کارب۔ موٹے آدمیوں میں ہڈی کا ایک طرف ٹوٹ جانا اور دوسری طرف سے ٹر جانا  
 یا دھرا ہو جانا یا جھک جانا۔ موٹے یا سوجے ہوئے پیٹ اور لپینہ والے سروالے آدمیوں  
 کے لئے مفید ہے۔ ۲۰۰ ملاقات میں استعمال کرائیے۔

## پھیمھوندی کی بیماری

لیکس۔ گرم پسینے کے ساتھ نیلگوں مائل جاسنی نظر آئے۔ نیلگوں مائل کن روں کے  
 ساتھ ناسور۔

فامفورس۔ چھوٹے ناسور جن سے بہت زیادہ خون بہے۔  
 تھوچیا { اگرچہ مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو  
 آرسینک البم } یہ دی گئی ترتیب میں دی جا سکتی ہیں۔

## ملف کا ٹٹھ۔ ملفوف رسولی۔

روٹا { بننے والا لیڈ  
 سلیشیا۔ کلانی کی پشت پر ملفوف رسولی۔

## نرم گوشت کا گلنا مسٹرنا

آرسینک البم۔ بوڑھے لوگوں میں خشک گنگرین۔ دھن اور جلن کو گرمی سے افاقہ ہوئے بے چینی  
 اکثر پیچڑوں کی گنگرین میں ظاہر ہو۔ بدبودار اسہال شدید کمزوری کے ساتھ۔

لیکس - زخموں یا چوٹ کے بعد گنگرین - خون میں زہر پھیل جائے - حصّے نیلے اور جانی رنگ کے ہو جائیں تب گہرا سٹرا ہوا خون اور پیپ خارج ہو - ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہونے کے ساتھ سردی محسوس ہو -

سیکل کار - برٹھاپے کی گنگرین، بھینچنا ہٹ اور کڑے رنگینے کا احساس - گرمی سے زیادتی - پنچوں اور پاؤں کی خشک گنگرین - پیچھے اور انگلیاں علیحدہ ہو جائیں اور پھینک دی جائیں - جلد بھری دار خشک سکڑی ہوئی اور ٹھنڈی - احساس زہر - بڑے بڑے دانہ اور غوبی پھائے جو گنگرین میں تبدیل ہو جائیں - اس دوائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں - مرض ٹھنڈے افاقہ محسوس کرتا ہے اور ڈھانپنا نہیں جاسکتا - آر سینکیم البم کے الٹ -

کروٹلیس ایچ - گرم، نیلی، انداز یا تر گنگرین بازو سیاہ پھالوں سے بھر جائے اور بہت سو جا ہوا - بدبودار بو خارج ہو -

کریو زوٹ - پھیپھڑوں کی گنگرین -

کاربووٹیج - پھوڑے اور پھنسیاں گنگرین قسم کی ہوں - متاثرہ حصّے جانی رنگ کے نظر آئیں - برف کی طرح ٹھنڈے - اخراجات گندے اور شدید کمزوری - سلفیورک ایڈ - چوٹوں کے بعد گنگرین ہو جائے -

## عام باتیں - عام علامات

بیلیس پرنس - کوئی بیماری جو ٹھنڈا پانی پینے یا آئس کریم کھانے سے جب جسم گرم حالت میں لاحق ہو جائے جب ایک آدمی گرم ہے یا پسینہ میں شرابور ہے اچانک سردی لگ جائے - ٹھنڈا یعنی گرم جسم یا پسینہ کے ہوتے ہوئے ٹھنڈی بارش میں بھیگ جائے - بووریکس - پیشاب کرنے سے پہلے پانا نہ خارج کرنا -

ایسڈ میوور - وہ بستر کے قریب گر پڑتا ہے اور اکثر اٹھایا جاتا ہے - بستر سے نیچے پھسل جاتا ہے - زنگولس بلب - گرم سے ٹھنڈی حالت یا ٹھنڈی حالت سے گرم حالت میں جانے پر زیادتی یا

درجہ حرارت کی تبدیلی پر کوئی بھی تکلیف ہو جائے۔

سٹریمونیم۔ میٹھی اترتے وقت وہ دو پاؤں پر بیٹھتا ہے اور گر پڑتا ہے۔

آرٹینک البم۔ { ٹھنڈے مریضوں کے لئے جو ٹھنڈے زیادہ  
تکلیف محسوس کریں۔ گرم موسم اور گرم چیزیں  
سلیشیا۔ { لگانے سے افادہ محسوس کریں۔

فلورک الیڈ۔ گرم مریضوں کے لئے جو گرمی سے یا موسم گرمی میں زیادہ تکلیف محسوس کریں یا ٹھنڈی  
کالی آبیوڈ چیزیں لگانے پر افادہ محسوس کریں۔

مرک مال۔ زیادہ گرمی یا زیادہ سردی برداشت نہ کر سکتا۔ درمیانے موسم میں اچھا محسوس کرے۔

ہائیو سائیمس۔ بے تکے یا غیر مہذب کام کرتا ہے۔ جسم کو بچاؤ لٹا۔

ابسنٹیم۔ تشدد پسند۔ متشدد۔ ظالم دے رحم۔ بلاوجہ معذرت رہے۔

غدد (تھائیرائیڈ غدد کا صحیح طریقہ پر کام نہ کرنا)

ٹیوبریکولینیم۔ گردن میں ٹی بی کے غدد۔ ۲۰۰ سے ۱۔ ایم یا سی ایم طاقت تک دیں،

یہ ایسے ہی ایسے غدد کی سوزش کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے تو وزج ذیل لٹا دیا کرنا یا نہیں۔

کلکیر یا آئیوڈ۔ یہ دن میں ۲۰ تین بار دے جائے۔ ٹیوبریکولینیم جو بطور عمل انگریزی جاسکتی ہے

۲۰۰ طاقت ہر ماہ دیتے۔

کلکیر یا فلور۔ غدد کی سختی اور ان میں جماؤ۔ لیمب کا بناؤ اور ہڈی کا بناؤ۔ پتھر کی طرح سخت

غدد و کری ہڈی میں جادلوں کا جماؤ۔

بریا آئیوڈائیڈ۔ جب غدد کے بڑھنے کے ساتھ ٹانسز کی سوزش بھی ہو۔

ہیپر سلفر۔ مفلت غدد کا بڑھ جانا سخت اور پیپ کے بغیر سرد موسم آنے پر۔ غدد

سے پیپ بھی خارج ہو رہی ہو۔

سٹش کیناڈیس۔ غدد کی سوزش اور اس میں سے پیپ کا بہنا۔ یہ پرانے ناسور اور گلے مرنے

کے عمل کو روکتا ہے۔ گردن کے غدود لائون میں گانٹھوں والی رسی کی طرح بڑھ گئے ہوں۔  
تھائیرائیڈین - تھائیرائیڈ غدود کے بڑھنے یا اپریشن کے ذریعہ نازک کر دینے سے یاروڈ  
کا پیدا ہونا۔ ۳۰ طاقت تین دن تک دی جائے۔

کالی آئیوڈ - بلا درد غدود سخت کناروں والے اور سوزش غدود میں سے وہی جیسی تپتی خراشدار  
پیپ ہے۔ غدود کا لاغر ہونا۔ سخت ہونے سے پہلے سوزش۔ آتشکی۔

کالی میور - کیسوی عمل درہم برہم چہرہ گردن وغیرہ پھپھیاں۔ سوزش کے بعد لطف کا رہنا۔

رشکس  
پلسٹیل  
ہیپوزینیا  
سلیشیا

لمف غدود کی سوزش - دی گئی ترتیب میں دیکھئے  
جب ہیرسلفر ناکام ہو جائے۔

فیرم فاس - لمف غدود کی سوزش۔ جذبات کی تصویری ہی انگخت کی وجہ سے چہرہ پر خون ہو  
جائے۔ جیض بہت کثرت سے اور بہت زیادہ مقدار میں قلت خون۔

فاسفورس - اسہال اور سپینہ میں مبتلا کمزور لوگوں میں غدود کی بیماریاں۔  
آئیوڈین - تھائیرائیڈ غدود کی سوزش یا بڑھ جانا۔ میرنرک غدود کا گانٹھوں کی طرح  
محسوس ہونا۔ مریض کمزور اور قلت خون میں مبتلا۔ جبر سے کچے پنچے کے غدود کی سوزش معمولی ہی  
بھی دل کی دھڑکن۔ غدود بڑھیں جبکہ جسم پتلا ہو رہا ہو۔

سپونجیا - خارش۔ سوزش اور غدود کا سخت ہو جانا خشکی۔ گرمی اور بے چینی۔

لائیکوس ویر - دل کی نمایاں علامات کے ساتھ غدود کی سوزش۔ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی  
ہے۔ بغض کی شرح کو کم کرتی ہے اور کافی حد تک سسٹول کی لمبائی کو بڑھاتی ہے۔

کاربو انھیلس - گلے کے غدود۔ پستانوں اور نعل کے غدود جامی ہو جائیں اور سخت ہو  
جائیں۔ نرم ہونے کا رجحان نہ ہو۔ یا پیپ پڑنے کا رجحان نہ ہو۔ غدود زیادہ نہ بڑھیں۔ لیکن ان  
میں کوئلے جلتے جیسی جلن ہو۔ یہ سخت قسم کو ٹھیک کر دیتی ہے۔

کوئیم۔ غدود سخت اور دکھیں۔ بغل کے نیچے غدود سوج کر ناسور بن جائیں۔ گردن۔ چٹوں۔  
اور پیٹ کے غدود بڑے ہو جائیں۔ غدود کی سوزش لعف کے راستے، زخمی کی طرح کی گانٹھیں بنائی۔

## غدود کی سوزش

برومیم۔۔۔ غدود کا بڑھ جانا، خضیوں کا دم پیپ پڑنے کا رجحان کے بغیر سختی۔

کلکیر یا ایوڈ۔۔۔ غدود کی سوزش اور سختی۔

کلکیر یا فلور۔۔۔ سر دیکل اور لعف غدود کی بلادرور بڑھنا اور سختی۔ برائے کائی اور میزٹرک غدود کی بڑھوتری۔ غدار موسم میں زیادتی گرم ٹیپوں اور ملنے پر اذیت۔ ۶ ملاقات میں استعمال کیجئے۔

بیلادوننا۔۔۔ غدود کی سوزش جس میں پیپ پڑنے کا اندیشہ ہو۔ یہ بغل کے حصہ میں یا پستانوں میں جو ذری سرخ اور حساس ہوں۔ سرخ دھاریاں جو سوجے ہوئے غدود سے نکلیں، شدید گرمی اور سوجی چھبے جیسی دردیں ہوں۔

کلکیر یا کارب۔۔۔ غدود کی سوزش جن میں پیپ پڑنے کا رجحان ہو۔ سر پرکھا اور بدبودار پسینہ۔  
گرفیائٹس۔۔۔ بغل۔ چٹوں اور گردن کے غدود کا بڑھ جانا جلدی علامات کے ساتھ۔ پیٹ بڑا اور سخت ہو۔

سکروفولییر یا۔۔۔ غدود کی سوزش جن میں پیپ پڑنے کا رجحان ہو شاندار دوائی ہے۔ چھاتیوں کا گوڑ۔  
مرک آئیوڈ۔۔۔ غدودوں میں درد کے ساتھ سوزش۔ سخت اور سرخ۔ یہ بیلادوننا کے بعد اچھا کام کرتا ہے۔ بہترین دوائی ہے۔

لیپس البس۔۔۔ یہ مختلف قسم کے اگاؤ کو ٹھیک کرتی ہے۔ غدود بڑھے ہوئے کچھ نرم بہ نسبت پتھر کی طرح سخت ہونے کے جیسے کہ کلکیر یا فلور میں سخت ہوتے ہیں۔ میزٹرک غدود کی سوزش۔  
آئیوڈم۔۔۔ غدود کا بڑھنا (بشمول ٹانسلز) تمام جسم کے تپلا ہونے کے ساتھ بڑھے سکرٹا میں اور جلد میں بھریاں پڑ جائیں۔ سوائے پستانوں کے جو بہت گھٹ جائیں تمام غدود بڑھ جائیں۔  
کاربوا نیلیس۔۔۔ غدود کی سوزش۔ غدود آہستہ آہستہ بڑھیں۔ تب ٹھہر جائیں، مدہ زبردیں اور

اور نرمی پیپ پڑے اور سخت ہو جائیں۔

**جلیسیم**۔ غدود بڑھ جائیں اور سوج جائیں۔ بخار جو ۱۰ اور ۱۱ بجے صبح ہو بغیر پیاس کے اور شام کو مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے۔ دماغی علامات جیسے کہ سر میں بے چینی چکر وغیرہ بھی ہوں غیبش گوٹر۔ ایکونائٹ لائیکوٹوم۔ سردی کی۔ بغل اور پستانوں کے غدود کی سوزش اور جہاں ہائکتر کی بیماری کا خطرہ ہو۔

ایتھوزا۔ گردن کے قریب تیسج کے دانوں کی طرح غدود کی سوزش۔

**گلوٹ**

**آیوڈم**۔ یہ گھبر کے لئے پوٹی کی دوائی ہے۔ دُبیلے پتلے گہرے چُست مریضوں کے لئے موزوں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایم طاقت میں دی جائے۔ نمایاں سختی کھینچاؤ کے احساس کے ساتھ۔ دونوں لوڈوں کا بڑھ جانا۔ گلوٹ بہت زیادہ سوج جانا اور انتہائی تکلیف دہ ہر بار صحن کے آنے پر۔ سائز میں بہت زیادتی خاص طور پر دائیں طرف اور نرم بغیر کسی نرمی کے۔ بغیر لوکے گوٹر بچے کے سرچنے سائز کا۔ اندرونی حصہ یا درمیانی حصہ میں گلوب کی طرح سرخ۔ بھاری ذہنی اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مریض تھلا ہوتا ہے لیکن کھاتا بہت زیادہ ہے۔ گھبر نرم گرمی کے ساتھ اور بغض تیز۔ آیوڈم کے مریض۔ یلوس کم حوصلہ اور خود کشی کرنے والے ہوتے ہیں۔

**برومیم**۔ جب ایک ایم طاقت آیوڈم ناکام ہو جائے تو یہ دوائی ایک ایم طاقت میں آزمائی جائے۔ غدودوں کا بڑھنا اور نرم ہونا۔ دل کی دھڑکن کی وجہ سے مریض دائیں طرف زلیٹ سکے۔ مریض کا رنگ ہلکا اور مزاج خننا زری۔ خوش مزاج اور خوش باش ہوتا ہے۔

**لایسکو پوڈیم**۔ دائیں طرف۔ سخت۔ ہموار۔ چمکدار کھینچاؤ کے احساس کے ساتھ گوٹر۔ اگرچہ زیادہ بڑا ہرگز نہ ہو۔

**نیرٹرم میور**۔ ابتدائی سٹیج میں مریض طوفان سے ڈرتا ہے۔ رات کے وقت اکیلے ہونے سے ڈرتا ہے۔ دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے۔ جب سٹیٹو سکوپ استعمال کی جاتی ہے جب بغض دیکھی جائے تو بغض تیز ہو جائے۔ کٹھنہ ملا۔ لاغری کمزوری۔ کانپنا۔ دل کی دھڑکن۔ پیاس۔ اعصابی چڑچڑاہٹ بن اور بے خوابی۔

لیکس - ہلا عشتہ گرم خون کا جھوک طرف آنے کے ساتھ۔ دل کی دھڑکن اور گرم احساس۔  
ابتدائی شیش کے لئے اچھی دوائی خیال کی جاتی ہے۔

فیکوس ویکس - غزلوں کی صورت میں مڈرنگ دیکھئے۔ گلاب کی اصلی دوائی ہے یا بنیادی دوا ہے۔  
بدھیمی - گیس اور قبض اس کی نمایاں علامات ہیں۔

گلکیر یا کارب - موٹے آدمیوں میں سادہ گلاب، سر اور گردن پر پسینہ۔ یہ ۲۰ طاقت میں ہر دو گھنٹہ  
بعد دن میں چھ مرتبہ دی جائے حتیٰ کہ آفاقہ شروع ہو جائے۔

ایڈرینالین - گنٹھ والا۔ تیز قبض۔ دل کا عمل تیز اور تنگی تنفس۔ آنکھوں کے ڈیلے باہر کو  
نکلے ہوئے۔ گردن کی پھلی طرف پکڑنا دارشمانیں۔ یہ ۲۰ طاقت یا ۱۔ ایم طاقت میں دی جائے۔  
اگر یہ ناکام ہو جائے تو کیگٹس دیکھئے۔

تھائیرائیڈین - اگر آئیوڈم اور برومیم ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے ۲ یا ۴ میں دیکھئے۔  
سپونجیا - تکلیف دہ گلاب۔ قلت حیض کے ساتھ دوسرے سنگین تر تکلیف۔ وادیوں میں رہنے  
والوں کے گلاب۔ یہ مریض کا روپ درنگ اور غددوں کی بھڑکوری تو برومیم جیسی رکھتی ہے اور  
ذہنی پریشانی اور کم موصلگی آئیوڈیم جیسی یعنی جسمانی علامات برومیم جیسی رکھتی ہے۔ ذہنی علامات  
آئیوڈیم کی کٹھی اس ایک دوائی میں پائی جاتی ہیں۔

فیرم میٹ - گنٹھ والا خاص طور پر حیض کے دہ جانے پر۔  
لیپس البس - غدد کی خنازیری بھڑکوری۔ معدہ اور رحم اور چھاتیوں میں جلن اور ڈنگ  
لگنے جیسے درد کے ساتھ گلاب۔

لائیکوپس - گنٹھ والا دل کی تکلیف اور سانس کا آنا کی تکلیف کے ساتھ۔  
اگنیشا - جب اعصابی مریضوں میں گلاب میں درد ہو۔

(دیکھئے خون بہنا - خون جاری ہونا بھی دیکھئے)

## گرمی

ڈور لیفورا - جسم کے مختلف حصوں میں گلا، مطلق، معدہ، ہیٹ۔ اسواء مستقیم اور چھاتیوں میں جلن۔

کیمرہ - اندرونی طور پر گرمی باہر کی طرف ٹھنڈ۔

دریازم البم - جلن جبکہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں۔ سردی اور گرمی بدل کر۔

سلفر - گرمی کے جھونکے۔ گرمی کی ہرجم کے کسی بھی حصہ میں جو بالآخر پسینہ میں تبدیل ہو جائے۔

مکریوں میں گرمی - پاؤں کے تلوؤں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں گرمی۔

آر سینکلم البم - متواتر جلن دار گرمی جس کو گرم پیٹیوں یا گرم مکروہ میں افادہ ہو۔ لیکن سر کی اندرونی

جلن۔ ٹھنڈے پانی سے دھونے سے افادہ پذیر ہوتی ہے اور گنتھیا وی حالت میں جو کھوپڑی

اور برہنی اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ ایسی جلن کو گرمی سے افادہ ہوتا ہے۔

ایکونائیٹ این - سب چیزیں یکساں تھیں۔ گرمی۔ ٹھنڈی چیزیں لگانے یا کھلی ہوا میں افادہ۔

لیکٹک الیڈ - دیا بیطس کے دوران جلن۔

فامفورکس - جسم کے کسی بھی حصہ میں جلن۔ ہڈیاں یا دہنی بگاڑ۔ ٹائیفائیڈ۔ لیکن دلدرد اور۔

بالش کرنے پر افادہ

امونیم میور - تمام جسم میں ابلنے کا احساس جیسے کہ خون کی وریدوں میں ٹھنڈے احساس

کھلی ہوا میں تکالیف بڑھیں۔ گرمی کے جھونکے جو پسینے میں تبدیل ہو جائیں۔

سیپیا - ہاتھ گرم اور پاؤں ٹھنڈے یا اسکے الٹ یہ اس کی نمایاں علامات ہیں۔

پلسٹیل - صرف ایک حصہ کی گرمی جب کہ دوسرا حصہ ٹھنڈا ہو۔

تھریڈین - گرمی جلن آواز اور جھونے پر انتہائی حساس۔

لائیکوٹوڈیم - کندھوں کے دوران خاص طور پر جلن۔

میڈورنیم - پاؤں کے تلوؤں میں جلن۔ کمر کے گرد جلن دار گرمی جیسے کہ کمر دھکنے کو لوہے پر رکھی ہوئی ہو۔

اگنیشیا - ایک کا اور، ایک کا گزگ سرخ اور دھکتا ہوا۔

ارکس ور - منہ، زبان، گلے سے معدہ تک جلن۔ جب اسہال میں مبتلا ہو تو بازوؤں میں جلن۔

ایمپس ایم - سرخی اور سوزش دنگ لگنے جیسے درد اور جلن دار درد چہرہ۔ آنکھوں پر پاؤں

ہونٹوں۔ زبان۔ گلے۔ بازوؤں اور خضبیوں میں ہو۔

میلا ڈونا۔ سسٹمی کے ساتھ شدید ملن۔ بھونے پر شدید گرم۔

پکر کر ایڈ۔ تھوڑا سا مطالعہ کرنے پر بھی ریڑھ میں جلن۔ ذہنی شقت پر جلن۔ تکلیف کے بہترین جلن۔ ٹیکسیائی۔ جلد اور جہر سے جلن دار جلن۔ سانس نفعوں کو بھی جلا دے۔

ٹیسیر پتھننا۔ جسم کے تمام حصوں اور سوراخوں میں جلن۔ معورہ۔ اعضاء مستقیم۔ مثانہ اور رحم میں جلن۔ فلورک الیڈ شام کے وقت جسم میں شدید گرمی نکلنے کا احساس بغیر درجہ حرارت برٹھنے کے پاؤں جلن اور بستر سے باہر کھنٹے پڑیں۔ رات کے وقت وہ سر اور چہرہ کو دھونا چاہے۔

ناجا۔ بھرے اور سر پر تواتر گرمی۔ پتھیلیوں کی سوزش۔ حرارت ناقابل برداشت۔ گرم لوہے کا احساس۔

روٹا۔ آنکھوں میں حرارت اور آگ کا احساس۔

الیوونا سلیکٹا۔ شدید گرمی طاقت ہی کو سلب کر لے یا کمزور کر دے۔ بھٹکل چل سکے اور ریڑھ میں شدید جلن۔

لیکسس۔ دن کے وقت گرمی کے جھونکے سے اور رات کے وقت ٹھنڈک کے جھونکے۔ بخوابی۔

## ہک درم

تھائیمول۔ ہک درم کے لئے مخصوص دوائی ہے، طاقت میں دن میں دو دفعہ یعنی صبح شام دیجئے۔ چینو نوڈیم۔ ہک درم کیلئے قطرے مڑنچکھ مرن تین خوراکیں دیجئے ہر دو گھنٹے بعد ایک خوراک دیجئے۔ کاربن ٹیسٹر اکلورائیڈ۔ یہ ہک درم کے لئے بہترین دوائی ہے جس تک میں بہت زیادہ ہک درم ہوں وہاں پر دی جائے۔ ۳-۵ سی کی ایک خوراک جو ان آدمیوں کے لئے ۹۵ فیصد ہک درم اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

ہارمونز۔ یہ تعریف ایسی اندرونی افرازات کے لئے جس میں بغیر نالی کے غدودوں میں

سے ایڈرینالین۔ تھائیرائیڈین۔ انسولین۔ وغیرہ اندرونی طور پر خارج ہوتی ہیں۔ جب یہ بے نالی کے افرازات کم ہو جائیں تو مخصوص قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کا علاج ان غدود کو ٹھیک کرنے سے مناسب ہو مگر ٹھیک ادویات کے استعمال سے ہی ہو سکتا ہے۔

یہ تعریف ایسی اندرونی افرازات کے لئے ہے جس میں لیغزائی کے غدودوں میں سے ایڈرنالین  
تھائیرائیڈین - انسولین وغیرہ اندرونی طور پر خارج ہوتی ہیں جبکہ کسی دوسرے سے یہ بے نمائی غدود  
کی افرازات کم ہوجائیں تو مخصوص قسم کی بیماریاں لاحق ہوجاتی ہیں۔ جن کا علاج ہومیوپیتھک ادویات  
کے استعمال سے ان غدود کو ٹھیک کرنے پر ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر باؤں کا قبل از وقت سفید ہو  
جانا اور گنہا پن تھائیرائیڈ غدود کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھائیرائیڈ  $30 \times 200$  میں صرف  
باؤں کو گرنے کا سہ نہیں روکتی بلکہ قدرتی رنگ بحال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح انسولین  $40$   
یا  $200 \times$  ذیابیطس میں بطور عمل انگیز کے کام کرتی ہے اور ان غدودوں کو انسولین بنانے کے اہل بناتی ہے۔

## سوزش

بیلادونا - جب سوزش سرخ ہو، جلن کے ساتھ اور تپکن دار درد۔ سوزش زدہ حصے چھونے  
پر یہ گرم محسوس دیں۔

ایپس ایم - پھولی ہوئی سوجن جیسے کہ مکھیوں کے کاٹنے سے ہو۔ پیشاب کم مقدار میں  
اور پرکے ہونٹ کی سوزش بغیر کسی چیز کے کاٹنے سے۔

کلکیریا کارب - جب سوزش زرد جگہ سخت ہو تو  $200 \times$  دن میں ۳ دفعہ دیجئے۔  
تھائیڈائیڈینیم - نائٹیریا میں (ایک قسم کے درم جو جلد کے نیچے اکٹھے ہو کر سوزش پیدا کرتے  
ہیں) سوزش بلا درد ہوتی ہے۔

آرم سلف - نعل کے غدود اور پستانوں کے غدود کی سوزش۔  
لائیکوپس ور - سوزش درد کے ساتھ۔ اس دوائی سے درد مکمل طور پر ہٹ جاتی ہے  
اگرچہ بلا درد سوزش رہتی ہے۔

## چوٹیں

ہائپریمیکم - جب زخم حصے کے ساتھ اعصاب کو بھی چوٹیں آئیں جیسے کہ ناخنوں کا کچلے جانا۔

سویاں لگنا۔ پنیں چھب جانا۔ کیڑے مکوڑوں کا کاٹنا اور جانوروں کا کاٹنا۔ پھدے ہوئے۔ پھٹے ہوئے۔ یا زخمی حصوں کے لئے سُناں دار دوائی ہے۔ جن میں اعصاب بہت زیادہ ہوں جیسے کہ ہڈی اور انگلیوں کے سرے۔ یہ رپڑھ ہڈی کے زخم اور دُمچی کی ہڈیوں کے زخموں کے لئے بھی مفید ہے ٹینس کور کے کیلے فوراً لیڈم پال دیجئے۔ ٹینس کے دوران ناقابلِ برداشت تکلیف کی موجودگی میں جو کہ چوٹ کی وجہ سے ہو۔ پارلے زخموں کے نشافوں میں درد جو جسم کے ساتھ چلیں اعصاب کے ساتھ ساتھ۔

• سمفا ٹیٹم۔ کُنڈلات کے لگنے سے زخم۔ اپریشین کے بعد پر درد مند۔ جب بندھنوں کے زخم میں روٹا ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔ آہستہ آہستہ زخم مندمل ہوں گے۔

شیف سگیہ یا۔ تیز دھار کے آئے زخموں میں یا جب سوراخوں میں ڈنگ لگنے والے ملین دار درد یا کسی سرجن کے کئے ہوئے غیر صحت مند زخم ہوں۔

لیڈم پال۔ سوراخ والے زخموں کے لئے جو چھوٹے پر ٹھنڈے محسوس ہوں اور مریض کو بھی ٹھنڈے محسوس ہوں۔ لیکن ٹھنڈی ٹپیاں لگانے سے اتفاق محسوس ہو۔ زخم جن میں سے خون کم نکلے۔ درد سو جن اور ٹھنڈک ہو۔ چوٹ لگنے پر سیاہ آنکھ کی طرح کا نشان۔ زنگ آلود میخوں کی وجہ سے ہونے والے زخم کیل یا میخ پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے ہاتھوں یا پاؤں کی نیلیوں میں زہریلے زخم ہو زخم ہو جائیں۔ یہ ٹینس کور کہتی ہے لیکن جب ٹینس شروع ہو جائے تو ٹامپیریکم دوائی کرتی ہے۔ بیمار شدہ بازو کا زخم یا پھدنے کے بعد تباہ ہونے کی حالت میں مفید ہے۔

اینا کارڈیم۔ جب بندھن تاشروں پر چکے ہیں۔

ارٹھرو لوکیا۔ جوتے کے لگنے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ کے لاگے کی وجہ سے کشتی لانی یا باغ میں کام کرنے کی وجہ سے چھالے یا زخموں وغیرہ کیلے مفید ہے۔

روٹا۔ موچ یا موچ کے بعد گلیاں۔ موچ کے بعد لنگر اپن خاص طور پر زخموں اور کلائیوں میں۔ زخموں یا موچ کی وجہ سے ہڈیوں پر بندھنوں کا الگ ہو جانا۔ فٹ بال اور کلکے سے گھٹا ہڈیوں کے پاؤں پر چوٹیں بڑی تیزی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں۔ بندھنوں اور کڑی ہڈیوں کی چوٹوں کیلے مفید ہے۔

آرژیکا مانٹ - شدید درد کی وجہ سے انتہائی حساس۔ گنٹھیا۔ چوٹ یا دوسرے زخموں کے لئے مفید ہے۔ نرم حصوں میں زخموں کے لئے۔ طاقت سے زیادہ شفقت۔ دباؤ اور موج کے لئے تمام جسم دکھے موج کے۔ سیاہ یا نیلے نظر آنے والے نشان اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔  
کیفیت ڈولا۔ تیز دھار آلوں کے زخموں کے لئے مفید ہے۔

ایلیم سیسیا۔ اپریشن کے بعد ڈنگ لگنے جیسی در دیں۔ جلن دار در دیں۔  
رسٹاکس۔ موج اور طاقت سے زیادہ وزن اٹھانے کے لئے شاندار دوائی ہے جب پٹھوں اور بندھنوں میں موج آجائے اور آرژیکا کافی معلوم دے۔  
گلکیریا فاس۔ جب ہڈیاں ٹوٹ جائیں یہ دوائی۔ آرژیکا۔ ا۔ ایم سے بدل کر دی جاسکتی ہے روٹا اور سمفائٹیم ہر دوسرے روز۔ ا۔ ایم طاقت میں استعمال کر لائی جائیں۔  
پنی او نیا۔ دباؤ سے ناسور جیسے کربستر پر پڑے رہنے سے زخم ہو جائیں یا تنگ جوتے پہننے سے زخم ہو جائیں۔

بیلیس پریٹیس۔ زخموں اور موجوں کے لئے شاندار دوائی ہے جس میں چھوٹے سے تکلیف ہو۔ یہ خون کی نالیوں اور اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ پس اس میں آرژیکا اور ایٹھ پیریم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ چوٹ لگنے پر پستانوں کا سخت ہو جانے کے لئے مفید ہے۔  
کروکس۔ پیپ دار زخموں کے لئے۔

### ٹانگوں کا ختم کھانا

چلتے وقت گھٹنوں کا گر کھانا <sup>۲۷</sup>ٹیوبو کولینیم۔ اس دوائی سے علاج شروع کیا جائے اور ہر راہ ایک خوراک دی جائے باقی وقت درج ذیل ادویات دی جائیں سو اٹھ ٹیوبو کولینیم دینے کے دو دن پہلے اور دو دن بعد یعنی ٹیوبو کولینیم دینے کے دو دن پہلے۔ دو دن بعد کوئی دوائی نہ دیں۔

گلکیریا فاس۔ کافی لمبے عرصہ تک دن میں تین دفعہ دی جائے۔  
لتھائی ریس۔ چلتے وقت گھٹنے آپس میں رگڑ کھائیں۔ لٹھرائی چال سختی اور ٹانگوں میں اینٹھن۔



## جوئیں۔

سیف سگیرا۔ جب جوئیں زیرِ نان پائی جائیں یہ سر کی جوڑوں کے لئے بھی مفید ہے۔  
لائیکو پوڈیم۔ جلد کی جوئیں۔ جلد کی جوڑوں کیلئے مخصوص ہے۔ جوڑوں کے پھول کیلئے۔ یعنی  
برسختی ہوئی جوڑوں کے لئے۔

سورائیم۔ سر کے بالوں کی جوئیں۔ اگر ناکام ہو جائے تو کاربالک ایسڈ استعمال کیجئے۔  
کاربالک ایسڈ۔ یہ دوائی جوڑوں کے لئے شاندار دوائی ہے۔

## چہرے کی جلد کا دق۔

بیسلیئم۔ اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے۔ یہ ۲۰x میں دی جانے۔ اس کے  
ایک ہفتہ بعد دوسری ادویات دی جائیں۔

ریڈیم بروم۔ چہرے کی دق کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔

آرسینکیم البم۔ شدید کمزوری۔ بے چینی۔ گرم چیزیں لگانے سے اجتناب اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے زیادہ۔

ایونین } چہرہ کا دق۔ ناک کا کینسر۔ مردہ کی طرح چہرہ زرد۔ ہونٹ نیلے۔  
ایونین }

نوٹ:- اوپر دی گئی ہر دوائی کو کافی عرصہ کیلئے استعمال کیا جائے تاکہ نتائج خوشگوار نظر  
ہو سکیں یعنی کم عرصہ دوائی استعمال کرنے سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا۔

## سوکھا مسان (بھربان بھی دیکھئے)

میگنیشیا کارب۔ بچے جن میں بُہت کی بُہی کے ڈوبنے یا سر کی بُہت اور اس کھوٹری کی  
بُہی سے اوپر ابھرنا ایک گڑھا پڑ جائے۔ یہ حالت محرمًا ناہائز بچوں (اولاد الزنا) میں پائی جاتی  
ہے جو چوری چھپے مجامعت کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔

ابرو ٹینم۔ بچے جن میں ناگوں کی کمزوری نمایاں۔ جلد پھلپھلی اور بھریوں کی صورت میں ٹکے سرکھندہ اس کو اوپر نہ اٹھاسکے۔

کلکیر یا فاس۔ سوکھا مسان کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ  $4 \times 6$  میں دی جانی چاہئے۔ جلد خشک اور بھری دار ہو۔

نیٹرم میور۔ بچوں میں گردن کا سوکھا مسان۔ پانی کی شدید کمی، غلغلیں اور حسرت بھرے انداز میں دکھائی دے۔ بچہ چھوٹا بغیر بالوں کے بندر دکھائی دے۔

پیکرک الیڈ۔ بچہ بوڑھا لگا اور گریس کا نظر آئے۔ برصی ہوئی کمزوری جلد کھردری بھری درگوں اور ہاتھوں کے قریب ہتھیں۔ ذہنی طور پر بھری اور خود سر تو رہتا رہتا ہے۔ رات کے وقت سر کو پسینہ آئے جو تکیہ کو تر کر دے۔ پاؤں کا پسینہ بدبو دار۔

سیلی کولا۔ بچہ کمزور ہو رہا ہو۔ شدید بھوک یعنی زیادہ کھائے پیئے۔

آئیوڈم۔ جب سوکھے مسان کا رجحان ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ پڑ پڑ اپنی بچہ قریب چھلکنے نہیں دیتا۔ یعنی بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے قریب آئے لیکن پھر بھی دُبلاتا پللا۔ بگڑے ہوئے اور سوجھے ہوئے جوڑ۔

کریٹا کارب۔ بچوں کی لاغری بلوغت کی عمر میں۔ موٹے تازے خوش خوراک لوگوں کا آہستہ آہستہ پتے ہونا۔ بڑھے ہوئے غدود اور پیٹ کے ساتھ بچوں کا کمزور ہونا۔

آئیوڈم۔ جب سوکھے مسان کا رجحان ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ پڑ پڑ اپنی بچہ اپنے قریب چھلکنے نہیں دیتا یعنی بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے قریب آئے۔ بہت زیادہ کھائے، لیکن پھر بھی دُبلاتا رہے۔ بگڑے ہوئے اور سوجھے ہوئے جوڑ۔

یٹوبرکولینم۔ یہ بطور عمل ایگر دوائی کے دی جاتی ہے ہر ہفتہ ایک بار ۲۰ ملاقات میں دیکھائے۔

## کنیٹیوں کی ہڈیوں کی سوزش

کیسپیکم۔ سوزش چھوٹے پردہ درکے۔ کنیٹیوں کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔

سلیشیا - کینٹی کی بڑی گھٹنا سڑنا۔  
 پلاٹینا - کینٹی کی بڑی کانٹن ہونا کینٹی کی بڑی کے ابعاد میں شدید ٹھن ہونا جان جسے کہ مرکب ساتھ سختی  
 کینٹھس - پھاڑنے والی دردیں جسے کہ بڑی ٹکڑوں میں ٹوٹ جائیگی۔  
 مرکب ایوڈ - کینٹی کی بڑی کی سوزش۔  
 بیلاڈونا - ابتدائی دور میں جب سوزش ہو اور کسختی ہو۔  
 فلورک ایڈ - کینٹی کی بڑی کا پھوڑا متواتر کٹا رھی زرد پیپ نکلے۔ ذیابیطس بہت زیادہ نصیر زدگار  
 اور پیاس۔ شدید جنسی تحریک یعنی جماعت کی خواہش۔

## ٹانگٹ کی ایک سوچن

پلسٹیل - مذکورہ بالا مرض کے لئے پھوٹی کی دوائی ہے۔ زردی ٹانگٹ سفید سوچن۔ درید کے  
 تنے کے ساتھ ساتھ درد اور دکھن۔ ٹھنڈا محسوس کرے۔ لیکن ڈھانپا جانا پسند نہ کرے۔  
 لائیکو پوڈیم - ران کی دو رگوں کا پھول جانا اور دم۔ دونوں گریں بڑی ہو جائیں اور دکھیں۔  
 یہ اور پر تک دیکھی جاسکتی ہیں۔  
 سلیشیا - نسجوں اور بندھنوں کے ٹکڑے پر۔  
 لیکس - جب پلسٹیل ناکام ہو جائے اور دل بھی متاثر ہو چکا ہو۔ ہمیں صبح کے وقت  
 زیادتی ہوتی ہے۔  
 ہیمامیلس - یہ ایک اور دوائی ہے جب پلسٹیل ناکام ہو جائے اور لیکس کی علامات  
 بھی نہ پائی جاتی ہوں۔ تو یہ دوائی بڑی کامیاب نتائج کی حامل ہے۔

## کمی و بیشی

سبائٹا - گھانا تاہل برداشت۔ گھانا اعصابیت پیدا کرتا ہے۔ ٹیڑیوں اور ٹیڑیوں کے  
 گودے میں اثر کرتا دکھائی دے۔

تھو جا۔ گنا سن کر رو پڑے۔

## جسم پر پیدائشی نشان مثلاً تل وغیرہ

تھو جا۔ اس کا علاج ۱۔ ایم طاقت سے شروع کیا جائے۔ صبح و شام مدد کچھ لگائی جائے۔

ریڈیم بروم۔ مندرجہ بالا دوائی تھو جا کے ساتھ ہفتہ میں ایک بار دی جائے۔ جس دن یہ دی جائے  
تھو جا ہرگز نہ دی جائے۔

فاسفورس۔ اگر مندرجہ بالا لعقیات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے۔

ویکسینیم۔ یہ دوائی ۲۰۰ طاقت میں بطور عمل انگیز کے دی جائے اس دن اس کے علاوہ  
کوئی دوسری دوائی ہرگز نہ دی جائے۔

## ہڈی کا گل سٹر جانا۔

سیلشیا۔ جب ہڈی کے تندرست ہونے کا عمل کسٹ پر چکا ہو۔ ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں

دیجئے اور کافی لمبے عرصے کے بعد دہرائیے۔

گلگیر یا فاس } یہ بہت اہم ادویات ہیں اول بدل کر ہڈی کو تندرست کرنے اور گلے ٹھٹھنے

گلگیر یا فلور } کے عمل کو روکنے کے لئے دی جائیں۔

یوفوریم۔ جڑے کی ہڈی گلنا سڑنا۔ جڑے کی ہڈی کا گلنا سڑنا۔

فاسفورس۔ پچھلے جڑے کا گلنا سڑنا۔

کالی آئیوڈ۔ جب آئرنک یا پارے کے غلط استعمال کی وجہ سے گلنے ٹھٹھنے کا عمل ہو رہا ہو۔

کو کولس۔ ٹوٹنے کے بعد ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سرے کو باہر نکالنے یا ران کی ہڈی کو باہر نکالنے

میں مدد دیتی ہے۔

ایسڈ فلور۔ گلے ٹھٹھنے گوشت کو باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے۔

## چہرے کا اعصابی درد (اعصابی نظام کے تحت درد اعصاب بھی دیکھئے)

میگنیشیا کا رب چہرے کا اعصابی درد جو ہر مہفتہ بعد تین یا چار روز تک برقرار رہے۔ یہ گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ چہرے کے بائیں جانب کا درد جو ریش کو بسترے باہر نکالنے پر بخور کر دے۔ متواتر حرکت پر افاقہ اور حرکت کو روکنے پر زیادتی۔

کالونٹھ۔ دریں جو جذبات کی اکساہٹ یا تنگ عزت پر لہروں کی صورت میں آئیں جن کو گرمی سے افاقہ ہو۔ دباؤ سے آرام ملے۔ اور آرام کے دوران زیادتی ہو۔ بائیں جانب کا درد اعلیٰ درد کے دوران چہرے کا بگاڑ۔ زخار کی ہڈی میں درد۔ آنکھ کے نیچے والے گڑھے کے اعصاب کا درد۔ بیلاڈونا۔ سرخ چہرے کے ساتھ شدید دریں۔ آنکھ میں خون ظاہر ہوں۔ سرگرم اور چھونے پر شدید حساس دایں طرف کا درد اعصاب جو ٹھنڈی وجہ سے ہو۔

میگنیشیا فاس۔ پھاٹنے والے اور گولی لگنے جیسے درد۔ بجلی کی طرح کے تیز اعصاب میں جو گرمی اور دباؤ سے افاقہ پذیر ہوں۔ آنکھ کے اوپر والے اور نیچے والے گڑھے میں شدید دریں۔ سیدرن۔ آنکھ کے گڑھے کا بالائی حصہ کا درد جس میں دقت کا تعین نمایاں ہو یعنی متحرک وقت پر درد جیسے دورہ پڑے۔

مینریم۔ جب درد شوہ کی گرمی سے افاقہ پذیر ہو (کوئی اور گرمی تریا خشک گرمی افاقہ نہ ملے) کھانا کھانے کے بعد زیادتی ہو۔ بائیں زخار سے درد کان تک جلنے اور رات کے وقت زیادہ ہو۔ لیکسس۔ جب پنڈلی کی ہڈی میں درد ہو۔

ولیریانہ۔ جب درد آرام کرنے پر زیادہ ہو۔

ایکونائٹ۔ متاثرہ حصہ کی کھنکھناہٹ کے ساتھ درد۔

سپائجیلیا۔ بائیں طرف کا شدید جلندار اور چھنے والا درد جو کتنا قابل برداشت ہو۔

سلفر۔ چہرہ کا اعصابی درد عصب کے پانچویں جوڑے کا درد جو چہرے کو ہمہ پہنچاتا ہے۔

کالچیکم۔ جب چھوٹی اعصابی کمزوری کے ساتھ درد لیکن سپائجیلیا جیسی شدت نہ ہو۔

سفلیں۔ جب درد اعصاب رات کو زیادہ ہو۔ چہرے کے ایک طرف کانال بھی ہو۔  
تو x1... یا سی۔ ایم طاقت میں دیکھئے۔

آر جنٹم نائیریکم۔ آنکھ کے اوپر اونچے کی دریں۔  
سٹانم۔ جب دریں آہستہ آہستہ آئیں۔ تیز بچ ٹھیں اور شدید ہو جائیں اور آہستہ آہستہ  
رگ جائیں۔ آنکھ کے اوپر کی دریں۔

کیمو میللا۔ جب درد ناقابل برداشت اور بہت شدید ہو۔ اسکے ساتھ دانت درد۔ کان درد۔  
یا گردن کا درد ہو۔

پلاٹینا۔ اینٹھن دار دریں۔ ٹھنڈک اور سن ہونے کے ساتھ۔  
بلائیگمو میجر۔ یہ تقریباً ہر قسم کے دروں کے لئے مفید ہے جب یہ مدھکچہ کی صورت میں لگائی جائے۔  
کالی آیوڈ۔ جلد کی شدید حساسیت۔ خنڈی کیسوں میں آنکھ کی نوعیت کے۔  
ورمیسکم۔ کان میں ناقابل برداشت کھنڈ۔ درد چشم زہن میں۔ تھوڑی سی حرکت پر درد  
میں زیادتی۔ دانتوں کو بھینچنے یا ان کو زبان لگانے پر چہرہ سرخ۔ کھٹے دکار۔  
سینگوئیر یا سی۔ بچے بھگنے یا سر کو فرش پر پڑھوٹی سے دبانے پر لفاقہ۔ اوپر والے جبڑے سے ہلنا اور  
سٹیفگیہ یا۔ درد اعصاب ہونٹوں کو بچہ یا کانٹے سے چھونے پر شدید گولی لگنے سے بیدار  
شروع ہو جائے۔

## اعصابی خلیوں نے ہوئے گوڑے

آرٹیکا مانٹ۔ اعصابی گوڑوں کے لئے ۲۰ طاقت میں دن میں ۲ مرتبہ تقریباً ۶ ماہ تک  
دیکھئے اگر یہ ناکام ہو جائے یا لفاقہ رگ جائے تو درج ذیل ادویات دیکھئے۔  
ہائیریکم۔ اعصابی گوڑوں میں جب آرٹیکا مانٹ ناکام ہو جائے۔ چار گھنٹے کے وقفے  
پر ۲۰ طاقت دن میں ۳ مرتبہ۔

کلیر یا کلرب۔ اعصابی گوڑوں پر چار ہفتہ بعد ظاہر ہوں۔ پیپ دار گڑبھن میں غوثی ہوا ہو۔

برائی ادویا۔ سر کے گوڑ۔ جلد کے بہت سے حصوں میں بھڑکنے سخت خدود۔  
کیلنڈرلا۔ زخم کی وجہ سے سادہ اصلی مرض کے گوڑ۔  
سفلینیم۔ سر کے اوپر کانٹھیں یا گوڑ۔

## بھیا ننگ خواب

کو نیم۔ دماغ میں قلتِ خون کی وجہ سے۔  
پی ادویا۔ کبھی بھوت کا خواب کراس کی اس کی چھاتی پر بیٹھا ہوا ہے اکثر بڑا کرفیز ہے جگن ملے  
سائیکلین۔ سو جانے کے بعد بھیا ننگ خواب نظر آئے۔  
لیڈم۔ سونے سے ڈرے کر وہ مرتے جانے۔ گلا سوجا ہوا۔ محسوس ہو گھٹن کا احساس۔  
امونیا کارب۔ دل کی بیماری میں ہر رات بھیا ننگ خواب۔  
نکس و امیکا۔ رات کا کھانا زیادہ کھانے پر یا شراب کے مشروبات پینے سے۔  
ڈیجیٹلس۔ جریان منی یا احتلام ہونے پر۔

## موٹاپا

کلکیر یا کارب۔ یہ ایک مزاجی دوائی ہے جو موٹاپے کو دور کرتی ہے سوتے  
میں رات کے وقت ماتھے پر پسینہ جو تھکے کو ترک کر دے۔ ۲۰x میں دیکھئے اور ہر سفتہ بعد دہرائیے۔  
فیرم میٹ۔ قلتِ خون کیساتھ موٹاپا، چہرہ پھولا ہوا۔ جسم پر دانے سے گڑھے ہیں۔  
امونیم میور۔ چتر موٹے۔ چتریلے گوڑ۔ جسم موٹا ناگیں تیلی۔  
فیوکس دیس۔ موٹاپے کیلئے استعمال کیے جب کلکیر یا کارب ناکام ہو جائے۔ مددکنج  
قسطوں کی صورت میں دیجئے۔

تھائیرائیڈینیم۔ موٹاپا دور کرنے کے لئے اچھی دوائی ہے۔  
آرم میٹ۔ دل میں چربی سی تنزلی کیلئے۔  
انٹم کروڈ۔ نوجوان لوگوں میں موٹاپا۔

گرفیٹس۔ نوپے کی طرف بائیں خاص طور پر غزروں میں حیض میں دیر سے آئے۔

## استسقاءی سوچن

آرم میور۔ پیشاب میں البیومن کے ساتھ استسقاءی سوچن ہیٹ کے اعضاء سخت ہرے پر۔ دفعہ دار بخار۔ تپ دق۔ جگر اور تلی کی بیماریوں سے۔  
فیٹر م کلورسٹم۔ چلنے پر ہاتھوں پر سوزش یا سوچن آئے۔  
ایپس میلیفیکا۔ ہیٹ کی سوچن کے ساتھ استسقاء پیشاب کم آئے پھینک دینے کے بعد پیشاب میں چربی آئے۔ گردوں۔ جلد کی شفافیت کے ساتھ اور پیاس نہ ہو۔ پیشاب میں بہت زیادہ البیومن ہو۔ بھتیجی کا استسقاء۔ اعصابی استسقاء۔ پھولا پھولا جسم بنانے پر گڑھے پڑیں۔

ایپو سائٹرم۔ ہیٹ کا استسقاء کم پیشاب لیکن پیاس بہت زیادہ یہ ایپس میلیفیکا کے الٹ ہے۔ حیض کے رگ جانے کی وجہ سے استسقاء۔ پیپ تنا ہوا اور پرورد یا بہت زیادہ حیض کے بہہ جانے کی وجہ سے تھکاؤ کے ساتھ ہوسانس کو نکلنے کی کوشش کرے۔ اور خزانے دار سانس لے آرسینکیم البوم۔ شریوں میں دل کے بڑھ جانے کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں استسقاء جلد کا۔  
استسقاء۔ آنکھوں۔ بہرہ اور غنوں کا استسقاء مریض۔ بے چین۔ پریشان اور خواب منہ خنک۔  
فاسفورس۔ گردوں کی سوزش میں اسبہال قلت خون کے ساتھ۔

ویسکیریا۔ گردوں کے مکمل طور ناکام ہونے پر استسقاء جو پیشاب خارج کرنا بند کر دیں۔ گردوں کے کام چھوڑ دینے کی وجہ سے پیشاب خارج نہ ہو۔ ایک ڈرامہ درنگینی خوراک دیجئے۔  
کالی آئیوڈ۔ سب سے ہوئے ضرور دوا کے دباؤ سے۔

لیکسس۔ دل کی بیماریوں میں پہلے دائیں ٹانگ اور پھر بائیں ٹانگ کی سوچن ہو۔  
ٹیرینٹینا۔ گردوں میں اجتماع خون۔ گردوں کی بیماریوں اور کمزوریوں کے ساتھ۔  
چائینا۔ کمزوری اور قلت خون کے ساتھ استسقاء۔

فیروزس این - دل کی بیماریوں جگر اور گردوں کی پیچیدگیوں کی وجہ سے استقامت گروہوں اور  
 دل کا استقامت تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ پیشاب مقدار میں بڑھ جاتا ہے اور البتہ جلد غائب ہو جاتی  
 یا میڈر کوٹ مائل - استقامت فیل یا غائیہ یا کے لئے نہایت مستند دوا ہے۔ ۹-۱۰ میں دیکھے۔  
 تھائیرائیڈ نیم - بازوؤں اور چہرے کا استقامت بغیر کسی ظاہری کے سبب کے۔  
 رسٹاکس - حسیوں کی تھیلی کا استقامت بغیر - مردانہ آرتھرائٹس اور عورت کی اندام نہانی  
 اور منہ پر استقامت - یہ جھلی کی نسبت جلد کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔

## قبل از وقت بڑھایا -

امبرگر اگریسا - قبل از وقت بڑھایا علامت ۶۰ سال کی عمر میں شروع ہونی چاہئیں ۵۰ سال  
 کی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہوں - کانپنا - لکھڑاٹنا اور دماغی کی خواب جیسی کیفیت بہت زیادہ  
 محسوس جانے کے ساتھ۔

برشیا کارب - قبل از وقت بڑھایا - پتوں جیسے کام اور بچوں جیسی باتیں کرنے - بوڑھے لوگوں  
 میں بیوقوفانہ رویہ - پٹھوؤں کا جواب دینا - ذہانت میں نقص آجائے۔  
 اپریشن سے پہلے، اپریشن سے بعد - اپریشن کے مدمات بھی دیکھے۔

## پیسینٹ -

کلیریا کارب - ڈھیلے ڈھالے آدمیوں اور بچوں میں پسینہ جو تکیہ کو تر کر دے۔ یہ ایک نرہ  
 دوائی ہے کمزور کو الالہ پسینہ نیند کے دوران کو الالہ پسینہ پسینہ ٹکڑیوں میں جب پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں تو اپریشن کی بجائے  
 سلیشیا - پسینہ کے لئے چوٹی کی ٹھانی ہے۔ خاص طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کی  
 تلوؤں پر گندی بودالہ پسینہ۔

سمبوکوس - دن کے دوران یا جاگتے وقت کمزور کرنے والا پسینہ جو نہی نیند آئے بغیر رگٹائے  
 میگنیشیا میوور - پاؤں کا پسینہ یا تلوؤں میں جلن۔

دریہم البم۔ ٹھنڈے پینے میں ملین۔ سردی اور گرمی اول بدل کر۔ عموماً منہ پر ٹھنڈا پسینہ۔  
میگنیشیا کارب۔ کھٹا پسینہ۔

پیٹرولیم۔ بدبودار پسینہ خاص طور پر بخلوں کا یا تانبا بدبودار ہوتا ہے کہ جو ننھی مرغی کے میں داخل  
ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔

منٹرواکل ایسڈ۔ پسینہ جس کو ٹیٹا ہوا نہ ہو۔ پیشاب میں یورک ایسڈ بہت ہی دنگ دار۔  
پیشاب اور بہت ہی بدبودار پیشاب۔ گھوڑے کے پیشاب جیسی پیچودالا پیشاب۔  
ٹیرنٹولا۔ گانے سے بہت زیادہ پیشاب آئے۔

کونیم۔ جو ننھی سوئے خواہ دن ہر رات پسینہ آئے یا آنکھیں بند کرنے پر وہی پسینہ آئے بہر کس  
کاٹ ہے۔

مرکیورس۔ جب پلے تو شدت پسینہ آئے۔ دن رات پسینہ اگر رات کے وقت زیادہ چڑیلے تیل  
دلے۔ بدبودار پسینے، بستر کے کپڑوں کو تر کر دیں۔ بدبودار ہوا ہر مگر جمیل جائے۔ پیشاب پاخانہ  
اور پسینہ بدبودار۔ یہ میٹھی چھنے والی بو رکھتا ہے۔ کھاتے وقت پریشانی اور ٹھنڈا پسینہ۔  
لیکسس۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ پسینہ۔ خونی پسینہ۔

اکونائٹ این۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ٹھنڈے پسینے جس کو ٹیٹے کا ارادہ ہوا ہی ہر پسینہ آئے۔  
کالی کارب۔ درد والے حصوں پر پسینہ آئے  
ہمیرسلفر۔ پاؤں پر ٹھنڈا اور بدبودار پسینہ۔

پلسٹیللا۔ جسم کے من ایک حصے پر پسینہ۔ اسی طرح جسم کے من ایک حصہ پر گرمی جب کہ  
دوسرا حصہ ٹھنڈا ہو۔

سلیسلک ایسڈ۔ پاؤں کا گند پسینہ بکثرت احساس کہ پاؤں کو پسینہ آنے والا۔

سیننی کولا۔ لاغر بچوں میں سر پر رات کے وقت پسینہ، پاؤں پر بدبودار پسینہ۔ من ڈھانپنے  
دے حصوں پر پسینہ (تھوہا کا لٹ) جب ہاتھ کھٹے کئے جائیں۔ توان پر پسینہ آئے۔  
ٹیوبرکولینم۔ ذہنی مشقت سے پسینہ سفید لینن پر زور داغ ڈال دے رات کے پینے موسم میں

تبدیلی سے حساس۔ سرد۔ نندار۔ گرم یا بارشوں کے موسم۔ طوفان سے پہلے زیادتی۔  
 ناٹریک الیڈ۔ ہاتھ اور پاؤں پر بکثرت پسینہ۔  
 انٹیم مارٹ۔ متاثرہ حصوں پر بکثرت پسینہ۔  
 ٹیلیو ریم۔ بدبودار پاؤں کا پسینہ۔  
 نیفٹھا لین۔ کمرہ کرنے والے رات کے پسینے۔ دن کے وقت پتلے بدبودار اسہال۔  
 کاربوائیمیلس۔ پسینہ زرد داغ ڈالے۔  
 گریفائیٹس۔ پسینہ زرد داغ ڈالے۔ کھٹا اور بدبودار۔  
 بیلاڈونا۔ دھانپے ہوئے سحر پر پسینہ۔  
 سوراٹینیم۔ تھوڑی سی مشقت پر پسینہ۔  
 سٹیفسگیریا۔ گندے اندوں جیسا پسینہ۔ رات کا پسینہ دق کی وجہ سے گھلے ہوئے مریضوں میں۔  
 اوسیمیم۔ بغلوں میں لبن کی بو جیسا پسینہ۔  
 جبراندلی۔ پسینہ بکثرت چہرہ اور سر سے شروع ہو کر تمام جسم پر پھیل جائے اور ہاتھ پاؤں  
 ٹھنڈے ہو جائیں اور آخر کار کھٹی مقلے آئے۔  
 اکونائٹ لایکوٹوم۔ ہاتھوں پر پسینہ۔  
 لاروسیروسس۔ ٹھنڈے مریضوں میں گرم کردوں میں آنے پر پسینہ جو کھلی ہوا میں کم ہو۔  
 آر مہیٹ۔ پسینہ گارھے پشیاب کے ساتھ جو گدلا اور بہت بدبودار ہو۔  
 کرڈن ٹنگ۔ غنی پسینہ۔  
 چینیم آریکیم۔ سوتے میں بکثرت اور کمرہ کرنے والا پسینہ۔  
 اگنیٹیا۔ چہرہ پر تھوڑی سی جگہ پر پسینہ کھانا کھاتے وقت۔  
 کیلیڈیم۔ میٹھا بودا پسینہ جس پر مکھیاں آئیں۔  
 تھو جیا۔ جسم کے کھلے حصوں پر پسینہ اور دھانپے ہوئے حصوں پر پسینہ نہ ہو۔ آلات  
 تناسل پر بدبودار پسینہ۔ پسینہ تیل والا۔ میٹھا۔ بدبودار جس طرف لیٹا نہ ہو اسی طرف پسینہ آئے

فیڑم میور۔ کھانا کھاتے وقت پسینہ۔  
 کیسومیلہ۔ کھانا کھانے یا مشروب پینے پر پسینہ۔  
 فلورک الیڈ۔ ہاتھ اور پاؤں متواتر پسینہ میں شرابور۔  
پسینہ دب گیا ہو۔

ایکونائٹ این۔ جب دبا ہوا پسینہ نزلہ۔ بخار اور قحطی سوزش میں مبتلا وکڑے۔  
 ٹکسوامیکہ۔ پسینے کے دب جانے سے بچش۔  
 کالجیکم۔ پسینے کے اچانک دب جانے پلگڑا پن خاص طور پر پاؤں کے پسینے کے دبنے پر قائم جسم کے لیے شراب۔  
 برائی اونیا۔ زچگی میں پسینہ کا دب جانا۔  
 ڈولک مارا۔ پسینہ کا اچانک ٹھنڈے دب جانے پر تکالیف ہو جانا۔

### گوٹر مٹانے کا۔

کلکیر یا کرب۔ شانے کا گوٹر۔

### کان کا گوٹر

ہائیڈرائٹس۔ کان کی بلغمی تھلی پر بہت زیادہ گوٹروں کا آگاہ۔  
 مکتوجا۔ کان کے درمیانی حصہ میں گوٹر۔  
 مرکبوس۔ سننے کی نالی دائیں طرف کی نرم آسانی سے خون بہنے والے گوٹھے رک جاتے۔  
 کلکیر یا کرب۔ کان کا گوٹر۔

### نرخرہ۔ حنجرہ۔

سینگو نریا۔ حنجرہ کا گوٹر۔

بریکس و لگیس۔ آلاتِ صحت کا گوٹر، سرخ، بغیر دھنسل کے بنیاد۔

## ناک کا گوٹر

کلکیر یا کارب۔ ناک کا گوٹر سونگھنے کی قوت نہ ہو۔  
 ٹیوکریم۔ سارے ہی نتھنوں کو بھر دے۔ جس طرف لیٹے اس طرف کا نتھنا بند ہو جائے۔ بڑا گوٹر  
 ہوز کام کے غلط علاج کی وجہ سے ہو۔ سبزی، مائل سفید اخراج۔ غذا و موسم میں بڑا ہونے کا رجحان  
 ناک کے گوٹر کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔

کالی نائٹرکیم۔ سردی کے درجہ کے بعد گوٹر تیزی سے بڑھے۔ بڑا تنا ہوا ناک دائیں طرف۔  
 ہیکلا لاوا۔ ناک کا گوٹر جو چہرہ کو بگاڑ دے۔ ڈیلوں کو اوپر کی طرف کر دے۔ پلکوں کو الٹ  
 دے۔ نتھنوں کو بند کر دے۔ بچے نہ تک بڑھ آئے جس سے سانس لینا اور چبانے کا عمل مشکل ہو جائے۔  
 الیومنا۔ ناک کے گوٹر بائیں طرف۔

## امعائے مستقیم یا ریٹیم کا گوٹر

ٹیوکریم۔ گوٹر کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ اس کے ساتھ علاج شروع کیجئے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے  
 تو درج ذیل ادویات آزمائیے۔

کلکیر یا فاس۔ امعائے مستقیم کا گوٹر۔  
 فاسفورس۔ امعائے مستقیم کا گوٹر یا فاس کے جگہ سوچی ہوئی۔

## حفظ ماقدم۔ روکنے والی

بیلادونا۔ سرخ، بخار کو روکنے کے لئے۔  
 کالی آئیوڈ۔ جانوروں میں منہ اور پاؤں کی بیماریاں روکنے کے لئے۔  
 پائیلو کارٹینیم {  
 پیروڈینیم { کن پٹروں کے غلات حفظ ماقدم۔

متھائرس ٹائیو - ریڑھ کے ستون کے پیلے رنگ کے مادے کی سوزش کیلئے حفظ ماقدم کے طور پر۔

ویریولنیم { چھوٹی پیچک کے غلات حفظ ماقدم کے طور پر۔  
ویکسینم {

میلینڈریم { پیچک کے غلات حفظ ماقدم کے طور پر۔  
ماریلینیم {

سٹرانسیم - تابکاری شعاعوں کے اثرات کے غلات۔

پروٹوسین - کالی کھانسی کے غلات۔

الفلاوٹینیم - الفلوٹینز کے غلات۔

ڈیفھرنیم - خناق کے غلات۔

دیکھے، جبل جانا۔ مہاپ وغیرہ سے جبل جانا۔

## سکروی

آر سینکم البم - شدید کمزوری، بچہ لاغر، انٹرلوں کا نظام درہم برہم منہ سے شدید بدبو۔

سلفر - جب موٹھوں سے خون بہے اور مریض کے منہ سے بدبو دار سانس آئے مریض بڑھا بھری دار۔

اور کمزور آئے اور جلد کی غیر صحت مند حالت۔ بدبو دار۔ پیپلر خون دانتوں کی جڑوں میں سے ہے۔

مرکبورس - جب دانتوں سے موٹھے پیچھے ہٹ جائیں۔ نیلے اور غیر صحت مند رنگ، ٹانگیں سوجی

جوتی اور بہت پر درد غیر صحت مند جلدی نیلے ناسور نمایاں علامات ہیں۔

کریوزوٹ - منہ بدبو دار سیلا۔ موٹھوں میں ناسور، نکسیر اور آلات تناسل سے خون بہے۔

کاربووٹیج - موٹھوں اور ناک سے متواتر خون بہے۔ یہ گردوں اور انٹرلوں بھی ہو سکتا ہے۔

آرٹیکامانٹ { ٹانگوں میں دردوں کے لئے دی گئی ترتیب میں دیکھئے۔  
سمفاقیٹیم {

نوٹ :- سکروی کے علاج کے لئے غوراک نہایت ضروری ہے۔ پھلوں کا رس اور سبزیاں جلد

اور اچھے نتائج ظاہر کرتی ہیں۔

کیلنڈر والا - ۱ - اور - آپ معطر کی نسبت سے ملا کر ہر دو گھنٹہ بعد دھونے سے جلد آرام آتا ہے اور گندی بو دور ہوتی ہے۔

## متلی قے جہاز - کار - گاڑی کے سفر میں جکڑ

بیشروکیم سفری سکالیف کیلے مخصوص مریض شدید متلی قے اور جکڑوں اس درد میں مبتلا رہتا ہے گاڑی میں سواری کرنے پر جی تھلا نا۔

ایپومارفیا - دماغی سکالیف کی وجہ سے قے  $2 \times$  یا اس سے اونچی طاقت میں استعمال کیجئے۔  
ٹوبیکیم - تھوڑی سی حرکت پر بھی زیادتی - عرشہ پر کھلی ہوا میں افادہ - لیکن زبردستی ٹھنڈے پینے اور ٹھنڈک نمایاں علامات ہوں - خاص طور پر باحتیاط کی۔

سینٹیفیکریا - اعصابی آدمیوں میں سفری سکالیف جب سرگرائی اور متلی شروع ہوئے قے لےنے سے پہلے دی جائے۔

کوکولس انڈ - جب گاڑی میں سفر کرنے پر بھولنے سے سفری سکالیف سرگرائی اور متلی وغیرہ ہوں۔  
تھیرپڈون - سفری سکالیف اعصابی عورتوں میں جو جہاز کی حرکت سے نجات پانے کیلئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔

پلسٹیللا - عرشہ پر کھلی ہوا میں افادہ لیکن جو نہی کمرے میں داخل ہو سفری سکالیف شروع ہو جائیں۔ طبعی طور پر خوش مزاج لیکن جلد ہی آسہ بھانے شروع کر دیں۔ پیاس نہ ہو۔  
لوورکس - متلی اور قے اس کی نہایت نمایاں علامات پیچہ کی طرف حرکت سے ڈر - جہاز یا گاڑی کی پیچہ کی طرف حرکت سے متلی اور قے شروع ہو جائے۔

برائی اونیا - جب مریض چپ چاپ لیٹے پر افادہ محسوس کرے۔ معمولی سا خلل روانی پیش کرنے پر بھی سکالیف بڑھ جائے۔

کافیا - مدہ میں متواتر سکالیف سر درد کے ہمراہ - برقت قے کرنے کی رغبت ہو گئے میں محسوس ہو۔

آدھے سر کے دروں کے ساتھ پتلے مواد کی تے۔

## احساسات -

کارلوائیٹس - تمام حصوں کا ڈھیلا پن آنکھیں اپنے خانوں میں اور دماغ سر میں ڈھیلا محسوس ہو۔

امونیم میور - کمر میں کندھوں کے درمیان ٹھنڈک کا احساس -  
ڈفنے - جسم کا حصہ بازوؤں سے علیحدہ محسوس ہو۔

سپینا - ریکیٹ میں سبب یا آلو جیسا گوار محسوس ہو۔ اس علامت سے اسہال اور قبض ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں میں ریت کا احساس -

کروکس - کوئی زندہ چیز پیٹ میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے (جنین پیٹ میں شدید حرکتیں کرے یا تصوراتی عمل کا احساس اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

سیکل کار - جلن کا احساس جیسے کہ دیکھتے ہوئے کوئے حصوں پر گر رہے ہیں جو چھوٹنے پر ٹھنڈے ہوں۔ ڈھانپا جانا پسند نہ کرے۔

مینزبریم - جیسے کہ دانت بہت لمبے ہوں۔

مرکوریس پرنس - محسوس کرے کہ جیسے دوزخ ہوں۔

ماریکائیبرفرا - جیسے کہ چہرہ پر کپڑے لکڑھے رنگ رہے ہوں۔

لوہیلیا انفلیٹا - جیسے کہ گلے میں ہڈی ہو۔

لیئم ٹنگ - کندھوں سے پیچھے کی طرف کھینچاؤ جیسے کہ گروہوں میں بندھے ہوئے ہوں۔

پٹنڈرا - جیسے کہ کچھ اعمالے متعین میں سے خارج ہو رہا ہو۔

لارویس ورسس - جیسے کہ نکتیاں اور نکٹیاں جسم پر چپک رہی ہوں۔

کیسکیم - جلن کا احساس جیسے کہ مچیں چھڑکی گئی ہوں۔

آرسکم الیم - جلن کا احساس جس کو گری سے افاتہ ہو۔

سلفر - جسم کے کسی بھی حصے میں جلن کا احساس - سر کے گرد سخت بند کا احساس - گلے میں بالوں

کا گچھا چھاتی میں برت کا گولا۔ چھاتی اور بازوؤں پر چڑھے ریگنے کا احساس۔  
فانسفورس۔ جلن کا احساس۔

بورکیس۔ مٹری کے جانے کا احساس چہرہ پر کھٹل اور کڑے مکڑوں کے چلنے کا احساس  
بیچلڈنٹیم۔ احساس جیسے کہ اس پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ہوا کی ٹالیدوں میں گرد و غبار کا احساس  
اور کھانسی آئے۔

ڈلکا مارا۔ ڈوبے کا احساس۔

اگنیشیا۔ خالی پن کا احساس۔

ٹیرینٹھنا۔ احساس کہ اس نے ایک چھوٹا سا گولہ نکل لیا ہے جو معدہ کے گڑھے میں اسکا  
ہوا ہے جیسے کہ انٹریاں ریڑھ کی ہڈی کی طرف کھینچ رہی ہیں۔

ٹیویرکولنیم۔ ریڑھ کی ہڈی پر گیلے تکلیف دہ پٹوں کا احساس۔

تھووبا۔ احساس کہ دماغ میں کیل ٹھوسا ہوا ہے۔ امعاء مستقیم میں سے ابلتے ہوئے سیر  
کا گزرنا۔ متعدد پانلے کے دوران میں مکڑوں میں بٹ جائیگا۔ جیسے کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔  
جیسے کہ جسم شیشے کا بنا ہوا ہے اور ٹوٹ جائیگا۔ جیسے کہ کوئی زندہ چیز جسم میں اچھل کود رہی ہے۔  
تھیرڈین۔ احساس کہ کوئی زندہ چیز جسم میں اچھل کود رہی ہے۔ تھووبا کے ناکام ہونے پر یہ  
استعمال کی جائے۔

کیمو میللا۔ احساس کہ ٹانگوں کی ہڈیوں کے مرن پر چل رہا ہے اور اپنے کوئی پاؤں نہیں کھتا۔

گریفائٹس۔ پچھلے پکڑی کے جانے کا احساس اسکو دہر کرنے کرنے کی سخت کوشش کرے۔

کیمفر۔ جسم کی بیرونی سطح پر شدید ٹھنڈک کا احساس کہ پڑے اتارنے کی زبردست خواہش بہت  
زیادہ گری یا پسینہ جسم کو ڈھالنے کی خواہش کے ساتھ۔ احساس کہ ڈھانپنے ہوئے حصوں پر  
پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔

ایلیٹھس۔ ٹانگوں پر چوہا چڑھنے کا احساس۔ سر سے بازو تک بجلی کی کرنٹ دھڑکنے کا احساس۔

کروٹیلکسی۔ احساس کہ کوئی زندہ چیز سر میں دائروں کی صورت میں چل رہی ہے۔ چند یا۔

یا چوٹی پر گرم سُرخ لہجے کا احساس۔ پیٹ میں سوراخ ہونے کا احساس جس میں سے ہوا خارج ہوتی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس۔ احساس کر دل پانی میں مچھو دیا گیا ہو۔ یا بھاتی میں پانی کا احساس۔ دائیں بازو کے چھوٹے ہونے کا احساس۔

پائیر جن۔ سر رپوٹی کا احساس۔ احساس کر اسکا سر ٹکیہ پر چڑھا رہا باقی جسم کا کوئی پتہ نہ ہو کہ کہاں ہے۔ فائبرک لیڈ۔ احساس کر ایک کان سے دوسرے کان تک لہجے کے ٹھیکنے یا بانگ میں کسا ہوا ہے۔ گلے میں لکڑیوں کا احساس جیسے کہ پھلی کی ہڈیاں ہوں۔

الکوناٹ این۔ جہرے کے بڑے ہونے کا احساس۔

الیومنا۔ بازوؤں اور جسم کے گرد بیٹیوں کا احساس۔ گلے میں پھلی کی ہڈی کا احساس جس وقت بھی کوئی چیز نکلے حلق میں گنگی کا احساس ہو۔ ٹانگوں کی پشت پر چھینٹیوں کے رینگنے کا احساس۔ کھڑکی کے جانے کا احساس۔ خشک اندوڑوں یا خون خشک چہرے پر ہونے کا احساس۔ اکیٹار لیپو۔ احساس کر اس کے ارد گرد سیاہ بادل ہو۔ اور اس کا سر ڈھانپ لیا گیا ہو اس لیے اندھیرا ہو اور درہم برہم ہو اور یہ سیسے کی سر پر وزن دے۔ دماغ میں ہلنے کا احساس جیسے کہ معدہ و گردن سے چنڈا تک پہنچ کس دیا گیا ہو۔

سٹس کیناڈیفس۔ جسم کے تمام حصوں میں ٹھنڈک کا احساس جیسے کہ معدہ۔ گلا بھاتی انگلیوں کے سبے دھیرہ احساس کر تمام جسم میں لیٹے وقت چونٹیاں رنگتی ہوں پریشانی اور تکلیف سے سانس آئے۔ اٹھنے پر مجبور ہو اور تازہ ہوا کے لئے اور کھڑکیاں کھولے جس سے اسے اتفاق ہو۔ لیٹے پر فوراً دوبارہ یہ احساس لوٹ آئے۔

کوگولس۔ سر میں کمزوری۔ خالی اور چلنے جانے کا احساس۔

گلوٹائن۔ احساس کر ٹھوڑی گھٹنے تک بڑھ گئی ہے

کالی بائیکرویکم۔ احساس کر سر اور ناک پھٹ جائے گی۔ کزناک کے اندر ڈھیلی ہڈیاں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہوئیں۔ نعتوں میں اونچا مال ہو۔ زبان کی پشت پر بال ہو۔ خفا پیشاب کی نالی میں پیشاب کے ایک قطرے کے رہنے کا احساس۔ لیٹے پر دم گھٹنے کا احساس۔

کاروبار نیم سلف - احساس کہ قریب ہی کوئی گڑھا ہوا ہے ایسے گرنے کا خطرہ ہو۔ کندھے کے جوڑ پر بوجھ جو اسے آگے جھکنے پر مجبور کرے۔

کالی کارب - معدہ میں گھونسہ۔ صدمہ یا بُری خبر کا احساس۔ بھلی کی ہڈی یا لکڑی کی کھیتی لگنے میں احساس۔ دوپہر کے وقت شدید ٹھنڈک کا احساس۔

لیکس - بھلی کی ہڈی کا احساس گلے میں۔ احساس کہ چہرے پر جوٹیں رنگ رہی ہیں۔ گرمی حرکت اور رات کو زیادتی۔

میںڈورنیم - احساس کہ دائیں کان میں کوئی کٹار رنگ رہا ہے۔ کان کی اندرونی نالی کی دیوار میں سوراخ کر رہا ہو۔ احساس کہ کاغذ یا پن معدہ کے گڑھے میں سے باہر آرہی ہو اسے تکلیف سے اٹھنے پر مجبور کر دے دہری ہو جائے اور چلائے۔ ہر طرف سے سوئیاں آنے کا احساس ہو۔ پلکوں کے نیچے ریت ہونے کا احساس۔

مرکوریس - گلے میں سیب کے گودے کے چپکے ہونے کا احساس۔

اوپیم - کسی بھی بیماری میں احساسات کا جلتے رہنا اس دردانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کوکس کی کیشائی - گلے میں بال کا احساس۔ اونسوڈ - احساس کہ کپاس پر چل رہا ہو۔

درٹیرم البم - احساس کہ اگر اس نے پانی یا تو یہ حلق سے نیچے نہ جائیگا۔ چند یا میں ٹھنڈک کا احساس۔ دریدوں میں ٹھنڈے پانی کے دھڑنے کا احساس۔ جیسے کہ وہ حاملہ ہو۔ جیسے کہ اس نے پودہ دینہ کھایا ہو۔ منہ اور گلے میں ٹھنڈک۔ جیسے کہ کوئی زندہ چیز معدہ سے گلے کو اٹھ رہی ہو۔ جیسے کہ انٹریاں چاقو سے کاٹی جاتی ہوں جیسے کہ پیٹ اور انتریوں میں گرم کوئلے ہوں۔ ایسڈ فاس - احساس کہ اس کے پاؤں اٹھ رہے ہوں اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔

ویلیرباینہ - احساس کہ گلے سے ایک دھاگر لٹک رہا ہو۔

نیٹریم سورہ - احساس جیسے کہ زبان سے دھاگر رہا ہو۔

زیستھوزائلم - احساس کہ جسم میں سے بجلی کے ہلکے ہلکے جھپٹے گزر رہے ہوں۔

پلاٹیم۔ احساس کہ کوئی جانور پیٹ میں چھوٹے چھوٹے حصوں کو دانتوں نے چیر پھاڑا ہو۔  
 کمر پر۔ بازوؤں۔ پیٹ۔ رانوں اور ٹخنوں پر پسوؤں کے رنگنے کا احساس۔ حقیقی پسوؤں کے کاٹنے  
 کی طرح مختلف جگہوں پر چبکچبیں ظاہر ہوں۔ مثلاً ہونٹوں پر۔ ناصوں وغیرہ پر۔ یہ شدید غارش پیدا کرتا ہے۔  
 پٹرولیم۔ احساس کہ دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ دھڑکن میں ٹھنڈک۔  
 پلاٹینم۔ احساس کہ رانیں سختی سے لپٹی ہوئی ہیں۔ ماتھے پر پانی کا احساس ٹھنڈک کا۔ رنگنے کا۔  
 ٹانگوں میں کسن ہونے کا احساس۔ پیٹ کے اندر دھنسنے کا احساس۔  
 ٹیلیائی۔ دماغ میں کیل کے گڑنے کا احساس۔  
 نرسکولس بلب۔ احساس کہ گھر سے باہر جانے پر جسم پر گیلیا کپڑا ڈال دیا گیا ہو۔  
 روٹا۔ آنکھوں میں حرارت اور گرمی کا احساس۔ ریڑھ کی ہڈی میں نیچے کی طرف ٹھنڈک کا احساس۔  
 سلیسک الیڈ۔ احساس کہ پاؤں پر سینہ آ رہا ہے۔  
 سینٹی کولا۔ احساس کہ سر کھٹکا ہوا اور ہوا اس کے اندر سے جائے۔ دماغ کے ارد گرد ٹھنڈے  
 پڑے کا احساس۔ احساس۔ احساس کہ کمر دو حصوں میں ہو۔ نچلے پر ہوا کی نالی میں کسی سخت چیز کا احساس۔  
 سلیشیا۔ زبان کے اگلے حصے پر بال کے پڑے ہونے کا احساس۔  
 سٹیفیگیٹ۔ احساس کہ معدہ اور پیٹ ڈھیلے ہو کر لنگ رہے ہوں۔  
 ویکم الیم۔ احساس کہ اسے کچھ کمرے نیچے کھینچ رہا ہو اس کے فوراً بعد احساس ہو کہ جسم کا اوپر والا  
 حصہ ہوا میں تیر رہا ہو۔  
 ایومنا سلیسکیٹ۔ احساس کہ دماغ میں سے چھینوٹیاں نیچے جسم کی طرف رنگ رہی ہوں اور پاؤں  
 میں سے نکل رہی ہوں۔ جسم کو لپیٹ دینا چاہتی ہو اور سر کو ٹھنڈی ہوا میں رکھنا چاہیے۔  
 بیریم سلف۔ سر میں جھکات کا احساس۔ دماغ کے ڈھیلے ہونے کا احساس۔  
 آرسینک سلف فلیوم۔ ٹانگوں کے اور پاؤں کے ذریعے ہونے کا احساس۔ بازوؤں کا سن پڑنا  
 اور جھکے گئے کا احساس۔  
 پیڈیکولس۔ احساس کہ بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا جا رہا ہے۔

کالی سلف - سر پر بہت ہی مضبوطی سے رکھی ہوئی تنگ ٹوپی کا احساس -  
 کینا بس انڈیکا - احساس کو دل سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں -  
 کالی بانی - دل کے قریب ٹھنڈ کا احساس  
 اوسیم - احساس کو اس نے ٹوٹے ہوئے پتھر نکل لئے ہوں - جیسے کرکڑ اور کندھوں پر کڑے رنگے ہیں  
 ہوں - سر کے گرد ایک ہاتھ ہو -  
 اکوئٹم کام - پیشے کے گرد چیزوں کے رنگنے کا احساس -  
 کلیٹیس - صبح کے وقت احساس کو اچھی اتنا نہیں سہا - یعنی کہ مطلوبہ نیند پوری نہیں ہوئی -  
 ایتھوڑا - احساس کو معدہ کے اوپر کا حصہ نیچے کی طرف الٹ گیا ہو بچائی میں جلن کا احساس -  
 سوراٹیم - جیسے کہ سردی کا ان اس کے اپنے نہ ہوں -  
 الیومن - احساس کو بازوؤں کے گرد رسمی یا ٹپی بندھی ہو، خاص طور پر ٹانگ کے گلو گھٹنے کے  
 نیچے چلتے وقت پاؤں کے تلوے دباؤ سے حساس ہوں -  
 آر جینٹم ٹائریکیم - گلے میں چھڑیاں یا پھٹی کی ٹپوں کا احساس - مریض ہر ٹھنڈی محسوس اور پسند کرے -  
 مہیر سلف - نکلنے وقت گلے میں چھڑی لیکن آر جینٹم ٹائریکیم کے خلاف مریض ہر چیز ٹھنڈی کے بجائے  
 گرم چیزوں کو ہی پسند کرے -  
 چارٹا - آنکھوں میں ریت کا احساس -  
 میگنیشیا میور - احساس کو بال کھینچے جا رہے ہوں - بالوں کے کیسے دکھیں - سر کو مضبوطی سے پیٹنے پر اتار -  
 نیٹریم میو - گلے میں پھیلی کی ہڈی کا احساس -  
 سلفورک الیڈ - تمام جسم اور بازوؤں میں سردی کا احساس بغیر ظاہر کا پنے کے -  
 ابروٹیم - احساس کو معدہ تک رہا ہو یا پانی میں تیر رہا ہو -  
 ایلیم ٹائیوا - زبان پر مال کا احساس - جب پڑھے تو تکلیف ہو - یا پڑھتے وقت  
 تکلیف زیادہ ہو جائے -  
 میگنیشیا کارب - احساس کو دانت بہت لمبے ہو گئے ہوں -

## صدرہ - دھچکا - شاک

ایکونائٹ این - ڈرکی درجہ سے ذہنی صدرہ - لیٹے ہونے کی حالت میں سے اٹھنے پر سرخ ہوا  
انتہائی زرد مردوں جیسا اور دوبارہ اٹھنے پر ڈرے - گرنے پر یا چوٹ لگنے پر ہلکا۔  
اتیم - تصوراتی درجے کو چھوٹ سے ڈرکی درجہ سے صدرہ - جنگلی جانوروں کے ڈرکی درجہ سے  
صدرہ یا شاک وغیرہ۔

کیخمر - داغی چوٹ کی درجہ سے بیہوشی - نظر کا باتے رہنا - سماعت کا جاتے رہنا - چوٹ  
کی درجہ سے بیہوشی۔  
آرنیکا - زخم کی درجہ سے صدرہ - ٹھنڈے ہاتھ پاؤں - زبان کا ہاتھوں اور پاؤں کا نینبا - شہ  
کزدی - لاغری اور تھکاوٹ - چھوٹے پر بے حس۔

اگنیشیا - خاندان میں اموات کی درجہ سے ذہنی صدمات یا اسی طرح کے واقعات جو افراد  
اور بے احساسات بنادیں۔

کینتھرس - جب صدرہ جلنے یا جھلنے کی درجہ سے ہو ۲۲ میں دیکھے۔ اور مددکنچر پانی میں  
ملا کر جلے ہوئے حصہ پر لگائیے۔

کاربوونج - سانس گلا - منہ اور دانت اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے - اور کپکپکے جانے کی خواہش۔  
چائنا آف - جنون کی کمی کو درجہ سے بیہوشی - کانوں میں گھنٹیاں بچیں - مٹھانے جانے کی خواہش  
بائیٹرکیم - ذہنی صدرہ جس کا نتیجہ افسردگی ہو کوئی مسکراہٹ نہ ہو اور مریض بائیں نزلوں میں  
اسے خوراک اچھی نہ لگے - زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہے - یہ صدمات علیحدگی یا محبت میں ناکامی یا کسی  
اور نامعلوم درجہ سے ہوں - ذہنی صدمات اعصاب - سن ہونا اور کانپنے کا باعث ہو یا ذہنی صدمات کے عصب

## اپریشن کے بعد کی تکالیف

فاسفورس - اونچی خوراک پیٹ کے اپریشن سے ایک دن پہلے دی جائے۔ یہ قلی اور اپریشن  
کی بے جینی کو درد کر دیتی - اعصابی مریضوں میں عضو کاٹنے سے پہلے یا بعد میں اگر بہت

زیادہ خون ہے یہ کلوروفنام کا تریاق ہے اس کے اثرات کو زائل کر دیتی ہے۔ اپریشن کے بعد دتے کو روکتی ہے۔ دانت نکالنے کے بعد خون کو بند کرنے کے لئے مفید ہے۔ ۵۴

آرنیکا مانٹ۔ یہ اپریشن کے صدات کے لئے مفید ہے۔ یہ اپریشن سے پہلے یا بعد میں دی جاسکتی ہے۔ اپریشن کے فوراً بعد دینے پر دکھن اور صدور کو روکتی ہے۔ سر کے زخموں میں سردی کو روکتی ہے۔ آپریشن کے بعد ٹانگے پر قابو نہ رہنے کو درست کرتی ہے۔

اکونائٹ این۔ یہ بہت ہی حساس فنجول کے اپریشن کے وقت دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آنکھ آنکھ یا دیناب کی نالی۔ یہ آرنیکا مانٹ سے بہتر نتائج دیگی جو کہ بڑے بڑے اپریشنوں میں دیکھائی گئی ہے۔ رٹاکس۔ دکھن اور درد کو بے مین اور دوسری تکالیف کو جو کہ آپریشن کے بعد ہوں پیٹ کے نیچے چھتائی جھتے میں ہو۔

پالسٹیل۔ جہاں پر مریض ہاتھوں کو سر کی پشت پر رکھ کر لیٹے۔ ہوا کے لئے ضرورت مند ہو اکثر وہ منہ کو دھڑا چاہے۔

نکسوامیکا۔ یہ اپریشن کے بعد کی تھ جس کے ساتھ زیادہ آبکیاں اور لہض کی بے چینی شامل ہو۔ ایلیم سپیا۔ کے ٹھوٹے بازو کے تھے پر اعصابی درد۔ درویں۔ دھاگے کی طرح باریک اور گولی لگنے جیسی درویں ہوں۔

امونیا میور۔ پاؤں کو کاٹنے کے بعد پھاڑنے والی، سوئی لگنے جیسے درد ارات کے وقت بستر میں تکلیف زیادہ۔ ماش کرنے میں افادہ ہو۔

مائیمیریکیم۔ انگلی کے آخری پورے کاٹنے پر تیز گولی لگنے جیسے درد۔ حادثے کی کی دھیر سے انگلی کاٹ جانے پر، دھویں شدید ہوں۔ ناقابل برداشت اور زخم کے مقابلے میں بہت درویں ہوں۔ سٹیفگیسیریا۔ جب پاؤں کے کاٹنے کا احساس سرجری کے کافی بعد تک ہے۔ درد اور بے چینی ایک خوراک دینے پر در در رک جائیگی۔ پیناب کی نالی کے پھینے پر تکلیف۔ اپریشن کے بعد غیر متخذ نرم۔ ورٹیرم البم۔ اپریشن کے بعد شدید کمزوری۔ ٹھنڈے پسینے جسم ٹھنڈا خاص طور پر ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ چہرہ زرد۔ خدو خال بے ڈھنگے۔ بے چینی اور تشنگی کے درے۔

کیعقر۔ یہ درمِ طمِ الم سے زیادہ خطرناک یا شدید کیسوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ صدر نمایاں ٹھنڈا سانس  
نبض کمزور لیکن تیز۔ زبان اور ہونٹ کانپیں۔ سانس کا عمل سُست اور آہیں۔  
کاربوہائیڈریٹ۔ نزعی حالت میں شدید اور مایوس کن علامات۔ یہ ہوشی اور محرکات سے زلٹوٹے بغیر مشکل سے  
محسوس ہو اور خراٹے دار سانس ہوں۔

سٹریشیم کارب۔ سرچیکل آپریشن کے بعد کے صدمے، خون کا زیادہ بہنا، ٹھنڈا اور پسینہ۔  
اوپیم۔ کافی لمبی بے ہوشی کئے اگر اوپیم ناکام ہو جائے  
ہیملی بورس۔ تو ہیملی بورس استعمال کرائیے۔  
پائیر و جیم۔ آپریشن کے بعد گھٹنے ٹرنے کی حالت میں دیکھئے۔

## سنگ جوتوں کے زخم۔

”کاسٹ“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیے۔

## کوتاہ قد۔ ناماقد۔

ٹیوبورکولینم۔ یہ ادویات ۲۰ ملاقات میں ہر ہفتہ اول بدل کر چھ ماہ تک یا زیادہ دیر تک  
برٹیا کارب۔ دی جائیں۔ قد صرف ۱۰ سال سے ۱۴ سال کی عمر تک بڑھنے کا امکان ہوتا ہے  
تھوہجا۔ جتنی چھوٹی عمر ہوا تھے ہی اچھے نتائج کی توقع ہوتی ہے۔

بو۔  
بوورسٹا۔ بغلوں میں بو۔

نکس ماسکٹا۔ عورتوں کی بغلوں کے پیچھے اور چھاتیوں میں بدبو۔

خواب خرامی۔ سوتے میں چلنا

آریٹیمیز یا ونگیرس۔ سوتے میں چلنا یا کوئی اور کام کرنا۔

نیرم میور۔ سوتے میں اٹھ کر بیٹھ جانا۔

اگیشیا۔ ہر چیز جو گلی میں سے گزرتی ہے اسکو دیکھتا ہے لیکن جاگنے پر معمول جاتا ہے۔ صاف طور پر دماغ کی اندرونی حالت کو بتاتا ہے (عزت نفس کے مجروح ہونے کی وجہ سے)

## غٹورگی

ہیلی بورکس۔ شعور کے ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز دیکھی یا سنی نہ جائے۔ ہر چیز اپنا ذاتی کھو بیٹھے۔

ریڑھ کے گوڑ میں سے ریڑھ کی ہڈی

کے اندرونی اجزاء کا خارج ہو جانا۔

ٹیوبرکولینم۔ اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔

سلیشیا۔ ٹیوبرکولینم ۲۰۰ x ایک خوراک دینے کے ایک ہفتہ بعد سلیشیا ۲۰۰ کی تین خوراکیں دن میں، پندرہ دن تک جائیں اس کے بعد سلیشیا دوبارہ دی جائے اس کے بعد آرسینکیم آئیوڈ دی جائے۔ ٹیوبرکولینم ۲۰۰ x صحت ۲ ماہ میں ایک دفعہ دہرائی جائے۔

کلکیر یا کارب۔ جب آرسینکیم آئیوڈ مناسب کام نہ کرے تو کلکیر یا کارب دی جائے۔

ریڑھ کے مہروں کی سوزش۔

کلکیر یا فلور۔ گردن کے غدد اور گوشت، سخت۔ کیلشیم کا جماؤ۔ پتھر جیسی سختی ریڑھ کے جوڑوں کے درمیان سوزش۔ چکر۔ کم درد جوڑوں میں کرکٹن۔ مریض ٹھنڈا اور نندا موسم سے حساس ہو۔ آرام کرتے وقت زیادتی مرض ہو۔ گرمی سے اتفاق ہو۔

نیفخالیسم۔ سر پکڑائے خاص طور پر اٹھنے پر، بازوؤں کا سس ہونا درد سے بدلے۔ یعنی جب بازو سس ہوں تو درد نہ ہو اور جب درد ہو تو بازو سس نہ ہوں۔ ٹانگ کے اگلے اعصاب میں کلٹنے والا تیز درد۔ رانوں میں اور پٹھے کے تعصب میں پھاڑنے والا درد ٹھنڈے پر زیادہ ہو بیٹھے پرانا قہر ہو۔

میڈورنیم۔ جب ٹیڑھا کھڑا ہو تو جگر آئیں۔ گردن سخت۔ گردن کے پھوں میں باغھن بازوں کا سن ہو جانا۔ جھنڈا درد۔ چند یا پردن اور دباؤ۔ ہاتھوں اور پاؤں کی جلن۔ اعصاب کا نہیں۔ اور جھنجھائیں۔ بازوں کا استطار۔ ناقابل برداشت دریں۔ اذیت بخش اعصابی درد۔ صبح سے شام تک زیادتی ہو۔ ساحل سمندر اور معدہ کے بل لیٹنے پر فاقہ۔

رہو ڈوڈن درد۔ گردن کی گڈی کے پھوں کا دباؤ اور کھینچاؤ۔ گردن سخت۔ گڈی کی سختی کم اور کندھوں میں پھاڑنے والے درد۔ بازوؤں کی جھنجھاہٹ اور بیماری پن اور انگلیوں کے سرے جیسے کہ ان میں دوران خون نہ ہو۔

لیڈم۔ کندھوں، ہاتھوں اور بازوؤں میں کھینچنے والے اور پھاڑنے والے درد۔ ہاتھوں اور بازوؤں کو اوپر اٹھانے پر یا ہلانے پر پھاڑنے والی درد۔ ہاتھوں میں ڈنگ لگیں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں بے حتی۔

فلورک ایسٹر۔ گردن کی گڈی میں سختی اور درد۔ کمزوری اور لنگرا پن۔ بازوؤں اور گردن کا سن ہونا۔ انگلیوں میں سوئی چھبنا۔ لکھنے میں درد اور تکلیف۔ چترروں کی ہڈیوں میں اور پاؤں کے تلوؤں میں سوئی لگنے جیسے درد۔ ٹانگیں سوجائیں۔ یہ دوائی ہڈیوں کے زائید بڑھنے کو نرم کرتی ہے اور جذب کر لیتی ہے۔

کاسٹیکم۔ گردن کے غدودوں کی سوزش۔ گردن کی گڈی میں دباؤ اور سختی۔ کندھوں میں درد۔ بازوؤں اور ہاتھوں میں درد اور کھینچاؤ۔ دائیں ہاتھ میں فالجی احساسات۔

کالوفاسیلیم۔ گردن کی گڈی کی سختی۔ کو حرکت دینے والے پٹھے میں کھینچاؤ اور سر بائیں طرف کو کھینچ جائے۔ انگلیاں بہت سخت اور کھینچی ہوئیں۔ جب ہاتھ کی ٹھلی بند کرے تو کٹاٹے دلی دیں۔ اکیلا پامیکاٹا۔ بازوؤں میں لنگرے پن کا احساس۔ خاص طور پر دائیں بازو میں۔ ہاتھوں کی فالجی کمزوری۔ پتھیلی دباؤ کے لئے بہت ہی حساس۔

**مورچ**۔ چوٹ بھی دیکھئے۔

آرنیکا مانٹ۔ اس دوائی کی مدد نہ کر سناڑہ چھڑ پکایا جائے اور اس پر سینک دیا جائے۔ اور

اندر دنی طور پر... طاقت میں ایک قطرہ ہر پانچ گھنٹے بعد دیا جائے۔ جب افادہ شروع ہو جائے تو دوائی کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہفتہ میں دو دفعہ دہرائیے۔ سیاہ اور نیلے داغ مویج دلے جوڑ اس دوائی سے بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ خاص طور پر بچہ دھرتے ہوئے اس کی طرف آئیں ان سے ڈرے۔

ریشاکس۔ جب آرٹیکالاکام ہو جائے یا مویج کو غیر مکمل آرام دے یہ مویج کو بہت کم وقت میں ٹھیک کر دے گی۔ ایک۔ ایم طاقت دیکھئے۔

آگیشیا۔ دماغی کیسوں میں منظر ہوتی ہے۔ نیند بہت کم اور بے چینی۔ آواز کا برداشت نہ کرنا پانی جیسا پیشاب کا پنے اور اینٹھن ہو۔

رودھاجی۔ خاص طور پر کلائی ٹخنہ کی مویج۔ ایک ایم طاقت میں آرٹیکالاکام۔ ایم سے بدل کر ہر تیسرے روز دیکھئے مٹی کر آرام آجائے۔  
(دیکھئے پھر ماقدم۔ قدم۔)

## سختی

آرٹیک سلف فلیوم۔ زیر غورانی کینچ رہنے پر تمام جوڑوں کی سختی۔  
انٹیم ٹارٹ۔ گردن کی سختی۔ گردن پھیلی ہوئی اور سر پیچھے کو جھکا ہوا۔  
ریشاکس۔ سختی جس کو حرکت کرنے پر افادہ ہوا اور جب آرام سے ہو تو زیادتی ہو۔  
اکونائٹ این۔ ہوا کے جھونکوں یا سردی کی وجہ سے گردن سخت۔ گردن ہلانے پر درد میں زیادتی۔ درد گردن سے کندھوں تک بڑھے۔  
کالچیکم۔ سختی کے ساتھ فالج اور درد۔  
رہوڈینڈرون۔ خشک ٹھنڈی ہواؤں سے طوفانی موسم کے آنے پر تکلیف میں زیادتی۔  
چیلیڈونیم۔ دائیں طرف درد اور سختی۔  
برائی اونیا الباسختی درد کے ساتھ جو حرکت کرنے پر زیادہ ہو۔

## انگوٹھا چوستا۔

نیٹرم میور۔ بچہ اپنا انگوٹھا چوسے اور ناخنوں کو کاٹے۔ ۱۔ ایم طاقت میں ہر ہفتہ دیکھ کر یوں۔ پرندوں اور پھوٹے جانوروں سے ڈرے۔

## دھوپ میں مجلس جانا۔

سال۔ دھوپ میں مجلس جانے کے لئے مخصوص دوائی ہے  
نوٹ ۱۔ جلے ہوئے حصہ پر ارنیکا یورٹس مرہم بھی لگائی جاسکتی  
ایکونائٹ۔ پریشانی اور موت کے ڈر کے ہمراہ۔ مریض کندھن۔ بیوقوف اور مٹھے پر زیادتی ہو۔

جیلسمیم۔ بچہ سرکے گرد پٹی بندی معلوم ہو چکوں کے بھاری پن کے ساتھ۔ کنپٹی میں درد جو کان تک جاتے اور ناک کے پہلو تک جائے۔ بدحواسی سے روک تھام کرنا چاہیے۔

اوسیم ۲۰۰x۔ جب بیہوشی اور تھکاوٹ ہو۔ یہ سیلا ڈونا کے بعد دی جائے۔  
گلوناٹن۔ زرد چہرے کے ساتھ شدید سردرد۔ آنکھیں نمند۔ سفید زبان بھر پور گول نبض۔  
سائنس شکل سے آئے۔ تپ اور معدہ میں ڈوبنے کا احساس۔ درجہ حرارت زیادہ۔ بعض اوقات بیہوشی۔ پہلے پہل یہ ہر پانچ منٹ کے بعد دیکھئے پھر وقفہ بڑھا دیجئے۔

سیلا ڈونا۔ سردرد چہرے پر اجتماع خون اور گرم۔ اونگھ۔ ہوش کا نہ رہنا۔ ڈھانپے ہوئے جسم پر پسینہ۔ کانوں میں سیٹیاں بھیں اور چھاتی میں گھٹن۔

نیٹرم میور۔ سن شڑک کے مزن اثرات سردرد کے ساتھ گرم موسم کے آنے پر دوبارہ لوٹ آئیں۔  
سوزج کی گرمی کی وجہ سے کمزوری اور سردرد۔

لیکسس۔ جب سوزج کی گرمی مریض میں سرگرمی اور بیہوشی پیدا کرے۔ گرم پانی سے شدید کمزوری پیدا ہو۔

# پیسینہ۔ سوزش۔ گھٹنوں کی سوزش

دیکھئے پسینہ۔ سوزش وغیرہ۔

سلیشیا۔ جوڑوں میں سوزش ٹھنڈے مریضوں میں جوڑوں کی چکنائی خارج ہونے پر ایسے مریض گرم موسم میں بھی گرم کپڑے پہنیں۔ متاثرہ حصوں کو گرم کپڑوں کے ساتھ لپٹنا چاہئے خاص طور پر گردن اور کندھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو۔۔۔ ۲x یا ۱۰۰ طاقت میں دیکھئے۔

ایس میل گھٹنے کے جوڑوں میں شدید درد اور پکی طرف اور اگلی طرف زیادہ درد گھٹنے میں گولی لگنے جیسی درد مفید سوزش اور جلن۔

رشتاکس۔ گھٹنوں کا گھٹنیا دی درد۔ رات کے وقت اور مرطوب موسم میں درد زیادہ۔

برائی اونیٹا۔ گھٹنے کے جوڑوں میں چکنائی کی سوزش۔ جب پلے تو سختی ہو سوتی لگنے جیسے درد کھینچنے والے۔ جھکے وار درد۔

پلسٹیللا۔ گھٹنوں کی سوجن بغیر درد کے۔ پھاڑنے والی۔ جھکوں والی اور کھینچنے والی دردیں گھٹنوں کی گرم سوزش۔

آئیوڈم۔ بہت زیادہ سوزش۔ جگہ بدلنے والی دردیں۔

سلفر۔ گھٹنے کے جوڑوں کا استسقاء۔ گھٹنوں کا نیم حاد درد۔

کلکیریا کارب۔ گھٹنوں کے جوڑوں کی بیماریوں کی بنیادی دوائی ہے۔

لیڈم۔ گھٹنوں کی چوٹوں یا زخموں کے لئے جہاں جوڑوں سے مواد برے حصے خارج دردیں

پھاڑنے اور مسلسل درد والی ہوں۔

روٹاجی۔ جوڑوں کی جھلی کی سوزش۔ گھر کی نوکرانی کے گھٹنے کی سوزش۔

## پیسایس

لائیکوپس درج۔ شدید پیس بہت زیادہ مقدار میں پانی پیئے۔ مرن اور مرن ٹھنڈا پانی ہی تسلی کرے۔

ایلیم ٹائیوا - پیاس جو نیند اچاٹ کر دے -  
 سلفر - جب مریض زیادہ پانی پئے لیکن بہت کم کھانا کھائے -  
 ڈیجیٹالس - بھوک کی غیر موجودگی میں شدید پیاس یعنی بھوک نہ ہو صحت شدید پیاس ہو جب  
 سلفر نام ہو جائے تو یہ دی جائے -

آرسینکیم الیم - تھوڑی تھوڑی مقدار میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر پانی کی پیاس بڑھ چک ہو -  
 کلکیہ یا آرسینکیم - ٹھنڈے پانی کے لئے پیاس لیکن خوراک کھانے کی باکس خواہش نہ ہو -  
 کینتھرس - گلے میں پیاس لیکن ذہنی طور پر پانی سے نفرت ہو - گلے میں جلن -  
 گوائیم - خوراک اور درد سے نفرت شدید پیاس ہو -

### انجماد خون

بو تھوڑے پس لین - انجماد خون کے لئے چوٹی کی دوائی ہے - یہ انجماد خون کے لئے - ادھر تک  
 مطابقت کرنے کی نااہلیت -

کلکیہ یا آرسینکیم - تھوڑی تھوڑی - ضمنی شریانوں کے سرکٹ غیر معمولی طور پر بڑھ گئے ہوں -  
 ایپس میل - راتوں کے جھکاؤ کے درمیان میں - ایک موٹی رسی راتوں کے اندر دنی طرف -  
 لیکسس - ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ انجماد خون کی ایک مخصوص دوائی ہے -  
 سمبل - انجماد خون میں بہت مفید بتائی جاتی ہے -

ادیکھے گاڑی کے سفر کی تکالیف

گوٹر - (عورتوں کے اعضائے ناسل کے تحت گوٹر بھی دیکھئے)

کلکیہ یا فلور - سخت گولے اور گانٹھیں - سخت غدد پتھر کی طرح سختی - ٹھنڈے پھوڑے کیلئے  
 شاندار اور انتہائی موثر دوائی ہے - کینسر کو بننے سے روکتی ہے - عورتوں کی بھاتیوں میں سخت گولے  
 کو نیم - جماؤ والے غدد میں بہت زیادہ سختی رات کو تکلیف کی زیادتی - کینسر بھاتیوں کے  
 گوٹریا کینسر کی ابتدا - غددوں کی چوٹ اور خراش کیلئے سب سے بڑی دوائی ہے -

میگ کرب - اس سے گوڑوں کا علاج کیا گیا ہے جو کہ جسم پر واقع ہوں۔  
برہسیرس و لیکرس - گوڑوں اور ان کے اگاؤ کے لئے۔

تھوجا - پریمیان اور جلد باز لوگوں میں گوڑ - قبض سے گیس پیدا ہو - خالی دکان سورج  
کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے - ٹھنڈے پانی میں نہانا چاہے جسم کے نکلے حصوں پر پسینہ -  
بلیس پی - جوڑوں کی وجہ سے اُگے ہوئے گوڑ - اگر ٹی بھی متاثر ہوئی ہو تو سینو تھس  
x9 کو ادل بدل کر دیں۔

ریڈیم بروم - یہ دوائی کینسر میں بطور عمل انگیز دی جاسکتی ہے۔ کینسر کی یہ بھی حالتوں  
میں انتہائی مفید ثابت ہوئی ہے۔

لیپس البا - یہ چھاتی کے کینسر کو ابتدائی دور میں روک دیتی ہے۔

ہیکلا لڈوا - یہ گوڑوں کے لئے مفید ہے۔ گوڑ کی تکلیف یا درد کو کم کر دیتی ہے ایسے مافیا  
کے انجکشن کی جگہ کام کرتی ہے۔ برہسیرس کی مخصوص شکل موت زرد - تنکا ہوا اور کڑھوت دکھائی دیتا ہے۔  
کلکیر یا کرب - خناری مزاج آدمیوں میں گوڑ - عصب کے پھوڑے میں جایا جائے علاج کرنا پڑے۔  
گوڑ یا گوڑ جو جاہل ہوتے بعد دوبارہ ظاہر ہوں - افراط خون والے گوڑ جو خون ملا مواد رکھتے ہوں  
بریا یا کرب - گوڑ خاص طور پر گردن کے چنیلے گوڑ خاص طور پر کمر کے پھوڑے میں تباہ  
فاسفورس - گردن پر گوڑ۔

ہائیڈراسٹس - گلہز اور حم کے لئے مفید ہے۔ یہ سادہ غدد کے گوڑ کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔  
کاربو انیمیلس - پستانوں کے گوڑ یا کینسر یا پھوٹی پھوٹی گانٹھیں جو پتھر کی طرح سخت ہوں - بغل  
کے غدد دسویج ہوئے پستانوں سے کھینچنے والے درد کے ساتھ۔

کالی سائیٹیم - دماغ کے گوڑ جو شدید سر درد پیدا کریں۔

آرنیکا مانٹ { دی گئی ترتیب میں ۶ ماہ کے لئے استعمال کیجئے۔ دن میں دو دفعہ صبح ایک  
ہائیپیرکیم { خود کو شام ایک خوراک دیجئے۔  
بریا آئیوڈ - سخت گوڑ۔

## طعی دنبل - گوشتین

برشا کارب - جلن خاص طور پر گردن میں -  
کروٹیلس ہوو - خبیث گوڑ جلن کے ہمراہ  
سٹیفنگیر یا - اعلیٰ گوڑ کے لئے جب کلکیر یا کارب ناکام ہو جائے -

ٹیکہ - ویکسینیشن - حقوجا - اگر ٹیکے (ویکسین) کے ہمراہ دی جائے تو ٹیکہ

کا اثر ہوگا - ٹیکے کے بُرے اثرات کے لئے جیسے کہ اگر زیادہ غیر -  
ویکسینم - ٹیکے کے بُرے اثرات کیلئے سوزش اور متاثرہ حصہ سے مواد کا بہنا -  
انٹم نارٹ - ٹیکوں کے بُرے اثرات کے لئے جب حقوجا ناکام ہو جائے -

## ڈامانٹر

ہو میو پیٹک نکتہ نگاہ سے ڈامانٹھیوری بہت اہمیت رکھتی ہے -  
ڈامان کی گولیان اور کیپول ہو ڈامان اسے بی سی مختلف نکلیات کی کمی کو دور کرنے کیلئے  
دی جاتی ہیں جو روزمرہ کی خوراک میں سے جسم کو میسر نہیں آتیں - ڈامانٹر کی حقھیوری اتنی کامیاب  
حقھیوری نہیں ہے - ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی جسم کو خوراک میں سے ڈامان حاصل کرنے  
کے اہل بنا ضروری ہے - ایسے ہو میو حقھی معقول شہادت دیتی ہے - یہ مرن مخروں ادویات ہی  
نہیں رکھتی جو جسم کو نکلیات کی کمی پورا کرنے میں مدد دیتی ہے - بلکہ ادویات نظام جسم کو خوراک  
میں سے مطلوبہ ڈامان استعمال کرنے کے اہل بنا دیتا ہے - مثال کے طور پر کیلسیم کے نکلیات  
کی کمی آسانی کے ساتھ کلکیر یا ناس ۶ طاقت یا کم طاقت میں دینے سے پوری ہو سکتی ہے -

## مُسے - موکے -

حقوجا - ایک ساتھ ابھرنے والے مسوں کی طرح کی ٹھنڈیاں  
سرکے پھل طرف - ٹھوڑی وغیرہ پر چٹے سیاہ مسے - بڑے بچوں جیسے تھے والے بعض

اوقات ان سے نمی خارج ہو اور آسانی سے خون بہے۔

کلکیر یا کارب۔ چھوٹے سنگ جیسے تھے بہت زیادہ تعداد میں غاروں میں پائے گئے اور ڈنگ گئے جیسے دروازے تھے۔ سوچے ہوئے اور نامور تھے۔

سلفر - سخت در دوائے اور ٹیکن دار۔

فیڑم بیور۔ ہتھیالیوں پر مے۔

کالی میویر - ہاتھوں پر مٹے۔

سیدیا۔ سرزدر کے کنارے پر مئے۔ جسم پر۔ بڑے سخت اور سیاہ مئے۔

کاسٹینک۔ مے جو بنیاد پر سے نرم ہوں۔ سینگ جیسی سطح پر۔ ماتھوں اور بازوؤں پر سے  
پلکوں اور چہرہ کے مے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے مے۔

روحانی - سے دردوں والے - چھوٹے ہاتھوں کی تھیلیوں پر ہمارے۔

ڈلکا مارا۔ ہاتھوں کی پشت پر مٹے۔

سٹیفسکیہ یا آتشک یا سوزاک کے باعث تھے۔ خشک تھے والے تھے۔ گو بھی کے  
پھول جیسے پارے کے غلط استعمال کے بعد تھے۔

نائبِ سرگ ایسٹ۔ سے آلاتِ تامل پر کے مے سائیکو میڈیا سفلینک بڑے بڑے دانے دار۔ تنے دار۔ دھوئے پر آسانی سے خون ہے۔ نمی خارج ہو چکے والی ۔

میگنیشیا سلف - سارے چہرے پر مٹے۔

سبب بنتا۔ آتشکی یا سوزاکی مے، ناقابل برداشت خارش اور جلن کے ساتھ۔

فیرم پیکرِ حکیم - کئی لکھی تے - ہاتھ مسوں سے بھرے ہوئے ہوں - چنڈی یا گٹھوں کے لیے یہ مخصوص دوائی ہے -

نیٹرم کارب - ہاتھوں کی متعلیوں پرے - بھونے پر دکھیں

اٹانگوں کی سوچیں۔ بھڑیاں (سوکھاسان بھی دیکھئے)

لائی کو لوٹیں۔ تجری دار اور بیمار دکھائی دے گا خاص پر جسم کے والا حصہ مانتے پر چھ ہاں ہوں۔